



y

20036/D  
t.f. m. vol II

12/-

JONISTON, J.

Barium Chloride. Potassium. No. 1.

Hunter

28 July 1895

p. 18  
182/99  
718









5212

# CELEBERRIMO VIRO

## D. HERMANNO BOERHAVEN

Medicinæ & Botanices in Academia  
Lugdunensi Professori .  
S. P. D.

HENRICUS RUYSCH.

**S**apientia summi Creatoris ex omnibus quidem rebus elucet, præsertim tamen e creaturis, quas sapientissimus opifex in hoc terrarum orbe posuit. Scilicet earum non tantum genera sunt adeo multiplicia, ut ingenium humanum vix eorum numerum capere possit; sed singulorum species sunt tam variæ & tam multæ, ut plane sit impossibile singulas comprehendere memoria. Adde, quòd diversæ regiones diversa etiam omnino animalia producant, quæ aut in aliis prorsus ignota sunt aut saltem rarissime videntur. Hinc excitata cupiditas ac diligentia eorum, quibus gratum est Divinæ Sapientiæ opes speculari, ad indagandum quidquid ubique est animalium. Dices id etiam non infeliciter tentatum jam à veteribus fuisse; fateor sua illis laus debetur, sed posterorum diligentia adeo non cedit eorum sedulitati, ut eam etiam longissimè superet. Si spectes, tam in regno vegetabili quam animali, quid debeatur veteribus, quid posterorum laboribus, non dubito, Vir Cl. quin fassurus sis nihil æque hoc nostro tempore excultum fuisse ac studium rerum Naturalium. Illud tamen dolendum est, gloriam istam exteris præcipuè deberi, licet nos nulli in toto terrarum orbe cedamus genti, si studium adeundi longinquas & dissitas regiones respicias, unde cumprimis singularia in hanc terram possint adduci. Verum plerique omnes in exteris regionibus degentes totos sese tradunt mercaturæ, nec alia cupiditate ducuntur. Non dico illud mercaturæ studium aut illaudabile aut improbum, sed dum illud excolitur, alia, unde magna etiam utilitas redundat, non debebant negligi. Quod si jam unus aut alter, quales fere sunt Ecclesiarum in India ministri, aliquod tempus tribuant istarum rerum indagationi, id fere non fit, ut viris cordatioribus isto modo satis fiat. Nempe testimonio erit hæc, quam Tibi consecro, Collectio. Videbis ibi pisces orientales plures quam trecentos, qui delineati sunt in Insula Amboina ab homine nec improbo quidem nec aliarum rerum imperito, sed forsan non satis docto in arte pingendi. Is enim cum ibidem conciones ad populum haberet, & ceteras res, quæ pertinent ad religionem, per aliquot annos curaret, otium sibi reliquum posuit in piscibus istius tractûs delineandis. Quod si ille aliquanto peritior pingendi fuisset, quæ hominis erat cupiditas bene merendi de literis, forsan per eum haberemus absolutum systema piscium Orientalium, sed bene cupienti defuit facultas ad finem perducendi ea, quæ bene destinaverat.

Icones ita depictæ cum incidissent in manus Wetsteniorum, ii rati sunt non esse committendum, ut prorsus perirent, quoniam multa in iis essent bona, multa forsan posterorum indagine detegerentur, quæ nunc veritati minus



videntur consentanea, quia nobis experientia earum rerum deest. Ego vero bonas aliquot horas in iis describendis posui, & ex proprio Museo, ac scriniis Lamotii quondam verbi divini Ministri vigilantissimi in Ecclesia Mauritiana quædam addidi, quæ ut animo facili accipias rogo, quæsoque. Parva sunt, non diffiteor, quæ nomini tuo tanto inscribere audeo, sed magis facio id, ut publicè profitear me plura tibi debere, quam ut ita velim significare me quod debebam persolvissè. Scilicet postea, ut spero, si Deus otium concedet, dabitur opus aliquod, omnibus partibus absolutum. Hoc tantum pro tempore sic editur, donec per otium in singula quæ jam in manus meas inciderunt, ac postea reperientur, inquisivero. Non dubito tamen, quin hæc mea amicitiae testificatio sit Tibi futura gratissima. Et cui, quæso, alii hæc forent gratiora, quam Tibi per quem Rei Medicæ & Botanices studio sua constat laus & suus honos? Id testantur tum Opera tua præclara, tum vox unanimis exterorum undique ad Te audiendum concurrentium, qui domum reversi libenter agnoscunt se Tibi debere quidquid in Medicina præclarum sciunt ac eximium. Accipies igitur, Vir celeberrime, hoc quantulumcunque, quod in hoc Theatro meum est. Vale, Vir exime, & perge bene mereri de Medicina, id est de toto genere humano. Amstelod. Nonis Maii. MDCCXIX.



# P R Æ F A T I O

A D

## L E C T O R E M.



Nihil æque præstantiam hominum supra bruta animantia commonstrat quam discendi cupiditas ac amor scientiarum. Hic & illa faciunt eum ceterorum omnium, quæ Divina potentia produxit, regem. Licet enim non diffitendum sit, nos multò esse celeritate & viribus inferiores quam quædam animantia, quæ a natura ficta sunt ad terram prona; illud tamen constat homines tantum sapientia reliquis animalibus præstare, ut mera stultitia sit comparisonem inter hæc & illos velle instituire. Sint cervi veloces, valeant leones, ursi, aliæque feræ, viribus; humanum ingenium veloces cervos capere, leones & ursos feroces domare novit. Nec sane quidquam laudis accedit ad feras e notissima fabula de leone cum homine iter faciente. Is enim cum homo ei ostendisset virum pictum aut fictum, qui leonem occidisset, respondisse fertur, quòd, si leones novissent pingere, ubique talia monumenta reperirentur. Neque etiam quidquam officit laudi humano ingenio debitæ, quod Boilavius, egregiis inter Gallos poëta, falsè eos ridet, qui regem vocant hominem ceterorum animantium, quum tamen in desertis ursi non timeant hominem, regem scilicet suum, sed homines urfos. Recte quidem illud: quis enim negabit à ferocitate earum ferarum timendum esse? Verum nullo modo efficere poterunt feræ, quin succumbant hominibus in eorum capturam armatis. Si hominibus libet aliquam regionem habitata anteà à feris incolere, protinus illis est cedendum, atque aliæ sedes quærendæ, ni omnes ad unam velint occidi. His possis plura alia addere, quibus omnis vis atque robur omne detrahatur argumentis & Fabulatoris veteris & Boilavii. Ingenium ergo solum est laude dignum. Reliqua illi serviunt. Attende mihi animum ad singulas disciplinas & artes, quæ quasi totidem indicia sunt præstantiæ humanæ, nihil illis opponere possit par aut simile universum genus animantium. Didicimus quædam ab Hippopotamo, ab Ibide, atque aliis animantibus. Num ideo eorum solertia in censum venire debet? Quod illi faciunt instinctu naturæ, nos ratione facimus. Eos quidem nos imitati sumus, sed ratio nostrà atque mens facit, ut nobis liceat ab illis exemplum capere. Si quidquam in illis esset vicissim rationis, illi etiam à nobis quàmplurima didicissent. Quod quum hætenus à nemine sit observatum, constare mihi videtur etiam in hac re nullam animantibus ceteris deberi laudem solertiæ, quæ solis hominibus propria ac perpetua est.

Illud tamen e contrario est observandum, hominem quàmplurima debere benignitati Divinæ, quæ eum imposuit regem quasi universo Terrarum orbi. Contemplare quidquid ubique est, illud aut tuum est aut hominum tibi simile. Omnia, quæ e terra nascuntur, aut ex ea cibum capiunt, prorsus subsunt hominum potestati, qui nondum omnes suas divitias novit, quatenus multas res ignorat, quæ ipsi aliquam adferrent utilitatem, si illis rectè uti novisset. Quam parum notæ sunt omnes arborum, fruticum, & plantarum species! Quam non cognita sunt universa animalia, quæ in singulis regionibus reperiuntur! Quis omne piscium genus novit? quis in censum retulit? Nemo sane; nec est illud unius hominis aut ætatis. Veteres quidem jam ante Aristotelem & ipse Aristoteles, vir egregius, multum temporis posuerunt in describendis animalibus & eorum proprietatibus, quæ in re etiam singularis est Æliani laus, verum tantum abest, ut illi satisfecerint huic argumento, ut etiam post illorum tempora plures exstiterint præclari viri, qui non vulgarem sibi laudem quæsiverunt & corrigendo, quæ perperam erant ab iis posita, aut addendo, quæ illi omiserant. Quid, ut alios mittam, Rondeletius, Gesnerus, Aldrovandus, Bellonius, Raius, Jonstonus, Willoughbeius, Pettiverus, atque alii quàmplurimi, non in hac parte præstiterunt? Ii detexerunt errores veterum multos, sed præcipua eorum diligentia elucet tamen in exhibendis magna multitudine cujusvis generis animantibus, quæ fuerunt veteribus ignota. Scilicet illi non solum iconibus fecerunt, ut omnia quasi subjicerentur curiosorum oculis, sed ipsis iconibus veluti vitam dedere accuratissimis descriptionibus, quæ Lectorem docent quid cuique animanti sit proprium ac singulare, quid cum aliis commune. Ergo res eo deducta est ab illis scriptoribus, ut eo



## PRÆFATIO AD LECTOREM.

rum scripta sint habenda universæ Naturæ compendii instar, in quo exiguo sumptu homines studiosi possunt contemplari singula animalia, & eorum naturam discere ac species.

Verum licet in istis operibus permulta ac præclara exhibeantur solertiæ humanæ testimonia, non cogitandum est tamen jam istud argumentum esse exhaustum, ac nihil ulteriori aliorum diligentia aut inquisitioni relictum. Tanta est potestas Divina ac ejus opera tam latè patent, ut non credam ea unquam omnia expositum iri oculis aut menti humanæ. Scilicet, quo plura repereris antè non cognita, eò plura comperies incognita superesse, quæ novum laborem merentur ac indagacionem. Ea res visa fuit mihi semper præclarum ac summum infinitæ Sapientiæ ac Potentiæ Divinæ testimonium. Nam cum nos homines sciamus nos esse multo præstantiores quam reliqua animantia, nostrâ sorte tamen contenti vix sumus, sed discendi nostra cupiditas, quæ multa nobis commoda affert, id habet incommodum, quod perversa quadam curiositate vult inquirere in naturam ac potentiam Divinam, ut possit inter se & illam comparacionem instituere. Illud tamen ne fieret diligenter cavet summus ille rerum Opifex, sed e contrario fecit, ut prudens ingenium semper reperiret materiam celebrandi ejus immensam Potentiam ac Sapientiam. Scilicet, si homo posset comprehendere quidquid Deus creavit ac fecit, sciret saltem ab ea parte quantus esset Deus, atque ita quodammodo suo ingenio complecteretur Divinitatem, quanta quanta esset. Inde in quibusdam nasceretur contemptus Divinitatis summæ, quæ non esset major, quam ut cadere possit sub sensum. Nunc autem quasi in mare aliquod profundum immergimur, si Divina opera contemplamur, neque usquam exitum reperimus, sed omnis nostra diligentia in admirationem vertitur, & quo longius procedimus, eo major & magnificentior Potentiæ Divinæ in nobis nascitur imago, licet multum illi desit ad perfectionem.

Omnis ergo inquisitio in naturam rerum creatarum, genera & species animalium, & in res hujuscemodi alias, in gloriam Divinæ Potentiæ vertitur. Neque cogitandum est unquam nobis materiam admirationis aut diligentia defuturam. Laudanda est eorum cura, qui ad discendum undique congerunt opes Naturæ semper parturientis aliquid admirabile, atque dicendum est eos tantum mereri de sua ætate non solum, sed etiam de posteris, quantum quisquam aliquo modo mereri possit. Per eos enim licet nobis oculos & animum pascere jucundissimo spectaculo & utilissimo. Contemplare mihi hoc Theatrum, vere Theatrum dices. Aërea, terrestria, atque aquatica animantia in illud sunt collata ac suis locis, generibus, & speciebus, quantum potuit fieri, digesta. Jonstoni in eo est laus præcipua, ut qui primus est ausus opus tale systematicum suscipere, verum nec meæ diligentia, ut spero, defutura est adprobatio eruditorum hominum. Nempe quum tam e quadrupedibus quam aliis animalibus, ac eorum partibus, medicina possit parari, meum esse duxi Lectori exhibere notitiam, tam morborum quibus remedia ex animalibus petuntur, quam animalium, quæ talia remedia præbent. Talem igitur indicem singulis præposui hujus Theatri partibus, e quo studiosus Lector statim atque uno intuitu potest discere remedia, quæ passim in singulis Theatri partibus indicantur.

Peculiare tamen est ac palmarium Additamentum Collectio Piscium Amboinensium & vicinarum Insularum Orientis, quarum icones ante menses non ita multos ex istis locis allatae in manus Westeniorum, ut in Dedicatione dictum est, devenerant. Ego autem eas feci publici juris, adieci brevem descriptionem, atque icones præterea aliquot piscium aut alibi à parente meo editorum, aut nunc demum e Museo meo prolatorum, addidi. Longe plura potuissem addere, quum a longo satis tempore non indiligenter versatus fuerim in Naturæ istiusmodi divitiis conquirendis, nec fuerim infelix in reperiendis; verum rationem non unam habeo, quæ me perpulit ad differendum istum laborem in aliud tempus. Si patuerit hunc non ingratum fuisse laborem eruditis lectoribus, deinde Mantissam aliquam huic adjiciam, & tum, spero, si hoc contigerit, videbit Lector, quam sim religiosus in depingendo animalia aut pisces, aut in iisdem describendo. Utere igitur hoc labore ac conatibus meis fave.







Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, possibly organized in columns.



# COLLECTIO NOVA PISCIUM AMBOINENSIIUM

partim


IBI AD VIVUM DELINEATORUM,

partim

EX MUSEO HENRICI RUYSCH M.D.

XX. Tabulis comprehensâ.

## TABULA PRIMA.

1. E TAFELVISCH, ita dictus ob singularem, quam Amboinensibus præstat utilitatem, quum fere in lautioribus epulis adhibeatur, tanquam eximium aliquod ferculum. Sapore dicitur non ab-  
similis esse passeribus nostris, magnitudine etiam major. Maculis variis est insignis, corpore striato, quod in superiori parte satis magnam habet pinnam, aculeos habet novem, sex in summo corpore, tres ante dictam pinnam, & totidem post eandem, quibus tres aliæ sub ventre respondent.

2. DE MOORSCH E AFGODT, five *Idolum Maurum*. Huic pisci nomen istud dedere nostrates, quia Mauri quadam religione prohibentur eo pisce vesci, quin potius, ubi in eorum retia incidit, eum dimittunt liberum. Eorum tamen superstitio non prohibet Christianos, quo minus comedant hunc piscem, sed as-  
sum, nam coctus non valet, neque saporem habet satis gratum. Superiore quidem est multo minor corpore, nec aculeos habet, sed dentes, & tamen ejusdem videtur speciei, quum & figura satis conveniat, & pinnam similem habeat in summo corpore, at rostro porcino præditus est.

3. DE VAANDRAGER, five *Signifer*, ita dictus, quod se quasi ducem præbeat aliis minutis piscibus, qui eum magno numero quasi ducem sequuntur. Figura cum duobus superioribus fere est eadem, licet corpusculum sit multo minus, ac squammis obsitum. Ex figura tamen patet eum esse ejusdem cum istis speciei. Esui est ineptus, nec ob aliam rem capitur, quam quod elegantissimis coloribus sit pictus, & ideo etiam in liquore à talium rerum æstimatoribus servatur. Tam mansuetus est, ut

adnatet cibum porrigentibus hominibus, atque ideo facilis captu. Ceterum non omnes ejusdem nominis pisces undiquaque cum hac icone conveniunt, sed exigua differentia est, quæ fecit, ut ex tribus aut quatuor speciebus unam tantum curaverim exhibendam.

4. HET WAFELYZER, five *Atropta*. Ita dicitur à nostratibus in India degentibus, quia oris extremitas fere desinit in figuram instrumenti istius, quo crustularii utuntur ad excoquendas crustulas. Saltem similitudo rostri, aliquo modo ad figuram istius instrumenti accedens, suffecit ad nomen huic pisci reperiendum. Toto corpore est fuscus, excepto quod maculis quibusdam coeruleis inficiatur, quod plerumque indicium est pisces iis insignitos venenatos esse. Ideo neque Mauri neque Christiani audent hoc pisce vesci.

5. ICAN SWANGI, five *Speervisch*. Nomen est generale, quo indicantur omnes pisces, qui aculeos habent five pinnas productiores. Eo nomine saltem vir iste, qui mihi delineationes istas tradidit, adseverabat omnes istiusmodi pisces vocari, qui habent tales aculeos; nam piscem, qui alioqui proprie *Ican Swangi* vocatur, exhibuit parens meus in Thef. Animal. I. Tab. II. ubi depictus ad objectum & descriptus extat, ac inde in hæc Tabulas translatus. Vid. Tab. V. N°. 19. Hic vero piscis, quem nobis hoc loco delineatio repræsentat, videtur esse Scorpæna Rondeletii, Gesneri, & aliorum. Exhibetur certe à Rondel. p. 201. & à Gesn. p. 846.

6. ICAN SWANGI. Eodem, ut vides, nomine vocatur, quo superior, sed tamen multum differt, si figuram respicias. Verum satis est, quod aculeos habet in dorso venenatos. Pinnæ laterales sunt satis latæ & magnæ. Os magnum est, cir-



ris duobus propendentibus ex inferiori mandibula. Esui est prorsus ineptus, quod & venenatus est & præterea exiguus admodum.

7. ICAN SWANGI. Exigua differentia est inter hunc & superiorem piscem, quum pro duobus cirris in inferiori mandibula tantum duos alios habeat ventrem versus, & pinnæ tenui pelliculo sint junctæ; secus ac in superiori vidimus.

8. ICAN SWANGI. Corpore est hic piscis striato & maculoso, in ipso capite quinque aculeos habet in caudam reflexos. Pinnæ in dorso sunt aculeis venenatis præditæ. Ab inferiori mandibula duo cirri dependent. In latere, sive sub branchiis, adeo latas habet pinna, ut fere videatur accedere ad volatilium piscium genus.

9. ICAN SWANGI. Idem fere dicendum est de hoc pisce, quum & ille sit striato & maculoso corpore, ac habeat aculeos in capite & dorso, verum isti fere ad caput vergunt, quod longe aliter se habet in præcedenti pisce.

10. ICAN SWANGI. Colorem si excipias, nulla differentia est inter hunc piscem & proxime antecedentem. Est autem utriusque color partim subcœruleus, partim flavescent, verum eodem corporis loco qui color in uno flavet, in altero cœruleus est. Hinc omnis differentia.

11. ICAN SWANGI. Cauda huic pisci est tricuspis, color nescio quid viriditatis præfert. Dentes habet satis acutos, squammas & caudam rubescentes. Supra oculum unam pinnam, alteram infra oculum ostendit, atque ita differt ab aliis cognominibus, quos hætenus exhibuimus.

12. ICAN SWANGI. Et hic piscis quam proxime accedit ad istum, quem numero octavo descripsi, præterquam quod cauda & pinnis magis sit similis proxime præcedenti pisci, quod intuitibus facile patebit.

13. ICAN SWANGI. Si compares hunc piscem cum altero isto cognomine, qui numero decimo exhibetur, non magnam reperies differentiam, adeo similes sunt inter se. Licet hic satis magnus sit, non audent tamen Amboinenses eo pisce vesci, quod ductus quidam cœruleus, quasi vena, reperiatur intra illum piscem; quæ res cum veneni, ut jam dixi, indicium præbeat, haud libenter quisquam periculum faciet de sapore hujus piscis, metu veneni.

14. ICAN SWANGI. Tres satis magnos aculeos in dorso ostendit, quartum etiam in ventre non procul à pinnis, quæ

caudæ sunt proximæ. Ceterum est colore simpliciter nigricante, sine ullis maculis, nisi quod in capite & cauda quædam reperiantur, nec vividi coloris nec valde magnæ, & ideo vix memoratu dignæ.

15. ICAN SWANGI. Similem huic piscem exhibet Tabula tertia loco primo, sed majorem. Vide tamen, quæ ibi dixi.

16. ICAN SWANGI. Dentatus est hic pisciculus, & cauda singulari modo trifida. E capite duo aculei, pro magnitudine pisciculi ingentes, prominent, & à ventre duo alii non dissimiles dependent. Præterea longiuscule productas pinna habet, tam in infimo ventre, quam in lateribus. Cum aliis ejusdem nominis hoc habet commune, quod corpusculum sit lineis variegatum.

17. ICAN SWANGI. Quod attinet ad aculeos prominentes, hic piscis non est dissimilis à superiori, sed magna conspicitur differentia in ipso corpore, quum hic, ut superior, lineis sive striis non sit variegatus, sed maculis rubris insignitus. Venenatus etiam non est, sed in cibum adsumitur ab Amboinensibus. Octo fere pollicum est magnitudo.

18. ICAN SWANGI, cui etiam apud nostrates nomen est de *Paarsche Speer-visch*. Scilicet quum colore sit nonnihil in violaceum vergente, statim inde sumpta est occasio nominis. Videtur autem caprisci species, qualem exhibet Rondeletius Lib. V. c. 27. Galli & Siculi, ex Gesneri observatione, porcum appellant, quo nomine etiam alibi apud Strabonem occurrit, forsan ideo quod sit ore porcino. Idque fit mihi tanto verisimilius, quia pictor autoptes referebat caput hujus piscis tantum esse, ut fere reliquam corporis partem æquaret. Carne est non insipida sed grata & pingui, quapropter libenter eâ vescuntur incolæ.

19. ICAN SWANGI. Ventre est hic piscis prominenti, è quo duo cirri maculosi dependent, dentes habet acutos, aculeum ad caudam projectum in dorso, ac alium in imo ventre, qui uterque junguntur pinnis ad caudam vergentibus. Alioqui videtur quodammodo accedere ad formam piscium cognominum, qui exhibentur loco primo & secundo hujus Tabulæ. Nam quod hic maculas duas, Lunularum sibi invicem obversarum similitudine, in corpore habet, id forsan huic pisci fuit peculiare.



## TABULA SECUNDA.

I. **DE GROTE SPEERVISCH.** Ita dictus est ab aculeo è dorso prominente. Non dubium est, quin hic piscis sit etiam caprisci species. Id satis ostendit aculeus, quem in summo dorso ostendit. Jonstonus Tab. XXXVIII. N°. 3. exhibet etiam piscem huic non dissimilem ex Marcg. Hist. Brasil. quem *Acaramucu* vocat, ac ita describit, ut ejus descriptio satis cum iconè istius piscis, quem hic exhibeo, conveniat. Capitur prope Amboinam, non ubique, sed tantum circa istum locum, cui à tribus fratribus nomen est. Pellis huic pisci est crassa ac dura. Hanc illi detrahunt incolæ, ac postea elixum mensis inferunt. Sapore est proximè ad carnem vitulinam accedente.

2. **DE SPEERVISCH.** Non multum hic differt à superiori, nisi quod minori corpore sit, aliis maculis insignitus & dentatus; nam si aculeum respicias aut pinnas, satis inter se conveniunt, atque ideo habendi pro duobus ejusdem generis tantum sed etiam speciei piscibus.

3. **DE SPEERVISCH.** Nomen huic simile est, quod duobus superioribus, ac eadem nominis ratio. Figura tamen aliquantisper ab istis recedit. Aculeus, quem in dorso habet, spiculis brevioribus est armatus. Præterea tam in dorso quam sub ventre minores aliquot aculeos habet, qui tenui membrana in superiori parte sunt juncti. *Lupi marini* nomine ab aliis vocatur, licet multum differat ab eo pisce, qui eodem nomine apud Ichthyographos occurrit. In cibum adsumitur hujus piscis caro, sed quum ingrati sit saporis & admodum sicca, fere solet sale conditus in usus domesticos adservari, ac tum satis bona est.

4. **DE SPEERVISCH.** Adhuc voluit noster pictor hunc piscem iis annumerari, quibus aculeus in dorso nomen dedit, sed, ut verum fatear, non incommode in Tabulam primam retulisset, ubi alii exhibentur, qui non multum ab hoc differunt. *Guapervæ* speciem possis dicere, quo nomine similem piscem exhibent Jonstonus & Willoughbæus. Vide infra Tab. XIX. N°. 1.

5. **DE SPEERVISCH.** Nihil fere huic pisci singulare est, quod non etiam observatur in superiori, si excipias, quòd superior præter longissimum aculeum sex alios habeat ab utraque corporis parte; hic vero, præter istum in dorso aculeum, non habet nisi unicum in imo ventre reflexum ad caudam.

6. **DE GROTE BEDRIEGER,** quasi dicas *Magnus Impostor*, quod nomen illi adhæsit è singulari oris forma ac consuetudine. Scilicet quum asellum nostrum minorem magnitudine æquet, & accedat fere ad carpionis figuram, ex ore tamen, cum opus est, emittit quasi quoddam prostoma, quod latissime patet, ac illi inservit ad pisces minutos capiendos, quos decem aut duodecim unica vice deglutit; postea vero retracto prostomate clauso ore natat, eo modo, quo caput exhibui N°. 7. Editur ab incolis, quibus gratissima fercula ex hujus piscis carne conficiuntur.

8. **ICAN RADY,** sive *Piscis retiarius*, quòd squammæ in retis ferè modum sese ostentent. Difficile est singulos pisces ad suas species revocare, verum hic quam proxime convenit cum *Peixe Porco* Lusitanorum, quem sub nomine *Guapervæ* exhibuit Piso. Possis etiam referre ad *Gobionis* sive *Paganelli* speciem, qui exhibetur apud Rondel. Lib. VI. c. 16. Præter aculeum, qui pinnis adhæret in summo corpore, sub ventre alium habet aculeum, sed non adhærentem pinnis, quæ ab ano initium capiunt, & ad caudam usque continuantur. Cauda est bifida acuminata. Illud cum aliis hac Tabula propositis piscibus habet commune, quòd cute sit dura, quâ detractâ in cibum adsumitur. Reperitur ad eam Amboinæ partem, quam nostrates *De Pas* vocant, sed rarissime capitur.

9. **DE STREPELING,** quem commode *Pisces striatum* Latine possis dicere, quia nomen illi est inditum à variis & versicoloribus lineis, quibus passim insignitus est. Pinnarum figura est admodum singularis, quibus etiam adhærent minutiores adhuc pinnulæ. In dorso novem aculeos habet, verum in aliis ejusdem speciei piscibus non semper idem numerus observatur. Aliquando plures habent, aliquando pauciores.

10. **DE STREPELING.** Lineæ per corporis longitudinem ductæ magis huic & sequentibus aliquot piscibus nomen invenerunt, quam figuræ externæ aliqua similitudo cum proxime præcedenti pisce. Aculeos in dorso habet sex, qui tenui membrana sunt juncti, atque pinnis adhærent, quæ inde ad caudam usque continuantur. Sub medio ventre alium aculeum habet, sed unicum tantum.

11. **DE ALPHOREESHE STREPELING.** A loco, ubi capitur, eo cognomine indicatur. Aut parum aut nihil à superiori differt, excepto colore corporis & linearum, quæ in hoc rubent, in illo cœlum æmulantur. Et hoc & priori



vescuntur incolæ, præsertim assis; nam alioqui minus gratum saporem palato præbet.

12. DE STREPELING. Ut in duobus prioribus tres lineæ conspiciuntur, ita in hoc quatuor vides, sed non omnes ad caudam vergentes, quum duæ superiores abeant ad dorsum. Colore est subviolaceo, pinnæ sunt fuscæ, nec præterea quidquam singulare reperitur in hoc pisce.

13. DE STREPELING. Hic est ejusdem speciei, & nulla est differentia nisi in pinnis & in colore. Nam nullos aculeos habet, sed tantum pinnae sine aculeis. Color est subflavus, pinnæ nonnihil virides, unde gratissimo adspectu oculos intuentium in se fixos tenet. Ad eam Amboinæ partem capitur, quæ ab incolis Honimo vocatur.

14. DE STREPELING. Si unum sub ventre aculeum, & quinque in dorso excipias, nihil differt à proxime præcedenti, atque adeo singula, quæ isti conveniunt, etiam de hoc possint dici. Incolæ libenter hoc pisce vescuntur, sed cocto & in aqua calida apposito, ut apud nos perca mensis inferuntur.

15. DE STREPELING. Satis ille etiam convenit cum aliis cognominibus piscibus. Sub ventre duos aculeos habet, & ii conficiunt omnem differentiam inter hunc & proxime præcedentem.

16. DE STREPELING. Medium corpus hujus piscis à capite ad caudam notatur linea flavescente, quæ ad utrumque latus mutatur in dilute coeruleum. Ajunt hunc piscem harengi magnitudine esse, & gratissimi saporis. Mihi quidem & hic & plerique omnes pisces cognomines videntur esse è genere Cyprino lato.

17. DE STREPELING. Sex omnino lineas in corpore habet hic piscis. Armatus est dentibus acutissimis & aculeis novem in dorso, duobus in ventre, quorum postremus adhæret pinnis ad caudam decurrentibus. In ea Amboinæ vicina insula capitur, quam incolæ Hilam vocant. Ad cibum utilis est & bonus, sed præsertim sumptus cum jusculo acetario.

18. DE STREPELING. Nisi satis sit, quod pisces unam aut alteram lineam in corpore versicolore habent, ad locum illis inter *Striatos pisces* inveniendum, hic vix suum locum videtur posse tueri. Sed quia noster autoptes voluit eum hoc nomine indicare, mihi non sumo tantum auctoritatis in alienum laborem, ut eum hinc removeam. Est igitur corpore, ut vides, oblongo, in dorso pinnae habet exiguo interstitio inter se distantes; verum in imo ventre prioribus dorsualibus nul-

læ respondent, quum ibi sit cavitas ventris, quæ in hoc genere pinnis non solet ornari. Ab ano usque ad caudam aliæ reperiuntur in ventre pinnæ. Capitur eo loco, quem nostrates De Pas indignant.

19. DE STREPELING. Et hæc est species ejusdem generis, sed armata spinis tam dorsualibus quam ventralibus. In dorso enim sex aculeos habet, tenui membranula junctos, ac tandem pinnis adhærentes, quæ usque ad caudam decurrunt. In imo ventre, post anum, etiam sex aculeos habet, sed disjunctos, nec membranula inter se ligatos, aut pinnis caudam versus adhærentes.

20. DE STREPELING. Est hic ut ultimus in hac Tabula, ita etiam extremus istius speciei. Totidem lineas habet, quot proxime præcedens, quinque scilicet, & corporis figura etiam satis inter se convenit, sed hic tantum duos habet aculeos in dorso, statim post caput, qui primum inter se junguntur membranula, ac deinde pinnis adhærent. Eæ, neque in dorso, neque in imo ventre ad caudam usque perveniunt, sed parvum discrimen relinquunt vacuum. Cauda ipsa est bifida, quod etiam in duobus præcedentibus observari meretur.


### TABULA TERTIA.

1. **I**CAN SWANGI. Ex genere armatorum piscium, quibus aculei nomen invenere est etiam hic piscis, quem cum nullo alio rectius possis comparare, quam cum perca Amboinensi parentis mei & Willoughbæi; sed tamen an idem sit piscis dubito. Cauda est acuminata utrinque. In ipso rostro nescio quos parvulos aculeos ostentat, quos duo alii circa oculos, & dein iterum alii magna multitudine in summo corpore sequuntur. Ad pinnae laterales quod attinet, eas non undiquaque bene expressit pictor, ommissa membranulâ tenui, qua inter se coherant. Inde credibile est hunc piscem proprie pertinere ad volatilium genus.


2. ICAN HONIMO, alio nomine vocatur *Piscis Siamensis*. Obstipito capite & ore dentato est. Multiplices tam in dorso quam in ventre spinas habet inter pinnae, sed præterea non procul a cauda est nescio quid, aculei instar, quod ultimo loco inter spinas ponitur. Apud Chineses hic piscis est in magno honore, habeturque inter delicias; verum fere semper utuntur isto pisce asso, rarissime elixo.

3. DE LEERVISCH. Hoc nomine eum vocari libuit nostratibus ibi degentibus, nulla satis idonea causa, nam quod in





























in dorso & ventre, sive potius in utroque latere, aculeos habet, qui quodammodo scalarum ligna transversa exhibent, an ideo statim arripienda fuit occasio ita hunc piscem nominandi. Forſan melius feciſſent, ſi illum à corio rigido ita denominaviſſent, nam ejus pellis corii inſtar riget ac dura eſt. Corpore eſt fuſco, & quatuor aut quinque maculis inſigni. Ceterum, habet dentes & pinnas verſicolores, ut etiam caudam, quæ præterea videtur non deſtituta eſſe aculeis. Dicuntur tales piſces interdum tres pedes aut tres pedes & dimidiatum longi & lati eſſe. Carne eſt gratiſſima, & ideo cupidè emitur tam ab Amboinenſibus quam noſtratibus ibi terrarum degentibus.

4. DE KALKOENVISCH. Videtur ſpecies Ican Swangi Tab. I. N. 16. Minutulus eſt hic piſcis, nec tres aut ſummum quatuor pollices excedit. In capite habet duos aculeos longiſſime prominentes. Pinnæ laterales pertingunt longitudine ad caudam uſque. Ore eſt magno & dentato. A cauda ad caput variis lineis eſt diſtinctus. Cauda etiam eſt tricuspis, ſed ita ut extremitates longius procurrant. Mauri libentiſſimè iſto piſciculo veſcuntur, & dicunt eum ſaporis non ingrati eſſe.

5. MAKREEL ſive *Scomber*, genus piſcis ſatis notum, & qui ubique apud Ichthyographos eſt diſcriptus. In hoc nihil prorsus ſingulare eſt, præterquam quod vividis coloribus ſit diſtinctus, & tam maculis quam linea circa ventrem ornetur. In capite quoque ab oculis aliquot lineæ deducuntur.

6. PASSER FLUVIATILIS, noſtris paſſeribus tam magnitudine quam forma ſimilis. Nec præter maculas albicantes quidquam habet ſingulare aut eximium.

7. ICAN PEIXE, eſt numerandus inter acus, ſed non ſemper accuratè unius eſt formæ. Os habet prælongum & offeum. Color eſt in latere cinereus, ſub ventre dilute grifeus. Lineæ tranſverſales, quæ à tergo ad latus ducuntur, rubent, ac tandem miſcentur cum viridi ſive citrino colore, qui in latere à capite ad caudam procurrit. Ab ore uſque ad caudam novaculæ inſtar acutus eſt, quo fit ut alios piſces inter natandum lædat & ſcindat.

8. JACOB EVERTZEN. Apud Willoughbæum, Jonſtonum ac alios ſcriptores ſit mentio hujus piſcis, ſed forſan non ſatis accurata, quum variæ ſint ejus ſpecies, quæ hic omnes ordine exhibentur. Dicunt inde nomen eſſe repertum huic piſci, quod navales focii navis cujuſdam, cui quidam Jacob Evertzen præ-

erat, eum ceperint primi circa Inſulas Flandricas. Scilicet erat iſte navarcha facie valde maculoſa, & piſcis variis in corpore maculis eſt inſignis; ideo focii navales per jocum navarchæ nomen huic piſci dederunt, quod adeo pertinaciter illi inhæſit, ut jam nullo nomine ſit notior. A Luſitanis vocatur Meros, à Braſilienſibus Gugupu guacu. Videndus præter alios diligentiſſimus Rajus in Synopſi Meth. Piſcium pag. 127. Ceterum dicunt hunc piſcem quodam tempore eſſe aptiſſimum eſui & gratiſſimi ſaporis, alio vero non tantum inſipidum, ſed prorsus ineptum. Nempe ſi ejus carnem igni admoveas, interdum corrugatur & in unum contrahitur corii inſtar, nec dentibus quidem hominum dilacerari poteſt; alio autem tempore caro eſt pinguis, nec ad ignem contrahitur. Tunc bona eſt, & in cibum adſumitur, non tantum in inſula Amboina, ſed aliis quoque locis in India maritimis. Alii piſces, qui hac in Tabula ſequuntur, omnes ſunt ejusdem ſpeciei & cognomines, ſed unica differentia in colore & aculeorum multitudine notatur. Ideo indicabo tantum differentiam. Ad hunc autem Jacob Evertzen quod attinet, iſ fuſco colore inſicitur toto corpore. Aculeos in dorſo ſex habet, qui tandem cum pinnis conjunguntur. Maculæ ſunt albicantes, quæ etiam in pinnis & in cauda conſpiciuntur, licet auctores negent caudam aut pinnas eſſe maculoſas. Willoughbæus tamen in icone hujus piſcis, quam exhibet Tab. T. tam caudam quam pinnas dorſuales exhibet maculoſas.

9. JACOB EVERTZEN. Hunc piſcem homo meus dicebat eſſe femellam ſuperioris, quod quidem verum eſſe poteſt, ſed color utrique non eſt idem. Cetera ad amuſſim conveniunt.

10. JACOB EVERTZEN. Octo habet hic piſces aculeos in dorſo, quorum ultimus conjungitur cum ſpinis. Colore eſt vergente in nigrum, maculæ candidæ. Sub branchiis nullas habet pinnas, ſecus ac videre eſt in ſuperioribus hujus generis.

11. JACOB EVERTZEN. Totidem etiam aculeos habet hic piſces, quot proxime præcedens, ſed colore & maculis convenit cum eo, qui deſcriptus eſt numero octavo. Circa branchias lineolæ aliquot cernuntur flaveſcentes, quod huic piſci eſt peculiare, nec facile in aliis ita obſervatur.

12. JACOB EVERTZEN. Dilute cœrulei coloris eſt, quem hic exhibeo piſcis. Aculeis, pinnis, maculis, & cauda reliquis ſimilis.



13. JACOB EVERTZEN. Nec in hoc pisce quidquam singulare, quod non in aliis itidem occurrit. Proxime tamen convenit cum pisce ultimo loco descripto, qui cum masculus sit, hunc aiunt esse femellam, quod vero dissimile non est.

14. JACOB EVERTZEN. Color huic pisci est violaceus, maculæ sunt albicantes, pinnæ tam in dorso quam in ventre sunt quodammodo rotundæ. Distinguitur autem hæc species ab aliis capite, quod pro corporis ratione multo majus est quam in aliis piscibus, undè etiam illi Capitonis nomen, Belgice *Groot-hoofst*, est inditum, quo signo, quasi characteristico, distinguitur ab aliis piscibus cognominibus.

15. JACOB EVERTZEN. Vix meretur hic piscis eo nomine insigniri, siquidem omnes fere maculosi pisces, quorum nomen ignorabatur, ita vocantur, verum huic nullæ sunt maculæ, si excipias tres aut quatuor, quæ sub ventre conspiciuntur. Aliud quoque nomen ab acuto rostro à nostratibus est ei inditum, qui illum solent *Spitsbek* vocare, nomine fane magis conveniente.

16. JACOB EVERTSEN. Majori jure hic piscis suum nomen tuetur, quum totus sit maculosus, ac in reliquis conveniat cum præcedentibus piscibus, quibus idem nomen est.

17. JACOB EVERTZEN. Et hic piscis, si maculas spectes, eo nomine dignus est, verum videtur pertinere ad Turdos, quales exhibentur à Jonstono Tab. XIII. Hic autem licet mihi fidem nostri pictoris confirmare, quum mihi aliunde sit transmissa hujus piscis Icon, sub nomine *Ican Soufalath*, quæ accurate cum hac, quam exhibeo, pictura convenit. Corpore est rubicundo, maculæ sunt flavæ, qui est etiam color squammarum & imæ partis branchiarum.

18. JACOB EVERTZEN. Caput huic pisci est magnum, os dentibus acutissimis armatum. Idem est ubique color, tam corporis quam pinnarum, fuscus scilicet. Maculæ, ut in aliis, sunt albicantes. In dorso spinam habet supra caput longiorem, sed reflexam ad caudam. Ab imo ventre, ubi caput desinit, duo cirri dependent, qua propter mihi quidem videretur commodius ad aliud genus posse referri quam ad hoc maculosum, verum nolui in ordine quidquam mutare, ne judicaretur nimis acutè in laboribus alienis cernere.

## TABULA QUARTA,

1. **K**LIPVISCH. Minutum genus piscium est, quod hac Tabula comprehenditur, in quorum descriptione est notandum, quod nostrates fere omnes pisces minores, quibus nomen deest, solent piscium saxatilium, sive *Klipvisch*, nomine comprehendere. Nempe passim ad littora inter scopulos magna multitudo talium anonymorum piscium reperitur, qui nullum nomen habent, & tamen quodammodo ad unum & idem genus pertinent. Plerumque ob colorum varietatem à curiosis naturalium rerum indagatoribus in liquore adservantur. Sunt qui non tantum vividis sese commendant coloribus, sed qui maculis etiam aut striis aureis ac argenteis splendescunt. Qui hic loco primo ponitur sex in dorso aculeos habet, quinque circa ipsum ventrem, eà tamen differentiâ, quòd superiores sunt ligati membranula tenui, quæ in inferioribus non cernitur. Cauda est variegata miris modis, quæ res tamen etiam in aliis piscibus observatur, nec quidquam auctoris fidei detrahit.

2. KLIPVISCH. Totum corpusculum hujus pisciculi, qui quatuor pollices magnitudine non solet excedere, est fere nigrum, nisi quod linea candidissima sese ostendet in latere statim post branchias. Notum est apud Ichthyographos plures pisces reperi, qui ita sunt corpore varie colorato, quod non injucundum est ad spectu. Immo ipse aliquot in liquore adservo, in quibus aliquot lineæ candidæ corpusculum, quod alioqui nigricat, distinguunt.

3. KLIPVISCH. Hujus pisciculi caput desinit in acutum rostrum, unde facile, si tanti esset, aliud huic nomen possis reperire. Ventre est laxiore & maculis notato. Pinnæ branchiales longiuscule pro corporis ratione producuntur caudam versus, quæ est bifurcata. Paulo ante caudam observabis lineas duas aut tres versicolores.

4. KLIPVISCH. Ejusmodi lineæ sive striæ versicolores, quæ in proxime præcedenti pisce conspiciuntur, etiam in hoc pisce sunt notandæ circa caudam. Caput est contractum & obtusum, unde etiam non difficile esset illi nomen invenire. Ceterum branchiales pinnæ fere sunt rotundæ. In ventre, præter pinnas post alvum, habet duas dependentes paulo infra caput.

5. KLIPVISCH. Huic pisciculo fere os est simile rostro aviculæ alicujus, quod singulare tantum in illo, nam quod atti-



attinet ad colorem, is violaceus est & hic illic maculis notatus; id commune habet cum multis aliis.

6. KLIPVISCH. Orbis diceret speciem esse hunc pisciculum adeo tumido ventre ac magno capite videtur, cauda in ductum tenuem desinente. Capite & dorso est cristatus, quum novem aculei inde promineant, qui sibi invicem adhærent per membranulam tenuissimam. Alias pinnas in dorso non habet sed in ventre, ubi corpus incipit gracilescere, quo loco etiam videbis tres aculeos, sed, ut in aliis ventralibus etiam vidimus, nullo ligamine junctos.

7. KLIPVISCH. Hic pisciculus est proxime superioris femella, nec inter utrumque alia est differentia, quam quod hic armatus non sit, ut superior. In reliquis prorsus conveniunt, tam quod attinet ad formam & colorem, quam quod maculas spectat & lineas, quibus uterque est notatus. Color autem vergit ad flavedinem, cetera non nihil viridatis ostentant.

8. KLIPVISCH. Paululum forma hujus pisciculi abit à superioribus, sed tamen non omnino est diversa. Variis maculis & lineis notatur præsertim circa caudam.

9. KLIPVISCH. Rarum & ignotum fere pisciculi genus. Tuto tamen referas ad genus Caprinum, quum aculeum erectum habeat in summo capite. Vide infra, hac Tabula numero 20.

10. KLIPVISCH. Neque hoc genus satis notum est. Exiguum corpus & raritas hætenus videntur non meruisse nomen. Colore est gilvo, lineis fuscis, quæ à dorso ad ventrem deducuntur. Tam in summo corpore quam imo pinnae sunt, quales etiam non tantum ad latus branchiales reperiuntur, sed etiam infra branchias binæ.

11. KLIPVISCH. Paulo aliis frequentior invenitur hoc pisciculi genus. Colore est fusco, sed corpus miris modis variegatum est, quasi marmor aliquod venis distinctum. Capite est brevior ac valde obtuso, quodque supra os nescio quam coeruleam maculam præfert, unde peculiare huic pisci nomen est inditum de *Blaauneus*.

12. KLIPVISCH. Inter pisciculos parvos hic fere est minimus, & ideo nulli rei idoneus, excepto quod animi gratia ob raritatem & colorem in liquore custoditur à talium rerum æstimatoribus. Si lagenæ aqua plenæ talem indes piscem, diutissime possis vivum adservare absque ullo alimento. Unde autem veniat, quod quidam pisces ita adservati diu vivant,

alii autem brevi tempore moriantur, licet non indignum sit scitu, hoc tamen loco id indagare nunc non est animus.

13. KLIPVISCH. Mandibula inferior hujus pisciculi est aliquanto productior superiore, venter quoque prominet. In dorso sex aculeos habet pro exigui corporis modulo satis magnos. Sub ventre ab ano ad caudam pinnas habet, ut & in dorso ab ultimo aculeo ad caudam usque.

14. KLIPVISCH. Mirum videtur, quod in hoc pisce quasi foliola quædam ex ipsis aculeis efflorescant, idque alternis. Corporis color vergit ad violaceum, sed maculae quatuor, quas in corpore cernis, sunt albicantes. E ventre duæ pinnae propendent non longè infra caput. Caudæ additur quasi præsegmen, alterius coloris quam caudæ, quæ subviridis quidem est, sed extrema ista pars flavescit.

15. KLIPVISCH. Paulo reliquis piscibus hætenus in hac tabula propositis est major & crassior. Ideo à popello capitur & in cibum adsumitur. Corpus est colore nigricante ab ore usque ad caudam. Præter unum aut alterum aculeum in summo tergo, tertium habet longiusculum, sed reflexum ad caudam. Maculae, quæ in lateribus observantur, sunt exiguae, sed dilutè coeruleæ.

16. KLIPVISCH. Multa hic piscis, quod ad formam attinet, communia habet cum isto pisciculo, qui numero quinto hujus Tabulae est descriptus, nec ulla fere differentia est, præterquam coloris, qui quodammodo coeruleus est. Præterea circa anum dependet pinna. Venter est prominulus, atque aliquot maculis notatus.

17. KLIPVISCH. Idem fere in hoc pisce color est, qui in superiore, sed formæ aliquantum inter se differunt. Capititur in ea insula, quæ à nostratibus Hila vocatur, verum rarissime, & ideo vix notus est apud plerosque etiam ibi degentes. Pinnae branchiales sunt rotundæ. Sub ventre pinnam habet tricuspitem. Cauda est bifurcata. Maculae, quas cernis in corpore, non multum differunt à reliquo colore, sed constant tantum è circulis nigricantibus.

18. KLIPVISCH. Hic multo est notior quam præcedens, atque ideo *Basilissæ* cognomine à quibusdam ornatus est. Præter aculeos in dorso pinnam habet, non uniformem, sed lineis rubicundis duabus variegatum. Pinnae branchiales ventrem versus sunt reflexæ. Præterea duæ maculae à dorso progrediuntur versus latera, ubi linea cernitur producta à capite



ad caudam. Eodem capitur loco, quo dixi superiorem inveniri.

19. KLIPVISCH. In hoc pisce singulare est, quod aculeum habet exstantem in medio dorso, inter pinnas priores & posteriores. Ceterum, maculosus est & ore acuto. In corpore exiguas aliquot maculas habet, nec præterea quidquam observatu dignum.

20. KLIPVISCH. Si aculeum, veluti cornu aliquod, supra oculos prominentem adspicias, non dubium est, quin sit hic piscis species Caprisci, qualis exhibetur apud Jonstonum Tab. XXIII. & alios; verum tamen non undiquaque convenit cum pisce ibi descripto, quod etiam necesse non est, quoniam non dico eundem plane esse utrobique piscem, sed ejusdem generis. Colore est violaceo nullis maculis interrupto, sed circa ventrem flavescit, & aliquot maculas cum aculeo habet, eodem modo, qui observatur in figura hujus Tabulæ nona.

21. KLIPVISCH. Est his piscis non alius coloris, quam qui in proxime antecedente cernitur, sed valde differt corporis forma. Multos equidem aculeos habet in dorso, multos in ventre, verum eadem, quam jam supra observavimus differentia, hic quoque obtinet, quod scilicet inferiores aculei nullo ligamine cohæreant, ut isti, qui in dorso reperiuntur.

22. KLIPVISCH. Majoris paulo hic est corporis quam alii pisces cognomines, atque ideo à Mauris in cibum adsumitur. Corpus dilute flavum est, cum versicoloribus maculis in dorso, quæ à capite ad caudam procedunt, sed tanto plerumque minores sunt, quanto eæ propius ad caudam accedunt.

23. KLIPVISCH. Figuram hujus piscis si respicias, non dubium est, quin dicendus sit *Scolopax* rostro porcino, qualis exstat apud alios descriptus. Habet enim, ut vides, rostrum plane simile porcino, & præterea aculeum ad caudam reflexum. Capitur non procul ab insula Borneo, atque non illibenter eo vescuntur socii navales, quod ille sit carne firma, sed tamen pingui.

24. KLIPVISCH, sed non anonymus, quoniam nostrates ei dederunt nomen *bet Princepsje*, quasi parvam feminam principem dicas. Capite est oblongo, corpore striato, in quo linea una corpus percurrit à capite ad caudam, dum tres aliæ transversæ, quasi totidem ligamina, ventrem pisciculi ambiunt. In dorso aliquot aculeos habet, qui terminantur à pinnis ad caudam procurrentibus.

25. KLIPVISCH. A striis, sive lineis,

quas in corpore hujus piscis depictas vides, nomen illi est inditum de *Gebandeerde Princesse*, quasi dicas principem feminam latioribus lineis striatam. Neque hoc neque proximè præcedenti pisce utuntur incolæ ad cibum, sed tamen propter eximios colores, qui non semper in eadem specie iidem sunt, capiuntur, ac in liquore ab amatoribus hujuscemodi rerum adservantur.

26. KLIPVISCH. Nullum nomen peculiare est huic pisciculo, qui tamen videtur esse ex genere triangularium. In dorso tres aculeos ostentat. Pinnas habet tam in dorso quam in ventre; præterea aliquot lineis est notatus a dorso ad ventrem vergentibus, sed earum numerus est incertus, nec color semper idem.


27. DE BOOTSHAAK, sive *Harpa-go*, quod nomen illi impositum est a filamentis, quæ ex ore illius videntur procurrere. Quatuor aculeos habet in dorso, & in lateribus notatus est lineola, a branchiis ducta ad caudam. Referebat meus homo incolas Amboinæ istius modi pisces conditos sale diu adservare, ac cum libet iis vesci, quemadmodum apud nos acipenseris solent, à quo tamen multum distat, si longitudinem spectes. Non est enim vulgo major quam aselli minores, quos vulgo *Schelvisch* vocamus. Mihi autem, ut dicam quod verius videtur, est species Bagræ, ut Markgravius vocat, & ex eo describit Jonstonus, quem vide Tab. XXXVIII.

## TABULA QUINTA.

1. **H**ic piscis à nemine hactenus est descriptus, nec facile poterit ad aliquam cognitorum piscium speciem referri, quum magis monstrum marinum sit quam piscis. Captus fuit prope Bagewalam circa Amboinam anno MDCCVII. Tres pedes cum dimidiato pede erat longus, pelle dura, & aculeatus tam in posteriori corporis parte quam in cauda ipsa. Color ipsi erat dilute cœruleus, sed singulare & mirabile prorsus fuit, quod circa dorsum in priori corporis parte notaretur figura solis satis accurate expressa & flavescente. Eiusdem coloris erant duæ maculæ non procul à cauda. In cauda autem ipsa cernebantur tres maculæ nigricantes. Ceterum aculeis armabatur tam in summo capite quam infra branchias. A ventre duo cirri ad caudam reflexi dependebant. Ut verbo dicam, nihil non monstrosum in hoc pisce erat, qui ideo in dicta insula memoriæ causâ adservatur.

2. DE BOOTSHAAK. Hic, ut vides ejus-











eiusdem nominis est cum pisce, quem ultimo loco superioris Tabulæ descriptum dedi. Si tamen icones inter se conferantur, satis magna differentia reperietur inter utrumque, nec videtur ad eandem speciem Bagræ pertinere, sed undique convenit cum Brasiliensium Tamoata, quem Jonstonus, Willoughbæus, & alii dederunt descriptum.

3. DE GROTE BYTER, quem forsitan haud incommode *Pandaceten* nominaveris. Corpore est magno & crasso, colore fusco, nisi quod linea lata & maculis insignis ducatur per medium latus a capite ad caudam. Dentes habet longos & acutissimos, quibus tam alios pisces obvios, quam quæcunque aliæ, solet appetere. Tres in dorso aculeos habet, quorum ultimus pinnis adhæret, sicut priores inter sibi invicem tenui membranula. Sub branchiis, præter solitas pinna laterales, duas alias habet. Similem huic piscem reperies N<sup>o</sup>. I. Tab. XII. sed notandum hic est, quod multum ii inter se colore differant.

4. DE EENHOORNVISCH, sive *Monoceros*, ita dictu à cornu satis magno, quod è capite prominet. Totum illud est durissimum ac plane osseum, & intus candidissimum. Aculeos habet in dorso, interdum plures, interdum pauciores; circa caudam tres maculas habet, quæ tamen non multum colore differunt à reliquo corpore, quod ad cœruleum vergit. Mira hujus piscis figura non obstat, quo minus incolæ illo utantur ad cibum, ac fateantur carnem esse non ingrati saporis.

5. DE KOFFERVISCH, quod ei nostrates nomen dedere, vertentes in suam linguam nomen Amboinense *Ican Tomtombo*, aliis etiam *bet Strykyser*, piscis triangularis dorso, capite & lateribus spinosis. Vivit fugendo, quod illi commune est cum aliis piscibus cognominibus. Namque illi, quum sint ore parvo, aliis piscibus, aut quibusvis rebus obviis adnatant, ac fugendo succum quemcunque adtrahunt, unde vitam tolerant. Tam pertinaciter autem adhærent, si manui imponas ad periculum faciendum, ut inde difficillime queas divellere. Pelle est tam dura, ut testudinem marinam fere æquet, atque ideo magna vi est findendus, ut possis inde jecur extrahere, quod ajunt oculis mederi simpliciter illitum. Ceterum hic piscis tam in ventre quam in dorso est aculeatus. Toto corpore maculas habet æqualiter magnas, & hexagonas, quod non injucundum est adspectu. In ventre, non procul à cauda pinna crassiores habet dependentes, quod

signum est hunc piscem fuisse femellam, quoniam mares etiam supra caudam, è regione inferiorum pinnarum, tales pinna crassiores habent. Quod semel dictum sufficiat.

6. KOFFERVISCH. Hanc speciem reperies descriptam apud auctores sub nomine piscis quadrangularis ab utraque parte cornuti. Corpus tegitur maculis versicoloribus æqualibus & adpectu gratissimis. In dorso, non procul a cauda, pinna habet crassiores & rotundas, quibus è regione in utraque ventris parte respondent duo aculei in caudam reflexi. Sunt, qui hunc vocent piscem flabellarium, propterea quod ejus cauda quodammodo referat flabellum, quod visum fuit sufficere ad aliquam quamcunque nominis rationem reddendam.

7. KOFFERVISCH. Forsan rectius hunc piscem dicas esse speciem caprisci quam orbis, sed tamen nescio quid videtur commune habere cum orbibus. Magnus venter, caput brevius, nullæ pinna præter binas crassiores circa caudam, quæ singula orbibus conveniunt, verum aculeus, qui solus in capite extat, facit ut libentius eum ablegem ad capriscos. Colore non valde differt à duobus superioribus piscibus.

8. KOFFERVISCH. Inter hunc & superiorem non magna est differentia, quæ fere consistit in pinnarum & oris forma, quam vereor ut pictor recte exprefferit. Atque id tanto majori ratione, quia singula, quæ de superiori pisce dicuntur, etiam de hoc narrentur. Quibus adde, quod Mauri hoc pisce vescantur, sed Christiani omnes ab eo abstinant.

9. KOFFERVISCH. Si conferas hunc piscem cum eo, quem loco quinto hujus Tabulæ descriptum vides, cujus est minor species, exiguum reperies differentiam, quæ omnis consistit in pinnis dorsualibus, quarum priores aculeum præfixum habent, posteriores satis accurate respondent crassioribus istis pinnis, quæ à ventre dependent.

10, & 11. KOFFERVISCHEN. Sunt & illi *Ican Tomtombo*, sed quos rectè annumerabis orbibus fere quadrangularibus. Omnis inter utrumque differentia in eo est, quod prior pluribus maculis sit insignitus, posterior paucioribus, quæ fere latus occupant circa branchias; præterea prior est fusco colore, posterior subcœruleo. Reliqua in utroque sunt paria.

12. KOFFERVISCH. Quod jam de aliis piscibus dixi, nempe alias atque alias videri rationes, quare adscribas huic vel illi generi piscium, idem etiam de hoc pisce



pisce dicendum venit. Verum de ea re nunc litem non movebimus. Pinna in dorso non est aculeata, cauda miris modis variegata, unde à quibusdam etiam vocatur piscis flabellarius. Sit quodcunque voluerit noster autoptes, postea forsitan occasio erit ulterius disquirendi de hoc atque aliis piscibus, de quibus nunc paucis tantum loquor, ad designandum singularia quædam cuique pisci propria.

13, & 14. KOFFERVISCHEN. Egregie etiam illi inter se conveniunt, excepto tantum colore & duobus aculeis, quos posterior ostendit in dorso. Prioris color flavus est, posterioris magna parte cœruleus, excepto quod maxima capitis & laterum pars etiam flavescit.

15. KOFFERVISCH. Quum plerique omnes pisces sint pelle, uti dictum est, durissima, hic è contrario habet eam mollem, sed tam in dorso quam in ventre præfert nescio quæ ferta, quasi florum corollas. Ea sunt durissima, ac cultro auferenda, si quis eo pisce velit vesci, quod soli Mauri faciunt, Christianis nolentibus pisciculis tam minutis, est enim 5. aut 6. pollicum, vesci. Nihil præterea singulare in hoc pisce occurrit, præterquam quod linea ab ipsius ore ad oculos ducta rubeat, quum alioqui totum corpus sit subcœruleum.

16. KOFFERVISCH. Hic circa Amboinam tantum capitur. Capite est maculoso, præsertim inter oculos, ubi versicoloribus maculis videtur insignitus. Aculeos tres in dorso habet, unum in ventre, nec est, quod diutius immorari velim huic pisci ulterius describendo.

17. KOFFERVISCH. Cum superiori undiquaque convenit, tam ad colorem quam figuram corporis quod attinet. In eo tantum differunt, quod hic habeat plures maculas, in capite non tantum, sed etiam in corpore, & vicissim sit destitutus aculeis, quos in superiore notavimus. Dentes etiam ostentat acutissimos, qui licet in superiore non conspiciantur, adfirmare tamen pene ausim, id esse factum pictoris incuria.

18. KOFFERVISCH. De hoc pisce nihil est quod dicam, nisi illum cum prioribus convenire, nec ullam observari differentiam præterquam in colore. Totus enim est dilute cœruleis, cum maculis ejusdem, sed paulo intensioris, coloris.

19. PERCA AMBOINENSIS. Hunc piscem in museo servo, & in Thes. I. à Parente meo est descriptus. Forma quidem est non admodum diversa à nostris percis, sed colore multum differt. Squammæ in superiori corporis parte obscure virides sunt, circa ventrem rubent, quo

colore etiam orbes oculorum & pinnæ tam branchiales quam dorsuales sunt notatæ. In cauda bifurcata duas maculas nigricantes habet.

20. Pisciculus est Ceilanicus, quem ex Thesauro I. Parentis mei hic effingendum curavi. Quod ratus est, nec major est quam aleæ lusoriæ vulgo sunt. Præterea reticulatus est ac maculatus, verum maculæ sunt non majores quam granum seminis sinapi.

## TABULA SEXTA.


1. **D**E KONING DER KAKATOES. Id est *Rex Psittacorum majorum*, ita dictus, credo, à variis & vividis coloribus, quibus hic piscis est notatus, ut solent majores isti Psittaci, à quorum similitudine nomen nactus est. Possis eum, & aliquot sequentes Callychtides nuncupare, nomine nec inconveniente, nec ignoto apud alios.

2. KAKATOEVISCH. Eiusdem est cum superiore generis, sed specie non parum differunt. Nam cum ille sit lineis sive striis latioribus à tergo ad ventrem procurrentibus, hic ejusdem fere coloris lineis est insignitus, sed à capite ductis ad caudam. Præterea ille tantum in dorso habet aculeos, hic vero etiam in imo ventre, quibus tam in dorso quam in ventre pinnæ rotundiores adjunguntur, quod etiam in aliis fieri piscibus exoticis solet.

3. KAKATOEVISCH ALFORENSIS. Diu ignotus fuit, & ante annos sex aut septem coepit primum innotescere. Tum nemo audebat ejus carne vesci, sed postea Mauri periculum fecere; timebatur enim nonnihil à cœruleis venis, quarum venenum exhorrescebant Christiani, verum postea, quum res Mauris bene successerat, coepere & illi hujus carne vesci. Porro, ut ex icone satis patet, lineæ ex dorso aliis è ventre ductis circa medium latus obviam fiunt, ac ibi angulum acutum constituunt. In capite etiam maculosus est, sed reliquum corpus est fuscum.

4. DE BRUINE KAKATOEVISCH, ita dictus est à præcipuo colore, qui in capite & toto corpore regnat. Verum per medium latus linea sive fascia satis lata à capite ad caudam procurrit. Ea tota est candida, qualis etiam observatur in aliis piscibus peregrinis, qui apud me in liquore adservantur, licet eorum corpusculum etiam sit quodammodo nigrum. In dorso septem aut octo habet aculeos tenui membrana junctos, ac pinnas adhærentes, quæ in hoc pisce rubent. In tergo aliquot reperiuntur maculæ nigricantes.





























cantes. Squammas nullas habet, sed pellem æqualem & duram, quæ detrahitur, antequam in cibum adfumitur. Solent enim incolæ hoc pisce affato vesci, nam elixus non valet.

5. DE RODE KAKATOEVISCH, nomen suum etiam à colore, qui ruber est, videtur accepisse. Circa branchias tamen nescio quid viridatis habet, corpore subinde candentibus maculis distincto. In deliciis habetur apud Amboinenses, qui adfirmant eum nihil cedere carpionibus, si saporem spectes. Magnitudine etiam interdum est major, sed raro conspicitur.

6. DE SPITSNEUSDE KAKATOEVISCH. Si excipias, quod hic piscis aliquot habet in dorso maculas, plane convenit cum præcedente. In ventre etiam maculosus est & circa branchias. Corporis color violaceus est. Ejus carne vescuntur incolæ Laricenses, nam ibi capitur, ac ea rubet cum cocta est, plane ut videmus in nostris salmonibus.

7. DE CITROENVISCH. A colore nomen Citrii mali huic pisci est datum. Corpus totum est distinctum lineis variis à capite ad caudam usque, sed intervalum, quod inter singulas lineas interest, obsidetur aculeis multiplicibus, qui totum corpus ambiunt. Sapore (nam editur affatus) non multum differt ab alosa nostrate, verum multo minus sunt in istis regionibus obvii, quam alosæ hîc sunt.

8. DE CITROENVISCH. Qui numero octavo sequitur ejusdem generis est, ac speciei non multum à præcedente diversæ. Verum nullos circa latera ostendit aculeos, quos tantum habet in dorso & in ventre. Ibi reperiuntur, quæ pinnis ad caudam decurrentibus adhærent. Præterea lineæ sive striæ corporis sunt versicolores, & ad caudam reflexæ.

9. POEPOETJE. Figuram satis mirabilem hic pisciculus præfert. Nam in medio latere, quum sit pelle dura & sine squammis; in lateribus tamen videtur admodum squamosus esse. Rostrum, aviculæ more, est acutum. In dorso primum aculeos habet ac deinde caudam versus pinnas, in ventre autem è contrario infra branchias ostendit pinnas & magis ad caudam aculeos.

10. POEPOEVISCHJE. Ut figurâ ita sapore hic piscis æmulatur percam nostram, colore nonnihil differt, ut & cirris ab imis branchiis dependentibus, & aculeo circa anum. Color purpurascit, sed dilutè, nisi quod circa caudam abeat in flavedinem.

11. POEPOEVISCHJE. Qui hic exhibetur pisciculus, est fere ignotus apud

ipfos incolas. Reperitur tamen, quamquam rarò. Ventre est latiore, & maculis in extremo corpore insignis. Circum os ducitur linea versicolor, qualis etiam conspicitur, ubi branchiæ desinunt. In mediam quasi caudam corpus procurrit.

12. POEPOEVISCHJE. Superiori est persimilis, sed magis notus, & aliquanto major corpore, quod sex aut septem pollices dicitur æquare. Utuntur etiam illo Amboinenses ad cibum, licet manum abstineant à superiore, quod an fiat ob raritatem, an vero quòd credatur venenatus esse, haud facile dixerim.

13. & 14. POEPOEVISCHJES. Licet & hos addas prioribus proxime præcedentibus, quum nihil prorsus differant à pisce, quem postremo loco descripsi, præterquam colore, & linea varia, quæ ab ore procedit, & continuatur usque ad extremitatem branchiarum. Ceteros hujus generis pisces pictor retulit in Tabulam XIX. ubi de iis plura.

15. KAPITEINSVISCH. Nisi aliud esset nomen, diceret & hunc pertinere ad illorum genus, qui proxime sunt descripti. Octo in summo corpore aculeos habet, in ventre nullos. Præter spinas branchiales satis longas, duas adhuc longiores habet sub ipsis branchiis in ventre. Dentes etiam habet acutissimos, quod illi commune est cum aliis piscibus, quos paulo ante dedimus.

16. DE KAPITEIN VAN DE KAFFERS, quasi Afrorum ducem voces. Rostrum est acutissimo, aculeoque longissimo in dorso præditus. Corpusculum quoque per mediam caudam procurrit ad finem usque. Lineis latioribus à dorso ad ventrem, quasi fasciis, distinguitur. Ad branchias ipsas habet pinnas binas, quarum altera est longior, altera contractior. Reliqua huic cum aliis communia sunt.

17. DE LEDENVISCH, quem piscem articulare vocare possis, quum quasi articulis tenui tendine coherentibus totus constet. Videtur esse species acus, aut tæniæ. Id vero huic pisci dicitur esse peculiare, quod eum possis extendere, & quasi duplo majorem facere, omnibus articulis inter se disjunctis, nec ipso pisce coherente nisi tendine tenui. Quod si ita extensum in aquam projicias, corpus denuo contrahit & illæsus evadit celeri natatu. Pro cauda habet tenuem & satis longam spinam, quæ crassior non est quam filum lineum.

18. DE FLUITER. Nullus dubito, quin hic piscis sit aliorum *Petim buaba*, sive *Tabakpypvisch*. Longo est corpore sed ita tenui, ut vix digiti minoris crassitiem excedat. Vocalis quoque est adeo,



ut nocte possis eum satis longo intervallo quasi sibilantem audire ; qua ratione ad Tibicinum genus videretur referendus. Vide quæ notata sunt ad num. 16. Tab. XVII. Indigenæ Amboinenses solent eo pisce vesci , quum alii non suppetunt , nam quum adeo tenuis sit , ut dixi , & cartaliginosus , facile possis con-jicere eum multâ carne non abundare.

### TABULA SEPTIMA.

1. **D**E ZAAGVISCH, nomen invenit à proboscide ferrata, quæ eboris instar est dura & intus nitida. Pinnae branchiales habet prælongas, quibus ad volandum utitur, sed cum corpore sit majore , quam vulgo solent pisces volatiles, non diu relicta aqua sese in aëre potest sustinere , verum statim decidit in aquam , nec se denuo tollere potest in aërem , nisi satis longo tempore post. In dorso habet aliquot aculeos. A branchiis duo cirri dependent. Non procul à cauda , tam in dorso quam ventre , etiam pinnae habet , quarum , quæ in ventre sunt , multo sunt longiores quam dorsuales.

2. **D**E ZEEDRAAK, sive *Draco marinus* , rostro osseo etiam est præditus, sed non ferrato. Cum superiore commune habet, quod utatur pinnis branchialibus pro alis. Notabile est, quod eæ quidem quum totæ sint dilute virides, in extremitate tamen rubeant, quod gratissimum præbet intuentibus spectaculum. Ceterum ab utraque corporis parte aculeos nullos habet , præter duos prope caudam , sed pinnae utrinque binas habet molles & flexibiles admodum. Soli pauperes hoc pisce vescuntur , quoniam & caro insipida & pauca in eo sit. Est enim fere totus cartaliginosus , & si cutem detrahas , non multum est quod restat carnis.

5. 'T KLEINE DRAAKJE. Pisciculus est itidem Amboinensis volans , qui fere in omnibus convenit cum eo , quem modo descripsi. In cauda est quidem aliqua varietas, sed non magna , neque quæ sufficit ad aliam speciem constituendam. Si forte in colore quædam sit differentia , credibile est eam pro loci & magnitudinis piscium ratione interdum variare , neque ideo alius esse piscis putandus est. Descriptus in Th. Animalium 1. Parentis, ubi etiam illius icon occurrit.

4. **I**CAN LOMPO. Peculiariter notandum de hoc pisce , quod fusco colore est , & corpore striato & maculoso , quæ striæ & maculae non ingratum ad-

spectu faciunt hunc piscem. Præterea est gratissimi saporis. Non in mari sed in fluminibus reperitur. Ideo delicatioris palati homines , qui è nostratibus mercaturæ causa fere in oris maritimis degunt , non refugiunt , quo minus sumptus faciant satis magnos , mittendo homines certos , qui decem aut duodecim milliaribus à mari remotas aquas adeant ac captos ejusmodi pisces pronò fluvio secum avehant ad oram maritimam.

5. **B**LIEMA. Alofæ fere similis est , quod attinet ad saporem , sed corpore aliquanto minor , capite magno , pinnis etiam magnis & rotundis , qua corpus in caudam vergit. Sub branchiis nullas pinnae habet , sed in lateribus tantum. Caput , præsertim inter oculos , est notatum variis maculis. In dorso cernuntur quinque aculei , quos dicunt esse acutissimos. Color corporis nonnihil purpurescit , ventre candente ac lateribus , verum sub imo ventre dilute cœruleus est.

6. **D**E KAMVISCH. Ita nomen huic pisci fecere , eo quod in summo capite candidam habeat maculam radiatam , quæ aliquid commune cum pectinis radiis videtur habere , atque adeo causa fuit nominis huic pisci reperiendi. Alaudæ cristatæ speciebus possis eum annumerare , quum figura & reliqua satis bene conveniant cum alaudis.


7. **I**CAN BARO. Singularis formæ & varii coloris pisciculus. Rostrum est plane porcinum , & oblongum. Macularum in corpore color aureus est , reliqui corporis dilute purpureus. Ab utraque parte singulas habet pinnae , caudam pro corporis magnitudine satis amplam. Mauri solent eo vesci , præsertim siccato , aut fumo indurato , nam alioqui non est saporis laudabilis.

8. **D**E GRAAF. Licet in hoc pisce lineæ sive striæ appareant , illæ tamen non alterius coloris sunt , quam qui est reliqui corporis , verum maculae capitis alios atque alios colores , qui interdum variant , exhibent. Unicum in dorso aculeum præfert , post quem pinnae continuantur ad caudam usque. Præter branchiales pinnae satis magnas , duas habet sub ipsis branchiis , quæ longius propendent , sed ad caudam reflexæ sunt. Ipsi caudæ extremitati quasi limbus quidam adfuitur , alio atque alio colore subinde notabile.

9. 'T DAMBORT. Squammæ variis coloribus notatæ ac quadratæ huic pisci peperere nomen. Videas illic rubras , fuscas , & flavas squammas , quarum diversitas gratissimum præbet adspectum.

Sub











Sub branchiis venter maculosus prominet. In dorso septem aculei reperiuntur, qui tenui membrana inter se cohærent. Venter anterior nullas ostendit pinnas, sed ab ano ad caudam usque cernuntur pinnae uno ordine ad finem continuatae. Rarissime capitur, verum è genere Turdorum est.

10. DE LANGBEK. Nec minus raro conspicitur hic piscis quam præcedens. Rostri longitudo nomen illi quæsit. Os est magnum & rictus pro corpore amplius. Non alio quam violaceo colore, sed obscuriore, conspicitur. Verum adeo pauci ejusmodi pisces reperiuntur, ut fere à peritissimis Amboinensibus ignoretur.

11. LINGUALA. Chinenfis in deliciis est, & merito, quum ejus caro sit eximii saporis. Caput illi flavum est, corpus ejusdem coloris, quem in superiori pisce notavi. Obstipum est caput, ore altiuscule sublato. Aculeos dorsuales sex aut septem habet, & præterea pinnam crassam & reflexam circa caudam. In imo ventre aculeum habet inter binas pinnas, quarum priores è regione respondent pinnis branchialibus.

12. DE GESTREEPTE SAUBILANG. Piscis est fere anguilliformis, & ejusdem saporis, qui in anguillis observatur. Pedem plerumque longitudine excedit. Sed reperiuntur etiam, qui ad duos pedes longitudine pertingunt. Saubilang quid sit fateor me non satis scire, verum prior denominationis pars est orta à lineis latioribus, quæ latera discriminant.

13. COUPANGVISCH, sive *Ican Coupang*. Vulgus nauticum isto nomine solet indigitare hunc piscem, quod fingat eum in capite præferre quasi numisma aureum, cui in India nomen est Coupangii, verum mihi quidem nullo modo dubitandum videtur, quin sit remora, notissimus piscis, atque ab omnibus auctoribus, post fabulam decantatissimam, quæ de eo narratur, descriptus. Quapropter huic diutius immorandum non censeo.

14. DE KNEVELBAART. Nomen huic datum à cirris duobus longissimis ab imo ore propendentibus, qui nescio ob quam causam magis proprii visi sunt ad nomen reperiendum quam aculei duo cornei, qui in utraque capitis parte supra oculos cernuntur. Color corporis est fuscus, maculis rubentibus. Præter pinnas dorsuales & ventrales duas alias habet infra branchias.

15. DE KNEVELVISCH. Eadem in hoc pisce est nominis ratio, quæ in superiore, & genus itidem unum, sed cum ille præferat duos aculeos crassiores, hic

ostentat unum tantum, sed majusculum, in summo dorso, paullo supra caput. Cirri etiam ab imo ore dependentes sunt aliquanto longiores, quam qui videntur in pisce cognomine.

16. DE POEPOESCHE SARDYN, id est, *Encrascolus Paponensis*. Vix quidquam in hoc pisce notabile, quod non item reperitur in nostris Sardis. Visus fuit tamen dignus, qui exhiberetur, quia capite est maculoso, corpore exiguis admodum maculis, ceu punctis candidis, notato, & pinnis rubris.

17. DE ST. ANTONIE-VISCH. Piscis Amboinensis volans, quem ajunt assum bene sapere, sed elixus aut coctus nulli rei est idoneus. Nullus mihi videtur esse dubitandi locus, quin hic Piscis Divi Antonii, ut meus autoptes eum vocabat, sit hirundo, quo nomine eum exhibet Pettiverus *Gazophyl. Nat. & Artis Tab. XXX. n. 2.*

18. DE V LIEGENDE HILAVISCH, ita dictus partim à facultate volandi, partim à loco, ubi capitur. Adeo parum differt à superiere, ut facile videre possis ejusdem esse speciei & hunc & illum. Licet tamen per me ut harengum volantem voces, ac conferas cum ejusdem nominis pisciculis, qui prostant apud Jonstonum *Tab. XVII. & XXII.* & apud alios auctores.

19. 'T V LIEGEND VISCHJE. Nullo peculiari nomine est pisciculus hic insignitus, quod exiguo sit corpore, & forsan effugiat aliorum diligentiam. Pinnae branchiales, ut in aliis etiam fit, illi præstant alarum usum, quibus tanto facilius sese extra aquas tollere potest, quod gracili corpore sit, & pinnae è contrario, pro corporis modulo, satis longæ. In ventre etiam pinnas prægrandes habet, præter alias, quæ ad caudam vergunt, & respondent iis, quæ in dorso reperiuntur.

20. DE SAGUEERDRINKER. Arbores quædam in Insula Amboina sunt, quæ vocantur *Sagueerbomen*, seu Palmæ Indicæ Vinariæ, *Sagueri* Rumphio dictæ. Eæ peperere nomen huic pisci, qui ex genere milvino est, nec multum abludit à milvo Salviani; forsan idem piscis. Namque subinde aquis relictis evolat in istas arbores, earumque fructus liquore plenos appetit. Deinde, cum satur est, relictæ arbore, vicissim aquas petit, sed dispari successu. Sive enim quod alæ exsiccatae piscem non ferunt, sive quod vertigine quadam corripiatur, fere in terram solet decidere, ubi non magno labore capitur, post aliquod tempus tamen evasurus in aquam. In summo dorso aliquot aculeos habet prælongos, a-



lios magis ad caudam remotos, ac tandem iterum alios in imo ventre versus caudam.

21. 'T GEHORENT VLIENGEND VISCHJE. Tenuissimo corpore est pisciculus, quem hic exhibeo, tenuioribus alis, sed longis. Cornutus dicitur à duobus aculeis, sive cornulis, quæ ab utraque capitis parte prominent. In ipso capite cristulam gerere videtur.

22. 'T VLIENGEND VISCHJE. Et hic tandem pisciculus minutus volantibus annumerandus venit. In exiguo corpore non magnæ sunt vires, neque magnitudine pinnarum branchialium sive alarum, compensatur, quod viribus deest. Ergo nihil aliud quam tollit se paullulum extra aquam dependente fere cauda in eam, ac ipso pisciculo singulis fere momentis decidente.

23, 24. PEDICULI MARINI, Insecti genus infestissimum piscibus, ut è Rondeletio observat Gesnerus, & post eum alii magno numero annotarunt. E limo generantur, ac adeo pertinaciter adhærent dorso mugilum & piscium saxatillum, ut eos omnino aridos reddant. Nec minor in fugendo est vis & pertinacia quam hirundinum.

## TABULA OCTAVA.

I. **D**E GEBANDEERDE CITSVISCH. Lineæ vestes Indicæ à nostratibus, si eæ sint pictæ, vocantur *Cits*. Inde factum est, ut huic pisci quæsitum sit nomen, quo appellatur; nam tam pinnæ quam corpus egregie sunt variegata vividis coloribus. Pinna dorsualis, aculeo cohærens, quæ in principio tenuis at per cæ instar ad caudam sese expandit, nigri coloris est, maculis albicantibus interspersis lineis transversalibus continuis è corpore; post duos aculeos in imo ventre circuitus pinnæ niger est cum maculis albis. In summo dorso conspicuus est aculeus, qui facit, ut hunc piscem tuto annumerare possis Caprifiscis, aut Ican Svangi, qui sunt propositi Tab. I. Idque eo magis, quod in imo ventre duos alios habeat aculeos, & tertium non procul ab ore sub squammis.

2. DE BANDERA. Piscis est latus, & mensæ inter fercula delicatiora inponitur. Color in toto corpore est unus, præterquam quod in ipso capite notetur fascia lata candidi coloris. Pinnæ ab utraque parte tenues sunt, & absque ullis aculeis ad caudam usque continuatæ, sed eæ sumunt tantum initium à medio pisce, cujus pars anterior omnino pinnis caret.

3. DE BANDERA, cui & *Capitonis*, à magno capite, est nomen. Vix convenit in aliqua re cum pisce cognomine, unde patet quam interdum nullas rationes habuerunt nostri ad imponendum nomen aliquod piscibus ignotis. Capite est magno, dorso aculeato, ventre prominente, corpore rotundo & versicolore. Quid, quæso, eorum est in priori pisce? Et tamen cognomines sunt; quod probe notandum, ne quis in simili differentia piscium decipiatur nominis similitudine.

4. DE BANDERA, cui à rostro acuto *Nasonis* cognomen adhæsit, corpore est cœrulei coloris, à capite ad caudam, sed corpus quasi interfecatur fascia latâ flavescente, quæ à dorso ad ventrem procedit. Similis color quibusdam hujus speciei etiam in capite, quâ in os definit. In dorso horret hæc species crebris aculeis, nec in ventre iis est destitutus.

5. DE BANDERA. Etiam hic est lineis latioribus, quasi fasciis vinctus, & ideo nomen & locum inter pisces cognomines invenit. Ore est acuto, dorso ad medium fere nudo, ubi aculeis quinque aut sex armatus est. Ab istis aculeis ad caudam usque pinnæ uno ordine procedunt, tam in ventre quam in dorso.

6. DE BANDERA. Percæ majoris magnitudine est, sed paulo latior. Totus à capite versus caudam striis, sive lineis latioribus notatur, partim cœruleis, partim flavescens, partim dilute violaceis. Nihil fere aliud in hoc pisce notatu dignum; nam quod incolæ libenter hac piscium specie vescantur, id is commune habet cum aliis quoque hujus speciei piscibus.

7. DE BANDERA. Major paullo est isto pisce, qui numero quarto hujus Tabulæ est descriptus; figura corporis etiam non prorsus eadem, sed tamen non valde diversa, nam utrique idem est color, eadem fasciæ, in ventre iidem aculei. In capite major est differentia, quum hic sit obstipito capite, ille rostro acuto; hic ore lato, ille contractiore & angustiore. Reliqua, ut dictum est, satis inter se conveniunt.

8. DE BLAZER. Vim, quæ ab hoc pisce adhibetur, ad aquam è fistulis, quas in summo capite habet, projiciendam, ajunt nomen huic reperisse. Namque interdum ex ore magnam aquæ vim projicit. Corpus illi est contractum, venter amplus, & aquæ capax. Ut verbo dicam, orbis est species, quarum esse plures quam quatuor, ut quidam voluerunt, non est quod quisquam dubitet, quum vel in hac Tabula plures prostant. Si ve-



ro ob exiguam differentiam omnes istos pisces ad unam & eandem speciem revoces, vereor, ut minus provide facturus sis.

9. DE BLAZER. Color convenit cum præcedenti, qui subcœruleus est, ut & forma corporis, verum hic habet tres aculeos in dorso, quibus alter ille caret. In lateribus à pinnis usque ad caudam caudidâ lineâ est notatus, verum istæ pinnæ branchiis non sunt adjunctæ. Venter fere totum piscem occupat, atque adeo magnam capitis partem. Respirandi aliam viam non reperies in hujusmodi piscibus quam per foramina, quæ in superiori capite sunt, aut per os ipsum. Unde fit, ut subinde aquam intus acceptam cum magna vi foras projiciant.

10. DE KLEINE BLAZER. Recte, credo, orbem hunc minorem adscribes iis, qui à maculis stellati dicuntur, nam, ut vides, maculæ aliquot in corpore notatæ sunt, sed non radiatæ, quod forsitan est adscribendum negligentiae pictoris. Cetera satis bene conveniunt cum orbibus stellatis. Corium utrique durum, ut omnium omnino istius generis piscium, nullas squammas habet neque hic neque ille, sed tantum sex aculeos in dorso, quorum tres priores nullo ligamine inter se cohærent, sed posteriores tres membrana tenui sunt juncti, primo inter se invicem, & deinde cum pinnis dorsualibus, quæ causam versus decurrunt. Sub ventre neque aculei sunt neque pinnæ, nisi ubi corpus jam tenue est prope caudam.

11. DE GELE STREEPKOP. Ratio nominis satis patebit iconem intuentibus. Nam nostrates eo nomine designant piscem, qui in capite lineas sive fascias versicolores ostentat, quales hic cernuntur in icone hujus piscis. Color est ei fuscus, sed lineæ in capite sunt fuscæ. Septem in dorso habet aculeos, & pinna rotundas post eosdem. Venter ad anum usque est glaber. Post anum duos aculeos habet & pinna respondentes dorsualibus. Notandum est de hoc pisce, quod raro reperiatur, & ob præstantem saporem tantii pretii esse judicetur, ut magnates etiam solant, si forte talis ab eorum servis piscatoribus sit captus, eum aliis dono mittere pro præstanti ac singulari munere.

12. DE BRAASSEM VAN LARYKE, quasi dicas Cyprinus Larycensis (nomen illud est insulæ distantis non procul ab Amboina) non aliam ob causam magis meruit hic depingi, quam ob prægrandes pinna, quas ab utraque corporis parte ostentat, atque ob colores longe alios,

quam quos videmus in nostris Cyprinis. Est enim ille colore helvo, qui sub ventre abit in albedinem. Per utrumque latus medium à capite ad caudam linea candida ducitur, quæ gratam in illo pisce varietatem colorum præbet, præsertim quum ista linea aliquoties, priusquam ad caudam pervenit, interrumpatur maculis subcœruleis.

13. DE BRAASSEM VAN AMBON, id est *Cyprinus Amboinensis*, aliquanto latiori corpore est quam proxime præcedens, & ni ejusdem esset cum illo saporis, diceret eum pertinere ad pisces istos, quos supra Striatos vocatos vidimus. Verum nihil obstat, quo minis, quod attinet ad formam exterioriorem, ad illos referatur, & tamen Cyprinus sit, sed latus, cum & illi apud Amboinenses reperiuntur variis coloribus mirabiliter picti, & ita possint numerari inter pisces striatos, cum tamen proprie Cyprini sint. Huic autem pisci pellis est variata quasi fasciis deductis recto ordine à dorso ad ventrem. Præterea aculeos præfert ab utraque corporis parte, aliquando plures, aliquando vero minores, ut necesse non sit hic eorum numerum designare.

14. DE BRAASSEM VAN AMBON. Quemadmodum eodem gaudet hic piscis nomine, quo superior, ita capite est eadem simillimus. Uterque enim ibi singulari modo ostentat fasciam unam aut alteram. Sed in corpore est satis magna differentia, tam si aculeos illius conferas cum hujus pinnis, quam si corporis maculas intuearis. Namque hic pro lineis latioribus aliquot tantum maculas habet, & colore persimilis est isti Cyprino, qui exhibitus est N°. 12.

15. DE BRAASSEM VAN AMBON. Hic est adhuc aliquanto latior quam præcedentes pisces cognomines, verumtamen ad idem genus pertinet. Vocatur etiam *Diklip*, quasi *Labeonem* dicas, propterea quod inferior mandibula multo est crassior quam superior. In reliquis sic satis convenit cum aliis istius nominis piscibus, excepto quod caput sit gilvi coloris ac divisum quasi duobus lineis dilute cœruleis. In ventre etiam aliquot maculas habet ad utrumque latus eodem ordine positas.

16. DE BRAASSEM VAN TERNATE. Nactus est hic Cyprinus cognomen ab insula Ternate, prope quam capitur. Si Hepatus, quem Jonstonus Tab. XIV. alique alibi exhibent, in latere haberet istiusmodi lineam latam sive striam, qualis in hoc pisce notatur, prorsus Hepatum hunc diceret. Est ergo & ille quidem Hepatus, sed hoc peculiare habet,



quod notatus sit istiusmodi linea coloris ravidī, quum dorsum & venter plane sit istius coloris, quem nos videmus in Cyprinīs nostris.

17. DE BRAASSEM VAN TERNATE. Idem fere dicendum venit de hoc pisce, qui ab eodem loco idem cognomen est sortitus. Verum in hoc singulare est, quod branchiales pinnæ versus superiorem corporis partem ordine fere recto adsurgant, & quod utraque caudæ pars muniatur quasi crassiori quodam & osseo acumine.

18. DE BRAASSEM VAN BANTAM. A loco, ubi frequenter capitur, etiam huic nomen est inditum. Totus horret aculeis in tergo, nec alias pinnas habet quam aculeatas, etiam in ventre. Cauda non tantum est bifida, sed utrique parti adhæret præterea aculeus dentatus, quod magis mirum videretur, si non simile aliquid, aut saltem eo tendens, jam in superiori pisce vidissemus.

19. DE BRAASSEM VAN BORNEO. Tam prope ad nostrorum Cyprinorum formam accedit hic piscis, cui cognomen est impositum ab insula notissima Borneo, ut non dubium sit, quin suo loco sit positus. Nam quod pertinet ad colores, ii speciem piscis non variant, multo minus genus. Illud quoque non indignum observatu videtur, quod hic piscis totus est fusci, seu potius nigricantis coloris, qui etiam in maculis non alius est, nisi quod maculæ paulo obscuriores videantur quam reliquum corpus. Adde, quod & hic & plerique alii, qui eodem gaudent nomine, soleant quidem inferri mensis, sed assi; nam alioqui eorum caro nimis est humida & quasi diffluit, quæ res mihi videtur adscribenda calidiorum regionum naturæ, in quibus pisces raro tam pingues inveniuntur quam in regionibus frigidis.

## TABULA NONA.

I. **D**E GROTE MOORVISCH. Egregius sane est piscis, & singularis utilitatis, quum satis magno sit corpore & carne non minus bona. Color fere niger est, unde illi nomen Mauri adhæsit, sed nigredo ista est variegata tenuissimis & confusis lineis, quales fere notantur in lapide porphyretico. Caput candens fascia ambit, quam ad utrumque latus, ubi branchiæ desinunt, excipit fascia sive linea latior ejusdem coloris. Simili colore quoque maculæ dorsuales gaudent. Pinnae in cauda fere nullas habet, licet binas pinnae dorsum præferat, ac in ventre, non pro-

cul à cauda aliæ non parvæ conspiciantur.

2. DE TURKSCH VISCH. Rationem nominis meus homo non addidit, verum patet id nomen huic pisci impositum esse propter tres candidas lunulas crescentes, quas in latere depictas vides. Verum illud meus autoptes adseverabat, quod nulli piscium generi, quod quidem apud nos notum est, hic piscis possit annumerari, quoniam duplo quidem major sit Carpiōne, quem refert, sed tamen nihil aliud commune habeat cum isto pisce. Pinnæ nullis aculeis horrent, præterquam duobus, qui in summo dorso exstant. In maculis majoribus aut minoribus, quæ in hoc pisce cernuntur, describendis, non immorabor, quum, tribus istis lunulis exceptis, in singulis istius generis piscibus fere soleant variare.


3. DE MAANVISCH. Singularis raritatis est hic, quem hoc loco exhibeo, piscis, & quidem tam raro capitur, ut in insula Amboinæ unus diu fuerit adfervatus, ad eum peregrè advenientibus ostendendum tanquam rem singularem. Scilicet cum luna est plena, crassus est piscis & fere rotundus ac firmæ carnis; cum vero luna decrescit etiam sensim atque sensim ejus corpus extenuatur, ita ut luna silente totus flaccescat, & nulli rei sit idoneus. Videtur esse species Caprisci, quod patet è prælongo aculeo uno & altero, quos è summo corpore vides prominentes. Dorsum est dilute cœruleum, venter flavet, & maculæ, quæ in ventre cernuntur, albicant.

4. DE GELE SIAANSVISCH. Confer hunc piscem cum alio ejusdem nominis, qui conspicitur Tab. III. N°. 2. Omnis differentia est in coloribus, qui raro iidem reperiuntur, etiam in ejusdem plane speciei piscibus. Ore hic videtur edentulo, saltem nullos dentes in hiante ore exhibuit pictor, sed linguam crassiusculam. In dorso subcœruleus est hic piscis, sed venter est plane flavus, unde nomen quæsitum.


5. & 6. DE SERBANDERS, quos etiam vocant, *Kussenvischen*, quia pelvium instar quadrati sunt. Pertinent ad *Platycthus*, & facile eorum forma sufficeret ad eos alicui generi annumerandos, si è forma eorum hujusmodi pisces ordinarentur. Colores plerumque iis nomen quærunt. Hi vero quasi fasciis verficoloribus involuti sunt, tam directe à dorso descendantibus, quam decussatim se invicem secantibus. Qui prior ponitur est masculus, posterior femella.

7. I CAN KAPELLE. Hic piscis descriptus




















scriptus extat apud varios, alio atque alio nomine. Jonstonus exhibuit Tab. XXXVII. & descripsit p. 141. sub nomine *Abacatuia*, quo nomine haud cum hoc convenientem piscem descripsit Rayus in Synop. p. 99. qui negat pisci ita dicto aculcatas pinnas esse. Hic vero, ut vides, habet aculeos aliquot grandiores & pinnas, quos Jonstonus dicit esse quinque. Squammas nullas hic piscis habet, sed cutis illi est glabra, argentei coloris, & splendens. Cauda pro corporis magnitudine satis longa & bifurcata, nam piscis ipse quatuor aut quinque pollicibus non est major.

8. 'T ZEEKATJE. Exiguus est pisciculus ac satis notus, qua propter ulteriori ejus descriptione supersedebo. Piscis quadratus est ab utraque parte cornutus minor, ac quatuor aculeos habet, quorum duo è capite prominent, duo sub ventre non procul à cauda nascuntur & caudam versus reflexi sunt. Diceres fere ex icone squammosum esse hunc pisciculum, sed non est; verum tota cutis dura est ac exiguis maculis distincta, non aliter ac videre est in aliis piscibus Orientalibus.

9. DE NONNEVISCH, quem *Moenialem* vocare licet. Ratio nominis non apparet. Nomen ipsum tamen satis notum. Capitur prope Hilam. Color est ei dilute coeruleus. A tergo summo usque ad mandibulam inferiorem decurrit linea lata, sive fascia, quæ rubet. Venter varie maculosus est. Ab utraque corporis parte pinnas habet non aculeatas. Esui quidem non ineptus est, si prius aperiatur & ad solem siccetur, aut salitus in usum conservetur.

10. DE NONNEVISCH. Ut nomen, ita pleraque communia habet cum pisce præcedente; verum, qui isti defunt aculei, huic sunt octo, sex in dorso, ac duo in ventre. Præterea color flavedinem aliquam præfert. Tres maculæ candentes sunt in eo conspicuæ, quibus totidem aliæ ab altera corporis parte respondent. Habet etiam pinnas sub branchiis, quæ defunt priori.

11. DE NONNEVISCH. Si conferas hujus piscis iconem cum proxime præcedenti nullam differentiam reperiēs. In colore est tamen permagna. Ille enim flavus est, hic fuscus, sed nescio quid coeruleum pellucet. Caput etiam quodammodo rubet, excepta linea, quæ per caput ducitur, & aliis atque aliis coloribus ornatur.

12. DE MUURVISCH, id est *Piscis muralis*. In ventre aliquot maculæ apparent in acumen desinentes alternis, alter-

nis vero in superiori parte rectæ, unde videtur aliquam speciem pinnarum muralium præferre, ac inde illi nomen. Corpore est longo sed compresso, non lato. In dorso medio pinnas habent aliquamdiu continuatas, sed tamen non ad caudam perductas. In imo ventre nullæ cernuntur pinnae, præter eas quæ à branchis dependent.

13. DE DUBBELDE MUURVISCH, five *Muralis duplex*. Hic non tantum in ventre maculas superiori similes habet, verum etiam in dorso ventralibus ad amussim respondentes. Nominis igitur ratio patet ex eo quod modo diximus. Reliqua omnia huic pisci sunt communia cum præcedenti, excepto quod hic una pinna ditior sit, in ventre scilicet.

14. DE CAFFERVISCH, tantundem est, puto, ac si diceres piscem Africanum. Ore est incurvo nec lato, corpus satis latum est, verum non valde crassum. Color dicitur fuscus esse, aut in tergo etiam nigricans. Sub ventre duo exstant pinnae, una in tergo; verum neque in illis ulli notantur aculei. Maculæ non sunt valde vividæ, quia non multum colore differunt à reliquo corporis colore.

15. DE CAFFERVISCH. Nil aliud differt à superiore, quam quod is maculosus sit, hic vero omnino maculis careat; nempe in corpore, nam capiti ejus etiam suæ sunt maculæ: præsertim latior linea, quæ per oculos caput ambit, & ita illud videri possit dividere in os & caput proprie dictum.

16. DE GESTREEPTE CAFFER. Cognomen, ut alii permulti, nactus est Afer hic à lineis, quæ corpus ejus ornant. Scilicet color corporis est quodammodo violaceus, verum quatuor aut quinque lineæ à capite ad caudam ductæ multo sunt vividioris coloris, quod gratum præbet adspectum. In dorso sex aculeos habet, in ventre nullos, at pinnae tam dorsales quam ventrales accuratè inter se conveniunt. Ubi incipiunt sunt longiores, sed statim post decrescunt, ac tandem omnino desinunt paulo ante caudam.

17. DE NYPTANGVISCH, five *Forcipinus*, à rostro productiore, duro, & reflexo ita videtur dictus. Est enim oris extremitas prædura huic pisci, ac morsus vehemens, quasi quem forcipe apprehendat. Pisciculus tamen non ubique reperitur, sed tantum prope insulam minorem, cui nostrates à Leonibus nomen dedere, & quæ non procul distat ab Amboina. Caudam non habet è pinnis constantem sed è carne, quod singulare ac dignum observatu.



18, & 19. ONBEKENDE VISCHEN, id est *Pisces Anonymi*; verum licet quidam Anonymi etiam apud editos Ichthyographos occurrant, nihil tamen iis est commune cum alterutro horum duorum piscium, quos exhibemus. Ceterum vel imperito oculo intuenti apparet istos pisces esse ejusdem generis ac prope ejusdem speciei. Prope, inquam, nam in maculis quædam est varietas, quæ possit videri fat magna esse ad constituendam aliam ejusdem generis speciem.

20. DE ONBEKENDE VISCH. Hic æque est Anonymus, neque licet mihi ob defectum descriptionis hoc loco illi dare nomen, quia facilis esset in conjiciendo lapsus. Verum forma hujus piscis ostendit utcumque illum esse ex non ignoto genere piscium, etiamsi pictor noster adseverabat se nomen hujus nescire, non aliam ob causam, quam quia piscis iste carebat revera nomine. In colore vix quidquam peregrinum, sed singula ubique obvia.

21. DE ONBEKENDE VISCH. Majori utique jure hunc piscem Anonymum dictum reor, & ipse autoptes confirmabat conjecturam meam, quum ille advehatur interdum ex ora Seramentis. Omnis illi ornatus in capite, quod supra lineis est variegatum, infra vero maculis quamplurimis minutis signatur. Rarissime per ures istius speciei pisces unà reperiess, nec si reperiess capere velis, quoniam nulli rei sunt utiles, sed solum adservantur capitis causa.

22. DE ONBEKENDE VISCH. Quidquid in hoc pisce est dignum observatu, id totum pertinet ad caput; namque ab oculo quaquaversum lineæ coloris subcœrulei ducuntur, quæ ab utraque parte in medio capitis conveniunt, atque ibi angulos varios constituunt. Præter aculeos ac pinnas dorsuales habet aculeum paulo post branchias supra pinnas branchiales.

23. DE ONBEKENDE VISCH. Rarus est admodum hic piscis, qui nusquam reperitur præterquam in ea Amboinæ parte, quæ de *Kaimans Hoek* vocatur. Caudam gestat latissimam, aculeos aliquot in corpore summo ostentat. Ipsum corpus tenue, caput magnum est. Lyræ videtur species.

#### TABULA DECIMA.

I. **D**E STOMPNEUS, quasi *Simum* dicas. Magno est corpore & lato. Dorsum aliquot aculeos præfert inter se junctos, sed circa caudam pinnis non adhærentes. Pinnæ ab utraque cor-

poris parte sunt rotundæ in extremitate, atque iis quasi tenuiores adhuc pinnae prætexuntur. Ad solem solent incolæ hujus piscis carnes exficcare, ac deinde in usum adservare; nam recens capus hic piscis nihil valet.

2. DE STOMPNEUS. Satis convenit cum pisce proxime præcedente, sed multo minor est, quapropter Amboinenses eum aliquo tempore ad fumum exponunt, ac deinde assatum comedunt, quemadmodum nos haleces infumatas solemus. Ratio nominis satis patet intuenti iconem, quum rostro sit obstipito, quod nomine vernaculo significatur.

3. DE STOMPNEUS. Minutus est hic pisciculus, cui capitis figura idem nomen imposuit cum superioribus. Caput subviolaceum est, corpus flavescit, verum isti flavedini admixtum est nescio quid venarum rubescentium, quæ quasi oberrant per totum corpusculum. Venter dilute cœruleus est.

4. DE STOMPKOP. Caput huic pisci est prope rotundum & valde crassum, ore ad inferiorem partem recedente. In dorso, ut vides, eminet aculeus unicus, qualis, sed aliquanto minor, etiam sub ventre conspicitur. Color ei est viridis citrino mixtus, non certis maculis, verum confusis & inter sese confluentibus. Si forte sub summa aqua natantem conspicias hunc piscem, totus fere videtur oblitus laminis aureis & argenteis, unde jucundissimum spectaculum præbet. Idem apud alios observatur de Dorado.

5. DE STOMPKOP. Eadem figura capitis eandem nominis rationem peperit, licet hic piscis reliquo corpore satis differat à priori. Longior enim huic est pinnarum series, aculeus aut exiguus aut nullus. Latus est maculosum variis lineis distinctum, verus corporis color est fuscus sive gilvus, qui circa ventrem ad albedinem vergit.

6. DE HERTVISCH. Si quis dicat hunc sibi piscem videri non recte delineatum, næ ille me sibi assentientem habebit. Nihil certum igitur possum de eo affirmare. Si vera est icon in pinnis supra caudam reperiess semper figuram cordis humani, à quo illi nomen inditum.

7. 'T ZEEBOTJE, & nomen & piscis figura convenit cum eo, quem nobis eodem nomine dedit Willoughbæus, quem vide. Natatu hic piscis est celerissimus, quod videtur adscribendum pinnis non solum longioribus sed etiam validioribus, quam vulgo solent in piscibus latis reperiri. Pinnæ duæ priores, quæ dependent à ventre, sunt adeo duræ, ut rectè



rectè eas possis dicere osseas. His dexterime utitur in natatu dirigendo, cursum sistendo, aut etiam nocendo aliis piscibus. Nam potest eas antrorsum, retrorsum, & ad latera, cum libet, flectere, & ita natatum suum dirigere aut sistere.

8. & 9. DE HARTEVISCHEN. Duo, qui hoc loco exhibentur pisces, nomen habent à cervis, quia, ut ajunt, eorum corpus est conspersum ramulis duris, qui cornua cervina æmulantur. Esui non sunt quidem inepti, verum pellis illis ante omnia est detrahenda, ac ossea ista durities, quæ in cute reperitur, rejicienda. Color utrique est gilvus, & quidem totius corporis. Aculeos uterque in dorso non habet, alter duos in ventre alter tres. Reliqua undiquaque conveniunt.

10. DE TERNATENSCHÉ BAARS. Hic piscis & aliquot sequentes, licet percarum nomina gerant, non tamen satis plerique conveniunt cum genere percarum, quod apud nos est notum. Verum ita est statuendum: in aliis piscibus corporis similitudo occasionem dedit denominationi, in aliis saporis. Rectè igitur hic piscis annumeratur percis, utpote cujus caro plane convenit cum aliis percis. Corpus in medio cingitur linea latiore sive fascia. In dorso sunt aliquot aculei, in ventre unicus. Ab utraque parte versus caudam pinnæ longiores eminent.

11. DE GROTE RODE BAARS. Hoc illi nomen inhæsit à colore & magnitudine; nam quamvis diversæ magnitudinis soleant percæ cum primis esse, hæc species tamen plerumque reperitur major, quam aliæ quæcunque. Corpus rubet, ac flavescens paululum lineis latioribus à tergo ad ventrem distinguitur. Pinnæ sunt flavæ, atque aculeis distinctæ. Plane similem in Museo meo habeo piscem, quem hic effingendum curavi, N. 24. ut diligens rerum hujusmodi studiosus videat sibi à nostro pictore non imponi. Nomen autem isti meo pisci datum fuit *Ican Sosor*, quod quam bene conveniat cum aliis piscium nominibus Belgicis, fateor me nescire.

12. DE RODE BAARS. A colore rubro nomen percæ rubræ huic pisci est inditum. Namque toto corpore rubet, præterquam capite, quod colore propius ad flavedinem accedit, ut & pinnæ. Eiusdem coloris est linea, quæ corpus in utroque latere dividit, & à branchiis procedit ad caudam usque. Capitur tantum prope Amboinam, & quidem circa castellum Nasselaviæ, quod in ora insulæ extima jacet. Talia castella XXI. reperiuntur in tota insula.

13. DE AMBONESCHÉ BAARS.

Neque forma corporis, neque color multum abluunt à præcedentibus piscibus eodem nomine dictis. In ore tantum quædam conspicitur differentia, & in branchiis, quæ hic illic notantur lineis subcœruleis, qualis etiam conspicitur sub ventre. Linea, quæ in latere procedit à branchiis ad caudam albicat.

14. DE AMBONESCHÉ BAARS. Forma totius corporis in hoc pisce quidem satis respondet aliis cognominibus, sed colore & lineis lateralibus aliquantum differt. In dorso octo aculeos habet, uno ordine positos ac junctos membranula inter se, ac tandem cum pinnis. Sub ventre totidem præfert aculeos, quatuor versus caudam ac totidem in medio ventre, sed nullo ligamine junctos. Lineæ laterales sunt, dilutè cœruleæ, verum corpus flavescit.

15. DE AMBONESCHÉ BLEI. Trutta est Amboinensis, quæ in corpore aliquantum est cœrulea, at maculas habet subnigras. Pinnarum color est dilute violaceus, ut apud nos etiam in quibusdam piscibus videre est. In capite ab oculis versus mandibulam inferiorem linea ducitur, cui aculei aliquot exigui sunt impositi, quod videtur non indignum observatu.

16. DE ZEEBAARSCH. Forma & color satis convenit cum piscibus aliis, qui idem nomen sunt nacti, sed in colore capitis quædam est differentia, quum passim caput sit distinctum maculis flavescens & lineis cœruleis. In dorso multis aculeis gaudet, in ventre unico circa anum. Maculæ nigricantes reperiuntur in pinnis.

17. DE RIVIER BAARSCH. Ut superior species percæ denominatur à mari, in quo capitur, ita etiam hæc perca nomen est sortita à fluminibus, in quibus solet capi. Corpore est viridi, sed pinnis rubris. Caput quodammodo flavum est, verum non absque rubedine. Aculei in dorso primum inter se deinde cum pinnis junguntur.

18. DE KLIPBAARS. Minutulus est hic piscis, & ex eorum genere, qui inter rupes & scopulos natantes inde sibi nomen peperere, ut jam supra vidimus. Corpus huic pisciculus est varie maculosum, neque semper eodem colore. Hic, quem exhibeo pisciculus, erat colore helvo, maculis fuscis, quod in aliis aliter sese habet. Sub ventre sex aculei prostant; sed dorsum iis quasi oppletum est à capite ad caudam.

19. DE STEKELBAARS. Aliquanto latiore est corpore, quam videmus aut in nostris percis aut in piscibus co-



gnominibus, qui in hac Tabula exhibentur. Verum, ut jam supra observavi, habuerunt forsan Amboinenses alias rationes, quibus adducti sunt, ad nomen istud huic pisciculo dandum. Ad quam rem aculei, tam è ventre quam tergo prostantes, potuerunt dedisse causam.

20, 21, 22, & 23. AMBONESCHE BLEIEN, id est *Alburni Amboinenses*. Hos omnes junctim damus, quum iidem sint pisces, & eorum omnis differentia versetur in colore, striis, maculis, aculeis, & pinnis. Primus enim est rufi coloris cum maculis argenteis, secundus cœrulei (obscuri quidem in tergo, at lætioris in lateribus) tertius ejusdem coloris, sed interstinctus est maculis colore flavescente conspicuis, ultimus autem est plane violaceo colore, sed argenteis maculis, ac præterea in capite præfert lineam latam & versicolorem, quæ per oculos transit ac caput totum cingit.

24. Vide quæ notavi ad hujus Tab. Num. II.

### TABULA UNDECIMA.

1. **D**E SNIPVISCH. Si totum hujus piscis corpus adspicias, quod eximie est viride, diceres formam ejusmodi esse, ut postularet etiam caput crassum, & obtusum; interim ex ipsa icone vides rostrum ei esse prælongum, ac dentatum, sed tamen non usque ad finem, quæ capiti jungitur, apertum, unde rictus non valde magnus esse potest. Sex aut septem aculeos habet in dorso, in ventre nullos. Pinnæ sunt citrini coloris, ut & cauda, cui tamen adhuc limbus quasi accedit alterius coloris, plerumque cœrulei.

2. DE SALMONETVISCH. In hoc pisce describendo nulla prorsus est difficultas, quum ab aliis jam diu descriptus exstet. Salmoneta Lusitanorum est, qui ab aliis confunditur cum Alpheste & Cinnædo. Color variat, ut Bellonius inquit, sed tamen plerumque est rutuli, aut fulvi coloris, qualis etiam exhibetur in delineatione, è qua hæc icon est transsumpta. Vide Gesnerum in Corollario de Alpheste, Rondel. Lib. VI. c. 4. & alios Ichthyographos passim.

3. DE SALMONETVISCH. Licet hic piscis paulum differat forma à superiore, ejusdem tamen nominis est, & sic satis convenit cum descriptione, quæ apud alios, ut modo dixi, reperitur. Dentes habet acutissimos, caninis similes, ac os prælargum, ut fere majorum canum. Color est etiam rufus, sed paulo intensior, quam in præcedenti pisce.

In lateribus notatur linea candida procedens à branchiis ad caudam usque. In dorso vides quinque aculeos membranula tenui inter se connexos, post quos sequuntur pinnæ ad caudam usque continuatæ, quibus aliæ in ima parte à cauda ad anum usque respondent. Anterior corporis pars pinnis caret.


4. DE KONING VAN DE KABOSSEN, patrio Indorum sermone dicitur *Kabos Lauwd*. Egregie variis coloribus notatus est, quum corpus sit flavum, hinc inde maculis rubris à dorso & ventre ad medium latus procedentibus, sed tamen sese non contingentibus in medio. Caput, quod satis crassum est, armatum vides dentibus acutissimis. In eo præsertim regnat idem color, quem dixi esse macularum in corpore conspicuarum, verum præterea dilite cœruleus color hic illic in capite conspicitur. Reliqua, quæ hac pertinent, vide N°. ultimo hujus Tabulæ.

5. KABOS VISCH. Hic piscis eodem gaudet nomine, sed corporis color multum differt à præcedenti. Nam neque maculis est insignis, neque flavus, sed cœruleus, ac in tergo quodammodo nigricat. Referebat meus homo hujusmodi pisces frequentius capi, quam superiores, verum non semper esse eodem colore. Hic, quem exhibeo, illud singulare habebat, quod caput passim esset notatum coloribus vividis, cœruleo, flavo, rubro, ac maculis candidis. Propterea dignus fuit visus, qui delinearetur, quum illud raro in hac specie soleat accidere.

6. DE RIVIER CABOS. Ejusdem est & hic generis, nisi quod piscis fluviatilis est, & non capitur, præterquam in aqua dulci, quum præcedentes fere in salsa reperiantur. Quatuor in dorso habet aculeos inter se membranulâ junctos; quibus succedunt pinnæ ad caudam fere usque. Pinnæ branchiales sunt satis magnæ. In imo ventre infra branchias etiam pinnæ longæ conspiciuntur, ac denique ab ano caudam versus aliæ pinnæ decurrunt. Earum color est viridis, corporis cœruleus; verum linea, quæ latus percurrit, candentibus maculis est notata.

7. DE GELE KABOS. Dentes huic pisci sunt tam acuti quam Luciorum, quibus obvia quæque facile frangunt ac lacerant. Intra oculos fere macula rubra reperitur. Reliquum caput helvi coloris, corpus subflavum est, unde etiam nomen isti est inditum. Rarum est hoc piscis genus, & magni propterea pretii. Nam à delicatioribus hominibus magno studio




















studio quæritur propter singularem saporē. Æque valet coctus ac assus, neque cuiquam Orientalium piscium cedit, si spectes raritatem & præstantiam.

8. DE CHINEESCHE KABOS. Longius abit hic piscis à forma aliorum cognominum, namque ventre est largo ac prominente, quod in aliis non ita se habet. Corpore est etiā contractiore ac latiore. Corporis solum color est idem, qui in præcedente, sed præterea tribus quasi latoribus fasciis est vinctus, quæ à tergo ad ventrem procedunt atque coloris cœrulei sunt. Dorsum horret sex aut septem aculeis, quos pinnæ excipiunt, quales etiam reperiuntur in imo ventre, ac sub branchiis. Chineses hunc piscem in deliciis habent, ac solent magno eos mercari, si quando in forum piscatorium inferantur.

9. DE BORROWESCHE KARPER, sive *Carpio Borrowensis*, in quo nihil fere singulare aut notatu dignum occurrit, nisi forte quod dorsum sit colore cœruleo, venter gilvus. Nec opus est, ut addam hunc illud cum piscibus ejusdem nominis commune habere, quod egregii sit saporis ac carne firma, namque affinitas earum rerum cum aliis carpionibus fecit, ut illud huic nomen imponeretur, licet figura nonnihil differat.

10. DE RIVIER OF BERGKARPER. Nihil etiam in hoc pisce singulare aut eximium. Omnia habet communia cum nostris carpionibus, ac proinde facile ulteriori descriptione supersedere mihi licet, quum vel apud plebem hoc piscium genus sit notissimum.

11. ICAN LAYER, quem nostrates de *Zeilvisch* vocant, Brasilienses *Guebu-cu*, ut observat Markg. Hist. Bras. Lib. I. c. 15. cujus descriptio optime convenit cum hac nostra icone. Dicit enim Markgravius piscem istum esse oblongo & ferme tereti corpore, capite porcino, rostro longo, acuto, osseo, duro, quod quam bene conveniat cum nostra icone, potes facile cernere, simulac oculos in eam conjeceris.

12. ICAN LAYER. Quem hîc exhibitum vides piscem, ego addendum curavi è Museo meo, ut justus rerum æstimator videat, quæ sit differentia inter hunc meum & alterum istum à meo homine descriptum. Namque, licet non negem fieri posse, ut præcedens piscis sit quidem ejusdem generis sed non plane ejusdem speciei, notabilis differentia cernitur inter utramque iconem. De hac autem pro certo adfirmare possum piscem prorsus ita se habere, ut hic exhibetur. Corpus est longiusculum & subnigrum;

nec pinnarum aut macularum lateralium alius est color, nisi quod maculæ sint aliquanto nigriores, quam reliquum corpus, pinnæ autem nigerrimæ. Rostrum est prædurum, acutum, ejusque superior pars dimidio longior est quam inferior. Pinnæ in dorso sunt maximæ, in ventre non quidem tantæ, sed tamen satis magnæ, præsertim quæ infra caput à ventre dependent. Natatu est celerrimus, naturâ pugnacissimus. In eo describendo singularem curam dicit se adhibuisse Guil. Pifo, quem vide Lib. III. p. 56. & adde Willoughb. Tab. I. 27. & Apend. 5.

13. DE BONTE CAFFER. Hoc nomine aliquot pisces vidimus Tab. IX. quibus & hunc possis addere, ob eximiam colorum varietatem. Scilicet corpus ipsum est subviride, excepto quod linea candida à branchiis procedat, atque ad caudam usque procurrat. Caput notatum est coloribus variis, qui interdum in hac specie alii atque alii sunt. Dorsum totum horret aculeis longioribus ac membranula inter se junctis. In ventre sex similes reperiuntur. Nullæ præterea pinnæ, si branchiales excipias, & illas quæ ab imo ventre prope caput dependent. Adde quod in corpore quidem reperiuntur maculæ quædam, verum eæ sunt non alterius coloris quam corporis, id est viridis, sed paulo intensioris.

14. 'T SERGEANTJE. Ita dicitur, quia nunquam fere solus capitur, sed cum aliquot piscibus, qui eum sequuntur, ac quibus sese veluti ducem præbet viæ. Corpore est fere rotundo ac striato, ejusque color est plerumque flavus in medio, verum ad caput & caudam vergit ad cœruleum. In tergo, præter tres aculeos ostentat cuspidem longiorem ac projectam ad caudam. Ceterum à ventre non habet aculeos, sed pinnas, quales etiam cernuntur in tergo post cuspidem longius prominentem. In superioribus Tabulis jam aliquot pisciculi sunt positi, qui quodammodo cum hoc conveniunt.

15. DE GOWELVISCH. Singularem Orientalium insularum incolis utilitatem præstat pisciculus hic, quem exhibeo. Namque carne est satis bona, & fere ubique prope littora reperitur in magna multitudine. Harengum fere ajunt æquare magnitudine. Cutis ei est dura, quæ tempestive, id est cum piscis adhuc vivit, detrahitur. Deinde in cibum adsumitur. Exterior corporis color flavet, sed venæ, quales in marmore cernuntur, totum corpus pererrant. Eæ sunt rufi coloris, quo etiam caput est notatum. Aculei huic nulli sunt, sed pinnæ ab utraque corporis parte longiusculæ.



16. **T VISCHJE PAMPUS.** Et hunc pisciculum magni faciunt Amboinenses non solum, sed fere omnes qui Orientalem Indiam habitant, ob singularem, quam præbet, usum. Nempe facile ad solem expositus exsiccatur, ac tum diutissime incorruptus perdurare potest. Si uti eo velis aquâ tantum est macerandus, & tum satis bonus est. Eam ob causam navēs, in longe distitas regiones abituræ etiam magnam multitudinem talium piscium ficcatorum secum avehant, tanquam certissimum contra penuriam cibi remedium. Navales focii in jentaculo aut merenda plerunque eo utuntur crudo, quemadmodum alibi vulgus aliis piscibus. Corpus huic pisciculus est latum ac subviride, sed colore variegato, nec semper certo. In dorso quinque aculei ad caput obversi cernuntur, post quos vides cuspidem unam longiorem, tam in ventre quam in tergo, quibus adhærent pinnæ, ad caudam usque continuatæ ac uniformes.

17. **CABOS LAUWD.** Eximius hic piscis, ad illustrationem piscis superius exhibiti, præter alios è Musco meo huc accessit, & dignissimus est, qui describatur, tam ob præstantes colores, qui passim in eo cernuntur, quam quod certus sim delineatum eum esse accuratissime. A summo ore nigricat, ut & superiori corporis parte; verum subinde dorsum est distinctum aut conspersum maculis candidis, quas fere argenteas possis dicere. Ab imo ventre ad latus medium lineæ ducuntur latiores & fuscæ, quæ in maculas rotundas desinunt, nec tamen pertingunt ad superiores sive dorsuales maculas. Ambitus oculorum aliquantum rubet, licet reliquum caput aliquam viriditatis speciem præbeat. Pinnæ branchiales gilvi sunt coloris. Aculei, tam dorsuales quam ventrales, juncti sunt tenui membranula candente, ac exiguis maculis nigris notata. Cauda tandem est etiam quodammodo nigricans, sed in superiori parte, quâ adhæret corpusculo, est macula nigerima, in qua cernitur quasi lunula candidissima. Quæ omnia fane adspectu sunt jucundissima.

#### TABULA DUODECIMA.

I. **D E GROTE BYTER.** Jam Tab. V. similem noster exhibuerat piscem & nomine & corpore, atque poterat hunc omisisse, nisi illi dignus visus fuisset, qui exhiberetur, quia hic nullis neque maculis neque lineis notatus est. Reliqua, quæ de eo dicendo erant, jam dixi Tabulâ indicata N°. 3. Addiderat &

tertium, sed ego tantum N°. 2. caput exhibendum curavi, propterea quod corpus omnino cum hoc conveniebat, atque ipsius capitis exigua quædam esset differentia.

3. **DE BYTER.** Dubium non est, quin & huic sit illud nomen inditum à mordacitate. Ore est prælargo, ac dentibus magnis & acutissimis. Corpus nullis maculis neque lineis est variegatum, sed uno eodemque colore, qui dilute cœruleus est, æquabiliter ubique insignitum. In dorso aliquot aculeos, ac postea pinnas habet, quibus in ventre ad anum usque caret, verum ab ano usque ad caudam pinnæ cernuntur. Haud difficile esset hunc piscem revocare ad genus aliquod è piscibus apud nos cognitis. Ab asello molli non multum figurâ distat, quem etiam æquat magnitudine. Indi haud illibenter eo pisce vescuntur, at nostrates eum, ut viliorē, rejiciunt.

4. **DE BYTER.** Et in hoc pisce eadem est nominis ratio atque causa. Figurâ corporis non multum abit à piscibus cognominibus, sed longissime colore. Namque licet potior pars corporis sit cœrulea, maculæ tamen rubentes & flavescētes, & quidem grandiusculæ, in capite, lateribus & versus caudam reperiuntur. Reperitur nusquam frequentius, quam prope Amboinam, ubi incolæ isto pisce non illibenter vescuntur, præsertim cocto, & cum jusculo acetario apposito.

5. **DE GROENE BEER.** A voracitate, credo, ac rapacitate illud nomen huic pisci est repertum; qui ideo cognomine, *de Groene* vocatur, quia corpus quodammodo viride est. Capitis pars anterior rubet. Aculei in dorso sunt longiusculi & satis magno numero. Nec quidquam præterea in isto dignum est observatu.

6. **DE GROTE BEER.** Quid causæ fuerit, quare hoc nomen huic pisci sit impositum, ne conjectura quidem assequi possum. Illud scio, Guapervæ esse speciem, quam maximam vocat Willoughbæjus, atque exhibet Tab. I, 23. Vide etiam quæ dicat idem Auctor Lib. III. c. 3. ubi reperies quædam, ad colorem quod attinet, huc pertinentia, quum color in hoc pisce, quem exhibeo, sit fuscus & alicubi nigricans. Ceterum, in ipso capite non tantum habet aculeum sive cuspidem longiorem & rigentem, sed etiam plures istiusmodi intra oculos & superiorem oris partem, sed multo minores. A ventre quoque similis aculeus, durus & osseus plane, propendet. Capitur circa insulam Borneo. Cutis est prædura ac de-

tra-



trahenda. Caro reperitur firma ac bona, sapore nonnihil ad carnem vitulinam accedente.

7. DE BEERIN. Nisi ratio autopten nostrum fugit, hic piscis est femella superioris. Ut dicam, quod res est, illud mihi non valde simile vero videtur. Nec tamen nunc libet diutius immorari in describendo pisce hoc ignoto, aut in inquirendo ad quod potissimum genus piscium sit referendus.

8. & 9. DE TYGERVISCHEN. Horum piscium corpora lineis æqualibus à capite ad caudam procedentibus notata fecere, ut iis à Tigride nomen quæretur. Nulla notabilis inter utrumque differentia est, nisi in colore & pinnis ventralibus. Prior est colore gilvo, lineis nigricantibus. Posterioris corpus subcœruleum est, verum lineæ itidem nigricant. Cauda utrique est viridis, qui color conspicitur etiam in pinnis. Verum tam cauda quam pinnæ sunt notatæ magna multitudine macularum fulvarum, quod certe jucundissimum est adspectu. Dicitur esse species aselli, quem quodammodo etiam sapore refert.

10. DE ZUIGER. Vides huic pisci esse os admodum exiguum, quale fere est iis, qui fugendo, unde nomen illis impositum, cibum quærunt. Color est fuscus aut subniger, nullis maculis interruptus, nisi quod prope caudam sit macula cœrulea. Ab utraque parte corporis reperiuntur pinnæ satis latæ ac densæ, quod etiam de cauda est observandum.

11. DE ZUIGER. Aliud plane pisciculi genus est quam præcedens, atque omnino ab illo diversus, licet in hoc quoque nominis ratio constet. Ore enim caret, sed pro eo habet proboscidem, qualem fere videmus esse muscis & aliis id genus insectis, quæ fugendo quærunt victum. Eâ iste piscis quoque utitur simili modo. Adnatat obviis quibuscunque, atque è singulis attrahit, quod in iis est succi. Dum ita omnia scrutatur prope fundum natat, ut res ibi delitescentes facilius possit appetere. Nihil tamen attrahit, quod ei possit nocere, aut hominibus, qui eo solent vesci. Propterea in deliciis habetur, atque ab Amboinensibus magni fit.

12, & 13. DE ZAALVISCHEN, sive *Ephippiati*, ita dicti, quod eorum dorsum in ephippium adsurgat, veluti præbiturus commodum fessoribus locum. Rostrum habent Psittacinum. In istis porro illud admodum singulare est, quod sint cataphracti post anum atque corio durissimo armati. Id sub ventre definit in

tenuissima lamina, ac eis est pro aculeis & pinnis. Eâ obvios pisces lacerant, quum non solum sit valde tenuis, sed etiam adeo dura ac acuta, ut aliorum piscium pellem possit facile discindere, veluti si cultri essent acutissimi. Porro figurâ prorsus inter se similes, colore non item, in quo aliqua observatur differentia, etiam si ea non sit magna.

14. DE HANGLIP. Inferior hujus piscis mandibula ita propendet, ut fere nullum usum præbeat illi, unde nomen est huic inditum. Corpus est coloris dilutè cœrulei, qui sub ventre albescit, verum infra caput ab inferiori mandibula usque ad pinnas ventrales est notatus macula rubicunda ac lata, qualis etiam cernitur in summo dorso. Ex eo ibidem prorumpunt quatuor aculei ad os reflexi, ac satis magni, sed nullo ligamine juncti. Capitur prope insulas in mari Orientali, cui nostrates Trium Fratrum nomen à similitudine imposuere.

15. DE KNEVELBAART. Bagræ hæc est species, atque à Belgis nomen accepit, quod veluti superioris barbæ partes ex utraque oris parte progrediantur. A mandibula inferiori dependent duo cirri satis longi, quod in hoc piscium genere fere solitum est. Colore est inter cœruleum & candidum, sed ubique conspersus rubris quasi venis, quales cernuntur in marmore versicolore. Cauda est bifurcata. Pinnæ duplices prostant in dorso, ac totidem in ventre, præter pinnas branchiales, quæ pro corporis modulo magnæ sunt. Id, quod ab autopte nostro vocatur *Knevels*, est osseum, durum ac nigricantis coloris. Alium hoc nomine piscem, sed diversum, exhibui Tab. VII. N°. 14.

16. 'T ZEE-ZWALUWTJE. Nihil hic pisciculus habet commune cum aliis, quibus ab auctoribus Ichthyographis idem nomen tribuitur. Piscis est exiguus atque saxatilis. Dubites merito rostrumne an cauda, an vero utrumque, illi meruerit hirundinis nomen, quum rostro sit acuto & cauda longa ac bifida, quod etiam observatur in avicula, quæ ei nominis causa fuit. Nihil præterea de hoc pro certo affirmare possum, quum meus homo diceret hujus speciei singulos pisces fere semper à se invicem differe.

17. DE PEERVISCH, sive *Piscis piriformis*. Ratio nominis ex ipsa icone satis superque elucet, quoniam pisciculus hic sit plane forma non tantum piri, sed etiam habeat quorundam pirorum colorem, nempe flavescens. Per caput, ad anum ventrem usque, procurrit linea latior cœrulea. Nulla est differentia inter



pinnae dorsuales ac ventrales, quoniam utraque aculeum præfixum habent, atque sint colore ruffo, qui & caudæ est.

18. DE HORENVISCH. Nova est caprisci species, quæ duo cornua præfert, ac os habet porcinum. Singulare est, fateor, piscem talem alibi reperiri, sed tamen non ideo pro ficto habendus. Forfan erit tempus, quo rerum naturalium indagatoribus erit notissimus. Nunc autem, quantum ego scio, plane ignoratur, ac ideo fidei nostri pictoris relinquendus.

19. KAPELLA KITSJUL, id est *Piscis parvo capite*, ita dictus, quia caput exiguum est pro ratione corporis satis crassi. Hujus etiam caput, ut paulo ante in pisce piriformi vidimus, linea seu fascia cingitur, quæ etiam corporis partem non minimam complectitur. Esui non ineptus est, sed grati saporis, licet parvus sit admodum, & à solis Mauris vescendi causa capiatur.

20. 'T ZEE-KEMPHAANTJE. Etiam hic saxatilibus piscibus adscribendus est. Corpusculum totum consitum est in dorso aculeis non inter se junctis, sed tamen satis firmis, quales etiam aliquot in utroque latere cernuntur. Oris rictus est satis magnus, pinnae branchiales longæ, ut etiam illæ, quæ ab imo ventre dependent. Earum color est helvus. In corpore non alius obtinet color quam dilute cœruleus, qui circa ventrem magis ac magis albescit.

21. DE ZEE-POSCH, sive *Porculus marinus*, singularis est atque eximiæ raritatis pisciculus ob colores, qui in ejus corpore conspiciuntur. Color est subviolaceus, verum à cauda usque ad caput cernuntur lineæ candentes. In tergo habet aculeos aliquot, quorum numerus non semper est idem. Infra branchias duo dependent cirri, & præterea pinnae, post quas sequuntur aculei, ac dein iterum pinnae ad caudam usque.

22. DE WAYERVISCH. Huic pisci natura tribuit pinnae in dorso longiores, quæque ad caput vergunt, ac constituunt quodammodo flabelli figuram; inde illi nomen *de Wayervisch* adhæsit, quoniam nos ita flabellum vocamus. Ceterum, duo cornicula supra caput eminent, sed exigui in hoc pisce usus. In dorso ac in ventre aculeos habet quamplurimos, inter se membranula junctos. Maculas quoque in dorso tres habet quadratas ac rubicundas, quum reliquum corpus sit coloris dilute cœrulei. Indi utuntur hoc pisce ad cibum, sed infumato; nam alioqui minus valet.

23. HET GOUTVISCHJE, sive *Pis-*

*cis auratus*, datur etiam piscis argenteus istius magnitudinis ac formæ non differens. Hoc illi nomen jure meritissimo est datum à colore, qui aurum æmulatur, tam colore quam fulgore. Parvulus est & nulli rei idoneus, quare non capitur à quoquam nisi ab amatoribus hujusmodi naturæ opum. Corpusculum in dorso est pinnis obsitum à capite ad caudam, in ventre, ab ano ad caudam etiam usque, reperiuntur quoque pinnae. Infra caput cirri dependent.

### TABULA DECIMATERTIA.


1. **D**E GROTE EILANDER. In medio latere hujus piscis magna cernitur macula flavescent, quæ interdum quidem variatur, sed nunquam tamen deletur aut in plures dividitur. Ista macula visa fuit nonnihil esse similis insulæ alicui, atque ideo nomen ab insulæ significatione petiit huic pisci est impositum. Corpus quoque viride ac undulatum est, præterquam in ventre, ubi magis albescit. Aculeos cernes in hoc pisce nullos, sed pinnae, quarum istæ, quæ adhærent branchiis, sunt satis magnæ.

2. DE PERROQUITVISCH. Cutis huic pisci est admodum dura, sed non ingrata adspectu, quum elegantissimis coloribus sit variegata, plane ut psittaci minores, quos Peroquetos vocant, solent. Inde nomen pisci inditum. Nulli non colores, qui oculos feriunt, in illo inveniuntur. Viridis, flavus, cœruleus, ac purpureus suas habent in illo vices, sed non semper eodem loco reperiuntur.

3. DE PERROQUITVISCH. Licet nomen in hoc pisce sit idem, quod in superiori, non est tamen eadem nominis ratio, verum magis nomen videtur impositum à rostri forma, quæ quodammodo procurrit atque incurvatur, ut videre est in psittacis. Nihil præterea in hoc singulare est aut notatu dignum. Nam quod parvulus est, & à solis Indis in cibum convertitur, id cum aliis quoque piscibus illi est commune.

4, & 5. DORADO, quem etiam *Delphinem* vocant, est quorundam judicio utilissimus atque omnium optimus piscis. Sive enim colorem respicias, sive formam corporis, sive saporem carnis, omnia sunt ita constituta, ut nulli cedant alii pisci. Qui hic exhibentur sunt plane ejusdem speciei, sed non capti prope locum eundem; atque ita factum est, ut utriusque icon apponeretur. Color in utroque est omnino idem, verum difficile




















cile est dicere quo nomine istum velis indicare, quum videatur mixtus ex aureo, argenteo, purpureo, viridi, ac coeruleo, è quibus omnibus semper iste color prævalet, qui maxime expositus est radiis solaribus respectu intuentium. Igitur prout movetur hic piscis, ita variatur colore, qui tamen semper in suo genere est intensus ac pulcherrimus. Prior horum captus fuit prope Hilam, posterior prope Bandam, sed tamen huic plane similes etiam reperiuntur prope Ternaten. Multa de his passim apud Ichthyographos, quare non opus est, ut plura hic addantur. Præter alios vid. Willoughb. Tab. V. 10.

6. HET RODE DOLPHYNTJE. Est quidem hic piscis è Delphinum genere, sed singularis prorsus species, quum asellos molles non soleat magnitudine excedere. Forma tamen satis convenit cum delphinibus apud alios descriptis. Hic, quem exhibeo, fuit captus prope Hilam. Corpusculum est rotundum fere, cutis violaceum colorem ostendat, qui tamen circa ventrem magis albescit.

7. DE GELE JUFFER. Quasi dicas *Dominam flavam*. Ita à colore dicitur, qui flavus est in ventre ac lateribus, verum tamen è dorso ad utrumque latus progrediuntur maculæ sive fasciæ rubicundæ, quæ lineis coeruleis ad utrumque latus sunt distinctæ. Octo oculos habet in dorso, quorum longissimus est, qui conspicitur loco ultimo, qua adhærent pinnis. Sub branchiis in imo ventre cernuntur etiam pinnæ longiores, non dependentes, sed ad latus reflexæ.

8. HET JUFFERTJE VAN AMBONA, id est *Domicella Amboinensis*, cujus nominis causa aut ratio evidens est nulla, nisi forte quod colores in hoc pisce sint admodum vividi, qualibus fere puellæ gaudent in vestitu. Corpus non est longius quam latum est. Ab utraque parte aculeos habet ac pinnas exiguas, verum è cauda duo aculei longiores ac ossei prominent. Color utcunque flavus est, caput rubet, rostro excepto, quod est coeruleum ac osseum.

9. HET JUFFERTJE VAN AMBONA. Satis magna differentia est inter hunc & superiorem piscem, & tamen, ut vides, idem nomen, quæ res facit, ut tanto magis credam vivos colores causam fuisse nominis imponendi. Scilicet & huic pisci color est vividus, violaceus nempe, sed maculis flavescentibus & coeruleis distinctus. Caput totum est flavum. Nulli sunt aculei, sed pinnæ, tam in dorso ac ventre, quam sub branchiis, quæ longiusculæ sunt.

10. HET RODE JUFFERTJE. Pisciculus est saxatilis, atque minimæ magnitudinis, sed variis coloribus, ut aliæ cognomines notatus. Quæ colorum varietas etiam notatur in pinnis è dorso prominentibus. Præsertim autem etiam fulvus & rufus color in eo est conspicuus. Prior in ventre ac dorso, usque ad corporis medium, ubi rufus initium sumit, qui etiam in latere est ac priori ventris parte conspicuus.

11. DE RODE JUFFER. Raro hujus formæ pisces capiuntur, atque ideo vix noti sunt. Apud diligentes talium rerum indagatores tamen reperiuntur. A capite ad caudam usque quasi cinctus est fasciis coeruleis, inter quas quamplurimæ, sed exiguæ, maculæ reperiuntur. Eæ albicant, verum earum ambitus est subniger. Caput est non magnum. Quinque aculei sunt in dorso, quibus succedunt pinnæ latiores ac rotundæ. Sub ventre binas pinnas habet, ac duos aculeos intermedios.

12. DE SPITSBEK. Rostrum, quod in hoc pisce fere accedit ad alicujus aviculæ rostrum acutum, fuit causa nominis ei reperiendi. Rictus est exiguus pro modulo ac magnitudine corporis. Color in eo est coeruleus, sed per medium caput fascia procurrit, quæ variis coloribus est insignis. Sapore Alburnum refert, à quo etiam corporis figura non multum distat.

13. DE SPITSBEK. Minutus est hic pisciculus, & saxatilis. Ideo non referri potest ad certum aliquod genus, quum saxatiliū tanta sit multitudo ac varietas, ut Natura ludibunda videatur in parvulis hisce etiam voluisse exercere curiosorum hominum studium. Præter colores admodum varios, & aculeum longiorem, nihil fere in illo observatu dignum.

14. DE LANGNEUS. *Nasonem* à nasi, sive mandibulæ superioris longitudine, recte hunc piscem vocaveris. Crediderim eum esse Caprisci speciem, quod videtur indicare prostrans in dorso aculeus. Caput subcoeruleum est, corpus à dorso ad latus fuscum; atque à latere ad ventrem, qui quodammodo tumidus est, ac rotundus, flavum. Præter pinnas branchiales, duæ, sed breves, propendent à ventre infra caput.

15. DE SPITSNEUS. In dorso supra caput adsurgunt pinnæ latiores, quæ videntur ab aculeo uno aut altero sumere initium. Idem non est color universarum pinnarum, sed quum flavæ sint ea parte, quæ corpori adhæret, extrema tamen earum pars est viridis, ut & cauda. Corpus ipsum est violaceum, ve-



rum una aut altera macula subviridi distinctum.

16. DE SPITSNEUS. Hujus piscis forma à superioribus plane est diversa, sed os quodammodo simile, atque ideo annumerandus piscibus, quibus acutum os nomen reperit. Corpus flavo colore est insigne, caput rubet. Sub ventre nonnihil coeruleum, sed albicans reperitur. Capitur præsertim circa insulam Hilam.

17. DE SPITSNEUS. Hic magis formâ superiori similis est quam quisquam præcedentium & cognominum piscium. Rostro acuto est etiam præditus. Corpusculum dilute coeruleum est, ac maculis albicantibus notatum. Nil aliud observatu in illo dignum reperitur; neque enim ob corporis parvitatem in ullo fere numero habetur. Quatuor aut quinque pollices longitudine nunquam excedit. Nusquam capitur, nisi prope Laricam.

18. DE MAREELPRIEM. Non dubito, quin hic piscis in plerisque conveniat cum Marena Schonfeldii, adeo singula in eo, ac pisce, quem sub Marenæ nomine ille describit, conveniunt. Harengo etiam non est dissimilis, tam quod ad formam corporis, quam quod ad argenteum circa ventrem colorem ac squammas facile deciduas attinet. Amboinenfes frequenter eo utuntur in cibo, sed præsertim fumo indurato, aliqui enim saporis est minus grati.

19. LINGUA. Corpore est lato & maculoso. Macularum color est fere albus, reliqui corporis flavus. A branchiis dependent pinnæ longiores. In ceteris, tam si saporem quam corporis formam spectes, convenit cum Buglosso.

20. LINGUA. Etiam hic est species à priori nonnihil differens, præsertim in colore, qui in eo est coeruleus. Præterea per medium latus procurrit linea candida, quæ etiam per caudam mediam transit. Capitis etiam color nonnihil variat, ut & pinnarum, quæ à capite proponent.

21. DE PARADYSVISCH. Mustelæ marinæ species videtur, sed non in omnibus conveniens cum reliquis hujus generis piscibus, qui hactenus descripti sunt apud Ichthyographos. E priori ac superiori capitis parte prominent duæ cuspides curvæ ac duræ. Aculeos aliquot habet in corpore summo, unde initium sumunt pinnæ, quæ per caudam ad medium ventrem usque continuantur. Nam caudam proprie non habet, sed ejus locum obtinent pinnæ, ut dixi, continuatæ, quæ illi pro cauda sunt.

22, & 23. PARADYSVISCHJES. Fe-

re conveniunt cum isto pisciculo, quem præcedenti Tabula N<sup>o</sup>. 16. sub nomine hirundinis marinæ exhibui. Quid causæ fuerit nunc eos exhibendi sub alio nomine, plane ignoro, nisi dicendum sit illos quoquo modo esse similes apodi Indicæ, quam nostrates avem Paradisicam solent nuncupare.

24. 'T BERGVISCHJE. Id nominis meruit hic pisciculus à dorso in altitudinem producto, sive gibbo. Describitur passim apud Auctores, quos vide. Præsertim Jonstonum Tab. XIII. & ejus descriptionem apud eund. p. 24. Illud in hoc nostro est singulare, quod ex ipso gibbo, quæ incipit ad caudam descendere, aliquot promineant tuberculi, quales etiam in lateribus reperiuntur.

25, & 26. ZEEPAARDTJES, sive duo *Hippocampi*. Pisciculi sunt satis noti, & quorum effigies passim reperiuntur, non tantum apud Ichthyographos, sed etiam apud Itinerarios. In Italia satis frequens est, atque inde fit, ut exhibeatur in quibusdam Itinerariis Italicis, ut apud Missonum Tom. I. pag. 295. ubi dicit Italis hunc pisciculum venire nomine *Cavaletto*, eum esse crinitum, sed crines decidere, simulac coeperit ficcari, ac singulæ quædam alia de hoc pisciculo adfert, quæ non sunt indigna scitu. Crinitos exhibet etiam Willoughb. Tab. I. 25. quem etiam operæ pretium est videre Lib. IV. c. 9. ut jam de aliis nihil dicam, apud quos depicti ac descripti exstant.

#### TABULA DECIMAQUARTA.

I. **D**E CHINEESCHE BILANG, quem non dubito vocare *Congrum Coronatum*. Habet enim in capite aliquot sive aculeos sive pinnulas prostantes, quibus adsimilatur corona. Dicitur hic piscis esse carne pingui, sed spinosa. Eam ob causam nostri homines raro isto vescuntur, idque tanto magis, quia Chineses eum magno mercantur, si quando in foro reperiatur. Ex eo ferculum conficiunt, cum allio & *Capfico*, sive, ut nos vocamus, *Pipere Brasiliano*. Atque eo modo mensis illatum ajunt eum esse gratissimi saporis.

2. DE ALPHORESCHJE GEEP. Et hic piscis ex Acorum, (ita enim malo cum Martiale scribere quam cum aliis Acuum) genere est, & quidem maximus, ut eum videtur vocare Willoughb. Tab. P. 8. Non habetur à ditioribus in magno honore, sed fere relinquitur militibus & aliis vilioris fortis hominibus, qui eum vili pretio mercantur. Mordax est admodum, atque ejus morsus est adeo venenatus,



natus, ut quidam ex eo sint mortui. Corpus est squamosum ac coeruleum. In dorso bis adfurgunt pinnæ ac toties deficiunt. Primum circa medium corpus, ac deinde non procul à cauda. In ventre autem unica tantum pinnarum series reperitur ab ano ad caudam.

3. DE ALPHORESCHÉ GEËP. Idem est plane piscis cum præcedenti, atque ideo singula, quæ de illo dixi, etiam de hoc sunt dicenda. Pinnas in dorso non habet, nisi circa caudam. In reliquis similiis est alteri isti, excepto quod aliquanto minor sit corpore.

4. DE GROTE HALFBÈK. Vocatur acus Indica mandibula inferiore in spiculum producta à Willoughb. & etiam icon habetur in Itinerario Nieuhoffii. Etiam hic acus est, sed cujus mandibula inferior longiuscule est producta, quales etiam apud alios scriptores reperiuntur. Capitur prope Ambonam. Color squamarum, quas habet densissimas, est argenteus. Maculæ tamen in lateribus nigricant. Ajunt eum magnitudine non cedere Luciis mediocribus, neque etiam sapore, unde fit, ut à quibusdam habeatur in deliciis.

5. 'T HALFBÈKJE. Acus minor est, nec excedit magnitudine harengum vulgarem. Corpus est dilute coeruleum ac undulatum. Reliqua optime conveniunt cum iis, quæ apud Ichthyographos de hoc piscium genere dicuntur. Minor species est præcedentis.

6. DE JAGER, quasi *Venatorem* dicas. Piscis est admodum rapax, ac natatu celerrimus. Inde fit, ut facile alios pisces consequatur. Tota piscis figura satis ostendit eum valere natatu, ac rapacem esse. Os enim illi est prælargum; dentes canini atque acutissimi. Pinnæ priores, quæ in dorso conspiciuntur, sunt longissimæ; aliæ breviores, quales etiam ventrales. Color corporis est argenteus, sed maculæ quædam rubicundæ, nullo certo ordine, in eo conspiciuntur. Eo ad cibum non utuntur Amboinenses, nisi forte infumato.

7. DE JAGER. Forma ac nomen hujus piscis sunt eadem, quæ vidimus in superiore. Neque ulla differentia est inter utrumque, quam quòd hic præter pinnas dorsuales nullas alias habeat. Nam quod in ore aperto nulli cernuntur dentes, id reor esse adscribendum pictoris incuriæ.

8. DE GROTE JAGER. A corporis, præ ceteris hujus generis piscibus, nomen *Magni Venatoris* meruit, qui hoc loco exhibetur piscis. Forma corporis cum duobus præcedentibus undiquaque

convenit, verum in pinnis quædam reperitur varietas. Namque præter tres in dorso aculeos, qui aliis defunt, pinnas habet non tantum longiores, sed etiam maculosas. Earum color est citrinus, verum maculæ partim rubent, partim albicant. Similes etiam observantur in pinnis branchialibus & cauda. Color pisci est quodammodo viridis, sed undulatus, atque cum movetur, diceret totum esse argenteum. Per medium latus quoque candida, splendens, sive argentea, linea transit, quæ ab ipso capite uno tramite ad caudam usque continuatur.

9. DE KIKVORSCHVISCH. Eundem locum cum ranis hic piscis incolit, lacus nempe & paludes, ac ex earum captura sibi victum quærit, unde illi nomen. Natatu satis celeri gaudet & dentibus acutissimis, quibus ranas & alia id genus aquatica solet appetere. In capite præfert aliquot aculeos sive cuspides, nullo ligamine junctas, quas aliæ sequuntur longiores in dorso sed inter sese cohærentes. Prope caudam pinnæ sunt in utraque corporis parte. In colore nihil est dignum notatu; verum valde mirabile est, quod huic pisci producuntur branchiæ, non in pinnas sed pedes, quibus, cum opus est, in aquis prope fundum utitur. Ceterum nihil minus quam ignotus est hic piscis, quum proftet apud Ichthyographos plerisque, qui eum exhibent sub nomine Guapervæ Brasiliensis, quo primum à Markgravio est dictus, ac deinde descriptus à Willoughb. Lib. III. c. 3. ac jam ante à Jonstono, quem vide sis Tab. XXXVI. & alios, quos non exscribo.

10. 'T ZEEVARKENTJE. Non est hic æque notus ac superior, sed tamen quum piscis iste habeat duos pedes, ac satis notus sit, minus mirum videbitur, si quis fidem habeat auctori meo talem piscem, quatuor pedibus, cum opus est, progredientem, prope Amboinam reperiri. Progreditur is aliquando in terram, & incedit satis celeriter, sed gradu infirmo, & lassus facile labitur. In aquis multo celerius progreditur in fundo, sed raro, quum plerumque natet, & ex aliorum piscium captura victum sibi quærat. Totum dorsum ac caput sunt cataphracta, sive tecta pelle tam duro, ut vix possit perrumpi, plane testudinum more. Sub ventre est tamen cutis mollis atque subflava. Dorsum totum horret aculeis fortibus & acutissimis. Pinnæ dorsuales ab iis ad caudam vergunt, atque præterea sub cauda reperiuntur pinnæ rotundæ. Ceteris pinnis caret.

11. DE VARKENSBEK, cui rostrum porcinum suum nomen peperit, est piscis



scis latus, & squamosus, in quo nihil singulare, aut notatu dignum, præter rostrum reperies. Namque color est illi, qui fere est naturalis omnibus apud nos piscibus, nempe dilute cœruleus. In aculeis aut pinnis etiam nihil est, quod abit à vulgatiore piscibus.

12. DE VARKENSBEK. E figura utriusque piscis satis patet utrumque ejusdem esse generis, ac specie non multum inter se diversos; verum hic posterior dignus fuit visus, qui adponeretur, quoniam colores in eo sunt longe alii ac in præcedente, atque aculeos aliquot in ventre habeat, quibus alius iste caret. Nempe dorsi color ac potior capitis pars nigrescit, inferiore capitis parte rubescit. Quin etiam venter ipse est subniger, sed maculiscandentibus distinctus. Lateris color fuscus est, quem variant venæ rubescentes, quod non ingratum est ad spectum. Præterea linea candidissima, quæ argentum æmulatur, deducitur per medium corpus à capite ad caudam.

13. DE OOSTINDISCHVAARDER. Quum nostri homines in Indiis viventes, immo etiam cum inde redeunt, præsertim gaudeant vestibus versicoloribus, non dubium, quin huic pisci inde sit nomen impositum. Est enim ille coloribus tam variis in toto corpore ac lateribus notatus, ut nihil magis varium possis videre. Scilicet corpus est flavum, sed ubique notatum lineis rutulis, cœruleis, aut candentibus. Amboinenses frequenter illo utuntur in ferculis, verum pellis ei detrahatur, antequam appareatur, quum illa sit durissima, ac nulli rei apta, è genere Caprisci versicoloris striati est.

14. DE GROTE OOSTINDISCHVAARDER. Magnum hunc vocant, quia aliquanto major est præcedente, sed non potest magnus vocari ratione aliorum piscium, quum revera magnus non sit. Corpore est vario, verum maculoso, non striato, ut in superiori dictum est. Os habet admodum parvum ac rotundum, etiam è genere Capriscorum uti præcedens. Sugendo victum quærit, quod aliis quoque piscibus peculiare esse supra vidimus.

15. DE GORRAVISCH. Quæ sit hujus nominis ratio ac causa fateor me juxta cum aliis ignorare, quod adeo mirum non est, cum nomen sit plane Indicum, nec meus homo ipse ejus significationem sciret. Dignissimus est tamen piscis, qui hic etiam locum inveniat. Scilicet, secus ac in aliis hætenus descriptis vidimus, dorsum majoribus aculeis vacat, pro quibus ab inferiori mandibula, quæ major est superiori, longissimus atque plane offeus aculeus dependet, non sine parvis

eminentiis, quemadmodum videre est in quibusdam ex genere cetaceo. Ceterum color est, ut in proxime antecedentibus, admodum variis. Quippe totius corporis color est flavus cum maculis albescentibus, & suis vicibus succedunt lineæ sive fasciæ rubescentes, quibus etiam in medio non desunt minores lineæ, sed cœruleæ. Circa oculos etiam in capite rubescit ducuntur lineæ quodammodo cœruleæ, quæ singula jucundissimum spectaculum intuentibus præbent.

16. HET PRINCESJE. Jam supra, Tab. IV. non unum piscem hoc nomine positum possis invenire, verum inter illos & hunc atque sequentem non exigua differentia reperitur. Caput est huic magnum, & rubicundum, excepto quod circa oculos ostendat aliquot lineas varii coloris, quæ non semper in hac specie eadem sunt, nec numero nec colore. Idem est ventris color, qui capitis, nisi quod venter sit maculosus. Reliquum corpus est cœruleum, utrimque aculeis armatum, atque pinnis ad natandi usum instructum. Non alio loco capitur quam prope Hilam, insulam non procul ab Amboina distantem.










17. HET PRINCESJE. Cognomen hunc piscem superiori vides, à quo & forma corporis non longe abit, longius capitis, & color. Quippe caput est parvum, sed acuto rostro, quasi aviculæ, præditum. Corpus est violacei coloris, vergentis tamen potissimum ad cœruleum, inque eo apparent lineæ ejusdem, sed paulo intensioris coloris. Quin etiam in cauda, quod singulare est, maculam habet flavam, qui est quoque ventris color. Medium caput dividitur quasi fasciâ versicolore ac lata. Adde, quod piscis hic & superior sint saxatiles.

#### TABULA DECIMAQUINTA.

1. DE ZEEPALING. Est Conger marinus satis magno corpore & colorum varietate conspicuus. Caput partim est viride, partim rubrum, duobus cirris cœruleis dependentibus. Color corporis est fuscus, linea, quæ per medium latus decurrit, est cœrulea, quo colore & maculæ sunt spectabiles, & extremum illud, quod caudæ loco est. Sub ventre fuscus tergi color in flavedinem abit.

2. DE GETEKENDE KABELAAW. Proxime hujus piscis figura accedit ad asellum majorem, cujus etiam nomen habet, licet aliqua differentia notetur inter hunc piscem, & asellum nostrum, quod attinet ad formam, de qua ut singula




















gula indicem non est opus. Duas in corpore lineas notatas vides, unam dorsum versus, alteram in medio latere, utramque notatam colore fulvo, maculis rubescentibus. Atque inde dignus fuit visus, qui hic exhiberetur. Adhibetur quidem ab Amboinensibus in cibum, sed tamen plerumque sale conditus in usum hybernici temporis solet reservari.

3. DE BANDASCHE KABELA AW. Recedit quidem hic piscis quodammodo à superiore & à nostris asellis majoribus, sed tamen quia circa Bandam non reperiuntur pisces propius ad asellum accedentes, ideo illud nomen ei impositum videtur. Totum dorsum & bona pars ventris aculeis sunt obsita. Nec quidquam aliud in eo notabile, nisi forsan, quod in latere, quà corpus cum capite cohæret, reperiantur tres lunulæ, ac maculæ duæ. Lunularum color non alius est quam reliqui corporis, maculæ vero rubent, qui color etiam notatur in piscis oculis.

4. & 5. DE KWIKSTAARTEN. Nul- lum fere genus piscium notorum exstat, ad quod possis hos referre, qui a cauda mobili dicti sunt *Motacillæ*. Forte tamen tuto possis dicere eos ad Bramas pertinere, sed in re non certa nihil adfirmare audeo. Alter eorum est masculus, alter femella. Neque quidquam fere inter utrumque differentiae est, præterquam quod masculus in ipso capite post oculos habeat maculam fuscam, & præterea aliam in summo capite, sed ea etiam in femella conspicitur. Color utriusque est dilute coeruleus, sed lineæ tres medium latus percurrunt, quæ ejusdem fere coloris sunt, qui in maculis cernitur. Capiuntur prope Amboinam, & quidem in sinu, qui vocatur Lusitanicus. Illud singulare ac observatu dignum est, quod si femella capiatur, masculus, qui eam semper comitatur, sua sponte insiliat in rete, ac ita piscatoribus una cum femella præda fiat.

6. DE DIKLIP. Singularia quædam de hoc pisce notanda sunt, non tam quod attinet ad corpus, quam quidem ad pin- nas & caudam. In superiori corpore aculei aliquot & pinnæ illos sequentes conspiciuntur; verum hoc ei commune est cum multis aliis. Illud singulare, quod pinnis ventralibus, quæ virides sunt, accedant quasi aliquot globuli satis rotundi, qui flavi coloris sunt. Eodem modo è media cauda prominet veluti alia cauda in acumen desinens, unde etiam quandoque de *Pylstaart* vocatur. Illud etiam est flavum, ut observavi de globulis, qui è pinnis ventralibus procedunt. Totius piscis color fuscus est, præter maculas

duas aut tres per latus sparsas, quæ partim coerulei sunt, partim albescent.

7. DE DIKLIP. Ejusdem generis est sequens hic piscis, sed alterius speciei. Nam hic est illo multo brevior, neque ea varietas in pinnis & cauda observatur, quæ forsan soli speciei superiori est peculiaris. Color est idem, sed nullæ maculæ, quarum loco habet lineam in latere candentem, quæ à capite ad caudam procurrit. Ab inferiori mandibula duo cirri longissimi propendent, qui in altera ista specie etiam quidem adsunt, sed multo breviores.

8. DE BONTE HAAN, quasi dicas *Gallus varius*, aut *versicolor*, quod nomen quare ille sit impositum nulla satis firma videtur ratio atque causa, nam si à colorum varietate piscibus Orientalibus nomen sit imponendum, omnes fere dicendi essent cognomine varii aut versicolores, adeo vividis coloribus, quod in illis eximium, notati reperiuntur. Caput obtusum est, ac viridi, flavo, & rubro colore notatum. Corpus totum est fuscum, verum à cauda ad medium latus procedit linea lata, sive fascia aliquantum rubens. Sub branchiis propendent duæ pinnæ longiusculæ, ut etiam eæ, quæ branchiis adhærent, pro corporis modulo dicendæ sunt satis longæ esse.

9. DE ZEEHAANTJE. A forma capitis videtur illud nomen adeptus. Nempè cristam in summo capite gerit, quemadmodum videmus in Gallis gallinaceis. Os sive rostrum, nam rostro porcino simile est, longius procurrit, & quodammodo etiam galli rostrum refert. Exiguus est pisciculus ac saxatilis, & apertura, quæ conspicitur in rostro, nulli alii rei inservit quam fugendo, quoniam huic pisciculo vita est toleranda fugendo, atque ita attrahendo succum ex obviis quibuscunque. Nullos aculeos habet, pinnas binas, unam nempe ab utraque corporis parte, quod colore fulvo est, qui sub vente diluitur, ac abit in flavedinem. Lineæ latiores, quæ tanquam flammæ à tergo versus latus procedunt, rubent.

10. DE GRAVIN, quam nomine apto magis & apposito quam Latino *Comitissam* recte dixeris, è genere Cyprinorum latorum est, atque meretur suum locum in hac Collectione obtinere ob singularem corporis formam, & colores in eo conspicuos. In dorso vides crebros aculeos, & post illos pinnas, quæ decurrunt ad caudam. Ex ipsa cauda prominent duæ extremitates aliquanto duriores ac magis osseæ. Caudam sequuntur non quidem pinnæ proprie dictæ, sed carnosæ quædam substantia, quæ quibus-



dam piscibus, Orientalibus præsertim, pro pinnis est. Ea est rotunda & subnigra, verum illi accedunt aliæ pinnæ minutæ. Deinde sequuntur tres aculei nullo ligamine inter se cohærentes, ac tandem pinnæ, quæ sub branchiis propendent. Totum corpus quodammodo violaceum est, sed maculis distinctum, nisi quod è medio ac summo corpore procedat macula flava ac magna, quæ fere medium corpus occupat.

II. DE GRAVIN. Idem est genus huic pisci, quod superiori, eadem fere species, excepto colore, qui variatur. Quippe corpus est flavum & macula, quæ à dorso procedit, variis, nec certis coloribus est notata. In inferiori capitis parte cernitur etiam quædam differentia, quum in hoc pisce ibi ductæ sint aliquot lineæ; partim flavæ partim rubentes, quod paulo aliter sese habebat in superiore; verum quod fasciâ quasi colligatur caput, id utrique est commune.

12. DE GRAVIN. Superiores duos dixi è genere Cyprinorum esse, quod de hoc pisce adfirmare non ausim, ut qui videtur pertinere ad aliud plane genus, planorum scilicet piscium. Corpus mire varium est, de quo vix quidquam pro certo adfirmare licet. Quidquid sit, illud certum est, hunc pisce in cibum adhiberi, sed cute prius detracta. Nec tamen valet assus aut coctus, sed elixus.

13. I CAN BOULANG. Inermis est piscis, neque habet, quo se tueatur contra aliorum insultus, si forte excipias cutem durissimam, quam alii pisces non facile dentibus perrumpere possunt. Lineis mirum in modum toto corpore quasi conspersus est. Corpus est quodammodo flavum, lineæ coeruleæ, sed non valde. Sub ventre color est fuscus, quod rarum, quoniam plerumque color ventris soleat aliquanto magis in albedinem vergere, quam corporis. Hic autem, è contrario, magis intenditur. Cauda lunæ crescentis in modum cavata est, & quâ definit aliquantum rubet.

14. DE KROPVISCH. Singulare atque notandum est in hoc pisce, quod quasi duplicem habeat ventrem, in quorum priorem primum cibum ingerit, quem deinde in posteriori concoquit, ut ita dicam. Ore est satis magno, quod amplius satis venter statim sequitur, aptus continendis pisciculis minutis, quos inter natandum devorare, seu potius deglutire, solet. Præter istam singularem corporis formam nihil in eo dignum observatu.

15. DE MODDERVISCH. Quod illi nomen datum est à consuetudine. Quip-

pe non solum versatur in limosis ac palustribus aquis, sed, ut parvus est corpore, solet, sese totum abdere in coeno, ubi illud reperire potest. Ceterum minutus est, atque ablegatur à potentiorum mensis ad popellum, qui tales pisces vili pretio mercatur, atque adhibet in cibum.

16. LIMOENVISCH. Harengo in multis est similis, sed aliquanto minor. In corpore nihil est singulare, quod à nostris piscibus discedit. Color enim dilute coeruleus est, qualis fere etiam aliorum piscium esse solet apud nos. Illud tamen silentio non est prætereundum, quod aculei dorsuales inter se sint ligati membranula rubente in imo, qua corpori adhæret, sed in superiori parte flavescente, & quod cauda latissime, pro talium piscium naturâ, expanditur.

17. DE VOLGER, quasi dicas *Secutor*, non valde discedit à superiore, excepto capite, quod paulo est obtusius, ac præterea flavet. Nomen autem *Secutoris* inde est illi inditum, quia solet in mari sequi ac comitari naves, unde haud difficulter & absque magno labore capitur. Vix tamen captu dignus est, quoniam carne est flaccescente & macrâ, ita ut nec mesonautæ iis velint uti, nisi cum penuria ciborum eos incipit urgere.

18. DOUWING ZHAAR. Hunc & sequentem pisce adjeci è Museo meo, atque propterea certo certius adseverare audeo eos ita vivos reperiri, quemadmodum hic reperiuntur. Caput huic est acutum ac in priori parte candens, verum circa oculos macula nigra oritur, quam deinde interrumpit alia macula coerulea, sed inde nigredo ista continuatur per dorsum ac medium latus, ad caudam usque, ita tamen ut passim notetur lineis rubentibus. Venter est candidus, nisi quod lineæ latiores per eam deducantur ad caudam. In dorso aliquot aculeos vides, ad caudam reflexos, quos pinnæ excipiunt, quæ partim candidæ, partim rubræ sunt. Sub ventre quoque duos aculeos habet, unum sub ipsis branchiis, & unum statim post anum.

19. DOUWING SONGO. Figuram corporis si respicias, pene est eadem, sed rostrum & colores corporis variant. Rostrum est longissimum, sed non valde fissum, ita ut piscis non possit os latius aperire. In ipso capite supra oculos omnia sunt nigra in hoc pisce. Corpus ipsum est candidum, præterquam quod squammæ rubeant sed non totæ. Venter albicat. In dorso ac ventre pinnæ reperiuntur rufi ac subviridis coloris. Reliqua satis ex ipsa figura cognoscentur.



## TABULA DECIMASEXTA.

1. **DE GROTE BLAZER** aut **HANG-BUIK**. Oportet quem esse valde imperitum in distinguendis piscium generibus, qui non videt hunc esse orbem. Nomen quoque illud satis indicat. Vide quæ ad Tab. VIII. N°. 8. dixi. Hic est longe omnium maximus in eo genere. Dentes habet plane caninos, & oris rictu satis magno aliis piscibus minatur. Cauda est tricuspis, ante quam ex utraque corporis parte, ubi incipit gracilescere, pinnæ longiores prostant. Corporis color est flavus, macularum, quæ in latere conspiciuntur, niger, verum eæ sunt passim punctulis candentibus distinctæ. Non multum hic differt ab orbe Lagocephalo, quem exhibet Willoughb. Tab. I. 2.

2, & 3. **ICAN DOURION**. Vocantur illi ita à fructu Indico aspero, Durione dicto, nomine, quod possis histricem interpretari. Illis non dissimiles pisces apud alios prostant, sub nomine orbium muricatorum, apud alios autem sub nomine histricum. Toti horrent pinnis sive cuspidibus acutissimis & durissimis. Immo ipforum pellis adeo dura est, ut nullus ensis eam possit perrumpere, cum ficcata est. Ideo Amboinenses ex istis pellibus, cum ituri sunt in pugnam, pileos faciunt, quibus tuto licet eis caput confidere, quoniam non tantum tunc non cedunt gladiis, sed ne minoribus sclopetis quidem. Ad icones quod attinet, nullum verbum addo, quoniam pisces ipsi satis sunt noti, ac apud alios descripti exstant.

4. **DE AMBONSCHÉ ZEELT**. Enomine satis constat de genere piscis, qui Luciscus possit dici. Colore est fusco ad nigrum vergente, excepto quod circa branchias, qua caput à reliquo corpore dividitur, grandis macula flava sit. Oris rictus est permagnus, in quo sese ostentant acutissimi dentes. Nihil aliud in eo notatu dignum occurrit.

5. **DE GEELVISCH**. A superiore non multum differt, si corporis colorem respicias, qui est etiam fuscus ad nigredinem vergens, verum caput omnino flavum est, ac inde nomen pisci est reperi- tum. Venter est coeruleus, & quidem intensè, quod observatu non indignum mihi videtur, quum, ut jam plus semel dixi, fere soleat color sub ventre minui.

6. **POELA**. Egregia carne hic piscis commendabilis est, atque ideo magni fit, non solum apud Laricenses, apud quos capitur, sed etiam apud vicinos insula-

res. Ex eorum piscium genere est, qui è raptu vivunt, quales apud nos Lucii, quos hic sapore etiam refert. Caput est rufum. Corpus à branchiis ad medium usque, caudam versus, est flavum ac quasi reticulatum. Quod restat dilute coeruleum est. In dorso nullos aculeos habet, neque etiam in ventre, sed in pinnis illud videtur tamen singulare, quod sint rubræ prope corpus, ac dein subvirides.

7. **DE FESTONVISCH**. Supra Tab. X. N°. 8. & 9. exhibui duos pisces, quorum in superiori cute hærent quasi cervina cornua; hic autem, quem hoc loco exhibeo, similiter ornatus cernitur quasi florum corollis sive fertis, quæ adeo dura sunt, tanquam ex durissimo ebore essent confecta. Ergo si quis hoc pisce velit vesci, quod frequenter accidit, quum caro ejus sit bona, ac in nulla re cedat vitulinæ, prius istæ corollæ, sive ossæ sive eburnæ, sunt detrahendæ una cum cute, quæ etiam valde est dura. Ceterum, corporis color est flavus, corollarum sive fertorum floralium est rufus flavo mixtus, quod non ingratum est aspectu. Caput perquam maculosum est, verumtamen vix aliis coloribus quam flavo & rubente est insignitum. Sub branchiis duæ pinnæ dependent. In dorso unica serie continuantur, usque caudam fere, absque ullis aculeis.

9. **KALIO**, qui frequenter siccatus ad solem adservatur ad usus domesticos, atque ideo nomen aselli arefacti, sive *Stokvisch* apud nostrates, meruit, pedes tres longitudine excedit, formâ non valde dissimilis asello nostro majori. Colores in eo varii sunt, sed præsertim flavus, qui universi corporis color est. Reliqui colores constituunt maculas, quæ potissimum coerulei sunt, si excipias lineam, quæ à cauda procedit, ac pertingit ad medium usque latus ea enim, præter coeruleum colorem, etiam præfert rufum.

10. **DE RODE ZILVERVISCH**. Hoc illi nomen est inditum partim à colore rubicundo, partim à maculis argenteis, quæ in latere, flammularum instar, cernuntur. Illud mirum non est; simulac enim maculæ piscium splendide candentes sunt, statim argenteæ videntur. Nihil præterea in illo dignum est observatu, quoniam forma corporis nihil singulare præfert, nisi forte quod oculos habeat magnos nigricantes, quorum ambitus notatus est circulo flavo.

11. **DE SALMONETVISCH**. Jam in superioribus hic piscis descriptus, & alioqui satis notus est. Adeo ut opus non



fit hic pluribus immorari ejus descriptioni. In colore tamen sunt quædam, quæ forsan videbuntur aliis aliquam attentionem mereri. Subnigri coloris est totum corpus. Verum in illo cernuntur, caudam versus, lineæ aliquot cœruleæ à dorso aut à ventre procedentes, quæ etiam quasi clavis sunt notatæ concoloribus. Reliqua nihil singulare præferunt.

12, & 13. ICAN LEMA. Ejusdem generis, ac penè speciei, sunt duo isti pisces, quos exhibui duobus hisce locis. Ne color quidem variat, & omnis in eo est differentia, quod alter habeat pinnas ab aculeis in tergo continuatas, alius iis careat; alter tres in ventre habeat aculeos, alius tantum duos. Prioris oculi sunt virides & quodammodo in medio albescentes, posterioris flavent. Adde quod prior sit notatus macula fusca, sive linea sub branchiis producta, quæ in alio nusquam notatur.

14. DE BONTE SPRINGER. Huic pisci sua consuetudo dedit nomen. Nempe, quod etiam videmus in quibusdam nostrorum piscium, inter natandum ex aqua profilit, veluti ludibundus atque lasciviens. Illo temporis momento, cum supra aquas est, si eum intuearis, admirationem, tibi pariet ob singularem colorum varietatem, quæ gratissima est intuentibus. Scilicet corpus illi est fuscum ac fere nigrum, sed lineæ bicolores illud passim dividunt. Qua ad caput obversæ sunt, flavescent, verum ea pars, quæ ad caudam spectat cœrulea est. In capitis maculis, quæ multæ sunt, omnes isti colores, qui in toto corpore conspiciuntur, reperiuntur.

15. DE PERSIAANSCHÉ VISCH, id est *Piscis Persicus*, quod nomen quare illi inhæserit pro certo adfirmare non audeo. Caput illi est breve & obstipum, corpus à capite valde crassum, quod deinde ad caudam decurrens multo fit tenuius. Unicum omnino aculeum habet, in dorso nempe præfixum pinnis grandiusculis, quæ dorsum medium occupant. Ceterum colores corporis sunt varii, nec certi in omnibus hujusmodi piscibus; quare non opus est eos hic indicare.

#### TABULA DECIMASEPTIMA.


1. **D**E SERAMSCHÉ ROG, sive *Raia Seramensis*, in deliciis habetur apud Amboinenses, & dicitur etiam nostris rajis sapore carnis multum præstare. Ossa cartilaginea, quæ in eo reperiuntur, sunt multo molliora, quam quæ in nostris rajis sunt, quo fit ut fa-

cile hanc raiam possis totam comedere. Forma, ut vides, aliquantum distat à nostris rajis, immo caput, cauda, & alia prorsus recedunt à nostrarum raifarum figura. Adfirmabat autoptes meus pelles hujus raie in magno apud Amboinenses haberi pretio. Quippe colores in iis sunt varii, & pellis per se est dura. Ea res fecit, ut mulieres nuptæ pudenda sua talibus soleant tegere, ad quam rem tanto major ab iis sumptus in pelles impenditur, quanto vividioribus coloribus ea possunt reperiri. Ad virgines quod attinet, ea incedunt omnino nudæ, adeo ut talis raie pellis in muliere Amboinensi sit signum eam maritum habere. Porro colores in ea, quam exhibeo primo loco, raia sunt notatu digni. In medio quasi insula quædam cernitur flava, quam ambit rubescens circulus, qui denuo est inclusus limbo cœruleo. Inde procedit color fuscus (qui in nigredinem tendit, ac venis subcœruleis percurritur) ad latera, verum antequam eo perveniat, interrumpitur semicirculo flavescente, inter quem & extrema latera visuntur maculæ aliquot cœruleæ atque rotundæ. Quæ omnia singularem adspectum præbent. De capite, cauda, & aculeis, præstat tacere, quam incerta quædam prodere.

2. ICAN PARING, qui est species *Lyra cornutæ*, ab auctore meo erat delineatus; isque addebat tales reperiri diversæ omnino magnitudinis, verum à nemine adhiberi in cibo nisi à Mauris. Ego autem, quum ipse talem piscem habeam in liquore, diligenter eum contuli cum hoc meo, atque curavi hanc iconem effingi ad piscem istum, quem vitro inclusum servo. Est ergo piscis longus quidem, sed tamen octangularis & cataphractus à capite ad caudam usque, non squammis sed durioribus ac osseis plane ac cuti firmiter adhærentibus quasi clypeolis. Color est, saltem in liquore, gilvus, & quidem in toto corpore, præterquam oculorum, qui plane sunt purpurei etiam in hoc meo pisce. In superiori mandibula cornua duo recta & ossæ, sed plana, prostant, quod singulare est, ut & illud, quod piscis cataphractus pinnas habeat & aculeos, quales tamen in hoc pisce notatos vides. Dixi Mauros solos eo vesci, quod non capiendum est, nisi de recentibus, nam saliti etiam à Christianis adhibentur ac mensis inferuntur, præsertim quodam anni tempore, quo pinguius solito reperiuntur.

3. ICAN SATAN, id est *Diabolus marinus*, maximus est piscis è rajarum genere, pinnis latioribus ac cauda longissima.




















lima. Exstat passim descriptus, nec est quod aliorum fedulitati possim addere. Nomen non aliam ob rem est nactus, quam quia magno impetu natans interdum progrediatur ad aquæ superficiem, ubi pinnas vehementer quassans magnum in aqua motum excitat. Ac inde illi adhæsit nomen Diaboli marini, quod timorem non exiguum incutiat navigantibus, ac intuentibus motum tam vehementem aquarum, cujus causam vix vident. Nam non cernitur totus piscis, sed aut cauda tantum, aut pinnae, aut caput. Color ei est dilute cœruleus, quo colore etiam maculae in corpore sunt notatae.

4. ICAN SATAN. Aliquanto est minor corpore hic diabolus marinus, sed multo monstrosior. Figura corporis est non uniformis, & ubi in latera ventum est, quasi aliquantum coarctatur. Inde utrinque pinnae prominent longiores, quas aliae minores sequuntur ad caudam usque, accedentibus ante eam aliis pinnis longioribus. Quin etiam cauda, quæ longissima est, ac definit in ductum acutissimum, non caret suis pinnis. Ea, ut totum corpus, flava est. In medio tamen corpore reperitur macula rubicunda in colorem violaceum vergens. Magis versus caput lineæ ductæ sunt rubicundæ, quæ versus oculos flectuntur, & adspectum magis tetrum efficiunt. Ex ipso ore cornu quasi planum & longum prominet, sed aliquantum reflectitur, nec eo hic piscis potest uti ad nocendum aliis piscibus.

5. ICAN SATAN. Eiusdem est hic fere speciei, cujus est proxime præcedens piscis. Genere saltem nihil differunt. Corpus est planum atque rotundum. Undique pinnas longissimas, pro modulo corporis, præfert, quæ caudam versus minores fiunt; aut saltem modo contrahuntur, modo producuntur. Maxima inter hunc & superiorem differentia reperitur in capite; quod ore hiulco ac dentibus caninis minatur cædem obviis piscibus. In corpore aliquot lineæ plures maculae conspiciuntur, quæ omnes sunt cœruleæ, sed in albedinem vergunt.

6. ICAN FAY, quem etiam quidam nomine immundo *De Strontvisch* vocant, atque sub eo nomine describunt. Mihi nunc non vacat videre, quid alii de hoc pisce dicant, quum satis ab hac, quam exhibeo icone, eorum figuræ recedunt. Hoc est adscribendum eorum piscium magnæ multitudini & varietati. Ajunt cum illud nomen esse nactum, propterea quod semper sequatur naves, & quidem diligenter inhiet excrementis circa istum locum, in quem solent nautæ ad alvum

exonerandam fecedere. Corpus est non magnum, color fuscus toto corpore, excepto quod maculae cœruleæ, aut subnigræ, toto corpore sint sparsæ. Licet è victu tam immundo vivat, non refugiunt tamen nautæ, quo minus ejus carnibus vescantur. Eæ autem sunt non admodum bonæ, nec sapore suo facile aliquem ad se possent pertrahere, si aliarum rerum esset abundantia.

7. DE BONTE VISCH. Non diu dubius hærebis in causa nominis in hoc pisce indaganda, si colores in eo admodum varios respexeris. Namque latus medium illi dividitur linea candente, ac id quod superius est, notatur macula ingenti cœrulea, in cujus medio iterum alia minor ac rubra invenitur. Reliquum corpus est cœruleum, ventre albicante. Duo aculei satis magni in dorso prostantes satis ostendunt eum esse Caprisceis adscribendum. In vente itidem duo reperiuntur, sed multo minores, circa anum, unde pinnae ad caudam procurrunt, ut etiam in tergo ab istis aculeis, quos ibi gerit. Pinnae branchiales plerumque versus tergum reflexæ sunt. Infra branchias duæ aliæ dependent satis longæ.

8. DE SALAMANDERVISCH. Quænam huic pisci fuerit causa nominis ignorare me juxta cum aliis fateor, nisi forte tuberculosa macula, quæ ab utraque lineæ ventralis parte cernuntur, quales etiam ajunt esse in salamandro quadrupede, illi nomen pepererint. Decem in dorso habet aculeos flava ac tenui membrana junctos, primum inter se, ac deinde pinnis, quæ ad caudam procurrunt. Corpus totum eo colore, qui vulgo piscium censetur, est, nempe dilute cœruleo, ventre albicante, sub quo priores pinnae sunt rutilæ, posteriores subvirides. In capite quoque permagna macula flava cernitur, quæ tanta est, ut non tantum totam mandibulam inferiorem occupet, sed etiam oculum includat ab utraque parte.

9. ICAN SWANGI. Hujus generis aliquot pisces jam vidimus aliis locis, præfertim Tab. II. quibus hic meretur apponi, quum totum corpus, atque adeo caput, horreat aculeis crassioribus. Pinnae branchiales sunt permagnæ, & fere accedunt ad formam piscium volatiliū. Totum corpus est subflavum, excepto quod maculae quædam in eo reperiantur, quæ in medio sunt coloris candidi, sed versus extremitatem nigricant. Caput miris modis variatur lineis cœruleis. Nihil aliud in eo est observatu dignum, quod non itidem possis videre in aliis piscibus cognominibus, quos forsan operæ pretium est cum hoc conferre.



10. 'T SPRINGERTJE. In superiori Tab. N<sup>o</sup>. 14. exhibui piscem cognominem, sed aliquanto majori corpore, aliis coloribus, & forma. Hic totus est cœruleus, ventre candente, in quo duæ lineæ leviter reflexæ procurrunt à branchiis ad medium corpusculum, quod tenui linea est notatum. Caput est obtusum, lingua crassiuscula ac rubens. Cauda panditur in latissimum spatium, sicum totius corporis magnitudine conferas. Caro est fere omnium piscium Orientalium præstantissima, quæ res hujus piscis pretium auget, quoniam ditiores sibi minutal ex ejus carne pro gratissimo ferculo habent, veluti apud nos è Luciorum carne minutal magni fit, quando religio illos prohibet vesci carne quadrupedum.

11. DE SCHOUT BY NACHT, possis interpretari *Prætor nocturnus*, si ad primitivam vocum significationem attendas, verum quum nostrates ita soleant vocare Legatum, qui in classe Archithalasso subest, dubium non videtur, quin inde sit nomen illi quæsitum, quemadmodum supra vidimus alios pisces nomina Reginarum, Comitum, Signiferorum, &c. gerere. Illud tamen non videtur prætereundum, quod noctu soleat capi accensis lucernis, ad quas procul visas adnatat. Percam mediocrem magnitudine non excedit. Colore est gilvo, maculis passim rubris passim subcœruleis. Oculi huius sunt virides, in quorum medio pupilla candidissima conspicitur.

12. 'T SLECHTHOOFD. Piscis hic videtur ideo ita dictus, quòd in capite neque maculas habeat neque lineas versicolores, quod alioqui frequens esse in piscibus Orientalibus, jam credo satis notum est. Alburni est species, quo tamen non utuntur Amboinenses nisi fumo indurato. In dorso habet aliquot aculeos membrana tenui junctos, atque pinnis adhærentes. In ipso corpore nihil est notabile, præterquam quod statim post caput sequantur maculæ quatuor flavæ sibi invicem succedentes, quarum posterior semper priore minor est, donec tandem deficient.

13. DE CORTISAAN. Solent nostrates eo nomine non tam aulicum, qui propriè tamen eo designatur, significare, quam quidem Morionem, qui operam navat medico circumforaneo. Quæ igitur fuerit ratio nominis imponendi mihi non videtur patere. Ad genus piscis quod attinet, Caprisci species est, ut vel è forma corporis ac crassiori ac longiori aculeo in corpore summo prostante satis patet. Corpus est contractum, respectu crassitudinis, atque coloris incerti. Undula-

tum enim est, ac exhibet rarios colores, viridem, cœruleum, flavum, prout aliter atque aliter intuearis.

14. DE BAARDMAN, ita dicitur à cirris longioribus, qui dependent ab inferiori mandibula. In dorso prostant pinnae, non continuatæ, sed tribus locis divisæ ac distinctæ. Corpusculum est violaceum, maculisque partim albeis partim cœruleis insigne. Caput autem potissimum est cœruleum, intercurrentibus aliquot lineis flavis.

15. DE VOREN VAN LARYKE, id est *Trutta Laricensis*, egregius est piscis, ac magni fit propter eximium saporem, quo vulgares nostras superat troctas. Magnitudine est plerumque quatuor aut quinque pollicum. In capite prope os duos aculeos, sed non magnos ostentat. Alios in toto corpore habet nullos. Corpus est flavum, sed linea lata, quæ latus occupat, est cœrulea. Caput quodammodo violaceum est, excepta lunula parva, quæ in mediis branchiis conspicitur, atque aurei coloris videtur.

16. DE TROMPETTER, quasi *Æneatorem* dicas, verum longe alia est facie, quam iste piscis, qui apud alios sub eodem nomine prostat, quem dicunt magno ventre esse. Hic autem est acus, Aristotelis qui dicitur, & quidem major, ut recte vocatur à Willoughb. Tab. I. 25. Dicebat quoque meus homo sonorum admodum hunc piscem esse, unde nomen illi fuit datum. Namque, noctu præsertim atque mari tranquillo existente tantum subinde sonum edit, ut possis eum ad dimidium milliare ab eo loco, ubi natat, audire. Colore est flavo, sed variegato lineis candentibus, quæ colorem suum quodammodo cum corpore communicat. Pinnæ in priori corpore nullæ, si aculeos in dorso exstantes iis non adnumeres. Prope caudam tamen utrinque enascuntur pinnæ latiores ac fere quadratæ. Ad rostrum vero quod attinet, illud est prælongum ac osseum, atque cum hic piscis sibilum vult edere, extremam partem tantum non claudit, atque ita rostro supra aquam prolato aërem attrahit, unde sonus oritur.

17. DE DIKMUIL, quasi dicas *Buculentum*, vocatur ita à superiori mandibula, quæ est crassissima. Pauca in eo observatu digna. Color est flavus, maculæ candidissimæ, atque argentum imitantes. Non magnus est, at adsumitur tamen in cibum, quoniam ejus caro satis grata est. Namque quinque aut sex pollicibus transversis nunquam reperitur major.



## TABULA DUODEVIGESIMA.

1. **DE BARBAAR**, ita fuit dictus, quia primum captus fuit prope regiones in Asia ad Mare Indicum subditis Turcarum Imperatori, quas regiones homines nostri uno nomine Barbaricas vocant. Mahumedani præsertim plurimi faciunt hunc piscem. Sapore non multum differt, ut nec corporis forma, ab asello nostro majore, nisi quod aliquanto sit pinguior. In capite etiam delicatiores homines venantur ac quærunt quod gratissimum est, quemadmodum apud nos quidam salmonum capita in magno honore habent. In corporis forma aut colore notandis; nihil dignum observatu fuit. Ubique idem est color, subcœruleus scilicet, nisi quod in medio dorso ducatur linea à pinnis ad ipsum os. Corpus quasi caudam intrat, & distinctum maculis tenuatur versus illam, verum non alius est earum color, quam qui in toto corpore cernitur.

2. **BOTSKOP**. Capite hic passerem refert, atque adeo ipsi inde nomen est impositum. Nam quantum capite accedit ad illum, tantum differt corpore, quod non planum sed rotundum est. Mandibula inferior est notata lineis rubescentibus ac cœruleis. Circa pinnas ventrales posteriores etiam macula rubra cernitur. Reliquum corpus subcœruleum est. Oculos ambit circulus flavus, ipsique oculi sunt coloris violacei. Infra eos lunula viridiuscula notatur.

3. **DE SPITSBEK**, ita dicitur ab acuto rostro, quod imitatur quarundam avicularum rostra. Multa in eo sunt, quæ nescias quo sint referenda, quum nihil fere habeat cum aliis piscibus commune. Ab utroque latere in medio corporis nonnihil contrahitur, ac deinde recedit, quasi priorem formam continuans. In dorso habet aliquot aculeos, in ventre nullos, sed circa caudam ab utraque parte longissimi aculei procedunt. Cauda est bifurcata, ac coloris flavi, quo colore etiam sunt pinnae dorsuales. De colore corporis nihil certi adfirmare audeo, quum interdum is varietur, non tantum in aliis atque aliis hujus generis piscibus, sed etiam in uno atque eodem pisce pro ratione ætatis. Ceterum, tam raro capitur, ut plerisque etiam Amboinensibus nunquam sit visus.

4. **DE GELE KAMEELVISCH**, id est *Camelus flavus*, ita est dictus à colore ac forma corporis. Est enim color flavus, corpus tuberculatum. Caro ejus est tam pinguis, ut inter edendum ni-

mia pinguedo nauseam moveat. Capitur in ora Seramenſi, atque incolæ istius regiones solent telorum suorum, quibus in bello utuntur, cuspides ex aculeis hujus piscis facere, qui brevi tempore tam duri fiunt, ut nullum cum iis ebur, ac ne vix quidem ferrum cum iis possit comparari. Corpus, ut dixi, flavescit, maculis interdum albicantibus, interdum vero rubentibus. Per medium latus linea cœrulea decurrit à capite ad caudam. In capite præter flavum colorem notantur maculae rubrae.

5. **DE JONKER VAN AMBON**, quem possis dicere *Domicellum Amboinensem*, qua ratione ita sit dictus, aut quid illi hoc nomen meruerit, ignoro. Quod etiam dictum velim de duobus sequentibus, qui etiam Domicelli sunt dicti absque evidenti causa. Color ei est quodammodo violaceus in maxima corporis partæ, in reliqua flavus. Nullos aculeos habet, sed pinnas in dorso continuatas. Sub branchiis in ventre pinnas habet crassiusculas, si modo ita possis dicere quod natura illi ibi dedit pro pinnis, ac reflexas versus utrumque latus.

6. **DE JONKER VAN HILA**, sapore percas nostras quodammodo æmulatur, quas etiam utcunque refert forma. In dorso multos habet aculeos inter se coherentes tenui membranula viridi. Sub ventre vides etiam duos, sed nullo ligamine inter se junctos. Ceterum, alternis quasi fasciis vinctum est corpus, quæ modo flavent, modo subcœruleæ sunt, atque ita se invicem excipiunt à capite ad caudam, quæ bifurcata est ac viridis.

7. **DE BONTE JONKER**. Et hunc libuit nostro pictori vocare eodem nomine, quia apud nostrates in Amboinensi insulâ degentes ita vocatur, ratione non magis evidenti quam in duobus superioribus. Pisciculus est saxatilis, atque proinde exiguus. Præter longissimam cuspidem, quæ in dorso prominet ad caudam reflexa, tres habet aculeos satis magnos in anteriori corpore. In ventre nullos habet, sed pinnas binas; primum scilicet sub branchiis, ac deinde ab ano ad caudam. Corpusculum est flavum lineisque cœruleis ac maculis ejusdem coloris distinctum. Nihil præterea in illo observatu dignum. Hoc, ut aliis quibusdam saxatilibus, soli Indi vescuntur, nostratibus eum, tanquam nimis parvum, rejicientibus.

8. **DE DROMEDARIS**, cameli nullo tubere in dorso notabilis nomen, quare huic pisci sit datum alii videant. Magna horum piscium multitudo reperitur



prope Amboinam, ac solent iis interdum incolæ vesci, verum ejus caro est admodum sicca. Si colores spectes, in corpore prorsus nihil memorabile occurrit, sed in capite observandum est, quod illud totum sit flavum, venis rubris per illud decurrentibus. Oculi sunt quoque magni ac rubicundi, nisi quod eorum pupillæ dilute viridem colorem præferant.

9. DE HARING VAN BANDA, quem si *Encrasicholi* speciem dixeris, non dubito, quin rectè sis facturus. Videtur de hoc pisce etiam loqui Nieuhoffius in Legat. Part. Ult. p. 115. quam possis confutare. Multa cum nostro harengo habet communia, forma etiam corporis non multum differt, verum hic aliquanto longior est pro ratione crassitie. Eodem modo, quo nostri harengi solent, sale contra corruptionem custoditur, atque ita servatur in usus domesticos.

10. DE AMBONSCH HARING, sive *Harengus Amboinensis*, aliquanto minor est nostris harengis, & etiam mollior carne, quæ si sale adspargatur parvo tempore omnem saporem amittit, & plane insipida fit præ falsedine. In dorso vides aliquot aculeos, qui plerumque octo sunt, adhærentes pinnis, quæ versus caudam decurrunt. Ea est satis lata & tenuis. Squammas quoque habet hic piscis, verum non densas ac facile deciduas, quod illi est commune cum plerisque piscibus, quibus carnes sunt molliores.

11. DE BUITELAAR, id est *Piscis Cernuus*, quo nomine vocatur, quia inter natandum cursu celerrime mutato quasi exsultat ac cernuus volvitur. Nil fere aliud de eo observandum, quoniam neque color, neque forma, neque caput, neque pinnæ quidquam habent singulare. Omnia enim in illo sunt vulgaria, atque undiquaque cum nostris piscibus conveniunt.

12. DE KROESVISCH, ita dictus fuit, quia ejus cauda quodammodo poculum aliquod refert, quo nomine nos solemus *een kroes* indigitare. Piscis est porro saxatilis, quique nulli rei est idoneus, sed à curiosis adservatur in liquore, tam ob corporis singularem formam, quam ob colorum in eo varietatem conspicuam. Rostrum habet acutum atque osseum, quod flavo colore est insignitum. Ad oculos usque caput est violaceum; atque ibi, ut in aliis jam ante factum vidimus, vincitur fascia viridi. Corpus ipsum etiam est violaceum à branchiis ad extremitatem caudæ usque. Pinnæ dorsuales non cernuntur in eo, nisi ubi corpus jam incipit in caudam flecti.

Verum aculeos aliquot in summo dorso prostantes vides, quales nulli in imo ventre reperiuntur, præter unicum, qui prope pinnas ventrales non procul à cauda videtur.


13. DE GEBANDEERDE GRUNDEL, quem Latine vocare licet *Gobium fluvatilem striatum*, capitur prope Amboinam, ac in cibum adsumitur tam à Mauris quam à Christianis ibi degentibus, verum non aliter quam in jusculo, sive embammate ex aceto, apponitur. Corpus, quod quatuor aut quique pollices transversos nunquam excedit magnitudine, fuscis sive nigricantibus lineis notatum est à capite ad caudam, quam exiguam admodum habet, occupante gracillima corporis parte locum etiam caudæ.

14, 15, 16, 17. GRUNDELS. Hi omnes Gobii fluviales sunt, quos omnes unà comprehendere placuit, quia ejusdem sunt generis, ac specie etiam non valde differant, si colores in censum recipere nolueris. Primus eorum est fuscus, capite maculose flavo ac violaceo; secundus, qui designatus est numero decimo quinto, est flavus, verum lineis subcœruleis ac maculis nigricantibus est conspicuus. Caput est subviolaceum, quod tamen non caret maculis flavis. In dorso pinnas habet, atque aculeos ante illas erectos; reliqua sunt ei cum aliis Gobiis communia. Hunc sequitur etiam Gobius flavus capite violaceo, in quo nihil etiam notabile est, nisi quod in dorso, quæ incipit ad ventrem flecti, recto ordine aliquot prostant maculæ candidæ; reliquo corpore existente flavo. Tales etiam maculæ reperiuntur in eo, qui ultimo loco est positus, verum ejus corpusculum est subcœruleum, & non tantum in dorso præfert aculeos erectos, sed etiam in ventre, qui tamen inter se non sunt ligati membranula, ut dorsuales.

18. LINGUEBAS, quod nomen quid significet non mihi meus homo explicuit, neque alibi explicatum reperire potui. Quod si Auratæ dicerentur pisces, qui quasi aureo colore sunt insigniti; possis eum Auratam vocare, à quorum forma etiam haud longe abit. Color illi à rostro ad caudam est flavus, seu potius aureus, quasi adspicias massam auri puri. Plurimæ tamen maculæ exiguæ colorem istum aureum interstinguunt, quæ quasi argentum per totum corpus sunt dispersæ. Pinnarum atque caudæ color est ruber, qualis conspicitur fere in nostris percis.

19. DE SNAVELAAR. Non est quidem hic piscis esui ineptus, verum non magni.




















magni fit, quoniam caro ejus est mollis & non boni saporis. Nomen nactus est à longius producta mandibula superiore, quæ facit, ut eum inter acos annumerare possis. In dorso vides aliquot aculeos satis longos, quibus in ventre nulli respondent aculei, neque ullæ pinnæ. Ab istis aculeis dorsualibus ad caudam usque progrediuntur pinnæ, ut & in ventre ab ano.

20. DE MOORSCHÉ SNAVELAAR. Eadem est nominis ratio, sed non idem genus piscium, quoniam hic non videtur pertinere ad acos, sed ad cataphractos & tuberculiferos. Neque rectè id, quod è capite prominet, possis dicere mandibulam esse superiorem, quum potius cornu sit, infra quod totum os piscis latet. Ceterum, habet hic dorsum durum atque coloris cœrulei, quod distinguitur lineis flavescentibus. Latera rubent, ventre ad albedinem vergente, in quo etiam conspiciuntur una aut altera macula candida.

## TABULA UNDEVIGESIMA.

I. **D**E JAPANSCHÉ KEIZER, id est *Imperator Japonensis*, ita dicitur ob multas rationes. Si enim respicias præstantiam carnis supra ceteros pisces Orientales, facile illud nomen ei concesseris. Est enim caro tam grati saporis, ut aliorum piscium carnes ne comparari quidem cum ea mereantur. Si colores attendas, non minori jure dices ei competere Imperatoris nomen, quum ii sint simul vividi ac simul gratissimi. Si à magnitudine nomen est sumendum, præstat hic etiam omnibus piscibus Orientalibus, iis nempe, quibus Indi solent vesci. Si denique intuearis coronam, quam in capite gerit intra oculos, non negabis ei competere nomen Imperatoris. Ceterum adeo pinguis est caro, ut salmonum nostrorum capita ab ea parte æquet, si non superet. Ad colorem exteriorem quod attinet, is est fuscus, sed lætus atque splendescens, perque totum corpus tenues lineæ cœruleæ percurrunt. Pinnæ multis quasi plicis convolutæ atque ita veluti colligatæ sunt, quod etiam non ingratum adspectum præbet. Capitis color est intense rubens, sed non uno loco per cœruleum variegatur. Cetera ex ipsa icone satis patent intuentibus.

2. DE GROOTOOG, qui ita à magnis oculis est denominatus, prope insulam Manipensem, nec usquam alibi, capitur. Eo salito utuntur Indi. Vix quidquam in eo est peculiare, quod non item in aliis piscibus notabile est, oculis exceptis, qui non tantum in illo sunt magni, verum etiam linea quadam rubente cinguntur.

Inferior branchiarum pars etiam variis coloribus est notata, lineis nempe cœruleis & flavis.

3. DE EENOOG, sive *Monophthalmus*, illud habet prorsus singulare, quod unicuique tantum habeat oculum in medio capite prominentem, nec præterea alium. Capitis quoque forma est inusitata, ac fere talis, qualis in insectis quibusdam esse solet. Corpus est tenue, color subcœruleus. In supremo dorso videbis pinnas longiores ad caput reflexas, & post eas aliæ sequuntur, tam in dorso quam in ventre. Neque indignum notatu videtur, quod sub branchiis quæ dependent pinnæ, etiam sint reflexæ versus anteriorem partem.

4. DE POEPOESCHÉ VISCH. Vide quæ de hoc piscium genere jam dixi ad Tab. VI. quæ ut hic denuo repetam, non opus est. Color est illi fuscus in nigredinem vergens, qui etiam pinnarum videtur. Lineæ sive fasciæ, quæ in eo notantur, sunt non unius coloris, sed præcipue tamen aliquam flavedinem semper præferunt.

5, & 6. POEPOEVISCHEN. Formam corporis horum piscium, si intuearis, Capriscorum species dices, & rectè; nam corpore sunt brevi ac rotundo, & dorso aculeato. Prior tamen, licet aliquot aculeos magnos habeat, non præfert tamen cuspidem primo loco longiorem, quod quodammodo omnium Capriscorum proprium est. Color ei est inter fuscum & violaceum, maculæ, quas in capite vides, sunt cœruleæ. De posteriori minus dubitandum est, quia is plane Capriscorum more longiorem aculeum præfert. Præter lineas fere similes priori, post caput, supra pinnas branchiales, adsurgunt maculæ insignes variis coloribus vividissimis. Reliquus corporis color paulo magis ad violaceum accedit, quam in pisce priore.

7. DE POEPOEVISCH. Hic jam plane Caprisculus est, nec possis merito de illo dubitare, quum non tantum cuspidem è summo dorso prostantem videas, sed eam quidem imprimis duram ac crassam pro corporis modulo. Tam in dorso quam in ventre videbis quoque pinnas longissimas, quod etiam huic piscium generi convenit, ut te docebunt fere omnes auctores Ichthyographi. Color corporis est viridis ac undulatus, id est incertis maculis, quæ, undarum instar, nullo ordine firmo constant, variegatus.

8. DE BANDAASVAARDER. Parvulus est piscis ac saxatilis, qui prope Bandam, nec usquam alibi, capitur. Est etiam de genere capriscorum. Habet in rostro aperturam exiguum, quæ illi inservit ad victum sugendo quærendum: post illam aperturam reperiuntur dentes quoque, ut in aliis



etiam fieri potes meminisse. Præcipuus corporis color est flavus, qualem etiam Nieuhoffius in Ultima Parte Legat. agnovit in hujuscemodi piscibus, verum mirè aliis coloribus, striis, ac maculis variegatus.

9. DE GOUDSPIERING, id est *Apua Cobitis aurata*, ita à colore dicitur, qui totus est flavus splendescens, atque adeo aureus. Corporis forma, neque os cum nostris istius speciei Apuis satis convenit. Nolo tamen illum hinc remove, quum placuerit homini meo illum hoc loco ponere ob nomen, quod etiam aliquot sequentibus, at magis nostrarum Apuarum similibus, adhæsit. Os est prælargum, longum, ac caninis dentibus armatum. Si corpus esset aliquanto tenuior, dicerem hunc piscem esse aci speciem, nunc anceps hæreo.

10. DE RIVIERVOREN, quem Latini *Troctam* five *Truttam fluviatilem* vocant, propius accedit formâ ad nostras Troctas. Verum color ejus multum ab istis discedit. Est enim toto corpore ita flavus, ut quodammodo in albedinem vergat. Lineæ, quæ per dorsum, latus, ac ventrem sunt dispositæ, fusci coloris sunt. Præterea in capite aliquot maculas habet rubentes, ac subinde cœruleo colore notatas.

11. DE VOREN VAN AMBON. Hic jam plane est Trocta, si formam respicias, neque aliam ob causam hic locum meruit, quam quia singulari modo in capite est coloratus. Inferiorem enim mandibulam percurrit linea versicolor, qualis etiam notatur, ubi caput corpori adhæret. In dorso pinnæ sunt æque ac in ventre. Præterea ibi etiam cernuntur aculei quinque, qui inter se membranula cohærent, ac deinde pinnis dorsualibus junguntur.

12. DE RUISCHVOREN. Species est etiam Troctæ latæ, quam quidam Salarem vocant, licet illud nomen proprie detur junioribus Salmonibus. Esui non est quidem ineptus, sed fere nullo alio modo apparatus quam tostus in sartagine, ac tum satis boni est saporis. Pauca sunt, quæ de hoc piscis dicere, quæ non jam in aliis quibusdam piscibus vidimus, atque adeo non diutius huic immorabor, postquam dixero colorem capitis esse rufum, corporis dilutè cœruleum, qui versus ventrem abit in albedinem.

13. DE SERAMSCHÉ VOREN. Est ille quodammodo præcedenti similis, excepto quòd nullos aculeos habeat in dorso, sed vicissim in ventre post anum duo aculei prostant, nec ullæ sint præterea ibi pinnæ. Sub branchiis quidem dependent exiguæ quædam pinnæ, verum si formam adspicias, dubitabis, an eæ proprie pinnæ sint dicendæ. In capite est color idem, quem

in superioris capite notavi, verum præterea idem color in dorso ac latus continuatur supra lineam lateralem, infra quam cernitur color cœruleus, qui circa ventrem penè in candidum mutatur.

14. DE LANGNEUS VAN AMBON. Mandibula superior in hoc pisce producta ei peperit nomen *Nasónis*, quod jam supra vidimus Tab. XIII. alii quoque pisci fuisse datum. Caput est flavum, in quo linea bifida infra oculum cernitur. Egregie variegatus est color corporis, qui dilute cœruleus est, sed variis, five venis five incertis linearum ductibus, variegatus, plane ut videre est in lapide porphyretico.

15. DE FLESSENVISCH. Ut supra vidimus alii pisci nomen esse repertum à poculo, ita hic nomen invenit à lagna, quam aliquo modo refert, si rostrum capias pro lagnæ colle. Parvulus est pisciculus & faxatilis, quique nulli rei est utilis. Color ei est cœruleus, usque ad fasciam, qua quasi vincitur, verum post eam totus rubet, pinnis exceptis, quæ virides sunt.

16. 'T LOOTSMANNETJE. Est hic piscis satis notus, propterea quod in medio mari semper Galeum sequentem prænatat, quæ res jam vulgatissima est ac decantatissima. Color ei plane est idem atque supra vidimus in Dorado, quare non opus est, ut hic denuo repetam, quæ ibi dicta sunt. Vid. Tab. XIII.

17. DE SABROVISCH. Ita vocatur à loco, in quo frequenter capitur. E forma diceres aselli minoris esse speciem, quod etiam mihi vero non dissimile videtur, quum dicatur etiam ejus caro accedere ad saporem aselli istiusmodi. Ceteroquin nihil peregrini præ se fert, atque ideo me non morabitur, quo minus transeam ad alios pisces.

18. DE STAROOGVISCH. Ab oculis hujus piscis quasi radii procedunt, quos ibi efformant maculæ obscure rufæ, atque inde nomen illi est datum. Aculeos multos in dorso ostentat ac pinnas rotundas, licet ea forma non ostendatur in imi ventris pinnis. Color est cœruleus, exceptis lineis latioribus, quæ rubent. Quidam incolæ Amboinenses eo vescuntur, sed plerique tamen eum, ut inutilem ac insipidum, nihili faciunt ac rejiciunt.

19. DE ZEE SNOEK, five *Lucius marinus*, quam proxime accedit ad nostrorum Luciorum naturam. Neque propterea quidquam occurrit de eo dicendum. Nisi forte quod hic, quem nobis autoptes depinxit, fuerit longus sex pedes & pollices octo. Omnis differentia in his & nostris Luciis in eo versatur, quod hi non habeant tot spinulas minutas per carnem spar-



sparsas, quæ edenti interdum haud exiguum molestiam creare solent.

20. COLUMBO, est piscis Seramenfis, sed ad nullam rem aptus, quum carne sit prorsus insipida, atque adeo moli, ut statim diffuat, si piscis aliquamdiu jacuerit soli expositus, ubi aliorum carnes solent ficcari atque durescere. Maculae aliquot in eo sunt insignes & nigræ, verum proprius piscis color est helvus. Superior mandibula est quidem satis crassa, sed tamen paulo ultra inferiorem producta, quod non indignum videtur observatu.

## TABULA VIGESIMA.

I. **D**E VYFVINGER VISCH. Vides in latere hujus piscis quinque maculas rotundas, atque eas fuerunt causa nominis huic pisci. Nempe Amboinenfes eum in sua lingua designant peculiari nomine, quod significatione convenit cum appellatione nostra Belgica. Possis eum *Dactyliophorum* vocare nomine satis ad rem appposito. Ceterum, notandum est, quod tanta multitudo talium piscium, mensibus præsertim Junii & Julii, prope Amboinam reperiatur, ut etiam vulgus eos vili pretio mercetur. Alofæ fere similis est sapore, sed corpore paulo rotundiore. Igitur nihil æque obstat horum piscium bonitati quam immensa eorum multitudo, & quod facile parabiles sint.

2. DE ALPHORESCHÉ BOT. Crassa ac prædura huic est pellis, de qua, respectu mulierum, idem est dicendum, quod supra de Raia dixi, quæ exhibetur Tab. XVII. N°. 1. Quod restat de eo dicendum non multum est, namque cum nostris piscibus cognominibus ad amissim convenit, si spectes formam aut carnis saporem. Colore tamen multum differt à nostratibus. Est enim ille obscuri quidem coloris, sed ubique lineolis sive striis variati. Maculae in eo cernuntur præterea coeruleæ & ad oras subnigræ.

3. ICAN TATABULA, quod nomen à nostris vertitur de *Speelvisch*, quasi dicas *Lusorium*. Scilicet natura dedit illi in summo dorso maculas aliquot quadratas, osseas, ac punctulis notatas. Eas imperitum vulgus fabulatur esse aleas lusorias, & non veretur mendacio quadam fabula fidem quærere. Scilicet ajunt nautas quosdam eo ludendi ardore processisse, ut neque dies neque noctes à ludo abstinerint. Deinde factum, ut aliquis eorum, quasi resipiscens, aleas extra navem projecit addito jurejurando, quo sibi ipse omnia mala imprecaretur, si postea denuo ad ludum accederet. Istum hominem cum satis tenax non esset jurisjurandi, postea denuo

libido ludendi incessit, atque etiam coepit ludere animo magis ludo intento quam unquam antea. Fit interea, dum is cum suis in posteriori parte navis strenue calfacit forum aleatorium, strepitus magnus in navi sociorum concurrentium ad piscem aleis in tergo notatis, ac hamo captum à sociis navalibus. Accedit & nauta, videt miraculum, & inde in memoriam jurisjurandi rediens sancte promittit se porro melius victurum. Videri possit cuiquam hæc fabula esse ficta postquam tales pisces coeperunt innotescere, atque reperisse fidem apud vulgus, quod ubique miracula venetur; is sciat se habere me sibi consentientem. Porro, quin talis piscis exstet nullus quidem dubito, quum supra aliquid simile in cornibus cervinis & florum sertis vidimus, sed maculas istas accurate aleas referre vix ego crediderim. Aliis liberum relinquo, quid de hac re tam insolita velint statuere. Ceterum, vix quidquam aliud in hoc pisce notabile, nisi forte, quod aculei quidam promineant è pinnis ventralibus.

4. DE BESAA NVISCH, ita dicitur à longissima cuspide, quæ mali instar prostat in summo dorso, paulum reflexa versus caudam. Rarissime hic piscis capitur, & ideo fere ignotus est. Videtur tamen species Signiferi, qualem Tab. I. N°. 3. exhibui, adeo singula in utroque conveniunt; præter colorem. Post cuspidem maximam in tergo prostant aliquot aculei, qui pinnis adhærent. Sub branchiis duæ longissimè prominent pinnæ, quibus hic piscis in natando dexterrime utitur. In medio corpore fascia lata subviolacea ambit piscem, qui alioqui est flavi coloris.

5. DE ZEE OS, quem si *Bovem marinum* dixeris, rectè facies. Piscis est cornutus in capite, è quo tria prostant cornua durissima ac plane ossea. In superiore parte lateris videntur squammæ, sed non sunt, verum cutis durissima, & lamellis quasi distincta. Præterea cuspidem in tergo prominentem ostentat, reflexam ad caudam. Sub ventre aculei sunt tres nullo ligamine juncti, verum satis magni. Cetera in hoc pisce observatu digna patebunt vel ex icone.

6. DE ZEE KOE. Si fides sit habenda testi oculato, hic piscis ejusdem non tantum generis, sed etiam speciei est, quippe habetur pro femella superioris, estque omnis differentia in cornibus & cuspide dorsuali, quibus hic caret. Durities pellis, forma, color, & reliqua conveniunt tam accurate, ut non magna sit causa dubitationis in hac re.

7. DE BORDUURVISCH. E Cyprinorum, ut forma corporis satis indicat, genere



est hic piscis, in quo præter maculas nihil dignum observatu reperitur. Eæ non semper sunt ejusdem coloris, sed pro ratione temporis ac loci, ubi pisces capiuntur, variant. Præsertim tamen rubent.

8. ICAN BANDA. Corpus huic pisci totum est obsitum maculis fere quadrangularibus, quæ squammarum instar se invicem excipiunt. Oculos in capite habet prægrandes & fulgentissimos; quibus addedit, quod ab eorum extremitate lineæ ducantur, tanquam radii stellares. Ceterum, capite est obstituto, & ore non magno, fere posito in medio capite. Aculeatus non est, sed pinnas longiores habet in tergo continuatas à capite ad caudam, quales etiam fere cernuntur sub ventre ab ano ad caudam. Accedit ad genus *Pectinis Saliviani*.

9. ICAN BRUNO. A fusco sive nigricante colore nomen videtur huic pisci quaesitum. Est enim ille coloris præsertim fusci in nigrum vergentis. Cutis ei est dura ac detrahenda, priusquam piscis apparetur in cibum. Deinde caro est satis bona. Rapax est genus piscis, qui præsertim vivit è captura piscium minorum, quos avide devorare integros solet.

10. ICAN BRUNELLO. Minor est hic piscis, si respicias corpus, verum non minoris apud Amboinenses utilitatis, quibus est, ut ita dicam pro perca, nam quemadmodum apud nos perca habentur pisces gratissimi ac delicatissimi, si in aqua calida ritè apponantur, ita eodem modo hi ibi mensis inferuntur, ac in æque magno pretio habentur. A colore, credo, etiam nomen illis inditum, quoniam eorum color undiquaque convenit cum proxime præcedente.

11. ICAN BINCO, piscis est curvo corpore, unde illi nomen est datum. Capitis color est violaceus, qui etiam est in lineis sive fasciis, quæ ambiunt corpus, atque itidem in pinnis, verum aliquanto dilutior. Reliquum corpus est coeruleum, ac notatum exiguis maculis, quales etiam conspiciuntur in fasciis violaceis.

12. ICAN PORCOS, id est *Piscis porcinus*, qua appellatione ab aliis congeneribus distinguitur. Quippe tanta pinguedine est, ut caro ejus proprie lardum sit dicenda, & nulla re magis obsit edentibus quam quod nimis sit pinguis. Caro ejus est igitur magis grata quam ad valetudinem conducens, namque ex nimio hujusmodi piscium usu provenit diarrhoea, quæ in istis regionibus difficillime curatur.

13. DE ZEEKAP. Ex eodem genere est hic piscis, cujus est superior, verum magnitudine & carnis natura differt. Scilicet neque tantus est, si corpus respicias, neque ejus caro est adeo pinguis. Ergo neque idem incommodum oritur ex esu hujus piscis, quod dixi ex illius esu solere oriri. Color est subcoeruleus, atque nullis maculis in toto corpore interruptus. Superior capitis pars est candida, atque adeo argenti instar splendida, excepto quod aliquantum viret, quæ corpori conjungitur.

14. DE ANGELVISCH. In hoc prorsus est singulare, quod ex ore ejus quasi hamus bifurcatus procedat, uti in anguibus ac serpentibus, quæ res etiam fecit, ut inde huic pisci quaereretur nomen. Si corporis figuram respicias Capriscum diceret, cui sententiæ etiam videntur favere aculei in dorso conspicii.

15. ICAN BOE. Est species Cyprini lati, quem in magno honore habent Amboinenses & vicinarum insularum incolæ. A cauda ad corpus medium coerulei est coloris, ac nihil in eo dignum observatu occurrit; verum in medio corpore quasi fasciâ latâ ac rubrâ vincitur. Quod restat, usque ad caput, est fuscum ac penè nigricans.

16. DE ZANDKUIPER. Notus est satis hic pisciculus, atque ab aliis jam descriptus. Icon nostra satis etiam convenit cum illa, quam dedere alii auctores in hoc pisciculo describendo. Est autem è genere torpedinum, at statim se in arenâ abdit, simul ac aliquem accedentem audit, unde apud Ichthyographos ei nomen *Ammodite Indici* adhæsit. Vid. Willoughb. Tab. G. 10. No. 2. ac Raium in Synopsi p. 154.

17. DE MONIVISCH. Ignotus mihi pisciculus, quem tamen non difficile esset revocare ad aliquam speciem cognitorum jam piscium, si videretur res tanti esse. Nihil in illo adnotatu est dignum, quod se non prodatur intuentibus iconem ipsam. Quare ad eam mittendus est lector.

18. DE HARDER, id est *Mugil*, sic enim nos interpretamur, quum vox proprie significet pastorem, sive bubulcum. Satis etiam hic est notus, nec dignus esset, qui exhiberetur, nisi os ejus esset longe alio modo positum quam aliorum piscium solent ora poni. Scilicet non in inferiori capitis parte cernitur, sed in superiori, quoniam caput non curvarur prope os, sed recto tramite à dorso procurrit. Illud igitur tantum notandum est, atque ideo hic piscis adscribendus aliis mugilum speciebus, quæ apud nos sunt notæ. Atque hæc dicta sufficiant de piscibus Amboinensibus & vicinarum insularum, è quibus quosdam vidimus satis accuratè delineatos, alii autem an omnes ita, ut exhibentur, ad amissim sese habeant, adhuc dubius hæreo. Verum spes est huic Naturalis Historiæ Parti deinde ulteriori indagatione haud exiguam lucem accessuram.


#### F I N I S.

ADMONITIO, quibus paginis Tabulæ piscium sint adjungendæ.

TAB. I. pag. 1. T. II, 4. T. III, 5. T. IV, 8. T. V, 10. T. VI, 11. T. VII, 13. T. VIII, 16. T. IX, 17. T. X, 20. T. XI, 21. T. XII, 24. T. XIII, 25. T. XIV, 28. T. XV, 29. T. XVI, 32. T. XVII, 33. T. XVIII, 36. T. XIX, 37. T. XX, 40.

HIS












# HISTORIA NATURALIS PISCIIUM.

CURA

H. RUYSCH.

P R Æ F A T I O

J O H. J O N S T O N I.



Ecce Tibi Historiæ naturalis specimen, studiose Lector. In piscibus id exhibere voluit Typographus: ego non multum interesse arbitrabar, in quibus daretur; modo & reliqua, quod Deo volente fiet, prodirent. Suscepti laboris tui mihi commodum causa; cui fortè per diffusa volumina hætenus incumbere molestum erat. Taceo jucunditatem, quâ melioribus ingeniis, dum inexhaustam specierum naturalium varietatem, & stupendum eorumdem genium exhibet, illabitur: *Deum, eruditionem, conversationem, & naturæ imitationem*, si respexeris, summe eam necessariam comperies. *Deum dico.* Cultor quotidianus infinitæ Dei Potentiæ & bonitatis esse teneris. Hic Naturæ liber tibi ejus post sacrum codicem admiranda aperit. Machinam hic tantæ vastitiei invenies; tantæ & ejus partes molis, ut difficile sit judicare, quid magis in stuporem nos agat, infinita partium à se invicem distantia, an tanta earundem inter se magnitudo. Videbis aspectu vilia, & tantæ subtilitatis corpuscula, ut nulla planè esse alii, centies quadragies major est Historico naturali terrâ: tantæ velocitatis idem, ut unâ hora distat, Lxx. terræ semidiametris; hoc est, milliarius Astronomicorum 178698. removetur: quæ si in nostra milliaria per 52. reduci deberent, quanta quæso distantia non exsurget? Terra & aqua in unum globum redacta; etsi gravia corpora, ita tamen in medio aëre suspensa librantur, & ad polos mundi disponuntur, ut ne latum quidem unguem, vel ab oriente in occidentem dimoveri; aut à septentrione in Austrum, vel vice versâ, propelli possint. Pisciculus est Echineis, quem Remoram Magnes: at quæ non miracula ejus beneficio patramus? Imbellis populus formicæ: tamen iis proferunt & siccant. Et quoniam ex diverso convolvunt, alterâ alterius ignorâ, certi dies ad recognitionem mutuam, velut nundinis, dantur. Exiguum insectum Apis, nec ullius, si solo aspectu æstimari debet, pretii. At si earum naturam, Remp. opera excusseris, exclamabis; *rerum naturam nusquam magis, quàm in minimis totam esse.* Infinitæ hæc potentiæ argumenta, quæ Historicus naturalis suggerit. Bonitatem si attendas, grande illius documentum, quod nulla re natura ad conservationem sui destituitur; quod omnes hujus universi partes, singulari nexu inter se colliguntur, & sibi mutuam ad conservationem totius præstent subsidium: quod superiora, etsi mole, loco & qualitatibus nobiliora videantur, inferioribus quasi inserviant; & denique, quod cuncta homini tanquam regulo suo famulentur. Rem se ita habere, per universam corporum naturalium seriem, in Historia deducitur. Bona eruditionis nostræ pars naturalium peritia. In eo defudat intellectus noster, ut quænam sit sublimium, elementorum, subterraneorum, plantarum, animalium, hominis denique ipsius conditio, penitus cognoscat. Spinosa illæ de materia primâ, infinito, loco, tempore, motu, generatione, &c. quæstiones huic desiderio non sufficiunt: historia, si exactè instrui adyta per singularia inducimur. Ab his illa abstrahi, per eadem restringi, confirmari, refutari, &c. differentie essent, nisi à singularibus eorundemque inter se comparatione peterentur. Non poterat Aristoteles & ex eo Plinius scribere, *Capita piscibus proportionem corporis maxima: Nulli animali, cui cornua, exertos dentes, sed omnibus concavos, piscium omnibus serratos præter scaro: volucrigue in pedibus talos habent, sævo pinguescere, bisulca, scissive in digitos pedibus, adipe; &c.* nisi Historiam consulisset. Inde ergo tibi & in hoc puncto necessaria; quod fortè accuratissimè explicata Physicæ, quas adhuc premit, partibus dabit. De *Conversatione* res clara est. Eo sæpius de naturâ apud veteres in conviviis in usu, Plutarchi Symposiaca, & Athenæi Deipnosophistæ docebunt. *Naturæ imitatio* summus sapientiæ nostræ apex est. Hæc indigentia humanæ subvenit, opes auxit,

inge-



## P R Æ F A T I O A D L E C T O R E M.

ingenium supra sortem mortalem extulit. Deo quasi similes reddimur, dum ipsius naturæ machinamenti usi, eandem, generando, corrumpendo, transformando, provehendo, impediendo, divertendo, resolvendo, reducendo, &c. nobis quasi subjici & famulari cogimus. Ausum est hactenus ingenium humanum, cœlum perpetuo & uniformi motu æmulari; ignes perpetuos, deducta quasi astris facce, accendere; ventis, pluviis, iridibus, fulguribus, tonitrubus, minari; aërem in unum coactum librare; aquas in declive ire solitas, in sublime propellere; monstra & novas species formare; lapides pretiosos fundere; corpora in sua principia, plumbum in hydrargyrum, ferrum in liquorem rubiginosum resolvere; arbores argenteas & aluminosas subito producere; plantarum incrementa retardare vel accelerare; easdem in seipsas transmutare; ex cineribus resuscitare; facultate purgativa, & venenata imbuere; ex stupidis lignis, & mineralibus, Deos, cœlites, heroas, Aquilas, columbas, muscas, mundum adeoque ipsum efformare, iisque animam inspirare; oculum syderibus inferre; exilibus stupendam molem adaptare; Musica affectus varios excitare & sœpire; Dæmontum denique apparitiones, spectra, & nescio quas πολυμορφίας ad instar Morganæ Reginæ in freto Mamertino, de qua ingeniosissimus Kircherus, *Artis Magnæ Lucis & umbræ* l. 10. c. 1. agit, mentiri. An hæc absque naturalium cognitione peracta? Palleris. Non potest agricola suum agrum bene proscindere, effringere, tertiare, voccare, runcare, farrire; non hortulanus suum hortum plantare; opilio ovibus prospicere; pecuarius pecori subvenire; venator feras sectari; piscator squamigero gregi insidiari; aucups aviculas allicere; &c. absque hujus subsidiis si fuerit. Hujus beneficio convenientia animantibus Adamus nomina imposuit: & Caini posteritas artes fabriles invenit. Non est ergo mirum, & Salomonem tantum huic studio impendisse, ut de plantis & animalibus libros, quos nos perisse dolemus, Urreta in Bibliotheca Preteganis habere nugatur, scripserit; tantum per Alexandrum M. indagandi Animalium per Aristotelem natura studio insumptum, ut summa ad plura talenta excreverit: tantum & præterito seculo Franciscum I. Gallorum Regem, ut *Gyllium* & *Bellonium*, viros eruditissimos, & quorum quædam in hac materia scripta extant, in remotas Europæ partes, quin Asiam & Africam miserit. Hujus etiam sine dubio admiratione factum, quod præter Reges & Principes, præcipui Philosophi in eam inquisiverint, & posteritati commendarint. Habemus præter eos, quos in Bibliothecis, Alexandrina, Constantinopolitana, Pergamenæ, & aliis perisse dolemus; quique fortè adhuc cum blattis & tineis conflictantur, inter veteres Geographos, Aristotelem, Theophrastum, Dioscoridem, Ælianum, Oppianum, Columellam, Varronem, Palladium, &c. & qui omnium instar est Plinium, cujus Solinus simia appellatur; inter recentiores, Gesnerum Germaniæ Plinium, Aldrovandum, Wottonum, Turnerum, Mouffetum, Agricolum, Boërium, Baccium, Ruveum, Schonfeldium, Freygiu, Mathiolum, Tabernmontanum, Bauhinum Ximenem, Bustamantium, Rondeletium, Beilonium, Cæsium, Thevetum, Marggravium, Pisonem, ab Horto, &c. & qui utriusque Indiæ Navigationes scripsere. Hinc fit, ut sæpe mirari soleam, quod nullam huic Historiæ in Academiis, Bononiensem si excipias (in Wittebergensi quoque eam cœpit urgere Cl. Sperlingius) Professionem assignatam videam: & malimus sæpe inter quæstiones de generalibus motis consensescere, nulli vitæ generi prompti; quam naturæ abdita scrutari, quæ omni inserviunt. Et tantum de Historia naturali. De *Labore* meo hæc paucis habe. Totam me naturalem historiam prætexere constituisse, si mihi ad tantas cûsas Deus vitam producere voluerit, eamque ex vastis illis tam recentium quam antiquorum, Plinii imprimis, Aristotelis, Oppiani, Gesneri & Aldrovandi, voluminibus excerptam, & brevioribus gyris inclusam, ut te quasi in illa scripta introducerem: illa præcipuè quæ ad naturalium cognitionem spectant omiſſis aliis attingere, ne te distraham: ordinem qui mihi videtur commodissimus sequi, ut memoria tua juvetur: Paralipomena ex recentioribus illis imprimis, qui Indica nobis dedere, addidisse, ne quid omiſſum esse conqueraris: in descriptionibus authorum ipsorum plærumque verbis uti, sæpe & breviora capita inserere, ne quid secus acceptum occurrat! Authorum loca etiam ab istis neglecta adjecisse, ne te ab his abduci per compendia, imaginæ: Figuras, & quidem elegantes, ut Chalcographus adjiceret persuasi, ut descriptiones facilius conciperes, & impressam memoriæ imaginem, specie ipse visâ depromere posses. In hoc de Piscibus volumine adjectos quosdam ex Schonfeldio habebis: Liber verò quartus ex Marggravii, in cujus immatura morte, ingentem Resp. literaria jacturam fecit, Historia Brasiliæ naturali totidem verbis depromptus est. Cur ad suas classes reduci non potuerint, dixi. His interim frui, studiose Lector, & ad sequentes nundinas, Avium, Quadrupedum, & Aquaticorum, Exanguium, quæ jam parata, Historiam expecta. Bene vale, & studiis nostris fave. Dabam Lesznæ Polonorum ex Musæo, in curcotide Nativitatis Salvatoris nostri, Anno M. D C. L I.



ENUMERATIO MORBORUM

quibus petuntur Remedia

ex PISCIBUS.

A.		Exanthema.	34. b.	Pterygia oculorum.	88.
A		F.		Pustulæ.	30. a.
dustæ partes.	Pag. 88. b.	Febris.	112. b. 115. b.	R.	
Alvus.	28. b.	Febris quartana.	155. b.	Renum lapides.	108. b.
Alvi profluvio.	24. a.	Fœtura.	119. b.	S.	
Alvum reddens.	56. b.	G.			
Anguillam purgationis causam.	83.	Genitalem humorem augens.	118. a.		
deglutire.	83.				
Angina.	55. a.	H.		Sanguis è naribus fluens.	112. b.
Ani vitia.	41. b.	Hepati conferentia.	24. a.	Sanguinem stringens.	147. a.
Arquatus morbus.	64. b.	Hemorroides.	41. b. 83. b.	Scabies.	24. a.
Arquatus oculorum morbus.	115. b.	I.		Scrofulæ.	34. b.
Asthma equorum.	83. b.	Ictericus morbus.	26. a. 115. b.	Secundinæ à partu hærentes.	104. a.
Articulorum dolores demul-		L.		Somnifera.	157. b.
cens.	16. b.	Lactis mulieribus copiam fa-		Strangulatus mulierum.	64. b.
Artuum dolores.	115. b.	cere.	4. a. 56. a.	Stranguria.	49. b.
Auditus gravis.	88.	Lethargia.	101. a.	Stillicidium urinæ.	37. a.
Aurium dolores.	83. a.	M.		Struinæ efficacia.	70. b.
		Mammæ.	24. a.	Suffusiones.	23. b.
C.		Mulicrum morbi.	157. b.	Surditas.	20. b.
Calculus.	32. b. 111. a. 159.	Mulieres ne concipiant.	41. b.	T.	
Caligo oculorum.	49. b.	N.		Tabes.	24. a.
Canum rabidorum morsus.	35. b.	Nephritis.	73. b.	Tenefmus.	35. b.
Capillos restituens.	83. b.	Nephriticis adversantia.	157. b.	Torpedines amovens.	115. b.
Capitis dolorem amovens.	11. b. 70. b.	Nervorum dolores.	83. b.	Tumor gingivarum.	54. a.
	115. b.	O.		V.	
Carnes oculorum supervacuæ.	63. a.	Oculorum maculæ.	104. b.	Venenis obstans.	61. b.
Cephalalgia.	34. b.	nubeculæ.	ibid.	Verendorum pustula.	56. a.
Cicatrices.	63. a.	suffusiones.	43. a. 104. b.	Veneris vim augens.	112. b.
Colica.	33. b. 104. b.	P.		Ventris tormina ex dysenteria	
Comitiales morbi.	157. b.	Panni.	33. b.	fopiens.	83. b.
Cutem denigans.	101. a.	Partus mulierum continens.	8. b.	Ventriculi vires reficit.	73. a.
		promovens.	ibid.	Verrucæ.	49. b. 55. a. 56. a.
D.		Pavores repentinos tollentia.	55. b.	Vesicæ vitia.	50. a.
Dentibus & gingivis infantium		Pavores arcens.	14. a.	Vini tædium pariens.	83. b.
conferentia.	155. b.	Pituita.	32. b. 42. b.	Vomitum compefcens.	73. b.
Dentium dolor.	19. b. 61. b.	Plueris.	111. a.	Vulnera.	83. b.
Dentitionem puerorum pro-		Podagra.	16. b. 157. b.	Vulva.	30. a. 55. a.
movens.	14. a.	Prurigo.	20. b.	Ulcera exsiccans.	111. a.
Dothienæ.	34. b.			Ungues.	88. b.
Dysenteria.	41. b. 55. a.			Unguium scabrities.	49. b.
E.				Urina.	28. b.
Epinyctides.	101. a.			Urinæ difficultas.	111. a.

NOTITIA PISCIIUM

ex quibus Remedia præstantissima capiuntur.

A.		G.		P.	
A		Glaucus.		Pastinaca marina.	
cus.	Pag. 37. a.	Gobii.	4. a.	Perca marina.	19. b.
Albula parva.	119. b.		35. b.	Perca fluviatilis.	30. a.
Anguilla.	83. a.	H.		Phoca.	108. b.
Anthis.	34. b.	Hepatus.	30. b.	R.	159. b.
Αἰθιοπική.	147. a.	I.		Raja.	20. b.
B.		Ichthyocolla.	101. a.	Rana marina.	23. b.
Blennus.	50. a.	Julis, aliis Jurella.	28. b.	Remora.	8. b.
Boopis.	56. a.	L.		S.	
		Lucius vel Lupus		Sardus.	54. a.
C.		Lupus.		Scarus.	26. a.
Carcharea.	14. a.	M.		Scombrus.	64. b.
Centrina.	16. b.	Manæ.	55. a.	Scorpio.	49. b.
Coracinus.	32. b.	Manatis.	157. b.	Squatina.	24. a.
Cuculus marinus.	42. b.	Milvus seu Milvago.	43. a.	T.	
Cyprinus.	112. b.	Mugil.	73. a.	Thynnus.	6.
		Mullus.	41. b.	Thymallus.	88. a.
D.		Murena.	11. b.	Torpedo.	18. b.
Delphin.	155. b.	Mustella fluviatilis.	104. a. b.	U.	
Draco.	61. b.			Umbra.	33. b.
E.				Uranoscopus.	63. a.
Erythrinum.	44. b.			IN.	



# I N D E X

in Historiam de Piscibus & Cetis, juxta seriem alphabeticam  
dispositus, in quo litera P. paginam descriptionis,  
T. tabulam denotat.

A.	P.	T.	P.	T.	P.	T.
<b>A</b> bacatuaja.	141.	37	Afellus alius.	2	Cete.	150.
Acacana.	160.		Afellus virefcens:	46	Cete admirabilis formæ.	45
Acara.	126. 133.	34	Afellus varius.	46	Channe.	30.
Acaraaja.	133.	34	Asper pisciculus	96.	Citharus.	59.
Acaramucu.	141.	37	Danubianus.	96.	Citharus flavus f. asper.	59.
Acarnian.	44.	18	Attagenus lepras.	27.	Clavatus Cyprinus.	120.
Acara pinima.	126.	32	alius.	13	Cobites aculeata.	97.
Acara pitamba.	127.	33	Atherina.	52. 17.	Barbatula.	97.
Acarapucu.	124.		Attilus Padi.	99.	Cobites fluviatilis Rondel.	97.
Acarauna.	123.	32	Aurata.	46.	Cobitus:	26
Acipenser Zelandicus.		23	Axotototi.	147.	Colia five lacertus.	64.
Acipenser	1	23			Conger.	9.
2	75.	23			Coracinus.	31.
3		23	<b>B</b>		minor.	32.
Aculeatus marinus major.		47	Bagre.	143.	niger.	32.
Acus major Oppiani	37.	15	species alia.	38	Cardx Rondel.	65.
minor Bellonii.	37.	15	alia.	38	Corocoro.	135.
alia species.	36.	15	alia.	38	Corvulus.	31.
Acus Aristotelis.	36.	15	alia.	38	alius.	2
alia species.	36.	15	Balæna genera.	151.	Corvus Niloticus.	94.
Adonis exocætus Bellonii.	32.	15	Balæna vulgi.	152.	Cottus Gesneri.	95.
Agonis Italicus.	121.	30	Balæna 60 pedem longitudine &	41	Cuculus.	42.
Germanicus.	93.	26	altitudine.	42	Cucupuguaeu:	134.
Ajereba.	144.	38	Ballerus.	114.	Cucuri.	39
Alauda cristata.	38.	17	Barbo.	88.	Curema.	137.
non cristata.	38.	18	Barbota Gallorum.	102.	Curimata.	128.
Albula cœrulea.	119. 120.	30	Barbus Salviani.	31	Cururuca.	125.
Albula lavaretus.	118.	30	Bezola.	118.	Curvata Pinima.	140.
Albula lacustris, Bezola dicta.	119.	30	Blennus.	49.	Cynædus Alphæstus.	31.
Albula minima.	119.	30	Blennus Bellonii.	19	Cyprinus.	111.
Albula nobilis.		46	Blica seu Ballerus.	114.	latus Rondel.	113.
Albula parva Gesneri.	119.	30	Boops.	56.	alius.	114.
Albula.		46	Boops peregrinus.	26	monstrosus.	112.
Alburnus albus Salviani.	120.	30	Boops Rondeletii.	66.	Salviani.	31
Alburnus Aufonii.	109.	29	Bubulca Bellonii.	98.		
Alofa.	70.	27			<b>D.</b>	
Alofa seu Clupea.	70.	27	<b>C.</b>		Delphinus prior.	154.
Alphestes.	31.	15	Comatipaguacu.	137. 40.	alter.	43
Ambiza.	148.		Camuri.	130.	Denter five Synodon.	45.
Amia.	6.	3	Canadella.	30.	Doncella seu Julia Salviani.	19
Amilot.	148.		Canicula seu Galeus canis.	14.	Draco marinus major.	60.
Ammocatus, vide Exocætus.			Canis Carcharias.	13. 14.	minor.	11. 60.
Amore Guacu.	132.	34	alia species.	6	Dracunculus.	61.
Amore Pixuma.	135.	35	Aristotelis.	159.		
Amore Tinga.	135.		Carcharias alius.	6	<b>E.</b>	
Anguilla.	81.	24	Canis Carchariæ dentium series.	7	Encrascolus.	51.
alia.		24	Canis marinus.	8	Epelanus fluviatilis.	109.
Anthias Rondeletii.	33.	16	Cantharus.	47.	Eperlanus.	78.
Anthias afellis conformis Rondelet.		16	Caper five Caprifcus.	74.	Erythrinus.	43.
Anthias primus.		16	Capeuna.	127.	Exos five Ichthyocolla.	100.
secundus.		16	Capito Anadromus.	73.	Exocætus.	32.
tertius.		16	Capito Aufonii f. Squalus veterum.	98.		
quartus.		16	Capito fluviatilis f. Squalus minor.	90.	<b>F.</b>	
Anthias congener.		16	fluviatilis rapax Gesneri.	91.	Faber.	57.
Antacæus Rondel.	100.	25	Carapo.	134.	marinus.	17
Alatus.	100.	28	Carana.	125.	Fario seu Trutta.	85.
Anthropomorphos.	146.	40	Carpio.	118.	altera.	86.
Aper.	3.	1	Carpio Benaci.	30	Farra.	120.
Aphya Cobites.	51.	19	Catan.	115.	alius generis.	30
Aphya Membras.	51.	19	Cataphraetus.	77.	Fiatola.	48.
Aphya Phaleica.	51.	19	alius.	46	Frater Hugo.	40
Apua.	50.	19	Idem supinus.	46	Fratola seu Fiatola.	28. 48.
Apua vera.	51.	19	Catulus major.	14.	Fuga seu Phycis.	28.
Aquila.	19.	9	Catulus f. Canicula Aristotelis.	13.	Fundulus.	95.
Amara.	137.	30		14.		
Araneus major, five draco marinus			Chalcis altera Rondel.	30	<b>G.</b>	
major.	60.	21	Channe hiatula.	30.	Galei genus.	45
minor.	60.	21	Channe.	14	Galerita.	40
Afellus.		1	Chromis.	45.	Galeus Acanthias, f. Mustelus	
Afellus minor seu Callarias. I.	1.	2	Ceixupira.	129.	spinax.	16.
Niger.	1.	2	Centrine.	16.	Asterias	
Afellus alter f. Merluccius. I.	1.	1	Copola.	49.		
Afellus mollis.		2				



# HISTORIÆ NATURALIS DE PISCIBUS. LIBER PRIMUS.

## De Piscibus Marinis.

### TITULUS I.

De Pelagiis.

### CAPUT I.

De Piscibus Squammosis.

### ARTICULUS I.

De Asellis.



**P**isces, qui Latinis *Aselli* dicuntur, Græci *ὄνις* & *ὄνισκος*, seu ab asinino colore, quod Varroni placet, seu à torpore, ut *Oppiano*, vocant.

Genera eorum duo Plinius, & *Dorion*, faciunt, *Callariam* & *Bac-*

*chum* seu *ὄνιν* quem *Gadon* alii dicunt, & *Cal-*  
*leridam*, *ὄνισκος*, & *μύζενος*; tria *Oppian.* nisi  
Oniscum pro parvo sumpserit: Nos ejus *Asel-*  
*lum nigrum*, *Molvam*, *Morhuam*, *Gobergum*,  
hisque *Mustelam*, & *Tincam*, adjicimus.

Onos, nonnullis *ὄνισκος*, *Asellus*, *Plinio*, seu  
quod *Libero Patri* facer, seu ob tumidū ven-  
trem *Bacchus*, *Dorioni* *Gadus*, *Holl.* juvencu-  
lus *Bolck*, adultus *Cabellian*, dicitur, magnitudi-  
ne est insigni, tres enim cubitos sæpe exce-  
dit; colore in tergore, nigricante, ad latera &  
in ventre albicante, capite amplo, ore, ante  
quod cirrum habet, (radiolum & virgulam  
quidam vocant) grandissimo. *ἀνθήρον ὄνις* παῖς  
*γυλαῖς*, *Arist.* dicit, ventre non variegato (malè  
*Epichar.* apud *Athen.* *ποικιλόχρους* vocat) sed  
tumido, ut *ποικιλόχρους* legendum sit, jecore ma-  
ximo. *Degit* in alto mari, in aliquo latibulo;  
sub *Sirii* maximè exortum latitat, cum alii  
per frigus se abdant, sæpè se arenâ obruit, un-  
de forte *Sandi* apud *Borussos* nomen.

*Uusus* ejus in cibis apud *Rom.* post *Accipen-*  
*ferem*, hodie apud *Septentr.* frequentissimus.  
Carne est alba & friabili. quod si mari puro  
& alimento probò utatur, carnis bonitate  
cum saxatilibus contendit. Difficilem esse  
concoctu, virosūq; aliquid habere *Diphil.*  
apud *Athen.* prodit. Exsiccatus osseam du-  
ritiem contrahit, nec nisi fustibus verberatus  
coquitur; unde piscis fustuarii, & *Germ.*  
*Stockfisch* nomen. Sale inveteratus, & sal-  
sugine abluta ex nova aqua elixus, *Laberdan-*  
*us*; (*Laberdan*) in Germaniam devectus,  
*Rheinisch* / *Rheni* piscis, vocatur.

*Callarias* s. *Clarius*, *galaria*, *galerida*, *galaxia*,  
*Holl.* *Schelfisch* / *Murmelio* *Piscis capitosus*,

*Gallis* *Merlucius*, longitudine plerumq; est  
cubitali, teres, ventricosus, squammas habet  
minutas, in lateribus & dorso ad cineritium  
colorem vergentes. *Caput* majusculum, & in  
eo lapillos duos oblongos, latum, pressum. *O-*  
*ris* riētum maximum. *Oculos* maximos, *bran-*  
*chias* utrinq; quaternas, duplices; in interiore  
oris parte post linguam ossa patre inferna, su-

perna, aspera, & in gula, regione cordis duo  
alia reliquis longiora, quæ obstant ne pisces  
dum devorat, in gulæ angustias compulsi, a-  
culeorum asperitate cor vulnerent. *Ventricu-*  
*lus* est magnus, crassus, superiore parte latus,  
inferiore acutus, albus. in interna capacitate  
tenuissima ac nigerrima membrana obduci-  
tur. *Pinnis* natat. 4. quar. quæ in supina parte,  
ori sunt propiores, quam quæ ad branchias.  
Unicam habere spinam ex dissecto *Salvian.*  
didicit. *Interiora* si spectes, *cor*, quod inter  
branchias situm est, pericardio involutum, fi-  
guram ossis dactylorum exprimit. *Iecur*, cui  
fel committitur, album, *intestina* rubent, *ute-*  
*rus* bifidus nec, longus ex vertebrarum extre-  
mitatibus, quæ retusa sunt, crassâ utrinque  
membrana, scapulæ formam dissecta ad amuf-  
sim repræsentans, suboritur; quæ capacita-  
tem intus vacuam, extuberantemq; efficit ita.  
ut piscis ventriosus reddatur. *Degit* plerumq;  
circa cænosa ac herbosa littora. *Gobionibus*,  
*atherinis*, & *marinis* rejectamentis vescitur.

Carne est candida & friabili. Huic similis  
est, quem *Veneti* *Pisces mollem*, *Rom.* *Ficum*,  
*Galli* *Merlangium*. Albus argentei coloris,  
mollis, squamis parvis tectus, oculis magnis,  
argenteis; ore mediocri, dentibus in maxillis,  
parvis, albis, acutis, ordinatis. In capite calcu-  
los oblongos habet. *Pinnas* ei tres in tergore,  
duas ab ano ad caudam, in lateribus ad bran-  
chias utrinque unam, *Bellon.* tribuit. Spina  
tergoris 60. vertebris. linea à branchiis ad  
caudam sinuosa ducitur. *Ventriculum* habet  
magnum cum multis appendicibus. *Epar* ex  
candido rubescens, vulvam bifariam juxta  
*Rondel* quadrifariam juxta *Bellon.* divisam.  
Ascendit sæpè ex alto ad littora, & *Aphyis*  
*Caridibus*, *Gobionibusque*, quos integros  
devorat, pascitur. In *Gallia* maximè fre-  
quens est. *Asellus NIGER* *Anglis* ideo  
*Collfisch* / à carbonibus dictus; squamis est  
latioribus, tergore nigricante, ventre can-  
didiore. Linea à capite ad caudam atra, &  
ad latera aliquantulum inflexa producitur.  
pinnæ reliquis sui generis piscibus durio-

Tab. I.  
2. 3.  
Tab. II.  
2. 3.

*Aldrov.*  
l. 3. de  
*Piscib.*  
c. 3.

*A'drov.*  
*Gelner.*  
Tab.  
II. 3.



res & robustiores sunt. Parvus carnem habet planè inspidam, profectus habetur in pretio.

*Asellum virefc. v. Tab. 46.*

## ARTICULUS II.

*De Molva, Morhua, Mustela, & Tinca marina.*

Tab. II.  
6. Tab.  
xxxvj.

**M**Olva, Rondeletio *Asinus varius*, & *Molva major*, dorsum habet cinereum multis maculis nigris conspersum, ventrem candidum falcatum, pinnae in dorso tres, à podice unicam, duas ad branchias, duas in ventre. Dentes in maxillis, internas partes Asino similes.

Aldrov.  
de Pisc.  
lib. 1. 3.  
cap. 6.

Morhua seu *Molva altera*, Anglis Morchuel, plerumque est sesquicubitalis longitudinis, pedis unius. Os ipsi magnum, dentes in maxillis, oculi magni. Ex inferioris maxillæ extremo appendix carnosæ ceu pilus è barba propendet. Pinnae ad branchias & in ventre binæ, parte prona tres, à podice duæ conspiciuntur. Dorsum cinereis fulvisque maculis notatur. Venter est falcatus. Caro coctione propter humoris tenuis consumptionem, glutinosior, ut farina aqua diluta, & saccharum dissolutum evadit, butyro immersa adeò digitis adhærescit, ut vix inde avelli possit. Intestina & folliculi ichtyocollæ conficiendæ inserviunt.

Gobergus duorum cubitorum magnitudinem superat. Colore est cinereo, ventre falcato, ore sine dentibus mediocri partibus internis Merlucio similis. Carne duriore quàm Asinus.

Tab. I. 4.

Quem Mustelam Genuenses vocant. Illyrici *Pegorellam* dicunt. Bellonius Aristotelis & Galeni *Callariam*, Rondeletius *Asellum*, veterum esse opinatur. Trium interdum palmorum est longitudinis, cruris humani crassitiei, colore ex livido in opacum abeunte. Duas in tergo pinnae gerit, minimo capiti vicina est, præter has alia ad caudam usque protenditur, ad latera utrinque una rotunda, ut & cauda visitur, sub quibus postremis crassiores ac carnosæ quidam cirri bifidi conspiciuntur. Maxillæ ipsi mobiles. Dentes confusi, in superiore labro, maculam, cordis figura, denticulis circumfultam, linguam albicantem & in cuspidem efformatam ostendit. Branchias distendit utrinque quatuor. Interiora si spectes, sub branchiis cor delitescit triquetrum, bursâ suâ involutum. Hepar pallidum ac ferè lacteum in tres lobos divisum, diaphragmati appensum. Sinistra ejus pars, cæteris major, vesiculam feliis oblongam admittit. Lien prægrandis sanguineus, gracilis, oblongus, pastorum instrumentum, cui cornutæ Musæ nomen referens, à ventriculo dependet. In pyloro, triginta & aliquot apophyses numerantur. Intestina tribus revolutionibus circumflectuntur, priusquam re-ctum attingat. Vesicula quædam cæteris Asellis communis, gemino veluri folliculo ter-

gori conjuncta, commodum nationis usum exhibere creditur.

Tab. I. 5.

Tinca marina, propter corporis cum palustri similitudinem sic dicta, *Pesce fico* Italisch quod passificus instar mollis sit, vocatur. Salvianus *Asellum Callarium* esse sed falsò, contendit. Vix pedalem mensuram excedit. Corpore est toto oblongo, latiusculo, squammis minutis contexto, coloris cinericii. Capite, in quo duos lapillos gerit, lato & presso. Ore magno, & valdè denticulato. Oculis aureis. Ex in feriore maxilla appendix cum barba propendet. Branchias habet utrinque quaternas, & ad eas binas latiusculas pinnis, unam scilicet utrinque. Ex anteriore ventris parte pinnarum vice bini longi admodum atque rotundi circi propendent. In primo dorso pinna parva erigitur; post eam alia una enascitur, per dorsum totum ad caudam usque extenditur. Inferiori ventri singularis pinna ab ano orta, ad caudam etiam usque producta, subnectitur. Cauda in unicam rotundam desinit. Hepar magnum & subalbidum visitur.

Caro concoctu est facilis, sed excrementitia.

## ARTICULUS III.

*De Harengo, & Lipari.*

**P**iscis, quem Germani *Harengum* fortè à Græcorum *ῥάπιδος*, quod falsamentum sonat, alii Halecem vocant, qui apud antiquos sit & vocetur, ignoratur. *Chalcidi* marinæ seu Sardinæ quidam congenerem faciunt. *Thrissis* sive Alosis nonnulli.

Aldrov.  
vand. 1. 3.  
cap. 10.

Dorso est quodammodo cæruleo, ventre albo falcato, squammis acutis pertinaciterque hærentibus. Branchiarum scissuram, quia pro corporis ratione magnam habet, citissimè aqua extractus emoritur. Jejuno duntaxat intestino instructum Albertus author est.

Tab. I. 6.

In Oceano Germanico circa Britanniam, Hiberniam, Scotiam, Norvegiam, Daniam inveniuntur, in Mediterraneo quoque capi, & Romæ, Massiliæ, Venetiis prostare falsò Bellonius prodidit, formæ similitudine, quam cum *Trissis* habeat deceptus. Puro aquæ elemento *Nutrivi* voluerunt quidam, quod in aërem protracti in momento expi- rent. Magnis simul agminibus natant, & tanta ipsorum copia, ut ad c c m. coronatorum in singulos annos capturæ precium ascendere Cardanus ptodiderit: In terra sancta Oceanici maris Insula um. hominum vitam harengis sustentabant. Cùm per petulantiam unam ex captis virgis cecidissent, adeò eor. numerus est imminutus, ut post illa vix centum ex eo quæstu vixerint. Lucent in aqua, ventribus versus summum æquor, obversis. imò tantum de se splendorem, squammis maximè quæ circa oculos, emittunt, ut mare fulgurare videatur. Lucem emoriente mori, credi-



credidere quidam, per aliquot post mortem superesse dies, quidam experti sunt. Semel anno teste Alberto pariunt.

Caradenus in  
Brigantibus.  
Lanfrus de Prin-  
cipatu Europæ.

Mira de eorum natatu prodita sunt. Proavorum tempore ad Norvëgiam sua quasi stativa habuerunt nostro tempore Britanniam totam immensis exercitibus circumnatant. Circa solstitium æstivum ex alto Scotiæ littora petunt: inde anglica littora adeunt, & ab Augusto medio ad Novembrem à castro Scarboroug ad Thamesin capiuntur. Postea aliqua vehementiore procella in Britannicum mare deferuntur, & in eo ad Christi natalitia piscantibus se offerunt. hinc Hiberniam utrinque pernatantes, in Septentrionalem Oceanum, circumnavigata quasi Britannia, se transferunt. & ibi ad Junium occultantur. Postquam fretificaverunt, redeunt.

Ufus ipsorum in cibis, apud Septentrionales frequens. Recentes muriâ conditi, & exsiccati; mensis inferuntur. Solent & saliti aqua macerari: salugine deposita, in craticula assi eduntur. Conspecta in novo orbe volantium nubes. *Misera horum*, inquit Thuanus, *conditio, quibus nec in mari natantibus, nec in aëre volantibus, tutus unquam receptus, naturamque in utroque elemento novercam experti, cum ut se à perniciæ cognatorum piscium asserant, in altum evadunt, mox ab avibus circumvolantibus rapiuntur; quarum si rostrum fugiendo evaserint, aresactis alis deficientes, rursus se in aquas præcipitant, & volando fessi, à piscibus infestis glutuntur. Itaque mediam sortem eligentes plerunque in obvias naves involant, & præda hominum sunt.*

Thuan. Histor. l. 117.  
Plin. H. N. l. 32. c. 12.  
Tab. I. 7.

Liparis piscis à Plinio memoratus, à pinguedine, quasi *λίπαρος* nomen invenit. Capite terrestrem curriculum refert. Os ei parvum, sine dentibus, maxillis asperis. virga à capite ad caudam satis lata. Squammæ parvæ. pinna ad branchias & in ventre binæ. alia à podice ad caudam, alia à cervicis loco ad eandem continua sine aculeis.

Cauda in duas definit. Adeò pinguis est, ut sub cute pinguedinem loco carnis habeat; asservatus, totus in oleum abiverit.

#### ARTICULUS IV.

De Apro Scolopace & Monocerote.

Tab. I. 8.  
Aldrov. l. 3. c. 12.  
de Piscibus.

Per Rondeletii, quem ille cum Apro veterum eundem, sed falsò ut Aldrovandus ostendit, ponit, piscis est squamosus, ferè rotundus, compressus corpore præduro; & aspera veluti ac villosa cute prædita, rostro suis instar, oblongo & obtuso, sine dentibus. aculeis præacutis, duris, longis, rectis. setas inæquales esse diceres, qui mox à capite secundum dorsum longitudinem decurrunt. Pinnas habet ad branchias duas, in ventre duas alias, multis firmisque aculeis & à se distinctis constantes. à podice tres aculeos bre-

ves & acutos. Cauda in unâ pinnam definit.

Iconem porci supini Salviani tradit Tab. XXXI. 1.

Qui Rondeletio SCOLOPAX, seu Ascolopax est, hunc alii *Elephantem*, sed perperam. rostrum enim rigidum est; Gesnerus *Serrā* Plinii quod radium caudam versus serratum habeat, nominat. Semper ferè parvum esse. exinde conjicit Rondeletius quod tres ejusdem magnitudinis ovium distentos viderit.

Tab. I. 9.  
Rondelet. ut Hist. Pisc. Gesnerus de Aquatilis.

Corpore est rotundo, Erythrini modo rubescente. rostro prælongo, rigido. In dorso habet aculeum longum durum, præacutum, alterā tantum parte serratum. denticulis serram referentibus, utpote contiguas basibus quæ latiusculæ sunt. Caudam habet tenuem.

Caro ei substantia Pagro similis. boni succi & facilis concoctionis. Cum rarus sit, exsiccat potius servatur quam editur.

Monoceros Clusii, ob consimilem potius cum Scelopore formam, quam ut quod intersquammosos censeretur debeat; aspero enim corio est; priori subjungitur. Ex orientali India alatum Clusius ita descripsit. Ab extimo ore usque ad caudæ pinnas, paulo longior erat tribus uncis, medio corpore paulo plus uncia latus, &c.

Tab. I. 10.  
Clusius l. 6. Exot. c. 27.

#### ARTICULUS V.

De Glaucis veterum & Hippuro.

Glaucus piscis à colore cæruleo seu Cyaneo ita dictus, *ὀπιδεύς* interdum à Græcis, teste Eustachio, dicitur, & benè à *Glaucisco*, cum ille æstate lateat, si Aristoteli & Ovidio credimus; hunc æstate & hyeme Damoxenus Comicus in cibis laudet, distinguitur. Mnesitheus apud Athenæum inter *πυλίων* Volaterranus ferratorum & carnivororum genera, eum ponit; Aristoteles squamosum facit, & paucas appendices supernè circa ventriculum exeuntes habere adjicit. Plinius austero & irascenti mari simili colore, esse prodit.

Tab. I. 11.  
Plin. l. 32. c. ult.

Apud Rondeletium tres ipsius habemus species. Prior provincialibus *Cabrolle* dictus, tricubitalis quandoque, corpore est longo, ventre compresso, dorso falcato, cæruleo, cute nitida, squammis vix apparentibus, ni cutis exsicceatur. ventre candidissimo, maxillis asperis potius quàm dentibus munitis. Statim à capite aculeos habet; quorum duo qui juxta anum sunt, velut in vagina conduntur. Aculeos pinna sequitur, ad caudam usque continua, initio magna, maculâ nigrâ notata, inde brevis & tenuis, tenuibus quasi villis constans. Ad branchias pinnae aurei sunt coloris, pro podice rimam potius quàm formam sortitus est. Ventriculum habet magnum cum uno appendice. Vesica fellis intestino adhæret. Splen parvus, caro candida & pinguis visitur. Salvianus *Amiam* veterum esse credit, Jovius centrinam quibusdam videre dicit.

Plin. H. N. l. 9. c. 36.

Alter minor, unde *γλαυκίδιον* apud Athenæum



næum esse conjicit, septem aculeos in dorso, ad caudam spectantes habet; à superiore branchiarum parte ad medium corpus linea tortuosa admodum dimittitur, hinc rectà ad caudam protenditur.

*Tertio* quem *sinuosum* vocat, quod linea à branchiis ducta, serpentum corporis flexibus gradientium instar tortuosa sit, dentes sunt acuti, dorsum ex cæruleo nigrescit.

Oppian. l. 3. Hali-  
cutic.  
Athenæus.  
Dipnos.  
l. 7.

*Locum* in petris etiam & arenis pasci Oppianus scripsit. Numenius apud Athæneum καὶ μὴ σιγαλένθῃ, id est, *per algas molles*, fluctibus minimè agitata & muscum versari, tradit. Aristoteles, & Athenæus pelagium fecit. *Cibus* quidem ipsi, carnes. Sed nec algam vel muscum contemnit. Vnde Tarentinus escam ad Glaucos capiendos præscribens, partem ex musco & farina, partem ex piscium carne componit. Fœtum suum ore, ubi metuit recipere, iterum emittere, tradidere quidam; quia spinosus est, de Glauco Galeo sumendum id videtur: sanè solum ex Galeis Acanthiam fœtus suos propter spinam non recipere, author est Aristoteles. Æstate circa LX. dies non conspicitur. Plinius alibi dictor. immemor, nunquam apparere scripsit.

Æl. H. A. l. 1. c. 16.  
Arist. H. A. l. 6. c. 16.

Plin. H. N. l. 32. cap. ult.

*Ufus* ipsius expetitus in cibis, sive utrum gerat, sive non. Caput tamen potissimum, apud Anaxandridem, Sotadem Comicum, inprimis si in Olyutho, & Megaris captus esset, commendabatur. Eustathius palmam oculis tradit. ut ut sit, difficulter, si Tralliano & Mnesitheo credimus, concoquitur. Concoctus permultum alimenti præbet. Ex jure sumtum seu Glaucum seu Glauciscum, copiam lactis mulieribus facere, Plinius Author est.

## ARTICULUS VI.

*De Hippuro & Reverso Indico.*

Plin. H. N. l. 32. cap. 9. Tab. I. 12.

Rondelet. in Hist. Piscium.

Arist. H. A. l. 9. cap. 10.

**H**ippurus seu à similitudine equinæ caudæ, seu δὴ τὸ ἵππου δίκλω & ὀρέειν ἰξάλλεσθαι quod equi more feratur & saliat, ita dictus, aliis ἀγρόντης ab agnis saltus urinantibus similes exercentibus, Dorioni & Epeneto κοροφαίνῃ, à pinna quæ à vertice incipit, in eoque veluti crista erigitur, Hicesio *Hippurea*, Hispanis *Lampugo*, *Gazæ Equilis* vocatur. Glauco colore internisque partibus similis est, & facilè inter cæteros pisces ex *pinna* quæ à capite incipiens in prona parte ipsi unica est, & caudæ equinæ simillima, villis multis constat, cujusmodi in nullis aliis piscibus reperitur. Venter in medio corpore situs est.

*Degit* in pelago, mari Mediterraneo ignotus. Carystius ab Archestrato maximè celebratur, quod mirum, cum cæteri ibi pisces viles sint. Delectatur carnibus, & nassis inclusus tantopere crescit, ut inde incrementum cepisse videatur. Vere *parit*. hyeme la-

tet in natatu celer est, & nunquam nisi certis diebus capitur.

Reversus Indicus duplex est, Anguilliformis alter, de quo inferius dicemus: alter, de quo hic, squamosus. Nomen inde, quod retractus venetur, accepit. Magnitudine est palmi. Squammis contegitur rugosis, spinis in dorso, & ab umbilico ad caudam maximè acutissimis. Docilis est, & facilè cicuratur. Magnam Indis in venandis piscibus præstat operam. Tenui sed valido funiculo alligatus ad mare deferitur, blandis animatus verbis in piscem conspectum, etiam magnum, emittitur, ejusdemque lateri seu ventri sese affigit. sic extrahitur. Præda blandè avellitur, ne, quia valide adhæret, discerpta intereat.

REVERSUM Indicum anguilliformem vide Tab. II.

Tab. III. Clusius. Exot. l. 6. c. 18.

Nieremb. Nat. Exot. l. 11. c. 18.

## CAPUT II.

*De Pelagiis Levibus.*

## ARTICULUS I.

*De Thunno.*

**T**hunmus, seu à Græcorum θύνῃ quod est magno impetu moveri, seu ab Ebræorum Thannia, quo Cetaceum piscem intelligunt, sic dictus, multa apud Authores pro diversitate ætatum sortitur nomina. Thynnis seu Thynna simpliciter sive mas est sive fœmina, Pelamyde major, Thunno propriè dicto minor. *Cordyla* appellatur partus, quot fœtas redeuntes in mare autumno comitatur, Byzantii αὐξίδα, δὴ τὸ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις αὐξάνειν ut testatur Aristoteles, seu quod paucis diebus augecant (*Gaza Auxum* vocat) dicunt. Redux in Pontum ex magno mari *Cordyla*, *Pelamydis* nomen, seu παρὰ τὸ ἐν τῷ πηλῷ μένει, id est quod *in limo se abdat*, seu δὴ τὸ πέλειν ἀμα quod *gregatim degat*, ut Plutarcho placet, (*Limosam*, *Limatriam*, & *Lutariam* alii vocant) sortitur. Pelamydes cum annum excessere tempus, *Thunni* vocantur. hisce paulò majores *Tritones*, *Orcynus*, *Apolectus*, *Sarda*, *Synodontis*, *Cybia* seu *Cybios*, *Cete*, *Melandrys*, *Triton*, *Chelidonas*, *Xanthias*, propriis suarum appellationem rationibus non carent. sed & variis eorum sale aservatis partibus, singularia nomina indita, apud Authores invenies.

Aldrov. l. 3. c. 18. Tab. III. 2. 3. 4.

Plin. H. N. l. 9. c. 15.

Arist. H. A. l. 6. cap. 16.

Plutarch. de solert. Animal.

Aldrov. l. 3. c. 11.

Rondelet. in Hist. Pisc.

Lubricos eos Plinius facit. Rondeletius suum *Orcynum*, ut & eum quem *Pelamydis* veræ seu *Thunni* Aristotelis nomine exhibet, squammis magnis ita ad amussim compactis, ut iis carere videatur, regi, coctione eisdem dehiscere, tuncque perspicuè apparere tenui membrana contextas, scribit. *Pelamydem* verò *Sardam* cute levi esse, & sine squammis, ea parte, quæ à pinnis ad branchias sitis, incipit excepta, adjicit. Sed nec vel de sexuum notis, vel de *Pelamydum*, & *Thunnorum* differentiis inter

Autho-



Aristot. H. A. l. 5. c. 9. Plin. H. N. l. 9. c. 15. Arhen. Dipnos. l. 1. Scalliger in Exercit. Bellon. cit. Al-drov. Oppian. Halieut. l. 3. c. 620. Plin. H. N. l. 9. c. 15. Strabo. Georg. l. 7. Aristot. H. A. l. 8. c. 19. Rondelet. Aristot. in admiran. Plin. H. N. l. 9. c. 3. Strabo Georg. l. 7. Aristot. in Admiran. Strabo l. 3. Athen. l. 7. Dipn. Polybius Histor. l. 34. Aristot. H. A. l. 6. c. 17. Oppian. Halieut. l. 4. Aristot. H. A. l. 6. c. 17.

Authores convenire videtur. Aristoteli Plinio & Athenæo mas à fœmina eo distinguitur, quod hæc sub ventre pinnulam habeat dictam, quâ mascaret. Rondeletius in utroque semper pinnam sub ventre deprehendi ait, indivisam in mare, divisam in fœmina, ut podicis foramen dilatari, fœtusque commodius in lucem edi possit. Ligures & Massilienses piscatores nunquam ex Pelamydibus Thunnos fieri apertè ostendisse, authore est Scaliger: à Pelamyde hoc unum distare Thunnum, quod hic sit lividus lateribus, illa undantibus maculis transversis atque obliquis eidem destinato gerat, asferet Bellonius. Captus Anno M. D. C. L. X. V. circa Gaditanum fretum, pedem xxxij. longitudine, latitudine xvj. in cujus pelle integra classis delineata conspecta est.

*Locus* Thunnorum varius pro ætate esse videtur. Oppianus, qui eos piscibus pelagiis annumerat, ex Oceano in mare Mediterraneum, cum vere ad sobolis propagationem instigatur, venire, ideoque tum plurimos in Tyrreno & Iberico capi, author est; mense Majo Xiphiis cogentibus irrumpere, Jovius adjicit. Pelamydes æquora fluvio aut paludi vicina incolere, ideo in Pontum ad dulciora pabula gregatim intrare, ex Plinio habemus, ibidem, ut & in Mœoticis paludibus nasci, Strabo retulit. tepore gaudere ideo per summa maris natante, aliquando flumina subire, ex Aristotele discimus; Vifos qui Agathopoli ad pontem usque, qui aliquot millibus passuum à mari distabat, conscenderent, Rondeletius prodidit. sed & in Rheno, Nilo, Pado, Platina scripsit. in algosis quibusdam locis. Gaditanis extra Herculis columnas sub solano vento cò delatis, ingenti numero, magnitudine & crassitie incredibili, occurrisse, Admiranda Aristot. venditant. Vix credendum Thynnorum multitudinem in Indico mari tantum, ut Magni Alexandri classis haud alio modo, quàm hostium acie obvia contrarium agmen adversa fronte direxerit quòd apud Plinium legimus. Græci scriptores enim Cete & Physiteres fuisse innuunt. De eorum circa Byzantium & captura & mora ita Strabo &c.

*Cibus* eis aliquando alga; sæpè, circa Hispaniam inprimis, (ex anteriore ad columnas delati pelago, esca deficiente macerantur) glandes, ex quercubus ad mare nascentibus delapsæ quibus vehementer pinguescunt: & ex harum ubertate, ubertas Thynnor. colligitur: ut plurimum caro. Tepore fœturæ quicquid attigerint, liguriunt. quin & partu soluto, ne propriis quidem parcunt natis, sed læti tempore veris *Ova vorant subito, & lacerant sub dentibus atris.* aliquando præ pinguedine rumpi Aristoteles author est.

*Vitam* ad biennium duntaxat producere,

quod Plinio ex Aristotele placuit, vix verisimile videtur. Ad tantam enim excrescunt magnitudinem, ut xv. talenta pendeant, caudaque duo cubita, seu ut apud Aristotelem extat, quinque palmum latitudine, expleat, & visi capi, quos corporis magnitudine, squammarum crassitie & corporum duritie biennio multo provectiores fuisse fateri oportuerit.

De *Generatione* habemus, Thunnos coire mense Februario post idus Junii initio parere semel, & quidem, in Ponto Thunnos, bis credi, quia partim tempestivus partim cordus ejus fœtus est. prior soboles mense Decembri ante brumam exit, posterior vere. *Ova* edunt quasi in utriculo. Ex his fiunt, quas Scordulas vocant, Byzantii Auxiadæ quod paucis diebus augecant.

Exeunt Autumno cum Thunnis simul, verno autem tempore repetunt, jam factæ Pelamydes. Quantum ad *animales functiones*, concessit & istis singularia quædam Natura. Dromades esse, seu ut Gaza reddit cursores, ex superioribus cognosci potuit. Non vagantur tamen bruma; ubicunque deprehensi usque ad æquinoctium, ibi hybernant. Ex Ponto exituri lævam tenent, & Aquilonem operiuntur, ut secundo fluxu exeant. ingressuri eundem, ad dextram flectuntur, quia dextro oculo plus cernunt, utraque natura hebet. Eadem debilitas in causa, quod ad saxum illud miri candoris, à vado ad summa perlucens, quod in Euripo Thracii Bosphori, quo Propontis Euxino jungitur, in ipsis Europam Asiamque separantis freti angustis, juxta Chalcedonem in Asiæ littore visitur, exhorrescant, & sic repetente terri, adversum Byzantii promontorium, ex ea causa appellatum Auricornu, præcipiti petunt agmine. Noctu proficisci & vetustissimum Amphyliti vatis apud Herodotum oraculum, & nummus à Bellonio visus, in quo altera parte spica, altera Thunnus conspiciebatur, & supra hunc Luna cum inscriptione PHILIPPENZE, innuit, nec de nihilo est, quod Plinius, postquam dixisset, capturam illorum à vergiliarum exortu ad arcturi occasum durare, reliquo tempore hyberno latere in gurgitibus imis, nisi tepore aliquo evocatos, aut pleniluniis, adjiciat. In natando figuram cubicam, si gregatim vagantur, servant, atque sex lateribus comprehensi, soliditatem ex semetipsis constituunt. Ad promontorium Bubonicum, maximi, suum instar, soli vagantur. alii more luporum bini proficiscuntur. nonnulli more caprarum, gregatim pascuntur. Ex oriente canicula, in Euxinum natate contendunt, & marinis fluctibus, & fervidè radiato sole calescentibus, inter se velut contexti, confertis turmis sese invicem opacant. *Dormire* infimis gurgitibus, sub saxo aut littore ab-

Plin. H. N. l. 9. c. 15.

Aristot. H. A. l. 8. c. ult.

Aristot. H. A. l. 5. c. 11. edit.

Scalig. Plin. H. N. l. 9. c. 115.

Oppian. Halieut. l. 4. v. 505.

Vide Oppian. & Scalig. p. 234.

Plin. H. N. l. 9. c. 11.

Plin. H. N. l. c.

Herodot. l. 2. Histor.

Aldrov. l. 3. de piscib. c. 18.

Plin. H. N. l. c.

Plutarch. de solert. Animal.

Ælian. H. A. l. 15 c. 3.

Aristot. H. A. l. 4. c. 10.



Oppian.  
Halieut.  
l. 2. c. 5.

ditos, Aristoteles prodidit; & quidem tam profunde, ut ne jactâ quidem fuscina, moveantur. Sub Caniculæ exortum cæstro exagitantur. Heret ille ubi cutis tenuior, sub pinna, & ita miseros divexat, ut sæpè in terram *ἀσπίδων* saliant, sæpè in naves se conjiciant.

De *Sympathia* & *Antipathia* non est quod multa dicam. Dicuntur Cephos habere comites, qui carunculas pisciculorum, à Thunnis discerptorum, aquis innatantes, depascuntur. Cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, à Sicilia prohibiti, in majores incurrunt belluas. Majo Mense à Xiphiis ex Atlantico Oceano in mare mediterraneum pelluntur. Non aliter ab iis gregatim in fugam agi, quàm ovium greges à lupis Mathiolus author est. De captura Thunnorum agere alterius loci est.

Plin. H.  
N. lib. 9.  
c. 15.

*Usus* reperire in *Cibis*. Olim membratim cæsi cervicæ & abdomine (*καὶ ἡσπυρίαις* Athenæus vocat) commedabantur, atque clidio (clidia Thyum Festus, Petimen ex Nævio Petimen piscinum, quod est inter duos armos ad pectus, claviculas Medici vocant) salitis, Omotarichi nomen impositum est) recenti duntaxat, & tum quoque gravi ructu; cætera parte plenis pulpamentis asservabantur. Melandria vocabantur, cæsis quercus assolis, simillima. Vilissima ex his, quæ caudæ proxima *ἀσπίς* dicebantur, quia pingui carenti hinc *ἀπὸ πτερόων* nomen, probatissima, quæ faucibus, Pelamides in apolectos, particulatimque confecti, in genera Cybiorum (sic dicuntur seu falsamenti frustra quæcunque in formam *κυσσοειδῆ* dissecta; vel quæ ex dorsi partibus cervici clidioque proximis) dispertiebantur. Alexis caput, commendabat, caudam Antiphanes. Falconius Hetruscus eruditioris gulæ ganeo, novum & sapidissimum obsonii genus ex iis commentus est. Athenæus *ἐν μὲν τὰ ῥα* (intritum hoc, ex aliis & aliis condimentis) aliis piscibus prætulit. Alii falsamenta, quæ *δυνναῖς* seu *δύννη* potius, quàm recentis piscis quamlibet partem præferunt. Sunt quippe Xenocrati apud Oribasium stomacho inepti, malisucci, flatulenti, ad excernendum difficiles. Gáleno, durâ carne præditi, & insuaves. Archestratus tamen nobilem Thunnum circa Byzantium, Carystum & Siciliam; præstantiorem circa Cephalen & Tyndaridem oram; præstantissimum circa Hipponium Italiæ, nasci, circa Samum ingentem, & deorum convivii dignum capi, prodidit.

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 10.  
Ælian.  
H. A. l.  
13. c. 27.  
Dioscor.  
l. 2. c.  
30.

Præbent & in *Medicina usum*. Sanguis fel, & jecur, sive recentia sive servata, vim psilothri obtinent. Non pubesciturum, qui in puericia iis illitus est, Ælianns affirmat, Omotarichus largius sumptus, Presteris serpentis venenum retundit. Cybiorum cinis, cum melle ad Condylomaia confert.

## ARTICULUS II.

De *Pompilo* & *Amia*.

**P**OMPILUS seu *παρά τῆς πομπῆς* à transvehendo, (fabulantur enim Pompilum hominem *πορθμεύα* portitorem, vel ut Athenæo placet *θαλασσομαχόν*, ab Apolline quod Ocyrhoën puellam trajecisset, in sui nominis piscem transmutatum) seu quod navigantes in alto mari ad continentem usque comitentur; aliis sacer piscis, aliis *πέμσιλον* dicitur, & à Plinio inter Thunnos reputatur. Athenæus Pelamydi similem & varium esse inquit. Rondeletius pro eodem, piscem squamis carentem, in dorso varium & maculosum, in quo à branchiis ad caudam lineam transversæ interpunctæ descendunt, ducitur. pars quæ supra & inter oculos est, flavescit, aurique colorem imitatur. Cauda in unicam non divisam, neque crescentis Lunæ figura, Thynnorum & Pelamydum more, desinit.

*Locus* ipsis ima maris sedes est. Sæpe navigia velis euntia comitantes, mira aliqua dulcedine per aliquot horarum spacia, & pascuum millia à gubernaculis non separantur, ne tridente quidem sæpius in eos jacto territi. ubi terram persensere, recedunt, nec longè abesse nautis colligitur. Inimicos experiuntur Delphinos sed magno horum exitio. Degustatis enim illis, continuo convelluntur, fororeque incensi, pelluntur, ad littora, esca marinis avibus futuri.

Amiam sex *παρά τὸ ἀμαίνεσθαι καὶ τὰ παρα πησίσαις*, quod una cum sui generis piscibus erat; sive quod *ἡ καὶ τὰ μίαν φέρει, ἀλλὰ ἀρετὴν*, quod non solitaria sit, sed gregatim vivat, ita dictam Ælianus *Troctam*, Hispani *Bizam* quasi Bizantium, alii *Bonitam*, vocant. Jovius & Salvianus pro ea Lechiam, alii Sphyrænam, quidam illum piscem qui Hispanis Lambugo dicitur, perperam substituunt. Piscis est Pelamydi, vel Thunno vel Scombro corporis specie, pinnis caudæ similis cute lævi, ea parte quæ circa branchias est dempta, *rostrum* acuto, oculis parvis auriæmulis. *dentibus* ferratis, acutissimis, in os recurvis. *branchiis* operitis, *ventre* crasso, argenteo, rugoso, longo, ad podicem usque demisso, cujus appendices sunt innumeræ scombrorum appendicibus tenuiores. *dorso* cæruleo, & dum vivit splendente; à quo ad ventrem lineæ ductæ sunt obliquæ, nigrantis, certis intervallis à se distantes. *Cauda* habet tenuem, in figuram lunæ in cornua curvatæ, *intestina* gracilia, *epar* rubescens, *splenem* nigrantem, *fel* toti intestino attextum, vel ad illud porrectum par cum eo longitudine, sæpe etiam replicatum.

*Degere* in mari, stagnis & fluviis affirmat Aristoteles, & cum eo Scaliger. vicinum fluviis & stagnis ob dulcem aquam & limum amare, Oppianus Pontum subire, atque

Tab. III.  
5.

Ælian.  
H. A. l.  
15. c. 23.  
Athen.  
Dipn. l.  
6.  
Apollon.  
Rhodius  
in Ar-  
gon.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
29.  
Athen. l.  
c.  
Ronde-  
let. in  
Hist. Pis-  
cium.

Plin. H.  
N. l. 9. c.  
15.

Oppian.  
Halieut.  
l. 1.  
Ælian.  
H. A. l.  
2. c. 15.  
Athen.  
l. 7.  
Athen.  
cap.  
Plutarch.  
utra ani-  
mal.  
Ælian.  
H. A. l.  
1. c. 6.  
Tab.  
III. 6.  
Ronde-  
let. de  
Piscib.

Aristot.  
de part.  
Animal.  
l. 4. c. 2.  
Arist. H.  
A. l. 2. c.  
18.  
ex Scali-  
g. sect.  
Arist. H.  
A. l. 8. c.  
13.

Scalig. ad  
l. 2. H. A.  
c. 18.  
Oppian.  
Halieut.  
l. 1.



atque ibi cum suis ducibus æstatem traduce-  
re, tum quod ibi belluæ magnæ pauciores,  
tum quod ob dulcium aquar. permistionem,  
pastus gravior; unde eorum incrementum  
singulis diebus intelligitur, certum. Circa  
Provinciam in maris angustis quas insulæ  
frequentes efficiunt, capi, Rondeletius au-  
thor est.

*Vescuntur* aliquando algâ, ut plurimum  
carne. Audaces & celeres sunt. quin Tro-  
ctam saltu valere Ælianus loco supra citato  
scripsit.

*Fugnam* cum delphinis apud Oppianum  
elegantè descriptam invenies. idem de  
Troctis apud Ælianus legitur. Capræ pro-  
filiunt, & arrosâ liniâ aufugiunt. Appetun-  
tur à quibusdam piscibus in escam, Glaucò  
inprimis, si Tarentino fides est.

Adhibentur in *cibis* tanquam boni succi  
ad excernendum mediis, sed parcè nutrien-  
tes. Archestratus autumnis tempore post  
Vergiliarum occasum, Byzantiasque inpri-  
mis commendat. procul à mari Helleston-  
tiaco deteriores scribit. si vicinum Ægei ma-  
ris tractum pertransieris, pristinam gloriam  
maculare invenies.

## ARTICULUS III.

De *Xiphia seu Gladio.*

**P**iscem qui à figura rostri *Xiphias* com-  
muniter, *οὐπίς* Epicharmo, *ἐπί* Me-  
nandro, Gladius Latinis dicitur, Homerus  
Hesychius & Varinus *δοφωρία* alii *Thra-*  
*nin*, Hermolaus *Tomum Thurinum*, ita  
enim apud Plinium legit. fortè à Thuriis  
Italiæ oppido. Albertus *Militem* appellat,  
*Galeum* à Plinio vocari; Salvianus & Mas-  
furius perperam oppinantur.

Magnitudine interdum est insigni. Ad  
decem nonnunquam cubitos accedere, tra-  
dit Rondeletius. Delphini magnitudinem  
excedere, Plinius; naviculas æquare, Strabo.  
*Corpus* habet teres, à capite statim valde  
crassum, deinde ad caudam usque tenuius,  
in extremo ante caudæ exortum eminentia  
quædam extuberat. *Corium* caudam versus,  
ducta manu læve est, os versus asperum.  
*Squammæ* sub cute latent plurimæ, *adeps* in  
dorso suis more residet. Utraque *maxilla*  
rostrata est, superior magis ossea, durior, ali-  
quando bicubitalis, (Athenæus totius cor-  
poris magnitudini æqualem esse, scribit)  
inferior brevior & triangularis, plerumque  
illa habet se ad totam magnitudinem ut tria  
ad decem, ista ut unum. *Gladius* est ferro  
acutior, sed extincto pisce corrumpitur.  
Gellius ejus mucrone dura excavavit saxa.  
*Dentes* ipsi falso Ælianus tribuit, non admo-  
dum curvos, nec admodum inanes. Nullos  
enim habet, eorum loco ossa oblonga & as-  
pera in palato resident, absunt in tantum  
gladium mareriâ, quæ dentibus cedere de-

buerat. *Oculi* ipsi orbiculati prominentes, &  
ante eos foramina. *Brachie* octonæ & du-  
plices, *tergus* ex cinereo nigricans, & serici  
instar splendens. *Pellis* tenuissima, *venter*  
argento micans. *Fellis* vesicula intestino  
committitur.

*Degunt* in mari, & rarò adeunt littora.  
Copiosius verò juxta Scillæum promonto-  
rium apud Siculos & Zephyrium quod Ita-  
liæ extremum est, hodieque Spartiventum à  
nautis nuncupatur, capiuntur. Tribuuntur  
tamen ab Æliano & Danubio, sed & in Da-  
nia in lacu Suerinensi notissimi dicuntur.

*Vititant* piscibus, quos rostri incursum in-  
terficiunt, nec prius comedunt, quam spicu-  
lo transfixerint.

Exortu Caniculæ divexantur ab æstro  
seu asilo (Animal est parvum, scorpionis  
effigie aranei magnitudine) tantoque infe-  
stantur dolore, ut in naves sæpè numero exi-  
liant. Balænam exhorrescunt, eamque con-  
spicati, gladium suum in terram, aut ob-  
vium quemcumque vadi locum impingunt,  
sic infixio capite sese continent. Nec tamen  
sua ignorare arma credendum. Utitur ro-  
stro tanquam gladio. Sæpe in mari Indico  
validissimas Lusitanorum naves, ad sesqui-  
palmum aliquando perforant. Visus in me-  
diterranea juxta navim natantem, medium  
rostrò discidisse. Græcanicum sermonem ab  
Italico distinguere, illum minimè reformi-  
dare, ad hunc diffugere, Joannes Marius  
Cætaneus, qui Locrensi in littore *Xiphia-*  
num piscationi interfuit, prodidit, & Brutii  
testantur.

*Ufus* in cibo rarus. Carne enim est arida,  
& difficulter concoquitur. Archestratus  
Byzantinum commendat.

## ARTICULUS IV.

De *Remora & Cetorum Duce.*

**D**E Remora, quæ *Echeneis*, *Remiligo*, &  
*Naucrates*, dicitur, vix quicquam certi  
scribere possum, adeò Authores in diversa  
scinduntur, tria tamen occurrunt, descri-  
ptio, facultatis naves retinendi, & causa. Va-  
riè à veteribus describitur. Quibusdam est  
parvus piscis, assuetus petris. Quidam eum  
pedes ex Aristotele habere opinantur, ita  
positâ pinnarum multitudine. Mutianus  
mûricem esse, latiore purpurâ, neque as-  
pero, neque rotundo ore, neque in angulos  
prodeunte rostro, sed simplice concha, utro-  
que latere sese colligente, quibus inhaerenti-  
bus, plenam ventis stetit navem, portan-  
tem nuncium à Periandro, ut castrarentur  
nobiles pueri, conchasque quæ id præstite-  
runt, apud Guidiorum Venerem coli, prodi-  
dit. Trebius Niger pedalem esse, & crassi-  
tudine quinque digitorum credit. Tres eo  
nomine celebrari, haud perperam inde col-  
ligas. Nec inter recentiores de eodem con-  
venit.

Arist. H.  
A. 1. 2. c.  
13.Plin. H.  
N. 1. 32.  
c. 11.Ælian.  
H. A. 1.  
14. c. 23.  
Ælian. 1.  
c.Oppian.  
Halieut.  
2. v. 509.  
Plin.  
H. N. 1.Oppian. 1.  
2. v. 509.Ælian.  
H. A. 1.  
9. c. 40.Tab. IV.  
3.Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 25.



venit. *Rondeletius* inter ignotos reponit. *Gillius* nunquam se piscem, vel piscatorem qui ipsum vidisset vidisse profitetur. *Bellonio* est totus exossis, mollis, lubricus, coloris herbacei, inferiore parte planus, dorso repandus, in gibbo convexus, limacis rubri testa carentis effigiem referens. Eidem ad spitamæ longitudinem & manubrii ligonis crassitiem plerunque excrevit, circa saxa in mari, sed lentè serpit, & iter cornibus prætendit, rhucaginemque ut limax serpendo relinquit. In *Corcyra* frequentissimè è verriculis extrahi dicitur. Quam in *Imperati Neapolitani* Exoticotamiejo Neapoli vidimus, sic describitur. Capite supino acetabula habet similitudine cirrorum sive acetabulorum Polypi, quibus naves magnosque ac cetaceos pisces apprehendens pertinaciter hæret. Cursumque eorum remoratur, & pro arbitrato suo retinet. Ad magnitudinem corporis Icon expressa est.

*Remora Aldrovandi* color toto ferè corpore ad violaceum inclinat. *Latera* candicant. medium corpus subviridis linea interfecat. *Cauda*, quæ unicam pinnam degenerat ad cæruleum vergit. *Rostrum* canino simile, nisi inferior maxilla superiorem longitudine superaret. *Pinnæ* toto corpore sex. Simillimus Embdæ in Frisia pisciculus repertus est, referente Gesnero. quatuor digitorum longitudine. Cuticula sine squammis tenuissima. capite pro corporis magnitudine maximo. Oculis parvis, reliquo corpore turbinato. sub mento quiddam habebat figura acetabuli. Cavitas cum digito premeretur, ita adhærebat ut circumferri posset. Par facultatis navigia retinendi ratio. Ruant venti licet, & sæviant procellæ cogit stare navigia secundum Plinium (verba ejus sunt. Ventum est ad summa natare &c.) Plinio Oppianus adstipulatur. Cheremenianus Trallianus apud Plutarchum impedimentum & moram navigationi inferre, & ut tardius navigia ferantur facere asserit ille puppi, hic lateri navis, Oppianus carina adhærere scribit. Petrus Melara Cardinalis Turonensis triremem cum è Gallia Italiam mari peteret, ab eodem (nisi forte de Lampetra id accipiendum sit) in medio cursu retentum fuisse. Kircherus pro fabulosis omnia ista habet. Nunquam talem à Plinio ad tempora nostra effectum notatum, etsi totus orbis navigationibus lustratus sit. Non posse potentia majus à minore vinci. Nullum magnetis frustum, quamvis efficacissimum, exactissimeque libratum aliud majus & gravius allicere. Frequenter in freto Siculo ob contrarios æstus, unam onerariam extensis velis, secundo vento in mediis fluctibus hære, vicinis cursum tenentibus.

De causis haud certiora occurrunt. *Rondeletius* Aristotelis responso, quo cur clavus cum sit parvus, & in extrema navi, tantum

possit, ut ab exiguo temone & hominis unius viribus, magnæ navium moles moveantur, exponit, innixus, minus potius ad contactum Remoræ moveri, quam sisti ostendit. Idem de Plutarcho dicendum, dum navim multo musco & alga obductam, aquam obtusius secare, & tardius moveri, hisce Echeneidem adhærere, si tarditatis non causam, sed causæ accidens esse, prodit. Fracastorio latentis scopuli Echeneidem indicium esse, navi ita ut avelli nequeat propter metum vacui, adhærere, placet. Scaliger Plinium secutus, ad occultas qualitates confugit. Movendi quibusdam esse potestatem, contrariam aliis. Nemini comperta in igne caloris principia. hunc Lonicerus sequitur. Suarezius influentias cœlestes addit. nec Basilius & Ambrosius renuunt. Peculiaris Keckermanni opinio. Viscosum & frigidissimum humorem de se fundere putat Echeneidem. hoc aquam circa gubernaculum congelari, ipsum quasi immobile reddi. Vix quicquam verisimile.

Quantum ad usum alii è Græcis lubricos partus atque procidentias contineri ad maturitatem alligato eo prodiderunt: alii sale adservatum ad alligatumque, gravidis partus solvere, ob id alio nomine Odynolyontem appellari. Amatoriis veneficiis infamem esse, indiciorum & litium moram, inter falsa repono.

Cetos ducem habere, tum quod mole corporis oppressi tardè moveantur, & facilè in cœnum, brevias & angustias impingant: tum quod parum acutè cernant, Oppianus Ælianus & alii authores sunt. destitutas, ad terram delabi & perire, Plutarchus & Claudianus prodidere. ἡ γὰρ ἰς ἡμεῶν ὁδὸς; Plinio, nescio quare Musculus, quo nomine Balenæ partem Oppiano & Aristoteli dici falsò opinatur Bellonius, Hermolao Iulus, aliis, *Mysticetus* dicitur. Longus est, colore albo, capite longo, angusta cauda, si Æliano credimus. Aldrovandus dodrantalem, rostro acuto, capite prælongo & plano, cauda angusta & tenui, toto corpore aspero, squammis experte, sed osseo corio tecto, proponit.

Fabulosumne id, quod *Rondeletius* arbitratur, an ambiguum, quod Scaliger, natura talem dederit, an amicitiae adscribendum sit, non disputo. *Amicitiae exempla sunt Balæna, musculus, quando prægravi superciliorum pondere obrutis, ejus oculis, infestantia magna vada, prænatans demonstrat, oculorumque vice fungitur*, apud Plinium legimus. Agnitum, ore velut anchoram à Balænis recipi, in faucibus dormire; hoc quiescente, illas non moveri, hoc gubernatore, destitutas, ad terram delabi & perire, Plutarchus & Claudianus prodidere.

A R-

Plutarch. Symp. l. 2. probl. 7.

Fracastor. de Sympath. c. 8. Scalig. Exer.

Lonicer. de Aquatic. Suarez. Disput. Metaph. 18. Basilius 8. Hexam. homil. 7.

Ambros. Hexam. l. 5. c. 10. Keckerm. in probl. nauticis. Plin. H. N. l. 22. c. 1. Tab. IV. 4.

Oppian. Halieut. l. 3. Ælian. H. A. l. 10. c. 6.

Aldrov. de Piscib. l. 3. c. 23.

Scaliger ad H. A. Arist. l. 2. c. 16.

Plin. H. N. l. 7. c. 62.

Plutarch. l. utra animal. Claudian. in Eutrop.

Gesner. in Hist. Piscium.

Plin. H. N. l. 32. c. 1.

Plutarch. l. 2. Sympof. probl. 7.

Kircher. l. 3. Artis Magnet.

Oppian. Halieut. l. 1. c. 22.

Rondel. de pisc. marin. l. 15. c. 18. Arist. in Maechnici quæst. 6.



## ARTICULUS V.

## De Serpente Marino.

Tab. IV. 5. 6. **S**erpens marinus, Plinio *Draca Marinus*,  
Tab. V. 1. *Æliano* *μύρον* & *Hydrus*, Aristoteli *ὄφις*  
Plin. H. *σαρδάριος*; dicitur.

N. l. 32. Notabilis ipsorum quibusdam locis ma-  
c. 1. gnitudo. Ejus sunt in Africa, ut boves in-  
Ælian. sectentur, & triremes apprehensas ever-  
H. A. 1. tant. Circa Norvegiam ducentorum pe-  
18. c. 28. dum longi visi, tantas aliquando supra ma-  
Arist. H. re spinas, erigentes, ut navis per unam tran-  
A. l. 2. c. sfire possit, si Olao Magno credimus. Con-  
15. spicitur in sinu Codano quidam flavi colo-  
Aust. H. ris XL. pedum, innoxius, nisi irritaveris.  
A. l. 8. Apud insulas quasdam ante Persidem, vi-  
c. ult. cenum cubitorum, terruere classem. Tales  
Plin. H. in Carmaniae promontorium & Arabiam  
N. l. 6. circa tres insulas è mari egrediuntur. Bara-  
c. 23. ces sinus navigantibus perniciosus, quod ad  
Solmusin eum è pelago tendentibus prægrandes &  
Polyhist. nigri serpentes occurrant. Maximi cujus-  
Arrian. in dam descriptionem & in Virgilio invenies.  
Periplo- Is de quo hoc loco, terrestri similis est, ca-  
maris pite & corpore congrui *ἀμαυρότερος* duntaxat,  
rubri. ore acutiore, si Aristotelem sequimur.  
Virgil. l. Si Salvianum, habet dorsum subrubrum;  
2. latera subflava, ventrem sub albidum.  
Æneid. Rondeletius cum trium cibitorum facit,  
Arist. H. corpore fulvo, quàm Anguilla rotun-  
A. l. 2. diore, colore quem & sceleton apud Aldro-  
c. 14 & vandum exhibebat, capite congrui, oculis  
1. 9. c. 37. flavescentibus, ventre & rostro cinereis,  
maxilla superiore longiore. Dentes muræ-  
modo, sed rariores habere, addit: pinnulas  
ad branchias veluti Anguillæ duas A. Ca-  
stellæto ad Aldrovandum missus, colore  
erat congrui, sed ad cæruleum inclinante.  
Ore intra rubido, dentibus acutissimis in-  
structo, sub mento apophysis barbæ modo  
propendebat, altera ad ani orificium.

*Maris* est incola: nec tamen *ἐν πύρσι σφάδρα*  
Aristot. seu profundissimis, gurgutibus na-  
H. A. l. 2. scitur. Qui in aquis fluviatilibus reperiun-  
c. 14. tur, Hydri sunt & toto coelo ab istis differunt.  
ex Scal. Degit tamen aliquando & in terra, ut ter-  
edit. 17. restris quædam species. toto ferè die in ma-  
Bellon. in rivivit, somni causa in terram egreditur.  
obsevat. vehementior est congruo, si *σποδυόμενος* ita  
Plin. H. placet vertere. Captus atque immissus in  
N. l. 9. c. arenam, cavernam sibi rostro mira celeritate  
37. excavat.

Pugnare aliquando in Turcia tempore  
Bajazeris à solis ortu ad occasum cum terre-  
stribus, Occisorum utrinque octo millia  
numerata sunt. Aquatici concessere victo-  
riam.

Comedi quidem potest: sed propter si-  
milem cum terrestri formam rejicitur.

Comedi quidem potest: sed propter si-  
milem cum terrestri formam rejicitur.

## ARTICULUS VI.

## De Congro &amp; Ophidio Plinii.

**C**ongri, qui Græcis à *γρό*, quod est  
voro; *ἀπερίσσι* *γάρ τῶν πελυσσάν τὰς πλεονάδας*  
*κρίναι* & *γρόν* aliis *Grillus*, quibusdam à  
corporis & coloris similitudine; *Anguilla*  
*marina*, dicitur, duo genera; *Unum* Al-  
bum & pelagium, *alterum* Nigricans,  
quod haud rectè vel littorale vel pelagium  
dixeris. Ambigit enim ut scribit Aristote-  
les: recentiores unum duntaxat, in quo  
omnes notæ congru à veteribus attributæ,  
reperiuntur.

Longus est & lubricus seu lævis. sæpè in  
quatuor aut quinque cubitorum longitudi-  
nem excrescit. Visus à Scaligero quem utra-  
que manu nequisses amplecti, ut non mirum  
multos in Sycyone quos homo vix ferat,  
aliquos plaustrum magnitudine capi, Eudoxus;  
circa Cartejam in exterioribus locis augeri  
supra minarum octoginta, Strabo prodide-  
rit. Toto dorso rubet, *ventre* & lateribus pal-  
let. Binis natat pinnis. Linea nigra in exterio-  
re parte membranaceæ pinnæ per dorsum  
extensa conspicitur. *Oculi* sunt Anguillis  
longè majores. In extremo *rostro* duo brevia  
cutacea cornicula gerit. *Dentes* habet parvos  
pectinatim coeuntes, *branchias* utrinque bi-  
nas, *pinnæ* harum rubent, quæ verò corpus  
ambit fusca est, & ad cæruleum inclinat. *In-*  
*teriora* si spectes; *Gula* ipsi exigua, qua alii  
piscis carent. *Fellis* vésica ab epate pendens.

In nullo non *degunt* mari, fluminibus in-  
primis vicinū si sit. nam & hos juvenes su-  
bire solent: ne de paludibus dicam, quarum  
illustris alumnus à Matrone Parodo vocatur.  
In terram egredi non absolum, cum idem &  
de serpente marino superius dixerimus, &  
de Anguillis ex Aristotele colligatur. *Vescun-*  
*tur* pisciculis. Ideo vehementiore spirante  
vento, quo tempore numerosiores pisciculi  
mare intrant, pinguescunt.

*Coitus* eorum Anguillar. coitui compara-  
tur, non quod ex simili spumæ sanie in arena  
obruta nascentur; sed quod circumplexu  
mutuo supina. partium coitum peragant,  
quod *ἀνδρῶν* & *μυρῶν* *πύρ* *ἐκ* *ἐκ* solenne est: *ova*  
longa ferie inter se protensa, pinguedine  
ita obducuntur, ut vix appareant. Si in ignem  
conjeceris, abit in vaporem pingue; ova ex-  
iliunt, & elisa crepitant.

*Latant* hyeme, nec eadem, præterquam  
statis diebus paucis, & iisdem semper, ca-  
piuntur. *Gregales* ne sint, an solitarii ambi-  
gitur. Causam Mnesitheus præbuit. Modo  
gregarios esse posse dicit, modo nec inter hos  
nec inter illos recenset.

*Inimicitias* cum Polypo, Locusta, & mu-  
ræna exercet. Polypum devorat. Neque  
enim ob laxitatem ab eodem apprehendi  
potest. A Locusta laceratur, licet valido

Tab. IV.  
7. Rit-  
ters hufi.  
ad l. 1.  
Halieut.  
Oppian.  
Athen.  
Dipnos.  
l. 7.  
Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 13.

Scaliger  
ad Arist.  
H. A. l. 2.  
c. 16.

Eudox. l.  
6. de ter-  
ramotu  
apud A-  
then.  
Strabo  
Geogr.  
l. 3.

Aristot.  
H. A. l.  
2. c. 13.

Oppian.  
Halieut.  
lib. I. v.  
113.  
Athen. l.  
4.

Oppian.  
Halieut.  
lib. I. v.  
516.

Aristot.  
H. A. l.  
5. c. 4.  
Aristot.  
H. A. l.  
6. c. 17.

Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 13.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
16.  
Athen. l.  
8.

Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 13.



fit corpore. Ipse & Murænacaudas inter se prærodunt.

Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 62.

*Ufus* ipsius apud Græcos in *cibis* laudatus. inprimis si è Sicyone adferebatur, Italum tantum cæteris præcellere putabant, quantum pinguis Thynnus vilissimis coracinis. Tanti denique æstimatus, ut Nereus quidem Chius Diis eum elixasse legatur: Dorion verè oposophagus, cum puer optimor piscium nomina dicere iussus, Congrum inter cæteros recensuisset, piscium se, non Deorum nomina dicere iussisse, reposuerit; Nunc in vili admodum sunt, apud omnes, *Hispanis exceptis*, precio. Angli pusillos cum aceto & sinapi comedunt. *Congener* congris est, qui in mari circa Canibales insulas capitur. Cutè intensè viridi & elegantissimè variegata; rictu patenti, & dentibus acutissimis. Caro detractâ cutè candidissima est; sed qualitatè adeò virulentâ, ut sæpe in mortem gustantes conjiciat.

De Laet.  
Ind. O.  
vid. l. 1.  
c. 18.

Tab. V.

Ophidion Plinii, quem Salvianus & Bellonius cum serpente marino confundunt, quemque Tragum Oppiani quidam esse opinantur, duorum est apud Rondeletium generum. *Unum* est barbatum, quod gemina barba à maxilla inferiore propendente instructum sit; *Alterum* imberbe & flavum, de cætero superiori simile. Bellonius palmum non excedere, pelle lubrica esse, pinnas carnosas habere integram in gyrum caudam ambire, & multa nigredine perfundi, testatur. *Linguam* habet parvam, acutam. *Cor* trigonum ruberrimum, *hepar* ad sinistrum latus exprorectum, *stomachum*, oblongum, *pylorum* permultis apophysis circumdatum, à quo tres intestinorum revolutiones ad anum pertingunt, *lienem* rubrum, & oblongum. Cætera ad ipsos Afellos accedit.

## ARTICULUS VII.

### De Muræna.

Tab. V.  
3. 4.

**M**uræna, quibusdam *Draco marinus*, quod corporis specie serpentes æmuletur, Græcis *μύρανα*, *σμήρανα* & *ἐμύρανα* (multæ n. dictiones quæ ab *εμ* incipiunt, olim per *εμ* scribebantur) *παρά τὸ μύρεν* vel *μύρανας*, quod præ pinguedine in summa aqua fluitent, & à sole terrefactæ, qua curvare se nequeant, mergi non possunt; quod tamen de optimis quæ Latini *Flutæ*, Græcis *πλωταί*, quasi navigabiles vocantur, potissimum sumi debet, quamvis & *rhyades* pisces Flutas Gaza vertat, dicitur.

Eustach.  
in Home.

Macrob.  
Saturnal.

*Externa* si attendas, ad duorum cubitorum longitudinem accedunt; circa Cartejam locis exterioribus minarum supra octoginta reperiri, Strabo, ad decem libras augeri neque maiorem se vidisse, Salvianus, prodidit. Longus est, lubricus seu lævis,

Strabo.  
Geogra.  
l. 3.  
Arist. H.

& serpentis speciem referens. Cutis quæ tenuissima diversi coloris, qui nec in omnibus sibi respondet, seu quod alius vivis sit, alius in mortuis (sanè Plinius, in Gallia septentrionali, Murænis omnibus, in dextra maxilla septenas maculas ad formam septentrionis aureo colore fulgere, duntaxat viventibus, pariterque cum anima extinguï testatur) appareat. *Mas* paucioribus maculis distinguitur, & quibusdam veluti stellis conspergitur, *fæmina* pluribus veluti aureis guttis, quas Ovidius auratas notas dixit, variatur; Bellonio; eidemque ut plurimum fulvescunt. Rondeletius colore fusco, ideò *καλαίνω* ab Oppiano dici; Massurius maculis luteis & nigris; Gillius alium colore subnigro, luteis alium, albo nigris quasdam colore distinctas, prodidere. Aldrov. fæmina varia est, blattariæ floribus simillimis, hinc ardens Ovidio dicitur. *Caput* habet rotundum, tenue, & acuminatum, rictum *oris* latissimum. *Dentes* acutissimos, ferratos, solidos, non in maxillis solum, sed & in ima quoque faucium parte dispositos. *Carnosum palatum*, quod linguæ loco obtinuit. *Maxillam* superiorem aquilinam in cuius extremo duæ sunt breves apophyses seu verrucæ *Oculos* magnos. *Dorsum* cultellatum, ut Pytheas ait, hoc est, spino acuto, & pinnulam ferè constituyente. *Pinnas* & branchias, adimit ipsis Plinius, sed malè. Quaternas enim has habent. Sed parvas; utpote ex quaternis minutis osculis, sive foraminibus paulum modo se exserentes; seu ut Aristoteles dicit, non *διπλοπρόσθας*, id est explicatas, sed præter alior. piscium morem confusas. Illas non ad latus sitas, neque tales ut natare possint.

A. l. 2. c.  
13. l. 4.  
de partib.  
c. 13.  
Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 11.  
Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 23.

Bellon.  
Hist. l. 5.  
c. 10.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 3. c. 27.

Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 20.  
Athen.  
Dipnos.  
l. 7. ex  
Theophr.  
Arist. H.  
A. l. 2.  
c. 13.

Arist. l. 2.  
Histor.  
c. 15.

Scalig. ad  
A. H. l. 2.  
c. 16. v.  
108.

Quantum ad *Interiora*, carnem habet candidissimam, sub cute obliquis & transversis ductibus dispositam; variis musculis hinc & inde abeuntibus munitam, multis spinulis brevibus & recurvis conspersam. *hepar* subfulvum, oblongum, stomacho incumbens, longiusculum; *fel* Cyaneum, magnitudine avellanæ, quod Bellonius jecori; Aristoteles intestinis inhærere, à jecore meatibus quibusdam dependere, scribit. Habet & lienem oblongum nigricantem, stomacho annexum. *Ventriculum* longum, à cuius medio intestinum sine spiris ad anum protensus, juxtaque eum cellulæ, instar intestini coli, habentur. *Vertebres* quæ minus frequentes, sed oblongiores quam Anguillæ, processus insunt transversî ac sursum spectantes præter aliorum piscium morem Aristas Scaliger vocat, quæ si coriam inversum detrahatur, cum eo simul omnes educuntur. In Oesophagi qui latus, & à rictu incipit, orificio, hamuli leviter uncinati, ad gulam citra fauces spectantes, linguæ vicem supplent, ac statim à branchiis folliculus



culus teres, spinæ incumbit, flatu turgidus, commodioris natationis usum præbens.

*Vivunt* quidem in mari, circa petrosa loca; videntur tamen & fluviorum ostia petere. In Oceano rarissimæ sunt. Tartesiæ & è Siculo freto, unde ad piscinas Romam accersebantur, antiquis in pretio fuere. minus ex Tarsensi & Carpathio mari probantur. Exeunt & in terram frequenter, in eademque capiuntur. & diu, quod parvas branchias habeant, parum aquæ admittant, nec multum refrigerii desiderent, vivunt.

*Cibus* ipsis caro, ideò in petrisquæ Chanis, & Patellis plenæ domicilium. Nec ab humana abstinent. Cujus rei gnarus Vedius Pollio, Eques Romanus, & ex amicis Augusti, invenit in hoc animali documenta sævitiae, vivariis earum immergens damnata servitia, non tanquam ad hoc feris terrarum non sufficientibus, sed quia in alio genere totum pariter hominem distrahi spectare non poterat. Cum rabie agitantur, sævissimè persequuntur squamosos; ita verò morfu valent, ut partem nisi tota amputetur, ab ea liberari posse neget, Rondeletius. In Sicilia in summa aqua præ pinguedine flutantur. Unde manu capi murænas flutas Papirius apud Varronem prodidit.

De Murænæ cum vipera congressu à multis sparsa opinio. Muræna inquiunt libidinis impetu plena, latibulum viperae intrat. Vipera mas stimulis concitata ad mare accedit, & sibilo edito amatam evocat: sic ambo invicem colligantur. Falsitatem si discrepantia (alii marem cum vipera foemina congressi, alii foeminam cum vipera mare produnt) non ostendit, at certè illud, quod Nicander famæ, Plinius & Ælianus vulgo eam tribuant. Andreas apud Athenæum, quod vipera nemor, secreta amet. nec à quoquam id observatum esse, vel piscatore vel littorum ubi frequentes murænæ, accola, neget, ostendere potest. Coeunt autem more serpentum, & ova parva, *quadrupla* eaque seu arenaea, numerosa & quocunque tandem tempore pariunt. Murænula recens prognata, celeri adolescunt incremento.

Latitant hyberno tempore, quo, paucos dies si excipias, non capiuntur. Quia pinnis carènt, flexuoso corporis impulsu *moven-*

*tur.* Ad *Ingenium* & *Mores* pertinet, quod, è vivariis egressæ piscatores adoriri, & è navibus in mare pronos dejicere; reti circumdatae maculas appetere ipsas, conscia teretis ac lubrici tergi, cum multiplici flexu laxari donec evadant; ut hæfere in hanc amplius devorare quàm hamum, admove reque dentibus lineas, atque ita erodere, infixas hamo, quod sint cultellato dorso, sese invertere; cauda ictas, celerrimè exanimari, capite ictas difficulter unde animam in cauda ha-

bere certum Plinio concentu & tintinnabulis, quod ex fabula de viperæ sibilo natum esse credo, à piscatoribus evocari, dicuntur. *Docilitatis* argumentum, L. Crassi, qui cum Cn. Domitio Censor fuit, Muræna Inauribus & gemmis distincto monili ornata, tanquam eximia pulchritudinis puella, vocem Crassi cognoscebat, ad eum adnatabat, & porrecta cum gaudio accipiebat. in piscina mortuam, atratus tanquam filiam luxit. Idem de Antonii Drusi in villa apud Baucilos, in parte Bajana, Muræna; dicitur.

*Antipathiam* ipsarum cum Locusta, Polypo, Ozena, Congro, Aceto, & Ferula notarunt authores. *Vincuntur* à locustis. Ad carnes Polyporum Ozænarum inprimis præproperæ feruntur. Pugnas Ælianus descripsit; addidit Kiranides incredibile, evanescere Murænam, si cum Locusta coquatur. Cum Congro sæpissimè congressam Puteolis, spectavit Perottus, Aceti gustu præcipuè in rabiem aguntur. Licinius Macer pinguescere jactatu, (alias lactatu) fuisse non interimi, easdem ferulâ protinus, prodidit. Mirum quod ex Æliano habemus, cum plagam unam acceperit torpescientem persistere; si plures inferas, funditus ita accendi.

Summis olim apud Romanos fuere in deliciis, seu ut gulæ irritamenta, seu quod diutissimè & magna copia in variis servari possent. vel unus C. Hirrius duodena millia festertia, ipsis alendis infumebat, & uno tempore Cæsari v i m. Murænarum mutuo dedisse in pondus dicitur. nam permutare pretio vel aliâ merce noluit. Hujus villam intra quam modicam quadrages piscinæ venierant. Tripatinus summa cœnarum lautitia, ex Fenestella appellatur; unaque fuit Murænarum, altera Luporum, tertia Myxonis piscis. Heliogabalus earundem lactibus in locis mediterraneis rusticos pavisse creditur, ut totum Romanum imperium perderet. Piscis æstimium Liciniis Murænarum nomen imposuit, ut Sergio Oratæ. Commendatas maximè prægnantes ex Horatio potest colligi. sed & à iactibus summam obtinuisse carnem. Nam si ve molles illarum carnes statuas, si ve duras, opprobrium vitare non poterunt. Illæ inflationes, hæ cruditates difficiles concoctu pariunt. Galenus tamen mediocres posuit, si in puro mari versentur.

Reperere & in Medicina usum. Nam Marcellus pellium cinerem ex aceto fronti illitum, prodèsse adversus capitis dolorem prodidit.

Plin. H. N. l. 32. c. 2.

Ælian. H. A. l. 8. c. 4. Macrob. Satur. l. 2. c. 1. Tzet. Chil. 8. c. 173. Plutarch. l. 1. utra animal.

Porphyr. l. 8 de abst.

ab anim. Ælian. H. A. l. 1. c. 32.

Oppian. Halieut. l. 3. v. 190.

Plin. H. N. l. 9. c. 30.

Plin. H. N. l. 9. c. 23.

Ælian. H. A. l. 1. c. 37.

Varro de R. R. l. 3. c. 17. Plin. N. l. 9. c. 55. Macrob. Saturn. l. 2. c. 11.

Plin. H. N. l. 35. c. 12.

Lamprid. in Heliogab.

Macrob. Saturn. l. 2. c. 11.

Horat. l. 2. ferm. Saty. 8.

Galen. l. 1. de cibis boni & mal. succi. l. 3. de Aliment.



## ARTICULUS VIII.

De Myro, Reverso Indico Anguilli formi & Tania.

Tab. V. 5.

**M**YRUS, seu *μυρὸς*, παρὰ τὸ μύρειν five *μύρειν* *μύρειν*, fluere, quod præ nimia pinguedine mari supernatet, dicitur. Volateranus, falso Plinio & Gazæ Oculatam, Plauto Ophthalmiam vocari scripsit. Alicubi Myrinus, sed perperam, *μύρινος* enim legi debet, vocatur. Sitne Murænarum mas, quod Plinius, Hesychius & aliis prodidere, ex descriptione colligetur. Aristoteles concolorem, muræna robustiorem, colore piceo, dentibus intus & extra instructum prodidit. Athenceo *λεόχρως* seu colore leonis & *τόρνος* seu torquillæ, esse creditur.

Plin. H. N. l. 9. c. 23.

Athen. Dipnol. l. 7.

Athen. Dipnol. l. 7.

Duo ejus apud Dorionem genera. *Nigrum*, quod Galli piscatores serpentem vocant, & *Ruffum*, quod deterius. Ille serpenti magis similis est quam Murænæ, corpore nigricante, rotundo, sine maculis, sine squammis. Carne tenerrima, sine ullis spinis. *Pinnulas* habet valde exiguas cutis substantia, unam à cervicis loco ad anum usque, & alteram ab ano ad eandem, quarum ora nigra est: unicum utrinque branchiarum imperfectarum foramen, *puncta* in utroque latere aliquot aurea, quæ magis in viventibus quam mortuis apparent. *gulam* ventriculo præpositam, *intestina* longa, recta ad podicem porrecta. *jecur* longum, rubescens, sine felle. *splenem* longum, tenuem.

*Alter* serpens rubescens Rondeletio (Dorionis Myrum *ὑπομυρῖνδα* non absurde dixeris) piscis est rarissimus, corporibus specie serpentibus terrenis similis, colore rubro vel phæniceo, lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eam lineam quæ à capite ad caudam protensa est, secantibus, scissura oris non admodum magna. *Dentes* habet acutos, ferratos, *branchias* squamiformum piscium instar opertas. in *dorso* à capite ferè ad caudam capillamenta tenuia à sese disjuncta, in ventre similia. *Cauda* in pinnam unam desinit.

Tab. II. 5.

**REVERSUS INDICUS** Anguilliformis, inter Pelagios non squamosos ab Aldrovando refertur. inter Galeorum genera ab Hernando. Instar Anguillæ Columbus facit, nisi grandiusculum caput haberet. Capite autem pelliculam quandam crumenæ similem gestare scribit. Si Hernandum sequimur, tres spithamas est longus, Corio nigro, figura mirabili: vix possis divinare an natet supinus vel pronus, imo judices, cum supinus est primum jacere, & cum pronus supinum. Rostrum habet acutum, labrum inferius superiori longius, latius, & ad superiora contortum. Caput compressum, ac rostellum spinifero octo uncias longo,

Nieremberg. Exot. Nat. l. xi. c. 18 ex Hernando.

tres lato insigne, quo tuberoni & aliis piscibus adhærere solet, pinnas circa branchias quaternas, singulas, juxta ventrem & dorsum, caudam nonnihil lunatam. Vivit in Oceano Septentrionali, & piscibus vescitur. Ufus ejus in piscibus capiendis, Viso fulgore aëris statim prædam deserit. Modus piscationis à Martyre descriptus est.

Martyr. l. 3. Decat. Oce. Ta. VI. l. 2. 3.

**TANIARUM**, quæ à similitudine fasciæ & vittæ ita dicuntur, Gaza vittas reddit, tres apud scriptores *descriptions* sese offerunt. *Una* est corpore longo, tenui, stricto, flexili; tenuiatis tantæ, ut ossa vertebrarum spinæque quibus firmatur, carne non recta, appareant. Caput ei depressum, ossibus multis constans. Oculi magni, rotundi. pupilla exigula ad branchias pinna utrinque unica ad notandum data. in prona parte villos habet ad caudam usque, in quos & cauda terminatur. Flammæ modo cum natat movetur; inde nomen Flambo à Gallis accepit. *Alter*a corpore est priori similis, coque argenteo, ad tres interdum cubitos excrescit. branchiæ ei, præter quæ ad pinnas, sub maxilla inferiore duæ ruffæ ejus coloris dorsi villi & cauda, maculæ in parte prona purpureæ, rotundæ, certo spacio à se distantes. Ventriculus magnus & longus. *Intestina* sine ullis gyris. *Cor compressum*, hepatis ex albo rufescens. *Lien*, & *fel* adeo parva, ut fermè visum effugiant.

*Tertia* Falce nuncupatur, quod falcem messorem referat. Est ulnam longa, palmum lata, tota ingyrum quibusdam veluti crenis ferrata, Capite deformi, ut simiam dicas oculis magnis. In lateribus linea visitur aspera. pinna in tergore unica, continua, subrubra, duæ sub branchiis totidemque substerno. Polypi modo mollis est. & perfrixus vel assus in quoddam veluti gluten resolvitur. Huc pertinet Piscis, quem *Iridem marinam* non absone dixeris. Solis quodammodo aristis & cute constat, & rubro amethystino, cæruleo & aureo colore variat. quin rectius quam præcedens *Tenia falcata* dicitur.

## CAPUT III.

De Pelagiis Cartilagineis.

## ARTICULUS I.

De Cartilagineis in genere.

**C**artilaginei pisces dicuntur, qui pro dorsi spinea Cartilaginem habent: Græci *χονδράκαρα* olim dixerunt; Aristoteles *σειλάχη* & *σειλάχια* primus, à splendore cutis, ut testatur Galenus, qua noctu lucent, vocavit. *Duo* a. talium sunt genera, *planum* unum, in quo alii aspera, alii lævi cute sunt præditi; alii spinis carent, quidam iis armantur, *Alterum*

Plin. N. l. 9. c. 24.



*rum longum & rotundum*, qui Galeno γαλει & γαλειόνι, Aristoteli γαλει γαλειοειδής aliquando & γαλειόδον, ἀπὸ τῆς γαλῆς, id est, mustela terrestri, seu quod corporis similitudine eam referant, seu quod quædam communia habeant, inter quæ *Iecur* adiposum, in oleum resolubile, dicuntur. Tribuitur hoc nomen & Canicularum generi, quod Ælianus secundum & varium, Oppianus tertium ponit, utrumque in cæno volutari, addit. Magnitudo etiam minorum inter mares ultra cubitum. Spinam Cartilagineam branchias detectas, quod cartilagine tegumenta earum consent, pinnas duplices & utrinque quinas habere, nullo discreto adipe carni ventrive adherescente pinguescere, ova ea specie, qua aves habere, commune omnibus. *Locus* illorum variat. Plana parte inferiore supinaque habent; oblongis in lateribus adherent, & tegumenti loco quinque habent foramina. Cor pentagonum, jecoris, & ejus gemini substantia adipea, fel in jecore situm, appendices supra ventriculū exeuntes, Galeis propria sunt. Vulvæ, quas qui ova pariunt, in binos sinus partitas, & sub præcordiorum septo constitutas habent, ad avium naturam vergunt. ad easdem in gravidis veluti mammæ albidæ visuntur. Os supina parte esse, non omnibus convenit, in extremo quædam rostro habent. quibus ita situm est, cibum corripere, nisi conversi resupinentur, nequeunt. sic & piscium quos insectantur saluti, & ipsorum commodo consuluit Natura. Immodica satietate isti interirent. illi, dum moram sese convertendo neſtunt, effugiunt. Sexus duplici dignoscitur nota. Maribus bina quædam circa excrementi ostium propendent; minores iidem. Fœminæ majores, illis destituuntur. *Locus* cartilagineis mare est. sed alii in pelago, alii in profundo cæno morantur. Cum pariendi tempus instat, vada & littora petunt.

*Cibus* ipsis pisces, hos resupinati, ut diximus, capiunt. Quantum ad *Generationem*, ore parere perperam sibi Ægyptii persuadebant. Coitus diversus, visa ex cartilagineis nonnulla, quæ averſa canum terrestrium more cohærebant. Plani qui caudam habent, non solum admotis supinis, sed etiam terga fœminarum, marium supinis superpositis, modo caudæ crassities nihil impediat, coeunt. Quia semine non abundant, nec fœminæ suos conceptus, nec marres suum semen spargere, quod generis non vivipari pisces facere solent, visuntur. *Ova* eodem tempore & superiore parte ad præcordiorum septum omnibus, cum majora tum minora multa, & inferiore jam exclusi fœtus; diversitas inferius patebit. quod non omnia simul, sed sæpe numero ac diu edunt; interim quæ in ima matrice sunt, concoquuntur, eodem mense sæpe & parere & coire crediti sunt. Superfoetare, & senis complurium u-

terum ferre mensibus, author est Aristoteles. Ex alto terram repetunt, ubi pariant. Sic teporem captant, & proli provident. Pariunt autem vere animal. hinc partus viperino similis: siquid in quibusdam differentiæ occurrit, insequentibus dicitur. discrimen fanè ipsi pisces inter se ostendunt. senos vel octenos, undecim interdum, si Rondeletio credendum, fœtus suis partibus absolutos pedali longitudine diversis temporibus parere scribit Bellonius. persæpè vivo emergente fœtu, ovis adhuc crudis, scatere uterum, superiorem ejus partem, quæ ad septum est occupantibus, eorumque alia dextro, alia sinistro matricis cornu concludi, adjicit. quod Galei metu insidiarum catulos devorent, his evanescentibus revocent, prodidere antiqui, & ad *Ingenium* referri potest. *Antipathiam* cum Pastinaca, qua nihil venenatius ex mari, exercere, apud Plinium invenies. Tanta est aviditas ipsius veneni.

*Uſus* Cartilagineorum in *cibis* rarus. Caro est concoctu difficilis, diuturno usu, visum hebetare, proditum à Diphilo. Exenteratos quosdam absque sale insolari ex Ephippo colliges. *τεμαχίτης* ipsi est.

## ARTICULUS II.

De Cartilagineis Longis.

## PUNCTUM I.

De Cane Aristotelis, seu Carcharia.

**P**rimum inter Cartilagineos longos locum Galei seu Musteli inter hos *Kéav* seu Canis, vel quia hoc in genere *maximus*; sibi vendicat. *Galeus* hic simpliciter Aristoteli; *Galeus Canis*, Oppiano; *Canicula*, Plinio; *Carcharias*, quia dentibus plurimum valet Theophrasto: allis *Scylla*. Perperam Rondeletio, ex Nicandri autoritate, *Lamia*. Nam & inter planos Cartilagineos à Plinio refertur, & incredibile, est tantæ magnitudinis piscem, qui loricatos etiam homines devoret, planis ab eo accenseri posse. Potuit Nicander Carchariam Lamiam propter aliquam naturæ similitudinem vocare, & Siculis Rana marina Lamia dicitur. Cete non esse, vel exinde colligas, quod & branchias habeat, & ova concipiat.

Magnitudine Galeos omnes excedit. Visus mille librarum pondere mediocris. Captus, qui ad quatuor librarum millia accederet. Inventus in quodam loricatus homo est. alter, currui impositus, vix à duobus equis trahi potuit. Cure aspera integitur. Os ipsi non in rostro, quod in mucronem exporretum, sed supina parte est.

*Caput* amplissimum. *Dentes* trianguli forma, durissimi, acutissimi, utrinque ferrati, feno

Arist. H. A. l. 3. c. 1.

Arist. H. A. l. 3. c. 1.

Plutarch. libroutra animal. Tzetzes Cheliad. l. 3. c. 126. Plin. H. N. l. 32. c. 2.

Tab. VI. 4. 5. 6.

Arist. H. A. l. 5. c. 11.

Oppian. Halieut. l. 1. v. 374.

Plin. H. N. l. 13. c. 15.

Theophr. Hist. Plant. l. 4. c. 8.

Plin. H. N. l. 9. c. 24.

Tab. VII. 1. 2.



feno ordine dispositi. Prioris ordinis extra prominent, & in anteriorem partem vergunt. secundi rari sunt. tertii, quarti, quinti, & sexti, in os maxima ex parte recurvi, in utraque maxilla carne molli conteguntur. quælibet maxilla duos & septuaginta comprehendit.

*Oculos* habet maximos rotundos; in quibus tunica cornea parte anteriore, posterioreque dura est. quæ humorem crySTALLINUM involvit, telas arenarum tenuitate superat. *nervi optici* ex substantia cartilaginea & dura constant. muscoli qui eos quodammodo intra trahunt, & fixos tenent, non radicem nervorum opticorum ambiunt. sed à superiore ossis regionis oculorum parte orti, in longum extenduntur; quem situm in humanis quoque videmus. Laterum & tergoris *pinnæ* longè quàm in sui generis majores sunt. binæ earum haud procul à cauda, binæ aliæ ad branchias & podicem, aliæ in medio ferè dorso. *Cauda* duabus constans pinnis cubitalem longitudinem æquat, & ejus pars superior, quæ vetebris communita, altius attollitur quàm inferior. hæc crescentis lunæ figuram exprimit; quarum inter capedinem dimidia linea explere potest. *Hepar* adipatum, in duos maximos lobos dividitur. *Degit* in alto. sed ad littora refugit. Amnes nonnunquam adire, fortè dum prædam insequitur, Wottenus author est: *Vescitur* carne, & pisces adoritur ex insidiis. benè ἀρπακτῆρα Oppianus vocavit: quia Archestrato ἀνθρωποφάγῳ, carne humana delectari, facillè crediderim. Pugnam cum Urinantibus apud Plinium legimus.

Plin. H. Cum caniculis, inquit, atrox dimicatio. N. l. 9. c. 46. Inguina & calces omnemque candorem Thunnos inprimis persequitur, & ex eorum venatione cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, Siciliamque attingere prohibentur, pinguescit. Vidit Bellonius undecim foetus uno *partu* edidisse, non tunicis involutos, sed umbilicali tantum in ea cum utero matris conjunctos. Caput ut in aliis animalibus primo prodibat. In *Cibis* non adeò expetuntur. Divinum quidem Archestratus cibum vocat; & Mnesitheus iis qui facillè concoquuntur annumerat; Galenus tamen, excrementitiæ carnis esse, asserit. Facillè in apparatu peccatur. Dentes argento inclusi, sub nomine dentium serpentis, dentitionem juvare, & puerorum pavores arcere, vulgo creduntur. Dentifricia optima ex iis parari Rondeletius tradit.

## PUNCTUM II.

De Galio Aristotelis, & Catulis.

Tab. VIII. 4. **Q**uem Oppianus γαλὸν κύνα seu Mustelum seu Galeum. Canem vocat, is Aristoteii simpliciter γαλῆς est. Quia apud Latinos nomen non habet, poterit vel simpliciter Mustelus, aut Galeus, Mustelusve Canis

vocari. Fortè est Græcorum σκυλάρα. *Corpore* est oblongo & rotundo, cinereo, à podice ad extremam usque caudam gracilescit. Centenas aliquando libras excedit, nec squammis, sed corio tegitur. *Oculos* habet oblongos; retrò eos bina foramina auditui inservientia, ex parte inferiore tunica enascitur, quæ, palpebræ avium modo, totum oculum operit. Os ipsi in supina parte denticulatum, ante ipsum duo alia foramina olfactui dicata. Branchiæ utrinque quinæ detectæ, juxta quas duæ pinnæ, aliæque rursus duæ supina parte enascuntur, præter has maribus duæ appendices, ex podice pendent. *Hepati* bifido & pallido, vesicula fellis subnectitur. *Splen* subrubescit. In cœnosis maris locis *habitat*. *Ova* vitellis ovorum Gallinæ similia, ex quibus foetus, donec foras prodeant, nutriuntur, parit. Quia Carne *vescitur* gregalem ne credas. Natantes homines adoritur. In cibis plebi inservit.

CATULI Aristoteli τὰ σκύλλια, Athenæo & Oppiano σκύμνοι, aliis γαλῆς γαλῆοι, Hinnulos vertunt nonnulli, quibusdam Caniculæ dicuntur, Bellonius Nissolas Massiliensium esse, quod albas maculas per dorsum dispersas habeant, putat. Galli duos pro iis, Roussettes dictos, ponunt. *Major* ad cubitalem magnitudinem excrecere solet, interdum binos superat; *Cute* est adeò asperâ & durâ, ut eâ ebur perpoliri possit. *Dorsum* & latera subnigricant, nigerrimisque & latissimis maculis insigniuntur. In petris & alto mari frequentius degit, hinc Saxatilis Canicula Rondeletio dicitur.

*Minori* cubiti aliquando magnitudo, dorsum & latera subrubent, notisque liventibus, & multò quàm in majore minoribus, consperguntur. Cutis, si à cauda sursum ad caput macrum ducas, aspera; si à capite ad caudam, minimè. Oculis, ore, branchiis, pinna, caudaque similis, ab aliis parum differunt. *Generationem* si attendas, *ova* ipsis in medio matricis circa spinam hærent, aucta circumducuntur. In binos enim partita finis matrix cum sit, atque sub præcordiorum septo constituta, in circumstantem utramque partem abscedunt. Gerunt testacea quædam, in quibus ovi specie, humor inest; quem colore & perspicuitate cornu, figurâ pulvinaribus quæ capiti dormituri supponimus, similem, facit Rondeletius: Ova nulla conteguntur secundina: à venosa umbilici parte ipsis nutrimentum est. testæ facies similis tibiæ ligulis, atque in ea sunt meatus, capillamentorum tenuitate. Testa intus rupta dilapsaque foetus exit; & ex ovo vivum protruditur animal. Caro Majoris ferinum edit odorem. Uterque etiam à plebe rejicitur.



## PUNCTUM III.

De Mustelo Lævi &amp; Asteria.

Tab. VIII. 6. **M**ustelus seu Galeus LÆVIS, non à cutis Lævore, sed ut ab Acatia cui perquam similis est, distinguatur, ita dicitur. Romæ *Pesce Columbo* vocatur. Vix ad viginti libras pervenit. Colore est albicante, *Corio lævi*, ore edentulo, dentium vicem asperæ maxillæ obtinent, foramina pro naribus habet; quibus minora sunt alia post oculos, rostro, branchiis, pinnis, caudâ, intereanisque cum Cane Galeo convenit. *Viçtitat* piscibus, etsi inter gregales habeatur. De *Generatione* sic Aristoteles. Ova in medio matricum continent, ubi circumstetere in utrumq; matricis sinum descendunt, & evadunt annexa per umbilicum ad matricem animalia, ita ut absumptis ovis, non alio modo quam quadrupedes fœtus habere videantur. Annexus est longus umbilicus ad matricis partem inferiorem, unusquisque tanquam appensus acceptabulo. Et ad fœtus medium quæ jecur habet, quem si feces, intus alimentum quasi ex ovo deprehendas: etiam cum amplius ovum non est. Tamen secundæ membranæque sua cuique fœtui, more quadrupedum. Fœtus per initia caput in superiore parte habet; adultus autem atque perfectus devexum. In læva mares generantur, in dextra fœminæ; quin eadem in parte simul tum fœmina, tum mas. Dissecto fœtu, quot habet viscera, puta jecur, ea interius magna, & sanguine constantia, sicut in quadrupedibus. Propter duram insuavemque carnem plebi relinquitur.

Tab. VIII. 8. **G**ALEUS ASTERIAS, Oppiano *Ποικιλός*, Æliano simpliciter *γαλιός*, nisi Galeos omnes maculatos vocet, Bellonio *Mustelus stellaris*, qui etiam Oppiano *Pardalim* dici credit. Lævi mustelo internis & externis partibus est similis, cute tamen læviore. Dorsi maculæ aliæ stellarum speciem referunt, aliæ sunt rotundæ. Locum, victum, partum, Ingenium, & Mores, communia cum cæteris habet. Itcesius Galeorum optimos & tenerimos esse opinatur.

## PUNCTUM IV.

De Glaucio Æliani &amp; Maltha.

Tab. VIII. 7. **G**laucus Æliani vel ideo inter Galeos refertur, quod sit Cartilagineus, tota corporis figura cæteros Galeos referat, & parvulos periculo instante, ore hiant excipiat, præterito, revomat. Piscis est quatuor aut quinque cubitorum magnitudine. Cute lævi. Dorso cæruleo exsaturato, ventre candido. Rostro acuto. Ore in supina parte posito. Oculis magnis, ex quorum inferiore parte enascitur membrana candida, quæ ad oculum sursum attollitur, eisque veluti nubecaliginem offundit. Dentium acutorum, la-

torum, quodammoda ferratorum, ad latera spectantium ordines sunt duo, in palato substantia fungosa & mollis, quæ supernam inferamque oris partem replet. *Lingua* crassa & aspera. Branchiæ detectæ; propè has *pinnæ* duæ magnæ, ad podicem totidem minores. duæ in tergore. *Cauda* ex duabus constat. superior multò longior est quàm inferior, sursumq; spectat. *Interna* si attendas, videbis *ventriculum* amplissimum & longissimum; *splenem*, qui ventriculo annectitur, longum, ex multis particulis carnosis rotundisque racemi instar compactum. *Hepar* adiposum, in duos lobos dissectum, quor. alteri vesicula fellis adhæret. *Fel*, viride. parte ventris infima in maribus seminis vasa in duas partes divisa, in fœminis *vulvam*; in maribus substantiam carnosam, digitali magnitudine, penis specie. *Intestina* primo sunt gracilia, dein lata, sine ullis spiris. Ex venis meseraicis rami duo oriuntur; quorum alter ad hepar, alter ad ventriculum tendit, & in multos ramos diducitur. *Cor* quoque angulatum est. Carnis humanæ avidissimus, & ad littora deambulantibus inhians. Exemplum militis cuiusdam præbuit, à quo cum calces apprehendere frustra tentasset, occisus est.

MALTHAM inter belluas marinas numerat Oppianus. Suidas cum Presti aliquando eandem facit. aliquando ab eodem distinguit, *δυσανθαράνισον* belluam appellans, Rondeletius Cetaceum esse piscem, & ex Galeorum numero colligit, quod caro ipsi sit laxa, mollisque. Pinnis, cauda, internis partibus, à Cane Galeo non differt, nisi quod alba oculorum macula destituatur. Rostro est brevi, dentibus latis & acutis. Os habet in supina parte, non multum infra rostrum. *dentium* multos ordines.

Oppian.  
Halieut.  
l. i. v.  
371.

## PUNCTUM V.

De Vulpecula marina, &amp; Galeo Acanthea.

**P**iscis, qui Græcis *αλώπηξ*, Oppiano *αλώπηξ*, Bellonio *Simia marina*, Latinis *vulpecula marina*, vel à caudæ longitudine, vel insuavi ingratoque gustu, vel ab astu ingenioque, nomen sortitus esse videatur. Distinguatur ne ab Archestrati vulpecula, quam circa Rhodam sapidissimam, & alio nomine *κύρα πίονα*; id est canem pinguem appellari scribit; an cum eo sit eadem, ignoro. Piscis est aliquando ad centenas libras excrecens. Cum Cane Galeo, oculis, foraminibus auditui, & olfactui inservientibus, & branchiis conveniens. Crassior & brevior. Cute tectus. Dorsum habet cineraceum, ventrem candidum, *caudam* falcatam, & quodammodo ensiformem, quæ magnitudine reliquum corpus superat, & in cuius exortu pinna conspicitur. Rondeletius ita eam exprimit, ac si ex binis pinnis constaret,

Tab. VII. 3. Rondelet. Hist. Pisc. Belon. l. i. de Aquat. c. 7. Diphilus apud Athen. l. 8. Arist. H. A. l. 9. c. 37. ex Scaliger dist. Æl. Hist. Var. l. i. c. 5. Athen. l. c. Oppian. Halieut. l. i. v. 381.



ret, quarum illa, quæ sursum abit, toto corpore longior est, altera decuplo minor. Pinnae ad branchias & anum quam in dorso longiores. Ventriculus amplus. intestina lata, jecur pallidum & in duas fibras divisum. Iconem apud Aldrovandum vide; nos hic alterius cujusdam subijcimus. *Locus*, in mari gaudet coenosis à littoribus magis remotis. Pisces etiam grandiores pro cibo. In *Conceptu* & partu spinacem imitatur. Sobolem metu periculi intro recipere, præter lapso emitte- re, Rondeletius oculatus testis est. Cauda, longitudo ob molliem quæ in tenellis facil- limè flectitur, impedit. Hamo devorato glutunt amplius ad infima lineæ, quæ faciliè prærodunt. Caro virus resipit.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 43.  
Oppian.  
Halieut.  
l. 3. v.  
144.  
Tab.  
VIII. 5.

GALEUS ACANTHIAS Gazæ *Mustelus Spi-  
nax*; Scaligero *Mustelus Spinus* est, Æliano  
*Centrines* nomine venit. Nunquam viginti  
libras implet. Corpus sensim gracilescit.  
Dorsum cinereum apparet, venter albicat.  
Rondeletius in mari argenteo colore esse, cum  
expiravit ex cinereo rubescere, author est.  
*Rostrum* ipsi primò latum, mox in acutum  
desinens. Retro oculos, qui mediocres, bi-  
na foramina auditui dicantur. Ante os, quod  
in supina parte, & dentibus validissimis ar-  
matur, bina alia olfactui inserviunt. Bran-  
chiæ à lateribus utrinque quinæ & detectæ,  
*Pinnae* duæ natatui destinatae branchias se-  
quuntur; in parte supina nullæ sunt, præter-  
quam expodice utraque parte, quæ in foe-  
mina minores, in mare majores sunt. hac no-  
ta, quia in cæteris omnibus Galeis inter po-  
dicem & caudam, imò ventri singularis com-  
missa conspicitur, ab aliis, ut mas appendici-  
bus parvis, quas illic obtinet, à foemina, di-  
stinguitur. Utraque in dorso pinna, aculeum  
longum, triangularem magis, quàm rotun-  
dum annexum habet. *Cauda* est gemina, su-  
periore parte longior inferiore brevior, *Splen*  
in duos lobos dividitur. Cæteris partibus  
cum aliis convenit. *Locus* ipsi coenosa maris  
receptacula, flumina nunquam subit: nec in  
Euripo Pyrrhæo reperitur. in septo præ-  
cordiorum supra mammas ova continere;  
ubi ovum descendit atque absolutum fue-  
rit, in eo catulum fieri, author est Aristote-  
les. Sex in ventre foetus perfectos observa-  
tos, multis aliis ovis non exclusis, pendentes,  
qui ex ovis per venam umbilicalem exclu-  
dantur. Ova nullo vinculo alligata esse, ob-  
servavit Rondeletius. Ex ovis alimentum  
trahere, donec perfecti foras emittantur,  
haud malè colligi potest. *Gregalem* esse,  
quod multi simul capiantur, certum est.  
Quod foetus suos nec recipere, nec emittere  
possit, spinæ faciunt. Carne est dura & insi-  
pida; minus tamen quàm vulpecula virus  
resipit.

Arist. H.  
A. l. 6.  
c. 8.  
I. Scalig.

Arist. H.  
A. l. 6. c.  
10.

## PUNCTUM VI.

De Centrine.

Nomine CENTRINES, Ælianus Muste-  
los aculeis præditos intelligit, cum duo  
Canum genera, in Galeos & Centrinas dispe-  
scit: noseum intelligimus, quem Aristote-  
les *παρακλινὸν γαστρίδαν*, esse, Arhenæus ab Epæ-  
neto *ἐπινωσίδαν* vocari, docet. Romæ & tota  
Italia *Pesce porco* dicitur. Plinius nusquam  
ejus meminit, nec apud Aristotelem quic-  
quam invenias, quamvis scripsisse Athe-  
næus prodiderit. Quantum ad descriptionem  
brevis est, crassus & spissus, à capite ad  
podicem *trianguli* figura. *Cute* integitur as-  
perrimâ, brevibus crebrisque aculeis horri-  
da. qui in capite & dorso robustiores sunt,  
colore ex cinereo nigricante *Caput* habet exi-  
guum & depressum. *Oculos* splendentes, post  
eos duo foramina auditui destinata, duo su-  
pina rostri parte pro naribus conspiciuntur.  
*Caput* supina parte, rotundum, magnum,  
semper ferè hians. *Dentes* latos, acutos, quo-  
rum in superiori maxilla triplex, in inferiori  
simplex ordo est. Branchias utrinque in la-  
teribus quinque, easdemque detectas. *Pin-  
na* prior à capite statim enascens, aculeo  
longo & ad caput sese inclinante armata,  
cristæ instar multum furrigitur, quæ è po-  
dicis regione minor, minore & ad caudam  
vergente aculeo instructa est. In caudam  
& podicis pinnae, imò ventri nulla alia  
pinnula subnectitur, quod ei cum Acanthia  
commune. Cauda in pinnam inferiore par-  
te latam, superiore parte in acutum angu-  
lum desinentem degenerat. In *partibus in-  
ternis*, ventriculus est oblongus crassus. *Inte-  
stina* haud multis gyris reflexa. *Hepar* præ-  
pingue, magnum, in duos lobos ad infimam  
ferè usque ventris sedem extensos divisum,  
albicat. *Locus* ipsi in coenosis pelagi domici-  
liis potius quam littore; ideo varius capitur.  
*Ova* primum in se gignit numero sissima, vi-  
tellis gallinaceorum ovorum similia. animal  
reliquorum cartilagineorum more excludit.  
Venenum fundere ex Oppiano discimus. quos ille *κέντρασιν ἐπινώμους* vocat, hoc *κεντρίδας*  
vocari, vetus scoliastes adscripsit. Vix  
aliquis ejus in *cibis usus*. nerveâ potius quam  
carneâ substantia constat. In *Medicina* oleum  
ex hepate frixo collectum, ad duritiem hu-  
mani hepatis emolliendam conferre, & arti-  
culorum dolores lenire ex Rondeletio ha-  
beo. Cinis urinas vehementer movet.

Tab.  
VII. 4. 5.  
Ælian.  
l. 2. H.  
A. c. ult.  
Arist. H.  
A. l. 5.  
cit.  
Athen.  
Dipnos.  
l. 7.

Oppian.  
Halieut.  
l. 2. v.  
640.

## PUNCTUM VII.

De Simia marina, &amp; Zygena.

SIMIARUM MARINARUM duas ha-  
bemus descriptiones. Æliano est bellua  
in mari rubro, cartilaginea, terrestri tum co-  
lore, tum facie similis; in hoc differt, quod  
variè distinguatur, cervicemque & bran-  
chias

Tab.  
VII. 6.  
Ælian.  
H. A. l.  
12. c. 27.



chias ruffas habeat. Tegmen corporis testudinis involucrium est. Cum natat, volare videtur. Gesnerus piscem sibi ex Dania allatum scribit, coloris corpore toto viridis, dorso magis fusci, ad latera pallidi. Os finum habebat. *pinna*s tanquam volans extendebat, & inter duas in dorso *pinna*s aculeum retrò tendebat. branchiarum foramina quina apparebant, obliquo inter os & oculos descensu. Testudineum involucrium si accessisset, Æliani simiam fecisset.

**ZYGÆNA** piscis monstrosus, à capitis figura, quæ τὸ ζυγόν imitatur, quo transversum librile, ex quo lances dependent significatur, nomen obtinuit.

**GAZA** Libellam vertit. Massilienses piscem Judæum à similitudine tegumenticapitis, quo olim Judæi in provincia utebantur, dicunt. Galenus, Ælianus, Oppianus eoque secutus Suidas, cetis annumerant. Galeis, quia multa cum illis communia habet, haud malè subnectitur. Corio tegitur. Ventre est albo, dorso cinereo, pro spinis cartilagineas obtinet. *Cervicem* & *gulam* habere scripsit Rondeletius. Os ipsi non rotundum, non rostratum, nec in latera compressum; sed in ea extensum, atque transversum habet. Pars frontis anterior, quæ utroque oculo, magno, & deorsum potius quàm sursum vel ad latera vergente, clauditur, in semicirculum ferè extruberat, & sic in aciem acuitur, ut obvios pisces secare possè credatur. Os subtus, inferiore parte, permagnum, dentibus validis sinus planis, in latus ferræ modò vergentibus, triplici vel quadruplici ordine digestis armatum, latet. *Lingua* lata, humanæ haud absimilis. *branchiæ* utrinque quinx & detectæ. *Pinnas* icon ostendit. in dorso nullam esse tradit Rondeletius. *Cauda* duabus inæqualibus *pinnis* constat, quarum superior vertebris fulcitur, ac multo longior est; inferior vertebris caret, & brevior extat. *Versatur* in profundo. Pisces obvios, & homines natantes frontis suæ acie subvertit, & Leoni quod ad vires, ab Oppiano opponitur. Occursus ejus olim, navigantibus infestus habebatur.

Ab ista **ZYGÆNA** plerimum ille differt, qui ventre candicante, ore miniacei coloris, cætera niger esse, scribitur.

## PUNCTUM VIII.

*De Mola Salviani, seu Orthragorisco Rondeletii.*

**M**onstroso pisci monstrosiorem subjicimus, sed & istum toto corpore cartilagineum. *Mola* quibusdam, seu quod informem molam referat, seu quod rotunditate corporis molæ molendinariæ similis sit, ut

Rondeletio placet, dicitur. Apud Massilienses, *Luna*, vel quod extrema corporis parte, quæ *pinnis* subest, crescentis figuram referat, vel quo demptis *pinnis* toto corpore plenæ instar sit, vel quod corporis extremum in cornua curvatæ respondeat, vel denique quod noctu splendeat, vocatur. sed cave pro Æliani sumas. Porcum, quem Lacedæmonii *Orthragoriscum* vocant, quemque Appion maximum piscium esse, & cum capitur grunnire, credit Rondeletius, nec abaudit comparatio. Nec longus, nec planus est, sed in latera comprimitur. brevis adeò, ut solum caput potius quàm piscem repræsentare videatur. Centenas sæpè superat. *Cute* tegitur asperâ non secus ac *Squatina*, argentei coloris, ventre est subalbido, dorso cinereo. Os habet exiguum. *dentes* tantum geminos, utramque universam oris partem munientes, quorum inferior retusior, superior magis acutus ac secans est, latos continuosque Rondeletius facit. Oculos parvos ac orbiculares. *De branchiis ita Salvianus*. Branchiarum internum orificium utrinque, unum est parvum & semicirculare, prope quod etiam utrinque *pinna* una parva & rotunda sita est, quæ alia prorsus ratione quam aliorum piscium laterales *pinnæ*, moventur. Cum enim illæ in piscibus à cauda ad caput, in hoc nostro à dorso in imum ventrem deducuntur. In extremo præterea dorso propè caudum alia multò major *pinna*, non rotunda sed sublonga erigitur: è cujus regione altera ejusdem magnitudinis & figuræ imò ventri statim ab ano subest, quæ alio etiam modo quàm dorfi & ventris aliarum piscium *pinnæ* mobiles sunt. Non enim ut illæ à cauda ad caput eriguntur, & à capite ad caudam inclinantur, sed in utrumque latus moventur.

In *caudam* carneam non degenerat: nam postrema ejus æquè ac latera lata sunt: *pinna* nata tamen cauda, non oblonga sed lata, atque omnem postremam piscis partem amplexante, in latereque mobili munitur. Crescentis lunæ figuram referre; superiore parte articulata esse, ut tam in dextrum, quam in sinistrum moveatur, Rondeletius addidit.

Quantum ad *Interna*, quæ ob corporis rotunditatem conglobata sunt. Carne est candidissima, nerveam potius, quàm carneam substantiam præferente. Cocta gluten ex tergoribus boum confectum refert. *Adipe* ut in porco, multo carni corium firmissimè adhæret, & difficillimè avellitur. *Iecur* habet pallidum, magnum, & teneberrimum, dum coquitur in densam pinguedinem facessit. Noctu ex internis partibus cæruleus è longinquo splendor, imò ignis splendidissimus enitet. Grunnire dum capitur, dicitur. Pinguedo ejus est multa & candidissima; linquefacta, lucernis inservit, solo pisculento odore molesta.

Ælian.  
H. A. l.  
15. c. 4.  
Plin. H.  
N. l. 32.  
c.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 3. c.  
44.

Oppian.  
Halieut.  
l. i. v. 6.

Ælian.  
H. A. l.  
10.  
Oppian.  
l. i. v.  
367.  
Oppian.  
l. 5. v.  
37.  
Ælian.  
l. c.

Tab.  
IX. l. 2.

Gesner.  
de Piscib.

Tab.  
VII. 8 9.



molesta. *Speciem aliam Gallus quidam Venetiis descripsit.* Iconem exhibeo. Forma, inquit, in orbem vergebat. Corio sine squamis, &c.

An huc Piscis Cadamusti suem referens dolium crassitudine, duo longitudine superans, formæ obrotundæ, suilla cute, Oculis parvis, edentulus, loripes, branchiis brachii mensuram excedentibus, cauda longa, & lata spectet, aliis judicandum relinquo.

### ARTICULUS III.

#### De Cartilagineis planis.

#### PUNCTUM I.

##### De Torpedine.

Tab. IX.  
3.4.5.6.

**A**bsolutis Cartilagineis longis, ad Planos progredimur, primus occurrit *Torpedo*, quæ veteribus Græcis *νάρκη* & *νάρκα*, ad differentiam affectus, *θαλάσσια*; modernis *τρυπαίνα* & Margotir, Alberto *Stupefactor*; mixto barbaris, *Torpigo*, *Terpigo*, *Stupor*, *Stupefaciens* & *stupefcor*, dicitur. Ex Cartilagineis planis esse, ex Aristotele & Plinio habemus. Lævem, apud Athenæum legitur. Cortuptus Aristotelis locus ex quo colligitur spinosa. nec vacat errore Cardanus. Duo olim ipsius genera, *Nigrum* quod ad capitis dolorem commendatur, & subruffum, seu ad rubricæ colorem accedens. In *Maculosas*, & *Non maculosas* optimè dispescuntur. Triarum illarum genera. *Macula* in quibusdam diversarum figurarum & albicantes, huc & illuc sparguntur, in quibusdam quinæ rotundæ, nigricantes, pentagoni figurâ locatæ, oculos tam egregiè repræsentant, ut Oculatam Plinius dixerit; benè dictum Bellonius defendit. Omnium corpus si caudam exceperis orbiculare est, senas libras vix excedunt, molli & lubrica cute teguntur. Venter est subalbidus, *dorsum* subflavum, & ad rubricæ fabrilis colorem accedens, partes quæ ad caudam mediis corpulentiores apparent. hæc *cartilaginem* quandam tabidam in seipsis habere videntur. *Ore* sunt in supina parte parvo, ante quod foramina duo odores deferunt, dentibus minutis & ferratis. Oculis in superiore parte antèrè exiguis, quos retrò foramina duo, ipsis grandiora, patula, & in palatum pervia. Cerebro non carent. *Lingua* destituuntur: *Branchie* in medio sunt corpore (ob ipsius tenuitatem ad latera locari non poterant) utrinque quinæ & detectæ, quarum orificia parva & semicircularia, tenui quadam cuticula conteguntur: *pinnæ* juxta caudam duæ; pro reliquis latitudine utuntur, & utroque sui corporis semicirculo quasi pinnis natant, podex in caudæ exortu, ipsa brevis & latiuscula. *Intus* Carnosum habent ventriculum: *intestinum* breve & amplum. *hepar* pallidum, & in duos lobos divisum.

*Fellis vesica* illaque magna hepati committitur & dextro annexa lobo, in sinistrum quoque venulas quasdam immittit. *Lien* est parvus & subrubens. Uterus oblongus & bifidus. *Habitant* in mari, locis cœnosis. reperiuntur & in Nilo. ut haud male in Marinas etiam & Fluviales, distinxeris. Piscibus *vescuntur*, quos astu, ut post dicam, capiunt. *Pariunt* circa æquinoctium, & quidem ova intra se præmollia, quæ in alium locum uteri transferunt, & excludunt. Sic animal pariunt, pua concipunt. Octogenos foetus habens, inventa est. Hyeme propter frigus in terra *latent*. Latitudine sua quasi geminis pinnis *feruntur*, natant sed ægrè, nam *νατὴς* *βραδυὶτις* *βαρύνονταί*, *pigra tarditate gravantur.* ideo *βελῶν* *κερδαλέων*, & *πολυμήχανον* Natura concessit. Singularis ipsis torporem vel tremorem inferendi, unde nomen habent, facultas. Mersæ in limo se occultant & pisces, qui securi supernatantes obtorpuere, corripunt. Idem procul & è longinquo, vel si hasta virgave attingantur, quamvis prævalidos lacertos, torpidos, & quamlibet ad cursum veloces pedes, alligatos reddunt. Et illi, qui rete, in quo una ex iis capta fuerit, attigerint, torporem patiuntur, quod Æliani fide dictum sit: & si inter mortuos pisces vivens torpedo sese moveat, qui tacti fuerint, interno quodam motu cientur, ut videantur vivere, quod Godignus de rebus A byssinis prodidit. In totone corpore, quod Salviano placet, an parte, quod Diphilus, Oppianus & Cardanus prodidere, incertum. Exiguam plerarumque, quæque quavis corporis excitatione refellatur; nec totum corpus infestantem, Gillii & Kircheri experientiâ docemur, ut vel inde Albertum, qui hoc veneno hominem interfici prodidit, refellere liceat. Causam in cæcam facultatem, quod mortua eadem destituitur, coniecere alii; in narceticam & insensibilem qualitatem, nervis & masculis contrariam alii.

*Ufus* Torpedinis in *cibis* commendatus à Galeno & aliis, quod carnem mollem, jucundam, & mediocriter per ventrem subeuntem habeat; à Diphilo & aliis rejectus est. Partes duntaxat quæ circa caput laudantur. Venetiis ne in foro piscario vendatur, præfecti sanitatis autoritate cautum est. Genuæ, Massiliæ, & alibi à tenuiore fortuna experitur. In *Medicina* diuturnis capitum doloribus admoveatur: & sedem prociduum coercet. idem apud Marcellum Empiricum invenies. fortè & arthriticos demulcet; eodemque modo Anteroëa Cæsaris libertum supra fidem podagram curasse, Scribonius Largus testatur. & Diaturpænos ceratum apud Æginetam ad podagram habemus. Mirum, si verum, quod de ea Plinius, si capiatur cum Luna in libra fuerit, triduoque asservetur sub dio, facilis partus facere postea, quoties inferatur. fortè quod velut induciis dolo-

Oppian.  
l. c. H.  
lieut.

104.  
Athen.  
Dipn. l. 7.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.

51.  
Arist. H.  
A. l. 5. c.  
12.

Oppian.  
Hal. l. 2.  
v. 58.

Plin. H.  
N. l. 9. c.

42.  
Oppian.  
Halieut.

l. 2. v. 55.  
Arist. H.  
A. l. 9. c.

37.  
Plin. H.  
N. l. 32.

cap. 1.  
Ælian.  
H. A. l.  
9. c. 14.

Athen.  
Dipn. l.  
7. Opian.  
Hal. l.  
22. v. 55.

Kicherus  
l. 3. Ma-  
gnet. ar-  
tis p. 6.

l. 4.  
Gal. l. 3.  
de Alim.

Diosco-  
rid. l. 2.  
mater.  
medi.  
c. 17.

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 10.



rum datis, natura ad excludendum foetum firmatur. Corium nuper decorticatæ, si par-  
ti matricis prolapsæ involvatur, ipsam redu-  
cere, Aëtius ex aliis habuit.

## PUNCTUM II.

De *Pastinaca marina*.Tab. IX.  
7.

**Q**uem Græci *παραγία*, seu ut D. Ambro-  
sius vertit, *Turturem*, ab alarum ex-  
pansarum similitudine vocant, is Latinis  
*Pastinaca marina*, seu à colore, seu quod ra-  
dio ceu pastino instrumento fossorio fo-  
diat & pungat: Gallis *Raja*, ob similitudi-  
nem quam cum *Rajis* habet, dicitur. Duas  
ejus species Bellonius & Rondeletius agnove-  
re. hic capite tantum & rostro differre ait:  
ille in *larvem*, cujus cutis perpolita, dorsum  
liver in corticis platani modum, venter al-  
bicat, plurimis veluti striis, per carnem hinc  
inde deductis; & *Asperam*, quæ tota acu-  
leis horret, atque ad caudam præsertim per-  
multis uncinis in gyrum dispositis scatet;  
disperdit. Magnitudine vix denas libras su-  
perant. Corpore sunt quadrilatero, ventre  
albicant, dorso livent. Superiore parte ali-  
quod capitis vestigium antè cernitur; ca-  
piti palustris ranæ non absimile: in eo non-  
nisi oculi oblongi & grandiusculi, à quibus  
foramina bina, oculis majora, semper pa-  
tula, in palatum deducuntur, pars oculis  
anterior in rostrum carnosum acuitur. Os  
habet parvum & edentulum, (mendum in  
Dioscoride, si dentes habere innuit) so-  
laque maxillæ asperitate illorum vice uti-  
tur. *Pinnis* carent circa caudæ exortum  
unum orbicularem si excipias, ideò latitu-  
dine sua natant. *Branchias* in medio ferè  
ventre quinæ, in partibus flaccidis & carne  
vacuis, (partes circa caudam mediis parti-  
bus carnosiores habere, cartilagineis pla-  
nis commune est,) sitæ sint. *Caudam* ha-  
bent longissimam, spinosam, muris caudæ  
per similem. Crassa primum, paulatim in  
magnam tenuitatem stringitur. super eam, in  
medio ferè aculeus, osseus, longus, acutissi-  
mus, & ferratus, quincunciali magnitudine,  
Dioscoridi *κέντρον*, Horo Apollini *ἰκάνθη*, Plinio  
radius eminet.

Quantum ad interiora, Ventriculum  
habet parvum, angustum, cui, quia satis  
ab ore dissitus est, *stomachus* præponitur:  
idem in ecphyfin à qua breve & gracile inte-  
stinum dependet, quod aliud initio angu-  
stius, mox sensim latius, dein priusquam  
maximè dilatetur, angustum postremum in  
tectum intestinum desinens, & unde excre-  
menta porracei coloris rejiciuntur, desinit.  
*Iecur* amplum, ex albo flavescens, in duos  
lobos, quorum dexter latior & major, si-  
nister brevior & minor, divisum. *Fel* he-  
pati annexum, ex viridi flavescens. Ute-

rum oblongum, quo ova continentur.

*Degunt* in cœnosis maris locis. Carnibus  
vescuntur & latrocinantur ex occulto, tran-  
seunt radio (quod telum esteis) figentes;  
nec quenquam attingunt, nisi telo suo vul-  
neratum.

Ex insidiis venari, quod Mugilem velo-  
cissimum piscem assequantur, argumento  
esse potest. *Cœunt* ut *Rajæ*, ad motus invicem  
non solum partibus supinis, sed etiam tergo  
foeminarum supinis marium, superpositis.  
Foetus aliorum cartilagineorum more non  
recipiunt. Id enim acuties caudæ prohibet.  
*Volatum* quoque exercere, falsò apud Ælia-  
num dicitur: sed radii sui veneno se tueri,  
tam certum, quam Musicæ dieteris & sal-  
tationibus delectari, ambiguum videtur.  
De ejusdem radii venenositate non est quod  
dubitemus. Nullum usquam execrabilius,  
arborea, infixus radici, necat, arma, ut telum  
perforat, vi ferri & veneni malo, non tamen,  
ut nulli remedio, quod Ælianus prodidit,  
succumbat; & necesse fuerit Leonidam, By-  
santium ictum occumbere. Benè radii cinis  
cum aceto vulneri admoveatur, feliciter fur-  
fures in eodem cocti auxiliantur. Lauri de-  
coctum, Theriaca Andromachi, Galeus,  
cum quo inimicitias gerit, haud frustra adhi-  
bita. Cauda, quæ idem intulit, in arborem,  
quercum inprimis, infixa, aut de eadem su-  
spensa, emarcidam eandem evadere, sanari  
ægrum, Aëtius prodidit. De *Usu in cibo*, ne  
falsò Galenus mollem & jucundam carnem  
ejus faciat, vehementer metuo, gustus in-  
suavem & ferinum quid resipientem, testa-  
tur. In *Medicina* mitigat dentium dolores  
radius, quos frangit & extrahit. Torreri eum,  
mox conteri resinaque excipi, debere, apud  
Celsum legimus.

## PUNCTUM III.

De *Aquila*.

**Q**uid per Aquilam piscem, seu *ἰκτίον* ve-  
teres voluerint, difficulter sciri potest,  
planum duntaxat, & cartilagineum, animal-  
que parere, ab omnibus proditum est, an ra-  
dium aliquem in cauda habuerit, nec ne,  
reticuere. Non mirum itaque in diversa  
recentiores trahi, & unam à Salviano, quam  
Rondeletius alteram *Pastinacæ* speciem fa-  
cit, duas ab Aldrovando, monstrosam à  
Bellonio & Paræo describit; *Salvianiana*  
magnitudine trecentas libras non superat.  
Lævi & molli cute tegitur, inferiore parte  
alba, superiore livida. *Caput* habet exertum,  
capiti bufonis simillimum: oculos magnos,  
rotundos & prominentes, post quos bina,  
magna, & patula foramina insculpta sunt. Os  
supina parte mediocre & denticulatum. *La-  
tera*, quæ acuta, expansas volantis Aquilæ alas  
æmulantur. In caudæ exortu utrinque una

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 42.  
Ovid. in  
Haliæur.  
l. 2. v.  
472.Aristot.  
H. A. l.  
5. c. 3.Arist. H.  
A. l. 6.  
c. 10.  
Ælian.  
H. A. l.  
8. c. 26.  
Ælian.  
H. A. l.  
9. c. 40.  
Idem. l.  
1. c. 30.  
l. 17.  
c. 18.  
Ælian. l.  
1. c. 56.  
Ælian. l.  
2. c. 50.Galen. l.  
3. Alim.Diosco-  
rid. Mar.  
Med. l.  
2. c. 22.Tab. IX.  
8. 9.Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 24.



parte & rotunda pinna exoritur, in *maribus* ex utroque podicis latere, una appendix pendet. Cauda pastinacæ tenuior & longior; in dorso paulo post principium pinnatam unam erigit, atque hac deinceps *aculeus* osseus, longus, acutissimus atque ferratus, eminet. *Intra*, Jecur est subflavum, lien subater. Aldrovandi *prior* videtur *ἀνίφαλον*, latissimis alis, qua corpori hærent cæruleis, in extremitate rubris. *Altera* supra oculos & in fronte aculeata est, in cauda binos gerit radios. Cœnosa hi pisces in mari loca incolunt, resupinati piscibus aliis vescuntur, quos ex occulto figunt. Vivos fœtus cartilagineorum more pariunt. Radio lædunt, ideo publicè cum eo non divenduntur. Caro quia tetrum & gravem spirat odorem, à mensis exulat. Quæ de lapide in capite ejus à Kiranide scribuntur, fabulosa sunt. Beiloonii verè monstrosus est. descripsit eum Gesnerus: Piscis hic rarus (inquit) & ignotus omnibus. & Paræus volentem facit, rostro viridi.

Tab.  
XII. 2.

## PUNCTUM VI.

*De Rajis in genere.*

Tab.  
X. 12.

Plin. H.  
N. l. 23.  
c. II.  
Arist. H.  
A. l. 2. c.  
13.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
24.

Ælian.  
H. A. l.  
13. c. 4.

**R**Ajarum nomen fortè à radendo Latini sumfere. Græci à quadam cum rubo similitudine, sunt dorso asperæ, ut recurvas supina parte rubus, spinas gerit; *βατρυ* marem, fœminam *βαλιδά* dixere. Plinius Græco vocabulo utitur. Ex cartilagineis & planis esse nullum dubium. Albertus in pectinum genere posuit. Tria vero illarum apud antiquos *genera*: *βατρυ* unum simpliciter, *λεϊόκαλον* Alterum Aristoteles & Galenus vocavere, *stellatum* Athenæus addidit. Rondeletius postquam in *laeves* & *asperas* easdem divisisset, mox stellulis notatas, iisque carentes addidit, & ex *asperis* alias modicè tactum vellicante lanugine, alias robustis sed raris aculeis; quasdam robustissimis & densissimis asperari dixit. Magnitudine inter se differunt, bicubitales aliquando Salvianus vidit, haud minores Ægolicæ clypeo in India nasci, Ælianus prodidit. Cuticulari teguntur operimento, omnibus membranula, quam nebulam vocant, *oculus* obtenditur. juxta oculos foramina sunt magna ampla, ad oris usque intima patentia, quibus operculum interiore parte à natura additum est. Ore aperto dilatantur, clauso magna ex parte occluduntur. *Cauda* omnibus procera atque aspera, in ejus dorso duæ pinnulæ, totidemque, sed exiguæ & orbiculares ad ejusdem exortum. Quod cartilaginei generis plana, pinnis destitui scripsit Aristoteles, illas quibus natando corpus impellunt, intellexit, quæ ad caudam, dirigendi itineris grata data sunt. Si quid in contrarium apud eum occurrit, mendum in causa *βατρυ* pro *βατρυ* legendum est. *Interiora* si lustremus, *fellis* omnibus in hepate vesica. *splen* in ventri-

culi plexu; intestina crassa; in ecphyfi & recti intestini extremo angusta, genitale vitulæ marinæ simile. Circulatorès ex exciscatis Draconum & Basiliscorum figuras effecerunt, sic plebeculæ imponunt.

Tab.  
XII. 1.

Commoda Rajis in cœnosis maris locis, non procul à littore *habitatio*. Hyeme latent, & quia numerosæ capiuntur, gregales haud malè colligas.

*Coëunt* non tantum admotis invicem partibus supinis, sed etiam tergo fœminarum supinis marium superpositis, nec inter suum duntaxat genus consistunt. Cum Squatina quoque *coire* scripsit Aristoteles. Gerunt utero testacea quædam, testa tibiæ ligulis similis est. Pariunt animal, cum primum ova intra se pepererint. *Ova* quæ flava, sine testa primum in superiore vulvæ conspiciuntur, quædam magnitudinem ovorum gallinæ æquant, alia his minora, nonnulla cicoris magnitudinem non excedunt, plura centenis in singulis aliquando numerantur. Quæ à perfectione propius absunt, in inferiorem matricis partem dimissa, restâ, & in qua albumen & ovum continentur, operiuntur, quadratiformia hæc, demptis angulorum, quæ variæ sunt appendicibus. Unius lateris appendices longiores, sunt foliis gladioli herbæ similes: alterius, breviores, latiores, replicatæ, quibus undique summotis, laterum anguli, tibiæ repræsentant ligulas. Unum aut ad summum duo pariunt, quod maximus earum in mari proventus, infinita ovorum in superiore vulvæ parte series facit, ex quibus tempore perfectis, iterati fœtus excluduntur. Abditas, pinnas exertas movere specie vermiculorum, allapfos ad eas pisciculos capere, sic tarditatem motus astu compensare Plinius auctor est. Aristoteles radiolos vocat. Mendum tamen hisce locis subesse, suspicio est, cum nec pinnas nec radiolos habeant, vel pinnas Plinius impropriè vocavit, & radiolis ab Aristotele tributum, quod rostri acumini competere videtur. Olaus quondam depingit; quæ homini in septentrionali Oceano circumvento suppetias tulerit. *Usus* etiam in *Cibis*. Copiosioris nutrimenti & concoctu difficiles Galenus facit. Rondeletius de Rajæ bonitate quæsitus; perinde ac si quis pallium elixum comedat, respondit. Archestratus scapulas & hyeme laudat. Laterum extremas partes à divitibus comedi, reliquas plebi relinqui, ex Gesnero habemus. Apud Hollandos potissimum elixantur, butyrum, acctum, & sinapi condimenti loco sunt. Caseo & Silphio veteres condiebant. In *Medicina* auri- bus fel est utilissimum, hepate ad pruritus feliciter Rondeletius usus est.

Tab.  
XII. 4.

Plin. H.  
N. l. 9. c.  
42.

Galen. de  
victu at-  
tenuante.



## PUNCTUM V.

De *Rajis Lævibus*, & in specie de *Lævi Raja*, *Undulata*, & *Oculata*.

Tab. X. 1.  
2. 3. 4. 5. 6.

**R**ajæ in Læves & asperas optimè distinguuntur: Inter illas; quarum aliæ acuto, aliæ obtuso rostro sunt, prima est quæ simpliciter Græcis, *ΛΕΥΙΡΑΙΑ* Latinis, *Mucosa*, & à lata fascia qua mucus seu potius coryza in laborantibus excipi solet, *Barvosa* Romanis dicitur. Omnium est sui generis piscium post bovem maxima.

Corpore quidem tenui, sed in amplissimas alas expanso. Cute ab aculeis nuda. Uterque oculus, media dorsi linea, & cauda tenuioribus & raris aculeis muniuntur, sed & in supina parte quidam in os, quod latum est, cibi sine dubio retinendi causâ, recurrunt. *Rostrum* tenui & pellucida cartilagine, constat. Alæ utrinque expansæ tenues sunt, & prono parte nigricant. *Cauda*, quæ tribus aculeorum ordinibus, instruitur, tota supina parte alba est. Rima quæ podici, pudendum muliebri refert: Quam Aldrovandus describit, maculis supina parte nigris undique variabat. *Rostri* pars in obtusum angulum, figura depressa, & quasi quadrangula tendebat. Branchias quinque detectas, habebat. Inter cutem & peritonæum albida caro mucosa, panniculi carnosum vicem obtinebat. *Intra*, *hepar* erat in latitudine ventris, ex albo rufescens, tribus lobis, linguarum figuram referentibus, quorum medius brevissimus, distinctum. Sub hepate figuræ planæ ventriculus, pars convexa ad sinistrum vergebat latus, concava in spinam. *Mesenterium* ad connexionem ventriculi & intestini medio hepatis lobo colligabatur, sub ventriculo caro cernebatur rubicunda, lienis fortè vice fungens. *Cor* thoracis sinu exiguo triangulari, exiguum, trunco unico veluti pediculo appensum continebatur.

**R A J A U N D U L A T A** à maculis flexuosis ita dicta, à colore *Cinerea* dicitur. Corpus ovi potius est, quàm Rhombi formâ, pronâ parte multis sinuosis lineis describitur. *Aculei* in linea dorsi pauci, parvi, & rari; circa oculos nonnulli; in cauda majores & densiores triplici ordine disponuntur.

**R A J A O C U L A T A** & lævis, *Asterias* quibusdam, sed perperam dicitur. Nam & *Galeus* à maculis, *Asterias* à maculis stellatim dispositis ab Aristotele nominatus est; quales in ista minimè deprehenduntur; & *Asterias* veterum tenerior est bonique succi, quod de hac dici non potest; & Galli hoc genus *Miralet* à speculorum parvorum similitudine vocare solent.

## PUNCTUM VI.

De *Oxyrincho majore* & *Raja stellari*.

**D**UO OXYRINCHORUM genera Tab. X. 8. (à rostri acumine ita dicuntur) Rondeletius facit. *Majorem* unum, *Minorum* alterum. Bos ille Bellonii est; non quod quadrupedem repræsentat; sed quod Rajarum generis maximus, ad Bovis magnitudinem excrescat. Ligures *vaccam* vocant, in quibusdam Galliæ locis *Eleno*, quasi subulam, quod piscis rostrum tale sit, dicitur. Ex planis cartilagineis Bovem esse dubitari non debet. Ad duodecim ulnas latitudinis excrescere, Oppiani autoritate affirmo. In descriptione non conveniunt Authores. Dorso, facie, lateribus admodum niger est. Supinæ partes albicant, si Æliano credendum. Bellonius toto corpore lividum facit. Eidem dentes habet truces, hami in modum inflexos, triplici ordine in maxilla dispositos, eosque mobiles. Oppiano sunt obscuri & exigui. Æliano ad eò inclusi, ut in conspectum non veniant. Rondeletio Major *Oxyrinchus* minori similis est, alis amplis & extusis, ipso corpore strictiore, acutioreque Dorso longiore. *Aculeorum* in sola cauda unicum habet ordinem. Pelagii sunt Ovidio boves; in cœnosis locis degunt Oppiano; Æliano in lutosus gignuntur. Piscibus *vescuntur*, sed humum maximè appetunt. *Pariunt* statim animal. Corpore etsi sint magno, ideo quibusdam inter Cetaceos, imbelli tamen, mollitie conscii, sola corporis mole feruntur, sic & piscantes pondere suo opprimunt, & capti, renituntur. Carne sunt quam cæteræ molliore, & sale fumoque cænditi exsiccantur, exsiccati diu incorrupti remanent.

**OXYRINCHUS** *Minor* corpore est maximo, & maculis multis lentis specie, notatur. *Dentes* habet in os vergentes. Ad oculos quatuor aculeos; in cauda tres eorum ordines, diversos & inæquales; primus medii ordinis major est secundo, tertius primo, quartus secundo respondet. Utrique per transversum recti sunt, ad latera conversi, qui per hos sequuntur in cauda extremi, in caput recurvantur. In supina parte rostri, alii sunt ad capiendos pisces recurvi, alii acutiores. Cæteris partibus cum reliquis conveniunt. Ad *Oxyrinchos* referri debet ille, quem Gesnerus Venetiis accepit, corpore cinereo, maculis distinguantibus fuscis, ambitu corporis subruffo, Normannis Hal, Lusitanis Huga dictus.

Iconem hic vide.

**R A J A S T E L L A R I S** lævis, Græcis *Asterias*, quam Gellius *Rajam oculatam* esse vult, capite, dorso, & cauda ab aliis distinguitur. Dorsi pars prona alæque expansæ,

Arist. H. A. l. 5. cap. 5. Plin. H. N. l. 9. c. 24. Oppian. Halieut. l. 2. v. 143. Ælian. H. A. l. 1. c. 19.

Oppian. l. c. v. 145.

Ovid. in Halieut.

Arist. H. A. l. 6. c. 12.

Tab. X. 9. Tab. XII. 7.



fa, stellulis eleganter depictæ conspiciuntur. Aculei in eodem mox à capite incipientes, in priorem caudæ pinnulam desinunt. *Caput*, quia crassius & latius, Pastinacæ quàm aliis Rajis similis est. Cauda tenuis, & quàm reliquis brevior.

## PUNCTUM VII.

*De Rajis Asperis: & in specie de Raja aspera Stellari, Oculata, & Clavata.*

Tab. X. 4. 5. 6. 7. Tab. XI. 2. 3. 4. 5. **R**AJA ASPERA STELLARIS tota aculeis horret. In oculorum intervallo multi sunt, breves, frequentes, peracuti: in medii dorsi linea alii magni, in cauda tres magnorum ordines, alii plurimis & minoribus distincti, infiniti alii sine ordine per totum corpus resperguntur, pro *dentibus* ossa dura & aspera gerit. Duæ hujus generis esse videntur. Una quæ stellulas habet in medio albas, sed quas ambit circulus ex nigris punctis constans, totumque corpus aculeis horridum est. Altera, stellulas prorsus candidas, cum multo paucioribus aculeis obtinet.

OCULATA lævi maculis similis est. Aculeos in alis extensis è regione macularum utrimque habet, alios in lateribus capitis utrinque, alios in dorso, in cauda, majores, frequentiores, & validiores visuntur.

Raja CLAVATA duplex est. Una quam Massilienses Clavade, Galli alii Rajæ bouclier vocant. Corporis specie reliquis est similis, sed multo brevior minusque acuto, &c. Colore nigricante, alis valde expansis. Hepar habet flavescens in duas partes dissectum, in quo vesica, fel aqueum & tenue continens. Pingue est illud, & inter cibos delicatissimos, in oleum resolutum, hepatis duritiem resolvit. Carne est durum. Posset Aquilæ conferri.

Alterà à superiore differt (Verba sunt Rondeletii, cui multas Rajarum species debemus, ) &c. Congener hisce est & illa, Cujus icon Venetiis ad Gesnerum missa est. Maculis distinguitur fuscis, reliquum corpus obscure subluteum est, reliqua apparent.

## PUNCTUM VIII.

*De Raja spinosa, Aspera Fullonica, & Asperrima.*

Tab. XI. 5. Aldrov. de Piscib. l. 3. c. 59. **R**AJA SPINOSA Gallis Cardaire, quasi Lanifica, à spinis seu aculeis quorum multi infixi sunt instrumentis quibus lana carminatur, figura corporis lævi rajæ similis est, si longas cutis spinas excipias. Spinæ non in alis solum habet, ut clavata altera, sed etiam in lateribus circa caput, duo ocu-

lis præfixi sunt, & in media dorsilinea, & ad priorem usque caudæ pinnulam continuus est aculeorum ordo unicus. Carnis substantia & succo ab aliis non variat.

ASPERA, illa à Rondeletio cognominatur, quæ à cæteris eo differt, quod *aculeis* parvis latera conspersa habet, corporis verò truncum nullis. *Rostrum* est acutius. In cauda tres sunt longorum & firmissimorum aculeorum, ad extremum usque caudæ ordines.

Rajæ FULLONICÆ ab eo nomine inditum est, quod ubique in alis, corpore, capite, cauda, tota frequentissimis aculeis conspersa sit, instrumenti illius, quo fullores pannos poliunt instar, quod totum aculeis ferreis confectum est. *Rostrum* est satis longo & acuto. Caudæ aculei incurvi sunt, triplici ordine dispositi. Rara est, & pugnacissima esse creditur.

Raja ASPERRIMA, à præcedente eo tantum differt, quod non solum prona, sed etiam supina tota aculeis peracutis ita horret, ut manu tolli non posset, nisi pinnulis cauda apprehensis, ideo supina in icona exhibetur, pro *dentibus* maxillas habet asperas & osseas.

## PUNCTUM IX.

*De Rana marina.*

**R**ANA marina. Græcis βατραχὸς θαλασσίος, Plutarcho βατραχὸς ἀλιδός nomen ranæ ex eo forte meruit, quod gyrinas sive ranulas recens editas, & imperfectas, oculis quidem & cauda notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes, & caudæ fissura, referat. A venandi olertia *Piscatrix*, quod & à Plutarcho factum, ob scædam corporis monstrositatem *Diabolus marinus* Dalmatis, ob oris hiantis amplitudinem, *Lamia* Siculis, ob carnis molliem *Maltha* Bellonio, sed perperam, dicitur. Magnitudine est ubique ferè pedali & cubitali, alicubi tricubitalem inveniri, Salvianus author est. Cute capitis, *aculeis* exceptis, lubrica & molli, infernâ parte subalbida, superna verò ex nigra flavescente tegitur. Unde molles, Ovidio, tergore Ranæ. *Caput* habet toto corpore longè grandius, ut nihil in eo præter caput & caudam conspicias aculearum, asperum, orbiculatum atque depressum. Os in promptu, seu anteriori parte, secus ac aliis cartilagineis, vastum, pro corporis proportionem grandissimum, ac quàm maximè hians. *Dentes* permultos magnos, acutissimos, in os recurvos, utrique maxillæ, duobus palati ossibus, & linguæ radici infixos. Bellonius mobiles, albos, & confusis ordinibus dispositos facit. *Maxillæ* ipsi rerusi, semicirculares, quarum superior brevior est, inferior longior & prominens.

Lin-

Tab. X. 7. Aldrov. libro cit. cap. 60.

Tab. XI. Aldrov. lib. cit. 61.

Tab. X. 6. Idem. c. 62.

Tab. X. 8. Vossius de Idol. l. 4. c. 28.

Arist. l. 3. de generat. c. 3. Aelian. l. 13. c. 2.



*Lingua* maxilla superiore longior. Membrana quædam gingivarum interiore parte enata, & in os complicata, quæ à maxilla separari non videtur. *Oculi* ampli in capitis vertice potius quam in temporibus siti, *aculeis* sepiuntur: Ante eos duæ propendent appendices, tenues, albæ, tetri odoris, si Oppiano credimus. In medio nasi *pinna* oblonga prædura, & versatilis, visitur: à cujus extremo musculus quidam ceu cirrus instar fili subtilissimi deducitur, per ejus cavum humorem certum in fundum usque cirri derivant, ubi coacervatus ad vivi vermiculi similitudinem tumet. Omnia hamum piscatoris exactè exprimunt. Parvæ ex rostro albicantes carunculæ, eminentia sub oculis cornicula Plinio, fili capilli speciem referentia, postremis quibusdam præpilatis, Aristoteli; gracilia quædam cornua Bellonio; pilli Gilio; geminæ regidæ albæque setæ Salviano, dicuntur. *Branchias* neque detectas, neque supina parte cæterorum planorum cartilagineorum more, sed in lateribus, non spineo operimento, sed cuticulari intactas habent. *Pinnas*, contra cartilagineorum planorum morem, in medio corpore, ubi cauda capiti jungitur, membranaceas & crassiusculas duas, propter amplitudinem partis superioris: in superiore caudæ parte una non admodum lata, sed longiuscula conspicitur. A capite illicò *cauda* sequitur, rotunda, brevis, carnosæ in pinnam, rotundam, crassiusculam & latam desinens. Ex hujus & capitis lateribus, appendiculæ cornosæ, certis intervallis à se distantes, dependent, quæ, natante ranâ, supernatant. *Intra*, si spectes, *peritonæum* vidibus nigrum; *ventrem* magnum, carnosum, appendice utrinque unica & brevi instructum; *intestina* gracilia, multis gyris circumvolata; *hepar* parvum, rubescens, in quinque lobos, ut Bellonius scribit, divisum. (Rondeletius sectum negat) eorum utrinque bini ad latera protrahuntur. *Fellis* vesica longo meatu ex hepate propendens, intestinis annectitur. *Vulva* est bifida, anfractuosa, duas ulnas longa, tribuit & vesicam, sed nescio quam verè Bellonius, & addit, totidem in Rana numerari cartilagineas, quot in quovis sceleto, ossium animalium terrestrium formas referentes, quæ prorsus medullâ, præter vertebrae careant; totidem item nervorum conjugamenta in ejus cerebro, multò tamen liquido, numerari, quot in reliquis animalibus numerantur. *Ventriculus* & interanea, si per os eximantur, corpusque quod ejus fieri potest, distendatur, totum perlucidum, & instar carbunculi fulgens evadit, immissoque lumine, laterna horrendo aspectu apparet. *Locus* ipsi herboisæ maris partes & litus. *Cibus* carnes humanæ etiam. Videntem aliquando virili membro apprehensum in profundum detraxisse, Gesnerus se audivisse refert. Con-

tra cæterorum cartilagineorum morem, ova, non animal pariunt. Caput corpore grandius & aculeatum in causa, quod ut aditui, sic exitui, ineptum est. Ovum unum solidum, durumque ut foris servetur, cum cæterorum cute molli tegantur, Aristoteles prodidit. Universa simul juxta terram edunt, ortus cum iis, quæ extra perficiuntur, & iis, quæ intus idem. Numerosius quidem scætificant: sed quia de facili pereunt, pauciores reperiuntur. Aliquandiu extra aquam vivere, Rondeletius testatur. Visa duos in littore dies inter herbas vixisse, vulpeculæque terrenæ noctu victum quæritantis pedem, dentibus arripuisse, & ad auroram detinuisse. *Solitarias* esse ex eo, quod plures una capi non soleant, colligitur. Plana quamvis, non sola tamen latitudine natat, sed pinnulis etiam, quas in lateribus habere dictum est. Singulari in venando astu utuntur. Inter saxa conditæ, aperto immani rictu, mentitum vermiculum musculo annexum, per pinnam in faucium rictum conjiciunt, eo viso pisciculi ceu ad escam accurrunt, rictum, cavitatem alicujus saxi reputantes subintrant, piscatores retracto, qui vellicatur hamo, orisque rictu clauso, totum pisciculorum gregem devorant. Macilentiores, quæ præpilatis villorum capitibus destituuntur. *Ufus* earum in cibo fere nullus. Insula, mucosa & ferina saporis carne præditæ sunt. Anaxandrides tamen eas in Cotyis Thracum Regis convivii reponit. Ventrem inter lautissimos cibos Anthiphanis recenset. In *Medicina* fel adversus suffusiones utile est. Quod strumas utiliter pungi, piscis ejus qui Rana in mari appellatur, ossiculo de cauda, ita ut non vulnerentur; idque fiat quotidie donec percurentur, apud Plinium occurrit; Rajarum potius aculeis convenit. Nullum enim ossiculum Rana habet. Diversa est ab istis tum illa castanei coloris, ventre candicante; tum Rana *Minor* dicitur. Tota tam supinè quàm pronè asperâ cute tegitur, supinè aculeata est, & albicat, pronè colore est cinereo. *Os* habet exile & planè edentulum: *Caput* erectum & velut cornu in extremo procerum, sub eo cuteus nervus, quem velut ex vagina exerere, rursusque contrahere videtur. *Oculi* ad latera ubi angustum valdè caput, velut in fovea quadam latent. Foramina olfactu distincta, supra os coeunte extremitate hærent, auditui inservientia oculis sunt contigua. Pinnas ex icone cognosces.

## PUNCTUM X.

## De Squatina.

**S**quatina pisces, Græcis, *Squatus*, Tab. XI. Quod sit squammis acutis, Isidoro, *Lima* Tab. VII. *Falle*, *Celtes* in veteri lexico, dicitur. Media inter Mustelos & Planos à Rondeletio ponitur. Magnitudine ad centum sexaginta sæpe

Aquil.  
lib in.  
Ran.  
Aristot.  
H. A. I.  
2. c. 13.

Aristot. f.  
l. 3. de  
gener.  
c. 3.  
Aristot.  
H. A. I.  
6. c. 17.

Alia.  
H. N. I.  
9. c. 24.  
Plutarch.  
l. intr. a-  
nimalia.  
Aristot.  
H. A. I.  
9. c. 73.  
Oppian.  
Hal. l. 2.  
v. 90.

Plin. H.  
l. 37. c. 8.

Kircher.  
l. 3.  
Art. Ma-  
gnet. p.  
6. l. 5.

Oppian.  
Halieut.  
l. 2 v. 90.  
Aristot.  
H. A. I.  
9. c. 37.

Aristot.  
H. A. I.  
2. c. 13.

Ovidio  
in Ha-  
lieut.  
Martial.  
l. 10. c.  
37.  
Gesne-  
rus de



Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 12.

sæpè libras excrescit. Coloris est pronè cinerei ad fuscum vergentis, asperrima: ut cute lignum & ebore poliantur, supinè alba & lævis. Partem corporis anteriorem habet latam, circularem, retusam, ut *rostro* prorsus careat. *Os* prima parte obvium, brevibus sed acutissimis, iisque aliter quàm in aliis piscibus dispositis *dentibus* munitum. Maxillarum ossa in angulum obtusum desinentia, in lingua extrema carneum tuberculum. Ex superioris maxillæ extremo, quod cute non integitur, apophyses duæ in alias divisæ demittuntur. Post oculos, qui in superioris capitis parte, ad latera parvi, foramina ad os usque patentia visuntur. *Pinnæ* utrinque binæ sunt. & utræque in lateribus. *Cauda* longiuscula in aliam lunatam pinnam desinit. *Mares* à fæminis appendicibus cartilagineis, quæ circa anum, distinguuntur. Intra nihil à cæteris cartilagineis differt. *Hepar* habet in duos lobos divisum, in quo *fellis* vesica felle viridi plena latet. *Lienem* mediocrem ex rubro nigricantem. *Cor* angulatum, compressum, & unico sinu instructum. De dentium situ ita Rondeletius, sunt eorum ordines, &c.

Arist. H.  
A. l. 2. c.  
25.

Oppian.  
Hal. l. 1.  
v. 380.  
Arist. H.  
A. l. 6. c.  
11.  
Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 51.  
Arist. H.  
A. l. 6. c.  
11.  
Arist. H.  
A. l. 5. c.  
9.

Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 37.

Oppian.  
Halieut.  
l. 1. v.  
742.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 3. c.  
66.

Plin. H.  
N. l. 27.  
c. 10.

*Cœnosa* incolere *loca* Oppianus prodidit, in alto veruari apud Rondeletium legitur. *Coit* etiam cum *Raja*. *invocat* nascitur, inter se mutuò partim iupinarum attritu. *Bis parit* autumnò occasu vergiliarum, qui partus secundus est; primus enim verno fit tempore, sed secundus felicior. Singulis fœturis septeni aut octoni prodeunt. Singularis & his in venando astusest. Obruunt se arena, sic latentes verberant oris vi radios (pinnas exerere vermiculorum specie apud Plinium extat) his pisciculi visis, quasi ad algam adnatant, sic capiuntur. Colorem mutare & piscium quidem solas, prodidit Aristoteles; quod nec corpore sint pellucidæ, nec cute ita tenui, ut humorum spirituumque perturbatione varii earum colores perluceant, negavit Rondeletius. Concedi in metu potest. Nam & tum in hiatum pinnis subjectum recipiuntur fœtus, ut apud Oppianum legimus, in ventrem recipi Aldrovandus credidit. Rejiciuntur à *mensis*, quod flatuum crassorum humorum provenit, quod cartilagineis omnibus commune, proferant. Unde oculorum acies obtunditur. Olim Smyrnæ secundum Dorionem, Mileti secundum Archestratum ortæ, cæteris preferebantur. In *Medicina* invenere in tertio tabis genere locum. Oleum ex hepate ad hepati duritiem confert. Ova exsiccata sistendo alvi profluvio. Ex cute optimum fit in psora & scabie smegma. Illitæ mammas crescere non patiuntur, si Plinio fides est; duriusculas reddi, utrumque experientiam comprobasse, Rondeletius author.

## PUNCTUM XI.

De Squatino raja & Lámia.

**P**iscis qui *SQUATINORAJA* dicitur Latini, Græcis *πίσκαλη* ex Squatina & Raja procreatus creditur, Parte priore Rajæ similem facit Aristoteles, posteriore Squatinæ. Absurdum id Rondeletio, quod & Philosophus dubius pronunciet, & ex Galeno fieri secundum naturam non posse, ut tantopere dissidentia corpora commisceantur didicerimus. Stant tamen ab Aristotele plærique, Bellonius, Gellius, Jovius, Aldrovandus, Columna præcipui. Castelletus nudum ejus sceleton misit & paucis ita descripsit. Neapoli frequens est, quod miror, &c.

*LAMIAM*, quæ *παρά τοῦ λείμου* à gula quibusdam dicitur. Nicander *Carchariam* & *Scyllam* vocari scribit, Rondeletius eandem cum Cane Carcharia facit. Plinius inter Cartilagineos planos enumerat. Descriptionem ejus nemo veterum suppeditat. Maximam evadere, cute integri scabra os in anteriore capitis parte habere, *dentibus* plus minus ducentis in utraque maxilla per quaternos versus dispositis, ad radicem latis, in acutem & pyramidem desinentibus, ad latera crematis, refertum Bellonius prodit. Verè an falso, non dixerim. Generis Galeorum certè, qui longi pisces sunt, eandem pronunciat.

## PUNCTUM XII.

De Lumpo Anglorum & Pisce gibboso.

**P**iscem qui Anglis Lumpus, quasi massa informis dicitur, sic describitur à Turnero. Piscis edulis est Lumpus noster, &c. Dorsum rubicundum, ventrem album habere, & in magnis deliciis reputari Maslarias addidit. Nos eum molli & in ore diffuente carne, esse experti sumus, cum Andreapoli in Scotia studiis operam daremus.

Piscem *GIBBOSUM* Græci *γαλίδανον* vocant, reperitur in mari Balthæo corii portiuncula, quam Fabricius Gesnero misit. Crassiuscula & tenax est, punctis multis seu tuberculis exasperatur. Eminent etiam Spinæ quædam ceu rubi, sed mucrone recto, pyramides formâ, aliæ magnæ, aliæ parvæ ex fusco albicantes. De sua pictura sic Gesnerus, &c.



## TITULUS II.

De Piscibus Marinis Saxatilibus.

## CAPUT I.

De Saxatilibus Squammosis.

## ARTICULUS I.

De Scaris.

**A**bsoluta Pelagiorum natura, Saxatiles sequuntur, inter hos primos *Scarus*, qui seu *από το σκαίρειν* id est, tripudiando, seu quod Athenæo placet, quod inclusis nassis, crebris caudæ ictibus, qui *σκαρδαμοι* seu *σκαρδαμοι* vocantur, aversus, fores laxat, atque ita retrorsum erumpat; seu quod algam, aliasque herbas depascatur; *σκαίρειν* enim interdum est *νέμεται*, ita dictus; *Meyrix* quoque, seu *Ruminax*, ut Scaliger vertit, ab Aristotele quod latis utriusque maxillæ dentibus solus ruminet, *Cerebrum Iovis* Ennio vacatur. Serò olim Romanis & toti Italiæ visus; ideò nec latinum piscis nomen habetur. Duo illius sunt genera, *unum* quod *όνις*, benè ab Onisio distinguendus, quod asino concolor sit, dicitur. *Alterum*, qui *αίον*, ex Nicandro Thiatyreno nomen imposuit Athenæus. Oppianus modò *σκαίρειν*, modò *βάνον* cognominat. *Onias* squammis est magnis tenuibus, colore ex cæruleo nigrescente, ventre candido; Sargo, corporis forma ad rotundam accedente, aculeorum pinna- rumque situ, & numero, similis, maculâ dun- taxat nigrâ, in cauda, & quod lineis nigris in dorso ad ventrem careat, distinguitur. *O- culos* habet magnos, supercilia coloris Indi- ci.

*Dentes* hominis modo planos imo solus latos, superioribus dentibus carere, quod Michael Ephesius prodidit, falsum, si *Meryx* est, & habere compertum. *Branchiæ* ipsi binæ, simplices alteræ, alteræ duplices, plu- ra & majora in maxillis ossea tubercula.

*Cauda* lata in duas pinnas non divisa. *Cor* angulatum, *hepar* album in tres labos divi- sum, à quo *fellis* vesicula intestinis alligata pendet. *Fel* coloris nigri. *Splen* ater, *ventricu- lus* cum quatuor appendicibus parvus. *Αίον* seu *Varius* oculis, ventris inferiore parte, in qua podex, purpurei est coloris, cauda coloris Indici, reliquo corpore partim ex viridi, partim ex nigro cæruleo. Squam- mis veluti notis obscurioribus aspersis. Ore mediocri, *dentibus* latis in superiore maxilla densis, in inferiore raris & acutis. *Ventre* in medio duabus purpureis notis insigni. A dorso & cauda ferè *aculei* tenui membrana connexi, æquis intervallis dispositi, con- spiciuntur. In singulorum summa parte membranula pendet vexilli instar. *pinnae* ad

branchias sitæ latæ sunt, & veluti ovi ea fi- gura. Intus habet *ventriculum* latis capa- cém; *hepar* subalbum, intestinalata & mul- ta, fellis multum, *splenem* magnum. *Quem* *Bellonius* in *Creta* observavit, corpore erat ex livido rubescente, squammis latis & trans- lucidis. Capite utrinque compresso, *denti- bus* obtusis, quorum incisorii nostris erant perfimiles. gula non valdè magna. Ad caudæ latera appendices transversas atque eminentes, quales in nullo se observasse pisce ait, utrinque habebat Gigantes Scarus, dentes habebat utrinque quatuor. Latos in inferio- re maxilla, in superiore ferratos. *Locum* si at- tendas, Asiæ Græciæque littoribus Sicilia tenus frequentissimus exit, nunquam in Ligusticum, nec per Gallias enatavit, in Ibericis mare, In mari Carpathio est sem- per obviis, & quod miramur promonto- rium Troadis Lecton nunquam sponte tran- siit. nullibi tamen quàm in mari rubro fre- quentior. *Bellonius* in Propontide, Ponto & Hellesponto, Galliæ littoribus, & in Ocea- no inficiatur capi, in Euripo Aristoteles, Archestratus tamen maximum circa Byzan- tium evadere prodidit. In Creta circa eum ubi ladanum colligitur locum, tam frequens, ut nullus crebrius capiatur. *A Carpathio ad- vectos*, Claudio Tiberio Principe, (Octavium Macrobius vocat) è libertis ejus præfectus classis, inter Ostiensem & Campanie oram, sparsos disseminavit. *Quinquennio* ferè est cura adhibita, ut capti redderentur mari. Postea frequentes in veniebantur Italiæ in littore, non ante ibi capti, admovitque sibi gula sapes pis- cibus satis, & novum incolam mari dedit, ne quis peregrinas aves Romæ parere miretur. Saxatilem esse vix dubitandum. Si Oppia- nus dum inter littorales recenset, contra- rium innuere videtur, vitium est, & benè *σκαρ- δαμοι* pro Scaris legitur. In dulcibus quoque nu- tritum aquis innuere Columella videtur, nisi pro Scaris Squalum legi debere velis. Sanè haud perperam ex Varrone id conjicere li- cebit. *Vicitat* herbis, & algæ pisis, phaeo- lisque plurimum inhiat Mercuriali adeo, ut ea capiatur. Pythagoras *Τρυγηδόν* facit, si Gyrardo fides est. Diphilus tamen carnivo- rum esse & lepores marinos captare scribit, nisi error committitur. potius namque Mullo ista quàm Scaris conveniunt. quod solus inter pisces ruminet, superius dictum est. *Gregales* esse vel exinde quod sodales è nassis liberare conentur, colligas. Caudam capitis morden- dam porrigunt. apprehensa educunt. Quod noctu non capiuntur, vigilantia ipsorum debetur. malè Galenius ideò solùm inter pisces dormire scripsit. Melius dices, solere

Εὐνήσιον καὶ ληστὴν ὑπὸ καὶ θάλασσιν ἵαυεν,

alicubi somnum nocturnum sublatebris ca- pere, sic insidias vitare. Salacissimum esse Ælianus prodidit, ideò sceminæ capiuntur.

Colu-  
mella R.  
R. l. 8. c.  
17.

Plin. H.  
N. l. 9. c.  
17.

Aristot.  
H. A. l.  
9. c. 17.

Plin. H.  
N. l. 9. c.  
17.

Oppian.  
Halient. l.  
1. v. 109.

Colu-  
mella l.  
8 c. 16.

Varro de  
R. R. l. 3.  
cap. 3.

Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 2.

Plin. H.  
N. l. 9. c.  
17.

Oppian.  
Hal. l. 2.  
v. 109.

Ælian.  
H. A. l. 1.  
cap. 2.

Athen. l.  
8.

Ælian.  
H. A. l.  
2. c. 54.

Plutar. de  
solert. a-  
nimal.

Ælian.  
H. A. l.  
1. c. 2.



Aristot.  
H. A. l.  
4. c. 9.

*Parere* bis in anno fatendum. hoc Saxatilibus commune. *Vocalem* esse, quod apud Athæ-  
næum Oppianum Tzetzem proditur, du-  
bium, cum pulmones non habeat; nisi ore  
aquam impellendo sonum edere dicamus.  
*Usus* si attendamus, in delicatissimis olim  
apud Romanos cibus erat; & jecinora eorum  
in Vitellii Principis patina inter lautiores  
primitias enumeratur. Primas inter Saxati-  
les tenere, & mollis ac friabilis carnis esse,  
Celsus. nullum videtur dubium: quamvis Celsus &  
Philotimus aliter credidisse putentur. Inspi-  
dos esse nisi cum suis facibus edantur, credi-  
tum apud Græcos. Jecur in cibo sumptum  
Ælian. ictericis prodesse, apud Ælianum legi-  
mus.  
H. A. l.  
14. c. 2.

## ARTICULUS II.

### De Turdo.

Tab.  
XIII. 5.  
6. 7. 8. 9.  
10. 11.  
Athen.  
1. 7.

**T**urdus Græcis *τιχλη* à macularum simi-  
litudine sic dictus, *πελιδανυμ* olim te-  
ste Nicandro & Pancrate apud Athenæum  
fuit. Duo ipsorum *Genera* constituit Salvia-  
nus, *Majorem* & oblongum, qui vel viridis  
vel ruber est. Rondeletius duodecim spe-  
cies pinxit. Veteribus, apud Athenæum  
*μελανόστιχλον*, seu nigris oculis varius. Erato-  
stheni *πέρκας* seu nigro distinctus, Pancrati  
*οινάδης* quasi vini colorem referens, Nume-  
nio *αλειδης*, id est purpureus dicitur. Pha-  
vorinus *πικροστιχλον* vocavit. Mutare tamen  
colorem dicuntur. Circa ver magis exsatu-  
ratos, dilutos magis æstate videas. Bran-  
chias ipsis quaternas Aristoteles tribuit om-  
nes duplici ordine excepto novissima. Quin-  
que sunt ab Aldrovando observati, duode-  
cim à Rondeletio. *Primus*, qui magna  
ex parte aureus, amethystino, cæruleoque  
ac rubro variat, os intus habet ruberrimum,  
dentibus carens. Oculos maximos, quorum  
auream pupillam circulus ambit niger, ni-  
grum rursus aureus, aureum cæruleus, hunc  
iterum aureus, ac tandem niger, alias omnes  
ambit. Habet & duas è mento dependentes  
apophyses cutaceas, subflavi coloris. tres præ  
cæteris lineas sanguineas, & denticulatas.  
Pinnae ad branchias omnino aureas, in pe-  
ctore totas cæruleas, nervos earum aurcos.  
Cujus coloris sunt & illæ, quæ ab ano, in  
dorso & cauda, qua uropygio junguntur,  
maculis duntaxat parvis sanguineis resper-  
sas, cæteras cæruleas conspicias. *Secundus*  
ad latera non nihil albicat. in capite vermi-  
cularibus, alibi rotundis, ubique cæruleis  
maculis insignitur. Tergoris pinna ex aureo  
ruber, sicuti & cauda, quæ in extremo cæ-  
rulea est. Utrinque dentatus est. *Tertio* Cor-  
pus subviret, venter albicat. Squammarum  
extremities cæruleæ sunt. *Caput* pro corpo-  
ris proportionem parvum, totum cærulei sed  
dilutioris coloris, præter branchiarum  
opercula, quæ candicant, maculisque

Aristot.  
H. A. l.  
8. c. ult.  
Aristot.  
H. A. l.  
2. c. 13.

oblongis & semicircularibus aureis con-  
sparguntur. Eiusdem coloris lineæ decus-  
satim & transversaliter per corpus ducun-  
tur. Dentes habet, maximos, acutissimos,  
ingentemque oris rictum. *Quartus* toto  
corpore sanguineo, aureoque distinguitur.  
dorsum & corporis maculæ ex cæruleo ni-  
gricant. *Quintus* *πολυχρῆμος*, totus ruber  
saturatus. Maculæ in extremo tergore  
conspiciuntur, orificiis non absimiles, sunt ni-  
græ, in capite longæ, & serpentis in mo-  
rem ferè contortæ, cæruleæ. Lineæ à  
capite ad caudam recta ductæ, rubræ  
sunt.

Turdus *Rondeletii*. *Primus* admodum  
varius est. Vnde *διολ* dictus. ad auratæ  
figuram accedens, pinnarum situ numero-  
que cæteris saxatilibus similis, dorso fusco,  
ventre ex albo livesciente. Dentes habet  
recurvos, labra crassa, & rugosa. Oculos  
sub quibus pars variis coloribus est illustris,  
magnos & rotundos. Pinnae ad branchias  
aureas, ad podicem & in tergo flavas, ni-  
gris cæruleisque maculis asperfas. *Alter*  
colore est ex viridi cæruleo, & quia co-  
lorem colli Paræus in pinnis & in cauda re-  
fert, Pavo dicitur. *Tertius* qui Pulcher  
dicitur; & à quibusdam *ferculum regium*,  
multas colorum differentias habet. Viri-  
dis est magna ex parte, sed punctis pur-  
pureis, cæruleis, Indicis, & aliis confu-  
sis coloribus conspersus. pinnis ad bran-  
chias flavis seu ruffis, aliis omnibus partim  
cæruleis, partim viridibus, partim ruffis.  
Branchiarum operculis punctis & lineis ruf-  
fis, sinuosis, certis spaciis dilutis. Cauda  
ruffa punctis cæruleis, notata. Romæ & in  
Levino Insula frequentissimus est. *Quartus*  
circa Monspelium Psittacus, ab eadem co-  
lorum varietate dicitur. Dorso est nigres-  
cente, pinna ejus virescente. Ventre & la-  
teribus flavescens. A branchiis ad cau-  
dam lineæ virides ducuntur. Pinnarum in  
ventre infimæ cæruleæ sunt. *Quintus* Go-  
bionem flavum refert, hoc solo, quod li-  
neam albam ab oculis ad caudam ductam  
habeat, & maculis nigris, quibus Gobius  
asperfus est, careat, distinctus. *Sextus* quin-  
to est similis, nisi quod huic rostrum sit lon-  
gius & aquilinum, & linea ab oculis ad cau-  
dam ducta cærulea. *Septimus* coloribus va-  
riis est insignis, dorso aureo, viridibus ma-  
culis consperso, ventre candicante, lineis  
ruffis & tortuosis, nullo ordine dispositis  
notato, labris viridibus. Cauda & pinnis  
magna ex parte cæruleis. Branchiarum o-  
percula purpureum quiddam habent. forte  
Scirrhis Wottoni, *Octavus* solis lineis in ven-  
tre sese interfecantibus ab isto distinguitur.  
*Nono* color est viridescens & flavus, linea  
ab oculis ad caudam alba, cum multis aliis  
aurei coloris confunditur & obliquatur. *De-  
cimus* colore est viridi. Extrema operculi  
bran-



branchiarum & pinnarum ventris purpura sunt. Oculi sunt rufi; os parvum, venter ex albo flavescit. A Monspeliensibus Menestrior, hoc est Tibicen vocatur. *Undecimus* inter Turdos maximus, ad Lupi magnitudinem accedit. Colore est rubricæ, qua pro terra Armenia utuntur. multis nigris & magnis maculis respergitur. Ventre plumbei coloris. *Duodecimo* caput est cæruleum, dorsum virescens. Linea viridis & tenuis, à branchiis ad caudam porrigitur, in extremitate macula rotunda insignis. Quem Gesnerus observavit, ita ab eodem describitur: Dorsum & laterum dimidia pars superior, fusci sunt coloris, maculis crebris, subnigris, variantibus. Lineæ: Inter Saxatiles esse Galenus & Diocles nos docuere. Non quælibet tamen Saxa amat, sed quæ prope littora sita, musco & alga obducantur. nec longè ab hoc domicilio recedit. In Ponto cum Merula desideratur. Non solis herbis vel alga vivere; sed interdum pisciculis, loliginibus, & aliis crustaceis pasci, Salvianus author est. Hyeme aliorum saxatilium more latere ajunt. quo tempore etiam foetificant. A Merula specie non differre, hunc marem, illam foeminam esse, inter Oppiani errores poni potest. Singulare idem en eis conjugalis amoris exemplum, notat. Mortuo marito progressæ de thalamis foeminæ, errant, communemque cum iisdem mortem appetunt. Carnem habent mollem, teneram ac friabilem, ut Galenus prodidit. Trallianus cibum fastidientibus eum commendat, & Ptisanam marinam vocat. Platina quovis modo coqui, sed assum sinapum requirere scribit.

## ARTICULUS III.

De Pavone Salviani, &  
Leprade.

**P**AVO piscis, quem Salviano debemus, cujus & Ambrosius & Isidorus Hispalensis meminere, diversus est à Pavone Philostrati, qui in Phaside Indiæ flumine reperitur, & cæruleas quasdam cristas, squammas versicolores, caudamque auream in quacunque voluerit partem versatilem, habet. Romæ *Papagalo*, à Lusitanis *Budia* vocatur. Bilibris sæpè est, ad cubiti mensuram perrarò ascendit. figura corporis, lacust. Tincæ absimilis non est. Squammis latis tegitur, & variis coloribus depictus est. Corpus enim ferè totum, inæquali varietate viret. Ventris pars posterior viret ex albo, anterior ex albo livet. dorsum & cauda, ex viridi nigricant. latera ex viridi partim flavescunt, partim livent. *Caput* quod crassum est ex cæruleo viret, maculis que quam plurimis rubenti-

bus, nonnullisque cæruleis piscem totum nulla habita ordinis ratione pingentibus. *Rostrum* extensum, sed non acutum. *Labia* crassissima, quorum superius duplex apparet. *Oculos* magnos & aureos. *Branchias* utrinque quaternas, & juxta eas *pinnas* latas & rotundas, duasque alias minus latas in ventre. In dorso una satis longa erigitur, cujus anterior pars stricta & aculeis munita est: posterior latior & aculeorum experts. A podice, qui in medio ferè ventre una quoque, duobus aut tribus innixa aculeis, per imum ventrem ad caudam explicatur. *Cauda* in unam pindam latam ac ferè rotundam violaceam & maculis atque lineolis plurimis cæruleis insignitam desinit. *Interiora* si spectemus, *ventriculum* habet magnum, appendices multas, *intestina* ampla, *hepar* subalbidum, cui fellis vesicula hæret. *Lienem* subatrum. *Victus* ipsi præter algam, & alia marina excrementa, pisciculi. Solitarius est, & sæpe singuli capiuntur. Verno in primis & autumnali tempore, fortè quod æstate ob caloris, hyeme ob frigoris impatientiam lateant. Ignobilis inter cibos censetur.

**LEPRAS** seu *Pforus* quod iisdem præditus sit suggillationibus quibus qui lepra & pfora laborant, sicut nonnullis, sed metu ne perperam videtur dictus, *Lelepris* Latinis, si vera prodit Rondeletius dicitur. Ex Turdorum est genere: Vix ad dodrantem in mari Adriatico excrecere solet, cum pedem & amplius in Oceano excedat. Totum corpus habet maculis nunc cancellatis, nunc rectis, nunc in obliquum sparsis variegatum. *Squammas* ad oram rubore suffusas, latas. *Caput* non ita multis coloribus cancellatum, quod lineas hinc inde ductas, ex cæruleo, viridi, ac rubro mistas, ostendit. *Oculos* parvos, rotundos: iridem oculorum aëri similem, quam si quando in gyrum contorqueat, cyaneum, deinde aureum, tandem argenteum circulum in crystallini coloris fulgorem referre conspicias. *Os* ipsi parvum, *dentes* albi, acuti. *Maxilla* superior tubi in modum cranio infarcitur, ut penè duo labia carnosæ esse credas: *lingua* alba & penè soluta. Continuum tergoris *pinnam* gerit, sedecim aculeis munitam, atque aliam sub ventre ano vicinam. Omnes *pinnæ* transparentes sunt, molles, leves, rubro, cæruleo, viridi, & aliis coloribus maculatæ. Linea quæ piscibus utrinque latera dividit, nequaquam in hoc pisce recta procedit, sed à superiori branchiæ angulo arcuata secundum tergus deducta est: mox ubi tergoris pinna desinit, illuc quidem linea reflectitur & arcuatur, deinde rectà per mediam caudam defertur. Quantum ad *internas partes* peritoneum habet album, *hepar* ex pallido lacteum, ad sinistram magis protensum, tribus,

Tab.  
XII. 13.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 1. c. 5.

Tab.  
XIII 12.  
Ambros.  
Hexam.  
Philo-  
stratus l.  
3. de vita  
Apoll.



lobis, uno tantum longo duobus brevibus, constans. *Lienem* planum, oblongum, minoris digiti magnitudine, rubrum. *Intestina* ejusdem capacitatis, ut propriè stomachus in eo videri non possit, semel à stomacho ad anum revoluta, multisque omentis obducta. *Lactes* copiosas, & vulvam bicornem. Hanc ex Bellonio, qui eundem cum *Marzapani* dici credit, fortè quod æquè in deliciis ob carnis suavitatem appetatur, ac panis Martius vulgò dictus. Est tamen alius Marzapanis piscis, qui *Rosa* dicitur, & totus maximè in dorso rubet, minus in ventre.

tur. sub crepusculum vespertinum (nocte fieri scribit Oppianus) intermissa custodia, cibum exquirunt. solæ conjugum quæ sunt intus, algas in cavernis & circum petras ad victum reperiunt. Mortuo mare, foras egrediuntur, quæ semper antea domi manebant, fœminæ. Impetuntur à Squilla. ideo piscatores, cum eos fœminas observare vident, Squillam vivam hamo affixam demittunt. Merulus, dum se de illo ulturum sperat, arripit, sic capitur, & exigui animi voluptas fit ultio.

Ælian. H. A. l. 1. c. 15.  
Ælian. H. A. l. 1. c. 14.  
Oppian. Halieut. l. 4. v. 190.

Tab. XIV. 1.

#### ARTICULUS IV.

##### De Merula.

Tab. XIV. 2.

Athen. l. 7.

Aldrov. l. 1. de Pisc. c. 6.  
Ælian. H. A. l. 12. c. 28.

Aristot. H. A. l. 8. c. 15.  
Plin. H. N. l. 9. c. 15.  
Columel. de R. R. l. 8. c. 16.  
Ælian. H. A. l. 1. c. 14.  
Plin. H. N. l. 9. c. 15.

**M**erula, Oppiani interpreti & Apicio *Merulus*, Plinio medico prodente Bellonio *Piscis Aspratilis*, Venetis *Tincamarina*, Græcis *κρίνις* & *κρίνις* dicitur. De illius colore dissentiunt authores, Numenius apud Athenæum *Nigram* cognominat. Oppianus *αἰθάλει*. Varinus *μελανόσικλον*, vocant. Salviano & Rondeletio ex colore Indico & cæruleo nigricant. Hic & sexu distinguit; in mare, colorem ad violaceum magis accedere, fœminæ ex vario nigrescere, scribens. idem colorem Indicum aut purpureum exsaturatum nigrum ab antiquis vocari, quod purpuram nigram. Circæam flore nigro, qui tamen purpureus est, aut Indicus, prodidit. Invenitur & quoddam genus dorso nigro, ventre Indico, quibusdam partibus cæruleis. Aldrovandus totum viridem exhibet. Virentem & Ovidius reliquit: Colorem mutare apud Ælianum legimus. Omnes in eo conveniunt. Tincas figura corporis referre, & squammas latiores quam Turdum, vertebrae dorso valdè erectas habere. Hoc unum in ejus Anatomia dignum occurrit, quod cum *hepar* habeat album, in duos lobos grandes divisum: fel tamen exerat tenui vasculo inclusum, & revolutionibus duplicatum, cujus longitudo est sesquipedalis. Quam Aldrovandus describit, magis in cauda, obscurius in dorso virescit. Pinnarum extremitates cæruleas, branchiarum opercula in fine rubentia habet. Oculorum pupillam circulus ruber, rubrum cæruleus ambit. Inter Saxatiles in quæ Petris stabulant ab Aristotele & Plinio referri certum est, quibus & alii accedunt. Pontum tamen non intrant. *Vescuntur* iisdem quibus Turdi. Comestum vero primo tentant & premunt, mox jacere sinunt. ubi non palpitare viderint, devorant. *Generationem* quod spectat, marium quisque cum multis congregitur fœminis. Medicam aut Persicam vitam agere diceres. Zelotypia semper vehementer laborant mares, cum partus tempora instant maximè. Fœminis domi quiescentibus, incubant quasi illi foribus, ne insidiæ tendan-

#### ARTICULUS V.

##### De Julide.

**I**ulide, piscis Synesio *ἰουλὴ*, Hermippo Smyrnæo *Hicca*, quo nomine Hermolaus Sturiorum intelligi arbitrabatur, aliis *Iurellæ*, & *Iura*, dicitur. Quia non una ipsorum species, ideo in descriptione variari, non mirum. Rondeletio digiti non excedit magnitudinem. Varius est, dorso violaceo. Squammistegitur parvis pinnarum numero, situ, labiis dentibus recurvis, cauda, aliis saxatilibus est similis. A capite ad caudam subauream lineam cinctam habet, hinc inde rostri modo dentatam, cui pars quæ subest colore est cæruleo, ventre candido flavescente. Bellonius addit, corpore esse gracili & oblongo; tanto in tergore *colorum* varietate, ut in eo iridem utrimque depictam videas. Squammistenuissimis, multorum colorum, super quibus ductæ lineæ rectæ, cæruleæ, virides, melinæ, rubræ ac fuscæ apparent, contegi. Caudam rotundam habere. Salviani descriptio ista est. Julis rostro est acuto, &c. Saxatilibus accenseri ex Oppiano coligimus. Antipoli & in toto Ligustico sinu frequentissimum esse, nec Adriatico mari infrequentem Rondeletius prodidit *Vescuntur* minoribus pisciculis, & eorum inopia, alga. Voraces Numenius testatur. Singulares in saxis vivere prodidit cum Salviano Bellonius, gregales facit Aristoteles. Cavent sibi ab hamo, haud tamen escam sæpè præripiunt. Os veneno refertum habere, & in piscatu urinatores & piscatores pertinacissimè persequi, eorumque sanguinem appetere, clarè ab Oppiano & Æliano affirmatur. Lævia, quæ in adversum Aldrovandus protulit. Ægris in albo jure elixari, sanis in sartagine frigi & assari prodidit Salvianus, fortè si caput amputatum. Jus alvum emollire apud Dioscoridem; urinas apud Plinium reperio.

Tab. XIV. 3.

Oppian. Hal. l. 1. v. 124.

Aristot. H. A. l. 9.

Oppian. Halieut. l. 2. v. 434.  
Ælian. H. A. l. 2. c. 44.  
Dioscor. in facile parabil.

#### ARTICULUS VI.

##### De Phycide.

**P**hycis, qui forte à Phycene solo sexu differt, *Fuca* Theodoro, dicitur. Nostri temporis Græci *Phycida*, ut Gellius ait, *Pho-*

Tab. XIV. 4.



*Phocida*, ut Rondeletius, *Phyceam* ut Massarias, *Pephycatismenam* ut Hermolaus, *Lampianam* ut Bellonius, appellant. Nomen, quod in musco marino (φυκος λευκόν ἐρυθρὸν διαχέον Neophyro & aliis) nidificet, invenisse creditur. Idem est cum Tinca marina & pisce Ficu, Romæ vocato. (nomen huic quod passus ficus instar, carnis sit mollissimæ & succiplena) Rondeletio refragatur Salvianus, & illum ipsum esse, qui ob magnam cum Perca marina similitudinem Percia dicitur, contendit: nec abludit Aldrovandus. Sane æque repando est uterque tergore, color idem est. Rostro acuto & extento, pinnarum situ, numero, & figura conveniunt. Non credendum tamen eosdem prorsus esse. Caput crassius Phycidi os majus, majoribusque dentibus in superiore maxilla munitum. Venter non ita prominet. Pinnæ parvis & ruffis maculis non insigniuntur. Lineis transversis nigricantibus, quibus Percæ latera notantur, caret. In capite & branchiarum operculis, lineolæ & puncta quædam cærulea, conspiciuntur. Marem nigriorem & squammis amplioribus dixit Aristoteles, sed nec idem perpetuo color. Verno tempore satur, reliquis dilutior videtur. Quod ἀναλυσεν apud Athenæum dicit, de aculeis quibus dorsi vel imi ventris spinæ horrent intellexisse, dicendum est. quia nunquam palmi magnitudinem excedunt, ideo φουκίδια ab Aristotele dicuntur. Bellonius non unum genus esse ostendit. Vidisse enim se fuscis, rubentes, virides, πικυχρας testatur. Addit, omnes pinnam tergoris continuam, duodecim aculeis munitam, rursus ad branchiarum latera utrinque unam, & sub ventre duas, quarum singulæ squammis tegantur latis, firmis, sæpe uliginosis, gerere; dentes in superiori maxilla utrinque ad latus unum vel duos videri; in inferiore plures; retro in maxillis molares multos. Omnibus lacteum est jecur, ad sinistrum magis extensum, fel lateri dextro, oblongo folliculo inclusum, colore subluteum, incumbit. Inter saxatiles Aristoteles, Plinius & Diocles posuere. λιμνῆτιν Suidas vocat. & Ovidius inter littorales recenset. Luto, alga, & musco, quod καυρίον vocatur, vescuntur; & quanquam cætera abstineant carne: squillas tamen sæpissime appetunt: Parituræ, Nidum ex alga sibi construunt, in eoque pariunt. Sic foetus contra tempestates tuentur. Bis anno parere Aristoteles author est, Eunuchos apud Oppianum dici falsum. Cynædum enim piscem illis verbis verecundo circumscribit. Laudantur à Xenocrate in cibis, Diphilo etiam ἀπαλώτατα ἰχθύδια ἐὶν ὀφθαλμοῖς, tenera carnis pisculi, ac faciles concoctu, dicuntur. Sed & Hippocrates inter raram & levem carnem habentes recenset, eumque viri mulierosi, seu αἰσθητοὶ φρονέοντες, ἐπιανεμίζω & cognomentum à piscatoribus ferre, innuit. Recensentur & in

Cotyis Thracum Reges convivio, hodie procerum patinas raro implent.

## ARTICULUS VII.

## De Perca marina.

PHycidi PERCAM, quæ Græcis πέρις, Tab. Dioscoridi & Paulo Æginetæ πέρις, licet Plinius in piscium catalogo pro diversis habuisse videatur, dicitur, & nomen à colore, quem Græci πέριον dicunt, sortita est, propter similitudinem de qua superius subjungemus. Nota ipsi cum paucissimis piscibus communis, quod transversis per tergus lineis conspergatur. Propter istam varietatem Aristoteli est γραμμωπείριον, ut apud Athenæum invenies, quod eadem vivida, ἀνδρίστρας Matroni Parodo dicitur. Duo vero ipsius sunt genera, Fluviatile nempe, de quo postea, & Marinum. Marina nunquam ad eam ad quam fluviatilis, magnitudinem excrescit. Ex colore veluti sanguineo nigricat, & unam duntaxat eandemque continuam pinnam in tergore habet. Squammis tegitur parvis. Venter livet, latera purpurant. Tergus ex flavo nigricat. Aldrovandus tres proponit. Prima caput, pennæ, cauda ex rubro flavescunt, seu potius aureo perfunduntur. Supremum dorsum ferrugineum est, deinceps flavescit, mox per latera & ventrem albicat quidem, cæterum maculæ amethystinæ albedinem operiunt, Pinnarum tergoris nervi argenteo colore, reliquarum & caudæ aureo perfunduntur. Lineæ transversales quæ à dorso per latera descendunt, ad instar labentis ex alto aquæ, argento emicant. Os habet intus album, labra rubicunda. Altera, quæ Majoris nomine venit, rostro intus & extra rubet, in ambitu flavescit. Tergus ruffescit. latera & venter albicant. Squammarum extremitates rubent. dorsi pinna tota, & toto fere in extremo crocea. qua Uropygio hæret, dorso concolor est. Branchiarum opercula flava, latis vermiculatisque lineis cineritiis conspersis suggillantur. Tertia insigniter dentata est. Tergus & caput ex cinereo flavescunt. Pennæ & cauda nigricant. Latera cærulea. Venter ad amethystinum inclinat. Lineæ laterales obscure rubescunt, quæ vero à branchiis ad caudam feruntur, in dorso rufæ sunt, reliquæ virides. Degit circa moscosa & algosa saxa. Ad littora Oceani Germanici dum reperiri Albertus scribit, de petrosis duntaxat & asperis id intellexisse credendus est. Saxatilem esse ex Galeno, Plinio, Oppiano, & Diocle clarum est. Carnibus vescitur. Tam mas quam foemina saxatiliu more hyeme conditur, quo tempore quoque fatiscat, Marsilius Ficinus celerrimi cursus esse prodidit. In cibis salubritatis laude resplendet, hinc proverbium vetus ἀντὶ περὶς σκερπίον, cum optima posthabentur: sed saporis insulsi gratia rejicitur.

Tab. XIV. f. 6. &c. Aldrov. de Piscib. l. I. c. 94

Oppian. Hal. l. I. v. 121.

Oppian. Hal. l. I. v. 121.

Arist. H. A. l. 8 c. 15. Zenob. Diogenian. & Suida.



Plinius in *Medicina* invenisse usum testatur. Nam cinerem è capite falsæ, addito melle, verendorum pustulas discutere. eundem admixto sale, cunila & oleo vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere prodidit.

## ARTICULUS VIII.

De Channe, & Canadella.

Tab.  
XIV. 10.  
II. 12.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. I. c. 9.

**C**HANNE Græcis χάνη si foemina, χάνη si mas, dicitur: (χάνη & χάνη corruptum esse videtur) quibusdam *Hiatula* ab hiando nomen inditum habet; non quod morientis tantum hiet, ut Bellonius credidit, sed quod mandibulas ita constitutas habeat, & perpetuo hiare videatur. hunc Epicharmus μεγαλοχάμινος vocavit. A Speusippo Percæ & Phycidi ob colorum varietatem confertur. Unde Aristoteles citante Athenæo, ποικιλόχρουν μάστιγαν, & ποικιλόχρουν appellavit. De figura nihil apud veteres occurrit. Tantam ei cum Perca similitudinem tribuit Bellonius, ut pisces pene eosdem esse credas, & pro iisdem vendantur. Salvianus rostri acumine, pinnarum situ, numero, & figura, oculis, branchiis, cauda, atque pictorato corpore, Percæ & Phycidi similem Channen prodidit mediocritate oris, parvitate dentium, tenuitate capitis, exiguitate Squammarum ovata totius corporis figura, Percæ. Colorum varietate, inferiore maxilla, & branchiarum aculeis, manifestè ab utroque distinguitur. Tergus Channæ ex rubro minus quam illarum nigricat. Venter & latera violacea quodam albedine notata sunt. Pinna dorsi flavet, quæ vero in imo ventre est, & cauda, rufis maculis insignitur. Ab ore per branchiarum opercula & latera, rubræ quædam lineæ, neque æqualis latitudinis, neque æquis distinctæ intervallis usque fere ad caudam deducuntur. Maxilla inferior non solum rubet, sed superiore etiam prominentior est. ideo perpetuo hiare videtur. In posteriore branchiarum operculi parte duo sunt aculei albi & acutissimi, non magni tamen, quibus Phycides & Percæ destituuntur. Ventriculus & intestina ampla habet, *hepar* subalbidum. *lienem* subrubrum. *Calculos* in capite gerit, quod ex Bellonio habemus. *Locum* ipsi in pelago Aristoteles assignavit; sed Oppianus in saxosis degere docuit. nec piscatorum experientia abludit. Sola carne *vescitur* carcinis inprimis, & dum per impetum pisces insectatur, sæpe in os ventriculus procidit. *Sexus* discrimen ambiguum in eis. Omnes enim vulvas habere traduntur. & omnes ovis capiuntur gravidæ. Rem se ita habere, ex plurimarum sectione Rondeletius didicit, inusitatumque hunc conceptum plurimæ horum piscium fecunditati adscribendum retur. Mare ova perficit, & vice maris fungitur. De CANADELLA, sic Martegue itagui accolis vocatur

tur) sic Bellonius: Ligustico mari cognitissima Canadella elegantem ac varium habet colorem, &c.

## ARTICULUS IX.

De Hepato.

**P**isces qui Græcis à colore & magnitudine hepatis Hepatus, à colore rutilo & subobsuro *πείλας* vocatur, Hermolaus *jecur marinum*, Gaza *jecorinum*, Galeni interpret *jecorinum* nominat. Diversum ab Hepato Æliani, pisce brevi & oculis conniventibus, cujus pupillæ ad cyanæum colorem accedunt, sequentia ostendunt, An ille, qui ἐν τοῖς μέγαις τῆς θαλάσσης, habitat, quia ad natandum, quamvis magnus, segnis, circa latibula sua duntaxat volutatur, idem sit, affirmari vix potest. Descriptionem si spectes, Phagrum Erythrinum & Hepatum pro similibus posuere veteres, sed illum rostro brevior, ferratis dentibus, colore nigro, oculis habitati totius ratione majoribus, cauda macula nigra insigni, corde trigono, eodemque quod de suprema forte parte, quam αὐλὸν φλεβοσπύδα vocat Aristoteles, sumendum est, nisi de hepate potius id dici debeat, albo, felle nullo, additum: nec omissum calculos in capite gerere, solitarium esse, & paucas ventriculi appendices habere. Hæ notæ an Belloniano, qui Gesnero describente, Piscis est undequaque fermè rubicundus, circa ventrem albicat. in dorso dimidia sui posteriore parte tribus maculis atris notatur, ultima caudam attingente addente Bellonio. Squammis integitur asperis. Dentes habet quam Phycidis obtusiores, qui pectinatim cœant. Calculos in capite gerit, penes lectorem sit iudicium. Aldrovandus hunc cuius icon apponitur, ponit, & Rondeletii Hepatum, qui modernis Græcis δαπνός verum Hepatum esse opinatur. Et sanè piscis est Pagro similis, oculis majoribus, quam pro ratione corporis ut Melanurus; colore obsuro seu ex cæruleo nigrescente, pinnarum numero, situ aculeisque Pagro similis, latiore majoreque cauda, in qua maculam Melanuri instar nigram habet. Dentes ipsi non lati sed rotundi & ferrati, Branchiæ utrique quaternæ, ventriculus cum appendicibus quatuor magnus. Intestina tenuia, *hepar* album sine felle, *cor* angulatum, in cerebro lapides duo. Verbo, optime cum illo quem ex veteribus descripsimus congruit. *Moribus* videtur esse insulsis, & parum ad vindictam pronus, quod apud Athenæum facete Eubulus innuit. Carnis in medio duræ & mollis esse, apud Galenum legimus. Frixi & paucio sale aspersi in cibo sunt suavissimi. Hepar tritum & emplastri modo impostum, omnem tumorem & podagram sanare mentitur Kiranides.

Tab.  
XIV. 13.  
14.

Ælian.  
H. A. l.  
15. c. 17.

Ælian.  
H. A. l.  
9. c. 38.

Athen. l.  
3. & l. 7.

Arist. H.  
A. l. 2.  
c. 17.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
13.  
Oppian.  
Halicut.  
l. I. v.  
124.  
Galen. de  
Natur. fa-  
cult. l. 3.  
Arist. H.  
A. l. 8. c.  
2.  
Arist. H.  
A. l. 6. c.  
13. & l.  
4. c. 11.  
Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 16.

Galen. l.  
3. de A-  
lim. fa-  
cult.



## ARTICULUS X.

## De Melanuro, &amp; Alpheste.

Tab.  
XIV.  
I. 5. 16.Athen.  
I. 7.Columella R.  
I. 16.  
Ælian.  
H. A. I.  
2. c. 17.  
Ælian. H.  
A. I. I. c.  
41.Plin. H.  
N. I. 32.  
c. 2.Ælian.  
H. A. I.  
I. c. 41.  
Oppian.  
Hal. I. I.  
v. 98.

**M**EELANURUS à nigredine caudæ quasi Nigricaudam voces, ita dicitur. falso *oculatum* Gazæ appellavit, quia tanquam diverſi pisces à Plinio ponuntur. An Plauti Ophtamiam recte dixeris, quod Rondeletius fecit, iudicio Tuo relinquo. *μελανόγραμμεν* & *πολύγραμμεν* Athenæus dixit, quod nigræ linæ latera ejus pingant. Hicetius Sargo similem seu corporis figuram, seu nigram caudæ notam spectes, fecit: sed hæc & in sparo, qui *σπαραγγίς* invenitur. Palmi magnitudinem aliquando superat, nec amplius quam unam vel sesquilibrium pendit. *Squamis* tegitur, latis, nec facile decidius. Os habet parvum, dentibus parvis minutum. *Oculos* secundum corporis proportionem maximos ex cæruleo nigrescentes, pinnarum numero, situ, & figura, branchiis, & cauda cum Aurata convenit, hæc latam ac nigerrimam notam habet, latera lineis nigricantibus à branchiis ad caudam deductis pinguntur. Ventre est subalbido: dorso ex cæruleo nigricante. Quantum ad *interranea* Hepar habet magnum, ex quo fellis folliculus pendet. Venter medium. Cor angulatum, in ventre *vesicam* aëre plenam, crassam, & densam. Quem Aldrovandus depinxit, & cujus hic Iconem damus, totus ex cæruleo amethystinoque nigricat, præter squammarum extremitates & extimum oculorum circulum, caudæque initium, quæ auro resplendent, pinnæ nigricant. Uropygium supinum candicat, primum intense violaceum, & velut nigram maculam constituit. *Vescitur*, propè littora in arenosis locis algæ. Ideo vix vere saxatilis dicitur. Ælianus varias incolere sedes tradit. Bellonius in Oceano Gallico perrarum, in Mediterraneo frequentissimum; Jovius Romæ raro videri, sæpe Neapoli prodidere. Tempestate fervente cibus quos è faxis erüunt vivunt, & abjectissima quoque, quæ alii pisces nisi urgente fame non attingerent, sectantur; fereno mari in solo sabulo pabulum inquirunt, imo quia vagabundi pisces sunt, non uno solo pabulo contentos esse verisimile est. Sane in Stabiana Campaniæ ad Herculis petram Melanuri in mare panem abjectum rapiunt. Timidissimos esse pisces testantur, hinc *ὀδυνεύει* Oppiano. Neque nassa capiuntur, nec ad eum accedunt. Mari quieto, in ima ejus sede ad petras & algas quiescunt, quocunque tandem tegumento protecti, fluctuante, cæteris ob impetum descendentes, ad petras adnatant, & spumam ad sui tutelam tum sufficere, ac si natura edocuiſſet, nec tentari iuratum à piscatoribus mare, arbitrantur. Hepate tamen caprillo, & massa expa-

ne & casco facta capi, Tarentino & Oppiano debemus.

Laudatur in cibo à Xenocrate, cui Hicetius accedit: à Matrone Parodo rejicitur, illi forte si alga viscatur, huic si cœno & sordidis maris excrementis.

ALPHESTES piscis ab inveniendò, nescio quare dictus, *Cynædus* quoque quasi præposteræ libidinis studiosus (fama est semper binos capi, & alterum alteri ad caudam comitem videri) vocatur.

In *Descriptione* variatur ab authoribus si calorem secleris. Veteres omnino cerei coloris, purpurascens tamen, quibusdam in partibus faciunt. *Plinius* solos piscium luteos esse testatur. Apud *Rondeletium* & *Bellonium* corpore est Pagro strictiore, *figura* Mœnis similis, pedali magnitudine, *dentibus* serratis caninis similibus, *dorso* purpureo, cæteris partibus luteis, squammis in gyrum crenatis, multa scabritie horrentibus. A cervice ad caudam spinas tenui membrana connexas, unde *μονάκων* habet.

*Aldrovandus* Cinædum totum fere Pagri modo rubentem, & aureis, argenteisque maculis exiguis, rotundis respersum, quam Illyrici Sebenicenses Cagnizam quasi Catullientem vocant, profert: dat tamen & *aliū* tergo amethystino, lateribus ferè cæruleis, ventre candicante punctis cæruleis notato, pinnis tergoris & retro anum viridentibus, illa etiam maculis rotundis viridibus insignita. Cæteræ pinnæ & cauda ex auro rubescunt.

*Rondeletii* Cinædo similis est ille qui Venetis *Brasavola*, Lusitanis *Salmoneta* vocatur. Rufus est toto corpore, cauda lutea maculis fuscis distincta, extremitate æquali non arcuata. *Macula* nigræ ad pinnarum, quæ luteæ sunt, juxta branchias initia habentur. *Linea* ruffa à branchiis ad caudam tendit, punctis incercepta nigris. De natura Alphestis nihil planè occurrit, Rondeletius carne & substantia eadem cum saxatilibus esse dicit, tenera nimirum molli, & minime glutinosa.

## ARTICULUS XI.

## De Coracino.

**C**ORACINUS, Gazæ, *Corvulus* & *Graculus*, Salviano *Corvinus*, Aufonio *Corvus*, Tarentino forte *κορακίνος*, seu à colore nigro, ut Oppiano placet, qui apud Vitruvium *Coracinus*, seu quod *τὰς κόρας κίνει*, quod pupillas moveat, ut Athenæo visum est, nomen sortitus videtur, nisi fortè illud amnico, hoc marino magis conveniat. An idem *σαπέρδης*, *πλατισσακός*, Nili accollis *πέλιτη*, Alexandrinis *ἡμίνη*, quod Rondeletius voluit, dictus sit; an vero, quod Aldrovando probatur, Saperdæ nomen Coracino amnico Platistaci eidem profectæ ætatis, Peltæ & Hemineri, Nilotico duntaxat sit proprium, in dubio

Oppian.  
Hal. I. 3.  
v. 459.  
Athen. I.  
7. Dipn.Tab. XV  
I. 2. 3.  
Athen.  
I. 7.Plin. H.  
N. I. 32.  
c. 11.Tab. XV.  
6. 4.  
Aufon.  
Epist. 4.  
Oppian.  
Hal. I. I.  
v. 139.  
Athen. 7.  
Dipn.



Oppian. d. l. dubio relinquo. *Μύλλον*, non esse Dorionis apud Athenæum verba ostendunt.

Arist. H. A. l. 5. c. 9. Plin. H. N. l. 32. c. 5. Athen. l. 8. Strabo Geogr. l. 17. In eo ponitur à Rondeletio censu, qui mare simul & flumina frequentant: quod & apud Plinium, Athenæum, & Strabonem inveniri credit, sed quia saxatilem esse ab Oppiano & Aristotele proditum, & excitatis authoribus Coracinum duntaxat in Nilo esse; quin quod apud Plinium legitur, Nilo peculiares, colligitur; nec ullum piscem ex mari in Nilum ascendere propter Crocodilorum metum, præter Mugilem, Alosam, & Delphinum Strabo affirmat, duo potius Coracini ut Percæ genera dari credendum est, quam easdem anni & mari communes. Et sane multo in Mæotide palude degere & Dorione: plurimòs in lacu non procul Oceano è monte inferioris Mauritaniæ originem trahente stagnante, quam Nilidem vocant, ac Nili ortum credunt, ex Plinio discimus.

Quis *veterum* genuinus Coracinus sit, haud tuto affirmari potest. Speusippus Melanuro similem, dixit. Aristophanes ob alarum nigredinem *μελανπτερυγον*, Numenius ob varietatem linearum *αἰόλων* vocavit, *Arecen-* *tioribus* quoque diversimode describitur. Bellonius pro eo piscem mari & fluminibus communem ex Glaucorum genere, *Pesce Scarpa* Commensibus nominatum, obtrusit. Rondeletius suum ita describit. Coracinus piscis est marinus &c. Salvianus duplicem dedit. Prior qui Romæ simpliciter Corvo & Corvetto dicitur, rostrum habet breve & retusum. Os, &c. Alter, qui Corvo de Fortiera Romæ, Niger, jure merito, ut prior albus, quia multo minus nigricat, censendus est. *Rostrum, ore, Capite, oculis, pinnis, cauda*, totius corporis figura, & interaneis omnibus cum priore convenit; in eo discrepat, quod totus fere nigricet, aculeum, cui pinna inhæret, majorem & validiorem habet. Pedalem magnitudinem nunquam superat, & saporis suavitate, carnisque teneritudine inferior est. *Gesnerus* Corvulum colore rubro depinxit.

Arist. H. A. l. 9. c. 2. Aristot. H. A. l. 8. c. 15. Arist. H. A. l. 8. c. 10. Arist. H. A. l. 8. c. 19. Pallad. R. l. 1. 4. Tit. 10. Arist. H. A. l. 8. c. ult. Rhodigin. Antiq. Lect. l. 12. Athen. l. 7. Dipnos. Inter gregales ponuntur Coracini: hyeme *latent*, nec nisi statis diebus, iisque semper capiuntur, quod & Rondeletius affirmat. Nunquam messe Tritici *pariunt*, sed autumno foetificant inter algas; longo temporis spacio uterum ferunt, & inter minora genera piscium celerrimo incremento perficiuntur. Anno squaliente melius valere, quia per siccitatem tepor accidit, ab Aristot. proditum est.

An adversus arborum formicas polleant, quod ex *Palladio Cælius Rhodiginus*, qui pro Coracina pice, Coracinum piscem legi debere ait, affirmat, ignoro. Rondeletium certe experimentum fefellit, sed & huic, vero veterum Coracino fidem non tentasse, obicitur. Meliores sunt cum uterum gerunt. Nilotici marinis, elixis assii, præferuntur. Hi-

cesius, parum alere, facile excerni, succi esse mediocriter boni, dixit.

*Usus in Medicina* quod spectat, lapides in capite repertos calculos comminuere, vel pituitam ex qua calculi gignantur exsiccando vel pondere seu pellendo, idque sibi experientia cognitum, reliquit Rondeletius.

N. Corvuli iconem refert. Tab. 2.

## ARTICULUS XII.

*De Exocæto seu Adonide.*

**E**XOCÆTUM, qui *Adonis* & *Cirrhis*, fortè & *νίφα* & *νίφου* aliis, inter saxatiles esse Athenæus testatur. Squamosus sit an lævis dubium. Nomen ab eo invenit, quod in littore seu sicco dormiat. Subruffum esse, corpore tereti, littoralis & pusilli Cestrei magnitudine, cui digitorum octo longitudo maxima est, pisciculo Hirco, (Moenam marem, quo tempore dat operam soboli hunc putat Casaubonus) præter nigram sub alvo maculam quam Hirci barbam vocant, simillimum facit Athenæus, inque eodem à branchiis in utraque corporis parte lineam albam uno continuo tractu ad caudam usque duci addit. Rondeletius sequentem Iconem pro Adonide posuit. Piscis vero est semipedali magnitudine, forma tereti *ιπποβύς* secundum Athenæum, secundum Oppianum *ξανθός*, seu colore aureo, partibus quibusdam virescente, magis rubescente aliis. Corpore Moenis jam foetis aut Gobionibus similis *Branchias* habet parvas, à branchiis ad caudam lineam candidam continuam.

Miratur eum Arcadia, tamen & in littore Monspelim stertentem, sæpissime vidit Rondeletius. Quod vero Exocætum circa Clitorium vocalem & sine branchiis tradit Plinius, impossibile videtur, & habere ostendimus. Nec quicquam de istis Pausanius de vocalibus in Arcadia creditis duntaxat agit, & diversus ab Exocæto marino fluvialis *ποταμός*. Diutinæ in sicco *vite*; quod magna aëris copia aqua suffocari possit, ob rimæ branchiarum angustiam non trahatur, causa, Rondeletio. Propter eandem & Anguillas diutissimè etiam sub terra vivere; credit: sed, quia in aqua, quæ frigidius elementum, fueti vivere pisces; & anguillæ sine ea senis diebus Aquilone spirante, qui frigidior ventus est; Austro paucioribus; reliqui diutius verno quam æstivo tempore vivunt; difficulter, nimia aëris frigidi attractione extra aquas lædi posse pisces, persuadere poterit. *Vide Scaligerum.*

## ARTICULUS XIII.

*De Scienasive Umbra, & Glaucobellonii.*

**P**ISCIS qui Græcis vulgò *συνάδρα*, Xenocirati *σύνιας*, *συνιάδης* & *συνιάδης*. Græcis modernis

Tab. XV. 7. 8. Athen. Dipnos. l. 8.

Athen. Depn. l. 1.

Plin. H. N. l. 9. c. 19. Paulan. in Arcad.

Rondelet. l. 4. de piscibus marinis c. 9. Plin. H. N. l. 9. c. 19.

Scalig. Ex. 273.

Tab. XV. 9.



nis *σκίος*, nonnullis *μυλοπόποιος*, is alicubi *ovis marina*, communiter Latinis *Umbrina* & *Umbra*, seu à colore nigrescente, quam umbrosum Isidorus, luteum Ovidius vocat; seu à lineis quibusdam obliquis à dorso descendentibus aureis & obscuris, quæ aliarum apparent umbræ; seu quod dum movetur adumbrantem quendam oculis colorem iridis in morem rutilet; seu à proverbiali joco, quo *σκίος* dicebantur, qui non vocati ad convivium veniebant, quasi multi convivas secuti essent, cum de hoc pisce edendum erat, dicitur.

Piscis est cetaceus, LX. plerumque librarum, quatuor plus minus cubitos longus. *Squammæ* ejus veluti obliquæ apparent, in Oceano nigriores & quasi opacæ, in Mediterraneo argentei, aurei, atque interdum ab his varii coloris, iridem dum piscis agitur imitantur, quod Bellonius prodidit. Rondeletius ei lineas obliquas quasdam aureas, manifestas, alias aliarum veluti umbras attribuit. Aldrovando fere unicolor est, tota videlicet ferruginea, in dorso, supremo capite, pinnis, & cauda obscurioris coloris; in ventre, lateribus, & branchiarum ossibus dilutioris, quia ad amethystinum inclinat. Salviano, dum parva est argentea ferè tota apparet: major facta, ventre argenteo, dorso verò & lateribus subliventibus ac veluti opacis conspicitur. *Caput* ex descriptione Salviani habet magnum: in dorso duas *pinnas*, quarum prior octonis aculeis, nullis altera munitur, ad branchias, quas quaternas utrinque habet, una utrinque enascitur, duæque aliæ in ventre conspiciuntur, imo ab ano una alia hæret. Coracino tam similis est, ut ichthyopola unum pro alio substituant, magnitudine differunt. Sed & pro Glaucos supponitur, in eo diversus, quod *deptes* in oris ambitu raros, firmos, acutos, prominentes, terretes, caninis longiores, & graciliores, quæ habeat; (negant habere Aldrovandus & Rondeletius) quorum superiores inferioribus majores, sic maxillæ inhærent, ut ipsius pars esse videantur. De *Verruca* sub mento controversum: affirmant quidam habere, negant alii. *Caudam* in angulos veluti desinentem gerit, ut Scari & Iulides. *Calculos* in capite habet prægrandes, quorum Aristoteles & Plinius meminere; *ventriculum* magnum & carnosum; *intestina* mediocria & pingua; *jecur* pallidum, ex quo fellis vesica pendet. Lienem subatrum.

Marinum piscem omnes fatentur, sed de loco non conveniunt. Arenosos gurgites melius eas pascere, Columella prodidit. Oppianus petream cognominat, & saxa herbofa incolere asserit, hisce & Galenus accedit.

Quia perraro plures capiuntur, *solivaga* potius quam gregalis esse creditur *Carnivora* & agilis, & propter lapides in capite frigoris impatiens. Dum caput recondidere,

latere se totas Struthionum & Phasianorum instar, putant. Oppiani id fide asseritur. Cibos quod spectat. Inter nobiles ab Ennio, Epicharmo, & Numenio pisces numeratur. Romæ inter sapidissimos, canicularum imprimis tempore censetur, & pari tum cum Sluris precio venundari solet. Capita Triumviris rei Romanæ conservatoribus dono dantur, de quo faceta est apud Iovium de Tanusio historia. Apud Pictones ex aceto & capis minutim concisis editur. Salvianus cum laucophago comestam, caryophyllis transfixam, ac verrubus assatam laudat. Archestratus gulæ suo tempore procerum princeps, nobilem capitis condituram multis carminibus expressit. De *Carnis* salubritate non conveniunt Authores. Galenus Philotimum quod eas mollis carnis piscibus adnumerarit, reprehendit. Xenocrates bonum ex eo nec admodum copiosum succum generari, & saporis esse jucundi scribit.

Invenit & in *Medicina* usum. *Interanea* & *squamma* combustæ, pannos teste Plinio discutiunt. *Lapides* argento inclusi tanquam colicæ amuletum gestantur. Non emptos, sed dono datos gestari debere, nugæis vulgi delirium est.

**GLAUCOS** Bellonii pelagiæ est piscis, ex eorum qui plures patinas implent numero, Lutetiæ invisus, Genuensibus frequens, apud quas *Fegarus*, ut apud Venetos Corbetus, quasi Corvulus dicitur. Massiliensibus & Romanis nullo alio quam *Umbrina* nomine venit. Ita de eo Bellonius.

## ARTICULUS XIV.

## De Anthiis.

**ANthiarum** nomen omnibus piscibus latis imposuit Bellonius, sed malè: nec idoneum testem habet; nec omnes lati tam pulchri, ut vel Anthiæ, vel Callichtydes, vel Callionymi dici possint. Ex squammosarum esse genere, dubium; à corporis floriditate nomen apud Græcos accepisse, certum. *Ανθίσιον* eundem ipse Aristoteles facit. Athenæo *κύλιχθους* & *καλλυώννυμος* dicitur, *ἄλλοπα* vocavere quidam; quo nomine & ille cui squammæ contra aliorum piscium morem ad os versus tribuuntur, insignitur: *sacrum* alii seu quod magnus sit, ut morbum comitiale, qui magnus est sacrum dicimus: seu quod quo loco Anthias est, ibi nullam bestiam esse confessum sit, vocant. Hicesius *λύκον* dici tradit, quod malè in *λεῖκον* Rondeletius vertit. Hesychius enim *ἰχθὺν ποτὶν λύκον* appellari asserit. Quatuor ipsorum genera ab Oppiano ponuntur.

*Ζαῖτοι ἀργυροῖτε, τὸ δὲ τρίτον αἶμα κελαῖνοι.  
Ἄλλος δὲ δίσπους αἶ, & αὐλαπὸς καλὸςιν.*

*Sunt flavæ & niveæ, sunt atro sanguine fusca  
Euops atque Auceps alios hoc nomine dicunt.*

E Toti-

Oppian.  
Hal. l. 4.

Galen. l.  
3. de A-  
lim.

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 11.

Tab.  
XV. 10.

Tab.  
XV. i. 2.  
4. 5. 6. 7.

Oppian.  
Halieut.  
l. i. v.  
254.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. i. c. 17.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
19.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
16.

Columel.  
R. R. l.  
8 c. 16.



Totidem & Rondeletius posuit; quorum vix aliquis, cum omnes dentati sunt, Anthiæ verò Oppiano edentuli, probatur. Prior totus corpore & pinnis rubens, Pagri aut Cinnædi modo; ad imberbes Mullos referri potest. *Alter* Afelli species est: quod neque salinus, neque vento siccatus, servari potest, vel calidiori in Gallia cœlo, vel obculta qualitati adscribendum est. *Tertium* ad Turdos pertinere stellulæ, quas in pinna ad anum gerit; & corporis forma testantur. Oculos habet magnos, rotundos, purpureos, & rubros. Podicem magnum è quo *intestinum* rubro viridique distinctum excidit. *Pro quarto*; (hujus generis Oppianus ὀπίπας & αὐλωπας vocat; id est ὀσφθαλμῶς & ἐπιμήκεις κατὰ τὸν ὀσφθαλμῶς, ut Scoliaſtes meus exponit, Ælianus cetacei generis & ore robusto facit,) squamosus & latus piscis, quem ex eo, quod supercilia oculos ambiant, Aulopiam esse colligas, ponitur. *Aldrovandus* quatuor quoque Anthiarum nomine è diversis locis sibi missos ponit, sed pro iis non obtrudit. *Primi* venter totus argenteis squammis resplendet: lateribus aureæ intermiscuntur. In dorso, quod fuliginosum, unica tantum pinna duodecim armata aculeis visitur, ventris pinnæ ad castaneum vergunt. Branchiarum opercula ex aureo & violaceo variant. Labrum inferius tum intus, tum foris ex flavo virescit, quod peculiaris notæ loco esse potest. *Alter* toto dorso pinnis duabus dorſi & aquæ retro anum est, viret. Vertice capitis aterrimo, cervice & labro inferiore interna parte purpurascens. Ossibus branchiarum auro resplendentibus, ventre toto argenteo purpura permixto. *Tertius* tam amplis violaceis toto corpore variegatur, ut violaceus quasi totus videatur. Pinnarum numero cum superioribus convenit, quæ ad branchias, vergunt ad violaceum, & in extremo roseæ sunt. Iris oculorum & mentum roseo sanguineoque colore, specificam & ob quam solam dignosci potest notam, in eo constituunt. *Quarto* inusitata est oculorum ac præsertim pupilla magnitudo & pulchritudo: iridem ex aureo roseoque permixtam habet. In capite retro oculos, cervice, & ad branchias, amethystino, aureo, argenteo, cæruleoque variat. Labrum superius habet viride, inferius cæruleum: *linguam* maximam candicantem. Ventrem primum viridem, dein argento & auro ad podicem usque splendentem, ad caudam usque roseum & sanguineum. *Locus* Anthiis in saxis, quæ tamen aliquando, cum ἀσθηρὶ οἶστρον ἐλαύνει, deferunt. *Ανάλυσις* δὲ πρὸς τὴν χερσὶν ἀσθηρὸν εἶναι locum absque bellicis esse ubi habitant: quod fortè inter φύσεις ἀπὸ ῥήθητα reputandum est. Unde sacri, ut superius dictum dicuntur. *Cum unum hamo teneri vident, lineam secare asperitate dorſi fortè, traduntur, eo qui tenetur extendente, ut secari possit.*

Capiti ἀλλοτρὶν ἑτοῖς διαμαρτυρῶν, & ἀποθνήσκοντες ἑαυτοῖς ἰσχυρῶς δρῶσιν & προπὶν τινὰ ἰσχυρῶς. *miserabile præbent spectaculum & mortem suam lugere, & quodammodo supplicare videntur.*

Ælian. H. A. l. 12. c. 47.

De ipsorum capiendi modo ita Plinius: *De Anthia* pisce sileri convenit, quæ plerosque adverte credidisse. *Chelidonias* insulas diximus *Asia* scopuli maris ante promontorium sitas, ibi frequens hic piscis & celeriter, &c. Censentur ab Eustathio inter eos pisces, qui ἀνθρωποφάγοι, quod ob magnitudinem sumptuum, ganeorum opes exhauriant: sed & θεοὶ Διὶ, quod preciosissimi sint, vocantur. Carnis est solidiusculæ. Unde χοιρῶδης apud Athenæum (malè χοιρῶδης) dicitur.

*Fel* cum melle inunctum, exanthemata, tubera, scrophulas, & dothienas sanat. Lapidem capitis ad collum ligati, *Cephalalgiam* domant.

## ARTICULUS XV.

*De Gobiis squammosis saxatilibus.*

**G**obiorum historiam loci & tegumenti differentia intricatam facit. Nobis de squammosis saxatilibus hic res est, eisdemque littorales adjiciemus, ne de iis pluribus in locis agere cogamur. Græcis dicitur γοβίον, Numenio apud Athenæum καβίον. Phavorinus explicat; Latinis *Gobius*, *Gobio*, *Gobius*, ut apud Ovidium, & *Cobio* ut apud Plinium legitur. Parvi sunt tam illi, qui in mari, quam qui in aquis. Tzetzes tricubitalis fama accepit, quod fortè de illis, qui in rubro mari, prout ab Æliano proditum, sumendum est. Bellonius ex saxatilibus *album* quendam facit, quem Græci χαλκίον & καυλίον, Rondeletius flavescentem seu pallidum vocat. Est is palmi longitudine, toto corpore rotundo, non composito & spisso, squamis rotundis tecto, colore vario. Nigris maculis conspergitur, oculis sursum potius quam deorsum spectantibus. Ad branchias pinnas duas habet, in ventre non duas cæterorum more, sed unicam non divisam, quæ natâ Gobii maximè à reliquis piscibus inter noscuntur; à podice aliam, in dorso non unicam velut alii saxatiles, sed duas, prior minor est, altera ad caudam usque extenditur. Dentes ei parvi, os magnum, ventriculus, cum multis appendicibus capax. Aristoteles complures supernè circa eum exire scribit. Hepar ipsi album non sine errore tribuit Hicetius. Qui Aldrovando Venetiis missus est, pinnas habebat in tergore binas conjunctas, quarum prior aculeis vigeat, altera levius erat, binas item in pectore, totidemque ab ano omnes nigras. Caudam & superiorem partem corporis nigra. Ventrem candicantem.

Ex littoralibus duplices apud Aurhores invenio. *Albos & nigros.*

Illos

Tab. XV. 11. 12.

Athenæus Diapnos. l. 7. Tzetzes Varior. Ælian. H. A. l. 17. c. 6.

Arist. H. A. l. 2. c. ult.

Ælian. Hist. Animal. l. 8. c. 28.

Plin. H. N. l. 9. c. 59.



Illos Rondeletius ita vocat, non quod tam candidi sint, ut cum aliorum piscium candore contendere possint, sed quod candore cæteros Gobios superent.

*Nigros* ita Bellonius describit. Eminentes ac turgentes supra caput oculos gerunt. Cornua tunica alba, & ut serpentibus dura obductos, adversus aquarum impetum, & ut sursum facilius ut Uranoscopus cernant. Vix excedunt duorum pollicum crassitiem aut palmi longitudinem. Rarè enim pedales & branchiales evadunt. Etsi autem lubrici sunt, tamen squammis integuntur hirtis, pinnamque habent unam in tergo continuam mollem & sine aculeis. Pinnas utrinque quatuor latas atque obtusas, ac præter has sub ventre etiam duas; sed ea, quæ caudam constituit, rotunda est. *Dentes* exerunt parvos, tenues, & subrubros. *Corpus* teres est, paucis spinis refertum, *Color* varius. Etenim qui Gobiones circa algam versantur ad viridem inclinant, alii ad cinereum accedunt, nonnulli albicant, alii ex fulvo in nigrum degenerant. Omnes grandiore sunt capite & lata ceivice. At quod ad internas ejus piscis partes attinet: peritonæum Gobionibus foris album est, intus nigerrimum. *Hepar* dextro lateri magis incumbit, pallidum; de quo *fel* pendet veluti janthinum. *Intestina* multis circumvolutionibus inflectuntur. *Stomachus* est oblongus, pylorus multis apophysibus præditus vulva undecunque ovis referta.

Facit & Rondeletius Nigri mentionem, quia Venetis Go, à Gallis Boulerot nuncupatur. Digiti is est magnitudine & crassitie, corpore rotundo ferè, non compresso, loco binarum pinnarum, quæ cæteris sunt in ventre, unicam habet nigram, barbam inquit dices; & exinde Athenæi *σπύρον* seu hircum, cui Exocætum confert, esse judicat. Vivit in littoribus & stagnis marinis.

De *Loco* proprio ambigitur. Ovidio littorales sunt, Diocli saxatiles, cui Synesius accedit, dum circa Africæ quoddam littus, loco petroso capi scribit. Aristot. in fluviis quoque pinguescere ait. A Theophrasto proditur in Ponto regione apprehendi in glacie piscium maximè Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum fatentes; quod fortè de lacustribus vel fluviatilibus sumendum erit. Oppiano *καμαδοῦσι & πέτρῃσι* gaudet. Pariunt juxta littora, suaque ovalatiuscula & arenida, ut Aristoteles prodidit, lapidum amplexibus mandant.

Ab Æliano inter illos ponitur, qui *ὀνύχωντας ἢ ἀγιάσι*. *Venenum* pungendo immitunt, annumerantur; Oppianus quoque *κίττωα πικρὴν θάλασσαν*, aculeos lethales ipsis tribuit, quod nec cum Ovidio, cui, *spina nocivis non gobius ulla*; nec cum Martiale, cui in *terris Venetis, principium mensæ gobius esse so-*

*let*, congruit. Et sanè invenit, & in *cibit* usum, etsi Juvenali vilissimus videatur. Alexandrides in Cotyis Thracum Regis convivio eos nominat. Anthiphanes laudat, Phalericos inprimis. Archephonti parasito, qui in Ægyptum ex Attica, à Ptolomæo Rege ad coenam invitatus, navigavit, Gobiorum frustra tria non sine stupore convivis omnibus visa apposita sunt. Jovius enim persuavem, & pingui teneritudine delicatum facit. Galenus ad voluptatem, digestionem, & probum succum gignendum præstantissimum, ait. Mnesitheo *εὐδυναί* sunt & *πρόσιμα*, Hicetio facile excernuntur, & non multum nutriunt, flavescentium substantia rarior & magis putredinis expers. Apud Hippocratem parem in alimonia cum Dracone, Callionimo & Ciculo vim obtinet. Assus & sine sale mansus, nimia egerendi desideria sedat, si Kiranidi credendum, illitum, canum rabidorum, serpentiumque moribus prodesse Dioscorides prodidit. Dorycinii vim, crudum, tostum, elixum infringere, apud Nicandri scholiasten legimus.

## ARTICULUS XVI.

De *Sphyræna* sive *Sudi*.

**S**PHYRÆNA, cujus præter Ovidium nulum alium meminisse, perperam scribit Plinius; nam inter Græcos Aristoteles, ex Latinis M. Varro meminere; Atticis *κίττωα* ut Athenæus affirmat, (significat hoc, ut & *σφύρα* stimulum aut stylum; item teli genus bello Persico inventum) Latinis *Sudis*, ut apud Plinium videmus, *Gazæ Malleolus*, sed malè, Romanis *Lucius marinus* vocatur, sunt qui pro Oxyrincho, quia acumenato est rostro, sumunt.

Duas ipsarum posuit species Rondeletius ex Oppiano, sed tam dissimiles, ut an ex eodem sint genere dubitari possit. Prior enim squamosam à capite ad caudam lineam habet, altera squamis omninò destituitur. Totidem & Bellonius innuit, quarum una Trachurum colore refert, atque eodem modo sub ventre albicat. Altera senescens Momyri laterales picturas colore assequitur. Quaternæ vix libram pendent, ut optime Plinius magnitudine inter amplissimos rarum scripserit: visi tamen aliquando bilibres. Colore Asellum æmulatur. *Rostro* est foris coæto, in extremo cuneato, nigro. *Ore* valdè resecisso. *Maxilla* superior quæ obtusa & brevior, cum inferiore, quæ acuta & longior ita coit, ut vix oris rostrive scissuram ullam dices. *Dentes* utrinque habet, in superiore majores, in inferiore minores. In ipso oris hiato unus est, cæterorum longissimus & acutissimus, qui ore clauso in foramen anterioris ac membranaceæ partes ita suscipitur, ut extrinsecus etiam paululum emineat.

Athen. l. 7.

Galen. l. 2. de Aliment.

Hippoc. l. de interi. affect.

Tab. XVIII. I. Athen. Dipn. l. 7.

Plin. H. N. l. 9. c. 2.

Plin. H. N. l. 32. c. 11.

Athen. Dipn. l. 8.

Arist. H. A. l. 8. c. 19. Theophr. l. de pisc. in sicco. Oppian. l. 2. Halieut. v. 457.

Martialis in Xenis.



*Lingua* scabra est, denticulisque aspera. *Linea*, quæ à branchiis ad caudam usque per latus deducitur, & initio flavescit cum dorso, squammis parvulis & duriusculis, mira arte contexta est. De numero *pinnarum* Authores non conveniunt.

*Aldrovandi Sphyræna* per dorsum nigricat, cætera ad amethystinum vergunt, & ejusdem coloris maculis interstinguuntur. *Linea* flavescit, ruberrimis infra supraque punctis exiguis notata. *Caput* cæruleum. *Oculi* & *pinnæ* pallescunt. *Cor* oblongum est, sub quadam vesicula alba inclusum. *Pylorus* à stomacho consurgit tam multiplici *apophysum* seu cæcorum cæsarie intertextus, ut penitus stomachum contegant, nec à quocquam numerari possint. *Fel* ab hepatis loco dextro latere in folle oblongo dependet. *Follem* ei natura vento plenum oblongum, anteriore parte bifidum, utrinque in acutum exeuntem donavit, ne ad imum siceret. *Spina* dorsi raris vertebrais coagmentatur.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 1. c. 21.

Oppian.  
Hal. l. 1.  
v. 168.  
Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 2.

Oppian.  
Halieut.  
l. 3. v.  
120.  
Ælian.  
H. A. l. 1.  
c. 31.

Athen. l.  
7.

De loco non est quod multa dicamus. *Ælianus* dum pelagias dicit, *Smyrænas* potius innuere videtur. Expressè enim ex quo ille de piscibus ferè omnia ἐπετρεῖται ἐν φαραδοσίον νίμονται. Gregatim degere & *Aristoteles* testatur, & piscatores comprobant. Captis an ὀλιγοπρόσοι μελίαναι διέξειπτεν *lubricis excidere membris*, quod ex *Oppiano* *Ælianus* prodidit, an competat, ex superioribus colligi potest. Non fallitur, qui pro *Sphyrænas* *Smyrænas* legerit.

Quantum ad *usum* Romæ ceu plebejus negligitur, nec peculiarem habet condituræ modum. Hicelius apud Athenæum προτιμώτερας congris esse, ἀπεδείκνυτο τὴν γαστέρα ἐν ἀσέβει, δόχυναι δὲ μέγας gustui ingratos, ori insuaves, succum mediocriter laudabilem generare dicit: sed cum congris ex cartilagineorum sint genere, *Philotimoque* δυσκατεργάστεροι dicantur, & *Rondeletius* carne esse candida suavi, quodammodo friabili, & *Aselli* carnem referente, cui simul cum *Lupo* præcipuam auctoritatem fuisse *Cornelius Nepos*, & *Laberius Poëta* tradiderint, quin *Cestræ* lumbi cum aliis lautissimis obsoniis ab *Antriphane* nominentur, vel librarios, vel Athenæum attractum superius errorem commisisse, verisimile est.

## ARTICULUS XVII.

De *Acu*.

### PUNCTUM I.

De *Acu Aristotelis*.

Tab.  
XIV. 13.

**P**iscis quem Latini *Acum* vocant, Græcis longitudine & tenuitate Βελόνη, Γαφίς, Athenæo Ἀβελόνης, quasi sine muco, dicitur, suunt qui βληδὼν ut *Varinus* citat, & βελλὼν nuncupant.

Unam ejus duntaxat speciem *Salvianus* agnoscit. *Bellonius* cum *Rondeletio* duas. Nos de *Acu Aristotelis*, *Oppiani*, & *Bellonii* agemus. Hinc autem *Rondeletius* illum piscem esse credit, quem *Bellonius* *Typhlinen* & *Ceciliam marinam* ob corporis figuram, *Plinii* *Spondylem*, Græcorum vulgo *Herophidiam*; *Massilienses* *Gagnolam*, quod quoties piscantur, si alios pisces præcedere viderint, lucrum portendi crepant, vocant. Piscis est longus, cubiti longitudine, digiti crassitudine, totus subflavus. *Corpus* utriusque sexus angulosum, oblongum, à capite ad meatum excrementorum semper crassescens, sexangulum, sed deinceps, ut tenuius efficitur, pro sexangula quadrangulam formam induit. *Caput* habet exiguum, *Rostrum* oblongum, durum, nec acuminatum. *Extrema* pars latiuscula exstat, rictus in altitudinem dehiscit, figura tubam æmulatur, in extremo tubæ veluti foramen conspicitur, tam pusillum, ut tum propter ipsius parvitatem, tum propter rostri magnitudinem angustiamque, ne minimus quidem pisciculus ingeri possit, eo veluti per fistulam, ex humore alimentum attrahit. *Oculi* sunt tam exigui, ut vix milii magnitudinem æquent. *Branchiæ* utrinque quaternæ, podex in medio ferè corpore. De *pinnis* disputatur. *Salvianus* cum *Aldrovando* unam parvam & tenuissimam in medio dorso ponit. *Bellonius* cum *Rondeletio* duas in lateribus juxta branchias, eam quæ in tergo tam tenuem & exiguum, iste addit, ut vix nisi cum vivit, aut in aquis movetur, conspiciatur. *Interna* si spectes, habet *gulam*, qua plurimipisces carent, ventriculum parvum, oblongum. *Hepar* pallidum, sub quo dextra parte *felcæsum* hordei magnitudine continetur. *Cor* vix milio majus. *Vulvam* cæterorum piscium more bicornem, ovis sesami magnitudine, rotundis, rubris, transparentibus plenam. De *intestinis* inter *Bellonium* & *Rondeletium* non convenit. Iste gracilia, recta, in spiras non contorta prodit, hic unum tantum album, recta expositum, multa pinguedine circumfessum scribit.

Quantum ad *Generationem*; ova se in dissectarum, rima, seu ὑπὸ τῶν γαστέρας διαφύσσει, de qua superius, multa invenisse, & multos foetus jam profectos, quorum majores partes omnes perfectas habebant, & movebantur; Alii tam tenues & exigui erant, ut oculi duntaxat & rostrum cernerentur, testatur *Rondeletius*. Emittere illa eo, & quasi in altero sinu fovet donec excluderit, dilatat natura rimam, donec pepererit: à partu vel ita coit ut coaluisse videatur, vel revera coalescit, quod & in cæciliis serpentibus traditur, huicque omnino tribuendum est, quod dehiscit propter multitudinem ovorum utero, adscripsit *Plinius*; ex *Aristot.* malè de eodem vertit *Gaza*, nec

Arist. H.  
A. l. 6.  
c. 13.

Plin. H.  
N: l.



Ælian. H. A. 1. 11. c. 13. Scaliger adl. 6. c. 16.

nec melius Ælianus deprompsit. *Αἱ πολλὰ αὐτῶν πρὸ τοῦ τί κληῖται διαφέροντα ὑπὸ τῶν αὐτῶν id est, ut Scaliger vertit. Multa earum parturientes disrumpuntur ab ovis. Quid sibi sequentia verba velint, & αὐτὰρ τὰ φιλὰγγια περιέχοντα, & περὶ τοῦ βελόλου. ἐνὶ τῇ γὰρ αὐτῇ & τῇ θύρῃ φέρεται.*

Athen. Dipnos. 1. 7.

*Fœtus circa parentem quasi phalangia circumfusi sunt. Ita enim parit, ut ei adhæreant, sed si tetigeris, fugiunt, difficile est dicere. De usu in cibo & Medicina dixisse sufficiat, Carnis esse duræ ac siccæ eoque difficulter concoqui. Unde Hicetio ἀχολῶν boni succi, & combusti cinerem in potu ad stillicidium urinæ à Galeno commendari.*

## PUNCTUM II.

*De Acu Oppiano.*

Tab. XIV. 14. 15. 16. 17. Aldr. de Piscib. 1. 1. c. 24.

**A**CUM Oppiani ab Acu Aristotelis debere distingui, tum quod hic dentatus sit, tum quod rima destituatur, ostendit. Haud in multam magnitudinem excrescit, feni vix libram pendeat. Vidit tamen & trilbrem Salvianus. *Ventre* est plano, candido & argenteo, reliquo corpore quodammodo ob lineam è squamis contextam utrinque protensam, quadrato, reliquis partibus lævibus, & sine squammis. *Dorso* cæruleo ad viride inclinante. *Rostrum* habet acutum, tenue, longum & durum, ut ait Athenæus. *Caput* triangulære viride. Inferiorem *maxillam* superiore longiorem, & in mollem quandam substantiam, degenerantem. *Dentes* utrinque parvos & frequentes. *Oculos* magnos, rotundos, luteos ante quos meatus ad audiendum vel odorandum triangulari figura observavit Rondeletius. *Branchiæ* sunt quaternæ duplices. *Pinnæ* ad branchias duæ parvæ; duæ aliæ sub ventre breves, quas rursus alia sequitur, longè à podice ad caudam se extendens, è cuius regione in dorso alia. *Cauda* brevis est in duas pinnulas terminata. *Podex* non admodum conspicuus. *Rimam* illam quam Aristoteles Acui tribuit circa podicem huius Acus foris quidem conspicuam esse, sed intus minimè videri, Salvianus auctor est. Rondeletius diligentissimus omnium circa Acum indagator ejus non meminit. *Partes interiores*, ventriculum, hepar, intestina, quæ appendicibus carent, longa habet. *Hepati* vesicula fellis oblonga adhæret. *Cor* angulosum est. In arenosis, saxosisque locis degit. Solemme ipsis ὅτε κόλπον δ' αὐτῆς ἐμπροσθ' ἔχει, quando *sinum retis effugerint*, iterum reverti, & dum ira velut perciti id dentibus lacerant, in laqueos iterum impingere. Carne est dura & sicca. Frixus & omphacio vel succo maliaurantii irroratus edi solet; nec ingratus palato invenitur.

Oppian. Hal. 1. 3. v. 605.

**ACUS MINOR** Bellonii *Lacertus* est, sue *Saurus Acubus similis*. Rondeletio *Piscis*

est marinus, pedis magnitudine, *Acubus* brevior & crassior. *Rostrum* acutiore sed brevior & fursum recurvo. *Dentium* loco maxillas serratas habet. *Branchias* quaternas, septem etiam, ut in superiore, quem Bellonius Majorem vocat, supernè ac infernè & in cauda propendentes *pinnulis*; *his*, *oculis*, & ante hos foraminibus, ventrisque squamis ac lineis, quæ ventrem ferè quadratum efficiunt firmantque, *Acubus* est similis; carnis substantia, & posteriore corporis parte *Scombris*. *Intra* ventriculus est oblongus. *Intestina* longa gracilia, in gyrum convoluta. *Hepar* longum rubescens: *fel* & *splen* nigricantia. Cujus Aldrovandus Iconem dedit, toto corpore subviret, maculis ex amethystino & cæruleo mixtis, in dorso intensius, in pectore remissius variantibus. *Rarus* est, & in insula nomine Lissa, olim Phunna affatim capitur. Inde salitus navigiis transfertur, & maximo quæstu divenditur.

## ARTICULUS XVIII.

*De Fabro.*

**F**ABER piscis, seu exinde quod omnia fabrilia instrumenta in eo reperiantur, teste Salviano, seu propter multiformes dorsi ac ventris aculeos atque varia capitis ossa, quibus fabrilia omnia instrumenta repræsentantur; seu ab atræ fuliginis colore, quod tamen, si ex Oppiano desumptum est, Coracino potius tribui debet, ita dictus est. An χαλκός sit, quod Salviano placet, dubitatur. Cum eum Gadibus principatum obtinere scribat Plinius; rotundum vel orbicularem, Athenæus faciat. Si est, utique & ζῆς seu Jupiter dicetur, nam & hoc τὸ χαλκός nomen est, seu à χαλκός formatum; seu quod fortè, ut nunc sit, olim etiam in templi Jovis tanquam sacer suspenderetur. Quidam χρισόφαρον nuncupant, an propter maculas laterales, digitorum Divi Christophori ut ajunt vestigia, vel quod eum quem jussu Salvatoris Div. Petrus cepit (maculæ prædictæ numismatis illius quodammodo figuram exprimere creduntur) opinentur, nescio. Romæ *Citula*, Liguribus *Rotula*, Hollandis *Gallus marinus* dicitur. Qui Chalciden, Acanthiam vel Citharum, vel Porcum marinum esse judicant, falluntur. *Primus* enim inter viles pisciculos à Columella; ab Aristotele inter fluviatiles reponitur: *Alter* cartilagineus & rotundus. Citharum piscem inferius dabimus. Porcus inter magnos pisces recensetur. *Zai* Hesichii idem fortè cum isto. Cum nec inter ἁπλοειδῆς, qui una parte candicant, nigricant altera, nec inter planos, à quibus oculorum situ differt, referri possit, benè inter lätos censebitur, quamvis maximè compresso ac plano sit corpore.

Tab. XVII. 1. 2. Aldrov. de Piscib. 1. 1. c. 25.

Plin. H. N. 1. 9. c. 18.

Coloris est variū. *Caput* & dorsum obscura sunt,



sunt, pinnae nigricant, latera partim ex caeruleo virent, partim aurea sunt. In medio corpore macula nigra, orbicularis, vel ovata nummi minoris magnitudine, colore caelesti, cum tribus imagunculis, figura quodammodo Hippocampi, colore aureo, visitur. *Squamis* tam exiguis tegitur, tenuibusque ut nisi digito scalpas vix appareant. *Caput* ipsi compressum, extensum, osseum, ossibus quàm plurimis, variis, angulosis, tenuibus, atque perlucidis constructum, maculis quibusdam exiguis purpureis exornatum. *Linea* obliqua à capite ad caudam ducitur. *Os* latissimum, plurimum hians, edentulum, etsi quodammodo dentatum pinxerit Bellonius. *Oculi* magni, rotundi, aurei. *Branchiae* utrinque quaternae, quarum ossea opercula in aculeos desinunt. *Pinnae* duae mediocres ad branchias, duaeque aliae in anteriore ventris parte paulo longiores, ac in quinos velut longos pilos aut fetas porcinas degenerantes, ab ano rursus duae aliae quarum prior pars quinque duntaxat aculeis constat; altera multo longior, & ad caudam ferè usque extensa, aculeis caret, in dorso unica tantum & magna, ut quae paulò ante medium dorsum exorta, ad caudam usque ferè extenditur, figura huic pisci propria, & aliorum piscium dorso pinnae dissimilis. Primum namque in longissimos pilos ejus ferè modo, quàm in anteriori ventris parte conspici diximus terminatur; deinde plurimis robustissimis aculeis intertextis armatur; postremò aliis etiam aculeis osseis multò brevioribus, bifidis atque recurvis, secundum ejus exortum in dorso praemunitur. Pars ventris utrinque ossibus instar acuti cultri secantibus firmatur. *Cauda* in unam pinnam desinit. *Ventriculum* habet mediocre, gulam manifestam, intestina parva tenuius in gyros convoluta, inter quae ova rubra latere Rondeletius ait. *Hepar* candidum sine felle, lienem rubescentem exiguum, mesenterio haerentem. *Cordis* pars infima rubet, suprema & media ex albo rubescit, quod in paucis piscibus spectatur.

Oppian.  
Hal. l. i.  
v. 133.

In saxis eum degere tradidit Oppianus, in Atlantico & Gaditano generosissimis piscibus adnumerari Columella. Ita carnivorus est, ut nec alia maris purgamenta spernat. An ei stridor competat, quem Chalcidi Aristoteles tribuit, ita ut pro χαλκός χαλκός legatur, quod Aldrovando placet, aliis judicandum relinquo: mihi, cum branchiarum opercula tam horrida habeat, ut dimota sonitum edant, & verò plurimi ex piscibus τὴν δούσαν φωνὴν τῇ πρὸς τὰν βραγχίαν (ἀκυσθῶντες γὰρ οἱ πόποι) hoc quod vox videtur, attritu branchiarum, quippe loca spinea sunt emittunt, verisimile videtur. Solivagus est, & erectus, non passerum more in latus conversus natat.

Reputatur inter pisces carne satis tenera

& friabili, concoctu facili, & boni succi. Apud veteres in multa fuisse aestimatione ex Columella dum dicit, *Atlantico pascitur Faber: qui & in nostro Gadium municipio, generosissimis piscibus adnumeratur, eumque prisca consuetudine Zeum appellamus*, didicimus. Cum ob corporis tenuitatem, commodè affari nequeat, aut frictum & omphacio aut aurantii mali succo irroratum, aut in aqua & vino partibus aequalibus, oleo, fale, beneque olentibus herbis atque aromatibus elixum comedit, Salvianus tradit.

Columell. R.  
R. l. 8. c.  
16.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
18.

## CAPUT II.

De Piscibus saxatilibus levibus.

### ARTICULUS UNICUS.

De Alaudis & Pholide

Inter Saxatiles laeves, Alaudæ duntaxat, cum iis qui ad eas pertinent Gutturoso nempe pisce, & Exocæto Bellonii, & Pholis reperiuntur.

Tab.  
XVII. 3.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. i. c. ult.

ALAUDAM duplicem facit Rondeletius, *Cristatam* & *non Cristatam*.

Illa corporis specie Scorpioidi admodum est similis. Colore fusco, multis maculis partim rotundis, partim oblongis & tortuosis notato, tenui, laevi & lubrico, ore parvo, dentibus anterioribus ferratis, posterioribus exertis, oculis parvis caeruleis, in vertice dum vivit erecta est *crista*, mollis & caerulea. *Pinnæ* ad branchias latae sed breves; in ventre parvae & tenues. *Podex* non procul à branchiis distat, à quo pinna ad caudam protenditur, alia in cervice ad caudam continua. *Peritoneum* ex nigro viride est. *Cor* angulatum. *Hepar* ex albo rubet, à quo *fellis* vesica pendet, perspicuitate & coloris jucunditate smaragdum referens. *Intestina* lata sunt, coloris lutei. Ob parvam branchiarum scissuram sat diu extra aquam vivit.

Carne est molli, sed ob parvitatem negligitur.

Ad hanc Piscis GUTTUROSUS dictus referri potest. Nigricat quidem ferè undique: sed & punctis caeruleis distinguitur, & color luteus per totam superiorem dorso pinnæ partem, circa branchias & summo ventre visitur.

Tab.  
XVIII.  
3.

Littoralis est, & foramina lapidum aut ædificiorum littoralium subire solet, vel carne vasi injecta mox exempta capitur.

ALAUDA NON CRISTATA capite est parvo & rotundo, ore & oculis parvis, dentibus anterioribus ferratis, posterioribus longiusculis, acutis, exertis. *Pinnulas* duas habet ad branchias, duas in ventre, aliam

Tab.  
XVIII.  
2.



aliam statim à capite ad caudam continuam, item aliam à podice ori satispropinquo ad caudam usque ductam.

*Cauda* in unicam definit saxatiliū more: *Maculae* multae mediae corporis parti aspersae sunt.

Aqua, mucō, parvis Atherinis & Aphyis *vescitur*. Carnis substantia & mollitudine cristatae par. In petrarum rimis *degit*, hinc nomen Percepiere sortitus est.

Tab. XV. 7. 8. Huc & Exocetus seu A D O N I S Bello-  
nii, qui cum Urticis plurimum delectetur, & istae circa littora inter cautes haereant, mari profundius mergi recusat, in rupibus Bononiae, in cavis cautium quiescit.

Species illarum sunt plures, quarum una *Cristata* est Masiliæ frequens, primo aspectu Gobium referens. Cute glabra obducitur. Vulgus *Glinos* vocat, colore est subruffo, ut Scorpana multis aliis coloribus confuso. *Dentes* habet ut Scarus, firmos, continuam tergoris *pinnam*, ac nescio quid supra *oculos*, quod veluti à pellis laxitate procedit, laterum pinnae inversas, duas sub ventre duabus tantam cirrhis radiatas. *Cristati* caput ad Chamæoleonem accedit, in cuius cacumine *pinnam* Galli cristam referentem videas. *Dentes* habet anteriores acutissimos.

*Cauda* *pinnam*, & laterum rotundam, sub sterno duas; alteram in tergo continuam, maximè latam. *Branchias* tectas, & parvo foramine pervias, sed & detectae quatuor numerantur utrinque. *Cute* integitur laxa, multis coloribus ut Draco variegata. Chamas & conchylia conficit: sed & urticis interdum *pascitur*. Triduum vel quatrimum absque aqua vivit.

*Tertium Exoceti genus*, piscatoribus Byzantinis *Glini*, aliis *Chelidonii* nomine venit.

Rarò sex digitorum longitudinem, & duorum pollicum crassitiem excedit. *Squamis* caret, & lituræ melinae cyaneae & fulvae per tergus diffunduntur. *Pinna* tergoris continua est & mollis, caudae & laterum latæ, varii coloris omnes. *Branchiae* sunt connectae Spinea exterior, ut in Dracone marino, duobus aculeis obfirmatur: sed ab eo dissidet, quod quilibet aculeus duobus serratis denticulis repandis & aduncis fulcitur. *Caput* habet polymitum, *Os* grande, inferiorem *maxillam* latam & planam. *Dentes*

Arist. H. A. l. 9. c. 55. & Sca- lig. in Arist. l. c. Glino priore aliquantulum minores. Dum scinditur, *branchias* non ostendit integras sed rudimenta coloris paulò magis rubra quàm in Muræna. Non malè ad *Basiliscos* Oppiani referrentur.

Tab. XVII. 4. *PHOLIS* à mucō ita dicitur, quem emittit. περιπλασισσα περί αὐτῆς ὁ γίνεσθαι καθάπερ θαλάμην. *In circuitu ejus is concrevit, ac fit quasi cubile*. Antipoli & ab Italis *Bavosa* vocatur. Alauda paulò major est, dorso fusco, cute laevi, maculosa, ventre pallido. Pinnis

aliisque partibus à superioribus non differens.

Nec abludit ab his SCORPIOIDES Rondeletii sic dictus, quod capitis forma Scorpioni marino similis sit, totidemque supra oculos apophyses licet molles habeat. Galli *Leporem marinum*, quia rostrum terreni leporis περιρμήν sive *scissura* admodum simile habet, nuncupant. Differt à Scorpio dentibus, quos ferratos quidem habet, sed renues & densos admodum, & in superiore maxilla duos exertos, ab eodem & Galerita pinnae dorsi magnitudine, duabusque ejusdem pinnae nigris maculis distinguitur. Littoralis est, mucō vescitur & aqua.

### TITULUS III.

*De Piscibus Marinis Littoralibus.*

#### CAPUT I.

*De Squammosis non planis.*

#### ARTICULUS I.

*De Mullo.*

**N**ON minus benè primum *Mullo* inter littorales pisces locum dari, quàm Scarro inter saxatiles datus est, inferius patebit. *Nomen* apud Latinos non tam à mulleorum colore, (calcei erant quibus priores Albanorum Reges, postea patricii usi sunt) quod Fenestellae teste Plinio placet; quam à mollicie invenit. Servitutis est indignatissimus, ut Columella loquitur, & in piscinis nihil vel parum saltem crescit. Græcis περιγλή non περιγλα, & περιγλῆς quod de foemina sumendum est, quod ter pariat. Hinc Oppianus περιγόνισσιν ἐπανύμους γονῆσαι dicit; vocatur. Cretensum vox Στριγλημπαρτίνου ex Græca & Veneta composita est. An περιγλα dicantur, quod Hesychius innuere videtur, cum Triglas Græci περιγλατῖδας cognominent, in medio relinquo.

*Duo ipsorum sunt genera*. Alii sunt *Barbati*, quos περιγλατῖδας vocant, quique sola suæ bonitate, siquidem alii alga, alii carne vescuntur, differunt. Unde *Lutarii* apud Plinium nomen. *Imberbes* alii, quos quidam ἀπόρωνες, περιγλάς Sophron, & quidem, οὐφαλότρυες, quod umbilicus podexve aut magis quam aliis congeneribus patet, aut minus rotundus est; οὐδίατες, quod in summo mari natantes tranquillitatem promittant, nuncupat. Dari tales Salvianus negat, nullum alium ex veteribus ejus meminisse, perperam prætendens. Xenocrates enim saxatilem barba destitui innuere videtur, dum pelagium describit. Mullastros recte dixeris, quorum alium imberbem, alterum à squammis asperum Rondeletius facit. Figuræ est totus oblongiusculæ, magnitudinis me-

Tab. XVII. 5. 6.

Tab. XVIII. 4.

Plin. H. N. l. 9. c. 17.

Oppian. Hal. l. 1. v. 590.



Invenalis  
in Satyris.  
Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 18.

mediocris; binas libras raro exuperare, apud Plinium habetur, quadrilibris Seneca, sex librarum Iuvenalis meminere. Si verum est, octoginta librarum in mari rubro captum, ut Lucius Mutianus apud Plinium prodidit. Alterius is generis fuerit necesse est, dorso repando, unde *κύσας* gibbosas Epicharmus in nuptiis Hebes dixit, ventre plano albicante, cætera purpureo, hinc *ῥεδόχροα φύλα* Mullorum apud Oppianum. Matronus Parodus *μυλτοπαρόν* colore miniaceo fecit. *Squammis* magnis, tenuibus, ferratis, obliquo situ dispositis, facile ut apparet deciduis, robustis tamen. (Tiberius piscatori sibi secreto agenti insignem adferenti Mullum, eo faciem perfricari iussit) Pallentes eadem seu ad viredinem vergentes, virgis quibusdam paralellis insignitæ. Si vivus desquametur, *colorem sanguineum* fortiri, hinc *χρησώπε* apud Plutarchum, & *ξανθοχρόν*

Oppian.  
l. c.

Sueton.  
in Tiberio.

Seneca  
N. Q. l.  
3. c. 17.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
17.

apud Nausicratem nomina, Massurius auctor est. *Mortuum* versicolori quadam & numerosa varietate spectari, rubescantiumque squammarum multiplici mutatione pallescere, utique si vitro inclusus spectetur, à Seneca & Plinio proditum est. *Caput* habet repandum, multis velut cancellis aureis exornatum, in quo *spinam* Cani similem, quæ renibus apposita, miro sit remedio, Marcellus Empiricus asserit. *Os* parvum, edentulum, *oculos* mediocriter rufos, in Aldrovandi ex Hispania misso, nigricant. Duo *cirri* cutacei albi in quibusdam, in nonnullis rubri, molles, rotundi, longi, atque barbæ similitudinem gerentes propendent. *Branchiæ* utrinque sunt quaternæ, ad quas *pinnæ* sunt duæ aurei coloris, in ventre totidem candidæ; à podice rursus alia, in tergore duæ, prior ex firmioribus, posterior mollioribus aculeis constat.

Scalig.  
Exert.  
226. l. 15.

*Cauda* rubet, & in lunatam pinnam degenerat, ac propterea laterum pinna, velut in acutum tendere Bellonius autumat. *Interiora* si spectes, gula est parva. *Ventriculus* cum innumeris appendicibus itidem, *hepar* ex albo rubescit, *splen* exiguus est & nigricat. Scaliger, sinistro illud ventriculi lateri adiacere, dextro hunc, scribit. *Intestina* sunt mediocria; *cor* triangulare.

*Quæ huic adscripsimus* Minori quoque *Salviani* *Mullo* conveniunt, hoc discrepat, quod purpureo pingatur, aureis lineis careat, & lituris quibusdam flavis ac liventibus notetur, & squammis medico contactu deciduis vestiat.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 17.

Ælian.  
H. A. l.  
2. c. 41.

De *Loco* ambigitur inter Authores. Septentrionali Oceano & proxima occidentis parte gigni Plinius dixit; Galeno sunt pelagii. Oppiano modo *χαμαλοῖσι πὰρ αἰγιαλλοῖσι νέμονται* humilia prope littora degunt: modo inter faxatiles cum Seneca referuntur; nec abludit Ælianus, *λεπράδεις* ei à loco, quem incolunt nonnulli, *πέτρας λίπας & ἀραιας* minuta

& *rara tubercula*, aspera illa habere, scribit.

Per incerta maris spacia vagari, & circa littora, eorundemque saxa, ut plurimum vel quosdam duntaxat degere, verisimile videtur: Sanè imberbem inter faxatiles numerat Xenocrates, & Cantharo *ἄσπρα* tribuit Ælianus; *πέτρῃσιν ἀπὸ λεπρῶν μέμλε* *petris semper asperis delectatur* apud Oppianum idem: quam tamen littoralibus annumerare Aristoteles non dubitavit

*Procreantur* & in marinis lacubus, detinuit & in vivariis Hortensius ad Baulos, & maiorem sibi habebat curam, ne ipsius esurirent Mulli, quam Varro se habere profectur, ne sui in rosea esurirent asini. *Gregalis* est & autumnoviget. *Pamphagi* sunt, & præter cœnum, unde ipsi Sargus, comes, ostrea, algam, & conchas, quibus apertis inhiant, piscium & hominum cadaveribus vescuntur, & *μᾶλλον τοῖς μεμιασμένοις & κακίστοις φιλήδονοι*, magis sordidissimis & male olentibus, adde betarum folia, delectantur. De cadaveribus apud Oppianum & Ælianus legimus, & videntur id pugnae navales & naufragia, quæ magna copia subsequi solent, Rittershusio declarare. Antiphanes tamen inter Helenæ cibos, quod homines non infectarentur posuit. Pisces infectari nullum dubium Orphum *ἐπιφύας* inquit Oppianus.

*Vescitur lepore*, marino unum tantum animalium ut non intereat nullus piscis, tenerasit duntaxat & ingrator viliorque fit, verba sunt Plinii. Dum itaque carnivorum Aristoteles negat, ex iis, qui vel præter carnes nihil attingunt, vel viva tantum maris animalia venantur, eximere videtur.

Ter parere anno constans est Authorum opinio, his certe toties foetura apparet. Aristote. *ἐπὶ τῷ πηλῷ δὲ ὅτ' ἐκείναι πολὺν χρόνον ὀπληθεύουσιν*, in cæno, itaque sero parere, diu enim frigidum est, addidit, solus Ælianus apud Aldrovandum, sterilem reddi postquam ter pepererit, natis in utero vermiculis, qui semen exedunt, prodit, quod mihi nondum apud eundem invenire contigit. *Antipathiam* cum lepore marino habere ex præcedentibus cognosci potuit; addit Aphrodisæus Torpedinem, cuius viribus stupefactivis ista resistere creditur.

Insignis est prodigo veterum luxu seu precium, seu coquos seu lances consideres. Argenti pari pondere sæpius à privatis etiam Quiritibus emptum, cum pedis longitudinem superaret, Iovius prodidit. *Asinius celer Claudio Principe unum octi millibus nummum*, id est, quadringentis plus minus Caroleis, *mercatus est*, licet magis luxuriam æstimare, quod Plinius suis temporibus neget facile Mullum repertum, qui duas libras excederet. Crispinus Ægyptius ex servili conditione ad equestrem dignitatem Domitiani indulgentia evectus,

Ælian.  
H. A. l.  
1. c. 26.  
Oppian.  
Hal. l. 3.  
v. 340.  
Arist. H.  
A. l. 8. c.  
31.  
Varro R.  
R. l. 3.  
c. 17.

Oppian.  
Halieut. l.  
3. v. 435.  
Ælian.  
H. A. l.  
2. c. 41.  
& l. 12.  
c. 42.  
Rittershus.  
ad Oppian.  
l. c.  
Oppian.  
Halieut. l.  
3. v. 188.  
Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 37.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
17. & 15.

Arist. H.  
A. l. 6. c.  
17.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 17.  
Macrob.  
Saturn. l.  
3. c. 16.

Mul-



Juvenal.  
Satyr. 4.  
Seneca  
Epist. 96.  
Sueton. in  
Tiberio.

— *Mullum sex millibus emit*  
*Aquantem sane paribus sestertia libris.*

Publ. Octavius ingentis formæ (quatuor pondo & ad selibram esse aiebant) à Tiberio Cæsare in macellum missum, quinque millibus sestertiis mercatus est. Idem tres, triginta millibus nummum vānisse, graviter conqueritur & annonam macelli Senatus arbitrato quotannis temperandam cēset. Nec satis soluta luxuria videbatur, nisi & coqui maximo conducerentur pretio. *Reputatio hæc inquit Plinius, aufert transversum animum ad contemplationem eorum, qui in conquestione luxus, coquos emi singulos pluris quam equos queritabant. At nunc coqui triumphorum pretiis parantur, & coquorum pisces. Nullusque prope jam mortalis aestimatur pluris, quam qui peritissime censum Domini mergit. Lances quibus inferebatur, Chrisendeta Martialis vocat, vel crustis aureis ornabantur; vel gemmatae fuere; gemmæ auro confertæ & contestæ tenebantur, ut Turnebus explicat. Non eadem tamen omnibus præstantia. Polluci Ionici maxime placent. Actio Syncero qui ad rupes Herculeas capiuntur. Nausicrati Æxonici: Æxoniam Magnesiæ urbs est: sed Cratinus eos improbat. Archestratus laudat Tichuntinos; Tichus castellum prope Tachinam Campiæ oppidum est. Corficæ & Taurominitanæ rupes à Juvenale celebrantur.*

Plin. H.  
N. l. 9. c.  
17.

Martial.  
l. 2.

Turneb.  
Adv. l.  
14. c. 3.

Juvenal.  
Satyr. 5.

Perothus præstantissimos in mari Tyrrheno juxta Corniculum, & Tarquinius capididit. Iovius Romæ hyeme & suburbano mari captos maxime prædicari; Ligusticis, Venetis, & Neapolitanis non eam saporis gratiam esse, quanquam multo grandiores in convivia veniant, scribit.

Sed & longius à littoribus captis sua quoque gloria. Purior enim aqua in causa, corporis rubicundus, igneus, aureusque fulgor argumento. Magnas parvis gulæ proceres præferebant; seu propter majora capita, & jecinora; summopere ista expetita ex Galeno habemus: seu quod ita subtilioribus pabulis placeret; seu ut in explebilem gulam preciosissimo obsonio explerent, quas Philoxenum Poëtam apud Dionysium fecisse legimus. Heliogabalus non integros, sed quod præcipue stupendum Lampridius scribit; barbas eorum plenis discis, palatinis suis apposuit.

De carnis qualitate inter scriptores non convenit. Xenocrates obsoniorum præstantissimum, stomacho idoneum, origratum, boni succi, carne plana, difficilem ad corrumperendum, mediocrem ad excernendum pronunciavit. Celsus medium inter duras & teneras carnes habentes reponit. Diocli, Philotimo & Psello difficulter concoquitur. Durissima est & valde friabilis, boni nutrimenti, si bene concocta fuerit, Galeno. Apparatus ad Oeconomiam pertinet. *Olim*

*parum videbatur recens Mullus, nisi qui in corvix manu moreretur. Vitreis ollis inclusis offerebantur; & observabatur morientium color, quem in multis mutationes mors luctante spiritu vertit.* Apicius ad omne luxus ingenium mirus, in lociorum garo (nam ea quoque res cognomen invenit) necari eos præcellens putavit.

Seneca  
Quæst.  
Natur. l.  
3. c. 17.

Venit & inter Remedia. Sanguinis & hæmorrhoidum fluxus promovet. Sæpe sumptus oculorum aciem hebetat, Vinum in quo suffocatus est inter virilis impotentia causas, numeravit Trepstares, nec mulieres si biberint concipere; ideo Dianæ in sacris offertur. Assus torminosus peculiariter prodest, à Tralliano dysenteria hepatica laborantibus præscribitur. Carnes ex capitibus decoctæ & cum melle subactæ, ani tollunt vitia. Percussis denique à Pastinaca cum lasere medetur.

Impotentia virilis.

IMBERBEM duplicem nobis descripsit Rondeletius. Prior, quem Occitani *Imbriago* à rubore, quo ebriosorum facies inficitur, vocant, rarus est, veteribus parum notus. Hirundini & Cuculo corporis figura similis, colore magis rubro, capite magno, stellulis cælato. Oculis magnis, Ore parvo, edentulo, pars inferior Cinnabaris colore inficitur. Os branchias operiens in aculeos ad caudam spectantes terminatur, ad quas pinnae duæ sunt rubrae cum appendicibus aliquot, in ventre duæ alia. Cute aspera & rubra in dorso & lateribus contegitur. Ventre est candido, ad quem è dorso lineæ multæ ducuntur. A capite ad caudam dorso medio acutorum ossiculorum ordines, cavum efficiunt; è medio pinna rubra aculeis ferratis constans erigitur, quod non nisi in Sagittario videbis; quam alia veluti è mollioribus pilis constans sequitur. Cauda rubra est Scorpionis caudæ similis. Ventriculus parvus cum multis appendicibus. Venter vere multis ovis distenditur.

Alter à squammarum asperitate, *Asper* nominatus, corpore est brevi; tereti, digiti magnitudine, colore minii vel valde purpureo. Capite, Branchiis, pinnis descripto similis, squammas habet parvas, ferratas, oblique sitas, à capite ad caudam lineam ex squammis contextam; pinnas ad branchias extra candidas, intra ex viridi nigrescentes. Venter cum appendicibus paucis parvum, hepar candidum, & sine felle. Splenem parvum ex rubro nigricantem.

Diversus ab hoc *Aldrovandi asper Mullus* Aldrov. Hist. est, ut pote totus fere ruber, capite aureis cancellis ornatus, in vertice aculeatus, dorso planus & asper, ventre candicans, branchiarum cæruleis striis pictis, cætera flavescens.

Galen. de  
Aliment.  
facult. l. 3.  
Achias l.  
2. c. 79.



## ARTICULUS II.

## De Hirundine &amp; Cuculo

Tab.  
XVII. 8.  
9.  
Plin. H.  
N. l. 9  
cap. 16.

**Q**UAMAM SIT GRÆCORUM Hirundo, seu ut illi vocant *χελιδών* ambiguntur. Rondeletius eandem cum *Lucerna* Plinii, quod noctu luceat, facit, & in Plinii loco transpositionem arbitrantur. Aldrovandus eum piscem esse, quem pro corace sive corvo Salvianus, pro *Lucerna* Gesnerus posuere, iudicat, & Hirundinem Plinii ab Hirundine Græcorum distinguit, illamque Rondeletii Mugilem alatum, Bellonii & Salviani veram Hirundinem opinatur. Ut ut sit, videtur *Lucerna* dici, non quod linguae ejus per os exerta tranquillis noctibus luceat, (piscibus enim explanata ista, si Aristoteli credimus; & fieri id, piscatores negant,) sed quod vel pinnae versicolores noctu fulgorem quendam emittant, vel quod speciem antiquæ lucernæ gerat, vel denique quod oculi ejus noctu luceant, quod verissimum esse iudico. *Caponem* Romani à capitis asperitate & magnitudine dixerunt.

Arist. l.  
2. de par-  
tib. Ani-  
mal. c. 16.

*Due ipsius sunt species*, quæ in omnibus ferè cum cuculo conveniunt. *Ore*, *rostrum*, *capite* osseo, anguloso, cæato, aculeorum, pinnarum, cirrorum cartilagineorum numero & loco. Maxima in appendicibus, utrinque ternis, similitudo: in eo distinguuntur, quod binæ *rostri eminentia*, quæ in cuculo longiusculæ sunt, in hoc vix conspiciantur, pinna lateribus hærens, primum sit viridis, in extremo cærulea, tergus quoque variegatur. Cuculus denique sæpè tres libras attingat, duas nunquam hirundo. *Squamis* tam exilibus teguntur, ut Gesnerus pro iis asperam habere cuticulam scripserit.

*Altera Hirundo* duas latas & cæruleas ad latera pinnas, Milvinis breviores habet, has per medium fere corpus expandit. *Corpore* quoque est recurvo, & crassiore, grandiore ventre.

Ælian.  
H. A. l. 2.  
c. 3.

*Solitarios* esse caputuræ arguit, singuli & pauci capiuntur. Cum aliquid metuunt, ex mari exilire dicuntur, sed humiliter volant.

Tab.  
XVII.  
10. 11.

**CUCULUM** Græci *κικυλός*, seu à sono, quo avis ejusdem nominis more obstreperit, ut Aristoteles & Athenæus testantur, seu quod cum retibus capitur vocem *κὺ* exprimat, dicunt. *Psellas* *κοκκυλίαν* nominat. *Typhon* apud Athenæum cum *τῆ τριγλῆ* sit similis, cum *Trigola* eundem à quibusdam haberi prodit.

Totus piscis rotundus est carnosusque, vix tres libras superat. Toto corpore præterquam in medio latere, in quo virga ex tenuibus squammis contexta protenditur, glaber est, in dorso à capite ad caudam duo squammarum ordines deferuntur. *Caput* ipsi magnum, osseum, angulosum, totum

cælatum, alicubi *aculeis* munitum. *Rostrum* in duas longiusculas eminentias semicirculum constituentes terminatur. Super utrumque oculum supercilii loco brevis, sed acutissimus & durissimus aculeus extat.

Utrumque branchiarum operculum alio & quidem longiori armatur *Maxilla* extrema sui parte asperiores dentium vice funguntur. Ante pinnas, cartilaginei cirri, utrinque terni dependent. *Ventrem* habet planum. *Caput*, dorsum, latera & pinnas rubra. *Ventriculum* cum multis appendicibus satis carnosum. *Intestina* lata, inter se convoluta, & multa pinguedine obducta, *hepar* subalbidum sine felle. *Splenem* rubrum & parvum.

Littoribus ab Oppiano accensetur. Aristoteles & Ælianus inter illos & pelagios ambigere dixerunt. Inter Brasiliam & Portugalliam densis agminibus volant, & aliquando milleni, sæpe centeni capiuntur. Pinnarum magnitudine adjutus in nando celer est.

Oppian.  
Halieut.  
l. i. v. 97.  
Arist. H.  
A. l. 8. c.  
13.

Carnem habet plurimam, albam, duram & siccam. Diphilus Milvo præposuit, quia friabilis, haud temere salubrem censeas. Ab Hippocrate in pituitosis morbis conceditur. Romæ frixus & aurantii mali succo irroratus, editur, quidam nec elixum aspernantur.

## ARTICULUS III.

## De Milvo, Hirundine Plinii, &amp; Lyra.

**MILVUS** seu *Milvago* Plinii idem est cum *Hirundine* Græcorum Rondeletii Aldrovando, Græcis *ἰεραξ*, Oppiano *ἰεραξ*, id est *Accipiter* dicitur, quod *Accipitris* species inter aves *Milvus* sit. *Pinnis* caudaque expansis *Milvum* avem omnino refert, latis nimirum & maculosis. *Corpore* est rotundo, oblongo, majori ex parte nigro, rubescente, aliquando omnino rubro. *Sesquipedalem* mensuram, vel maxime auctus non excedit. *Caput* habet osseum, quadratum, durum, asperum cujus pars posterior duobus iisdemque magnis & robustissimis aculeis, ad caudam spectantibus armatur. *Branchiæ* quæ tectæ, opercula ossea in duos aculeos robustos desinentia gerunt. *Pinnæ* stellulis maculisque variis asperguntur: *Squamme* osseæ, asperæ & triangulares serpentium more inter se committuntur. *Cauda* unica atque lata pinna terminatur. Quantum ad interiora, *Lingua*, & palatum splendore Sandaracum vel Cinnabarim superant, his Noctu lux, ac si candentes carbones ore continerentur. *Ventriculus* mediocris multis appendicibus munitus est, *hepati* pallido vesicula fellis committitur. *Lien* est oblongus & subruber. *Uterus* bifidus, ovis rubentibus refertus. *Cor* Angulatum.

Tab.  
XVII.  
11.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 2. c. 5.

Qui



Qui Hirundinis nomine Aldrovando ex Hispania missus erat, sub oculis ex violaceo, albicabat, cancellis quæ ad aureum colorem vergebant, exceptis. *Alas* habebat longissimas & latissimas, ex cæruleo viridescentes, maculis plurimis rotundis cæruleis conspersas majores aureis punctis oculorum qui in Pavonis cauda conspiciuntur similitudine ambiebantur. *Tergus* asperum partim aureo, partim ferrugineo colore tinctum erat.

Quem hic describimus, solo in mari degit, & raro, si Salviano credendum, capitur. Licet edentulus, Carnivorus tamen est. Iuxta littora ubi minor insequentium piscium metus est, humilem exercet *volatum*: altum, ubi major. Ad lapidis ictum volatum protulisse, quatuor extra summam aquam cubitis eminens, in Gallico maris interni littore visus est. Qui ad Herculis columnas navigant, tantum aliquando ibi horum piscium volantium turbam affirmant, ut aves aquatiles esse videantur.

A mensis propter carnis ingratitude reijcitur. A nautis templis offerri, ibique ob raram formam suspendi, Gillius author est. Rondeletius fel contra *oculorum suffusiones* efficax esse comperit.

**HIRUNDINEM** Plinii eum piscem Aldrovandus esse judicat, qui Romæ *Pesce Rondine*, Agathensibus *Falcomarinus*, Massiliensibus *Landola* dicitur. Si alas auferas ad Mugilis Cestrei inprimis accedit figuram, hinc Mugil alatus Rondeletio. Cubiti magnitudinem attingit. *Squamis* contegitur magnis. *Caput* habet rotundiusculum, *rostrum* acutum, *os* parvum, prorsus edentulum. *Pinna* quibus volatum exercet, totum corpus longitudine adæquant. *Cauda* pinna est lata, magna, lunata, & ceu in duas pinnas desinens. *Linea* quæ in cæteris piscibus à branchiis vel à capite per latera ad caudam dicitur, in hoc pisce à pinnis ventris orta per imum ventrem ad caudam fertur. *Venter* albicat, *dorsum* quod latiusculum est, ex cæruleo nigricat.

*Describit & alium* Aldrovandus, sub nomine *Mulli alati* seu *Lyræ* missum, *alis* rotundis, intus virentibus, extra nigricantibus, pinnis pectoris & cauda fuscis, ventre argenteo. Latera, *branchiarum ossa*, & *Syn Ciput* auro resplendebant. Non omnibus locis capitur, & Romæ rarissimum ajunt. Alga & aliis maris quisquiliis victitat, sed carne abstinet. Mugilibus carne & succo similis esse creditur.

**LYRA** piscis, qui quibusdam *Cephalus*, *Orphus*, *Erythrinus*, imò *σιδάρι* falso creditur, vel à cornibus anterioribus, quibus similitudinem lyræ, repræsentat, vel quod veluti lyræ sonum edat, ita vocatur.

*Species ejus duas* Rondeletius posuit. Prior lyra piscis est teres, ruber, *capite* osseo, ma-

gno: *rostro* in duo cornua lata protenso, quibus lyræ antiquæ formam refert: quem veterum *Lynam* Salvianus esse credit: quique squammis parvis & asperis contegitur, & plus ossium quam carnis habet. *Altera*, quam superioris maris quidam esse arbitrantur, sed falso, quoniam in hujus quoque ventre ova rubentia reperiuntur; palmi est magnitudine. *Corpus* habet quoad vivit rubrum, extincto color evanescit. *Caput* osseum, angulosum, aculeis & eminentiis plurimis asperum, cujus anterior pars in duo longa, lata, & retusa cornua degenerat, sub quorum exortu os est satis amplum, rotundum, & edentulum. Ex inferiore maxilla *cirri* quidam breves, molles & carnosi dependent. *Oculi* & branchiarum ossea opercula aculeis muniuntur. Ex duabus in dorso pinnis prior brevior in longas & rubentes festas degenerat, posterior à medio dorso ad caudam, sed inermis decurrit. *Cauda* in unicam pinnam illamque parvam desinit. Tegitur ossæarum atque grandium squammarum; quæ Media sui parte acutissimo, recurvo, atque ad caudam spectante aculeo muniuntur, octonis ordinibus; unde sicuti asper totus ita octangulus creditur. Quantum ad *internas partes*, *ventriculum* habet parvum, cum parvis & paucis appendicibus. *Hepar* pro corporis ratione magnum, album, & in eo fellis vesiculam. *Splenem* parvum & sub rubrum. Carnis porum, ideo facile exsiccat & sit levissimus.

*Vescitur* maris excrementis. Plures capi non solent. *Vocem* grunnitui similem omitit, seu attritu branchiarum, seu suis anterioribus, quas circa ventrem habent. Spiritus enim inclusus in his est, quem dum atterunt atque agitant, sonos illos elidunt.

Utraque quia dura est, damnari ferè in *cibis* solet.

#### ARTICULUS IV.

##### De Phagro & Erythrino.

**PHAGRUS** seu Pagrus, *παρά το φάγειν*. Tab. XVII. quia vorax est Græcis; à colore fragorum, rubeo enim est, Italis ita dicitur. Cave cum Paguro confundas.

Tanta est inter ipsum & Erythrinum similitudo, ut, cum ejusdem sunt magnitudinis, etiam peritis imponant. Distinguuntur tamen eo, quod Pagrus *hyeme* à ruffo ad cæruleum magis vergat, toto corpore sit latiore & rotundiore, Sargi instar recurvus, rostro spissiore, rotundiore, & ad aquilini nasi figuram accedente. Habet in super *tergoris* pinnam crassiorē: *oculorum* pupillam crystallinum, iridem rubram, peculiaremque lituram, nigricantem, tactu asperam, in lateribus circa cervicem, ubi lineæ est, quo corpora piscium interfecat, latam.



latam. *Squammas* gerit rotundas tenues & latas. Superior *maxilla* in tubi modum cervici veluti infarcta est, neque cranio inhæret. Cum oscitat exeritur, postea contrahitur. *Dentes* quoque habet acutos; quatuor exteriores parum falcantur; molares, qui rotundi & obtusi, duplici ordine disponuntur. *Interiora* si scruteris, sunt ei lapides in cerebro, *lingue* in ore veluti rudimentum, *hepar* sine felle. *Cor* angulatum, vesica aëre plena. Numenius *λοφίαν* quasi cristatum dixit, quod ea corporis pars, quæ cervici respondet, sublimis sit & alta.

Quem *Aldrovandus* exhibet, is pinnis omnibus tergore & cauda rubet. *Oculorum* ambitus ruberrimus, argenteis lituris conspergitur. A *branchiis* ad caudam linea excurrit, aurea, ferrata. *Ambigit* inter littorales & pelagios, inter hos *Mnesitheus* locat. *Oppianus* in faxis degere scribit. Quod ex Indico mari salitum afferri *Oribasius* prodidit, de illo potius, quem *Syenitæ* in *Ægypto* sacrum habent, coque, quod una cum incrementum *Nilo* apparens, incrementum ejus denunciet, abstinent, intelligendus est.

*Visitat* alga & luto, sed & *sæpiolas*; *squillulas*, *loligunculos* appetit. *Echinis* an vescatur; quod nimis aculeati sint, dubito. *Isidorus* tam duros ei dentes tribuit, ut & *ostreis* in mari aliquæat. *Hyeme* prægelida, quod lapidem in capite habeat, latet. Inescatur *chiannis* sive *hiatulis*.

Quid sibi *Aristoteles* velit, dum citante *Athenæo* *Pagrum* *ἀμύξιν τὸ ἔαρ* id est *vere rigere* scribit, difficile intelligi potest, nisi *τὴν ἔαρ* parere vere innuatur.

*Archestratus* *Syrio* exoriente comedendas esse suadet. *Suavēs* & *media carne* *Hicesius* posuit. *Gellius* inter delicatos habuit. *Sanazarius* ex *Dicarchi*, nunc *Puteolos* vocat, littoribus, celebrat.

*ERYTHRINUM*, qui peculiare hoc nomen à colore invenit, moderni *Græci* *ἐρυθρίον*, *Cyrenæi* authore *Zenodoto* apud *Athenæum* *ἔρυκλον*, authore *Clitarcho* *δινύλον* vocarunt. *Thodorus* satis ombigue *Rubeculam*, *Plinius* rectius *Rubellionem* dixit. Idem ne cum *Ruburno* & *Ruscupa*, de quibus *Murmeli*us, non disputo.

*Palmi* mensuram raro excedit. *Ruber* est ut *Mullus*, dilutior tamen, unde fortè *ξανθὸν* *Oppianus* dixit, latus ut *Aurata*. *Rostrum* habet acutum, sed non valdè extensum. *Os* parvum, mediocribus dentibus munitum. *Caput* utrinque compressum. Ante oculos, qui magni, foramina patula. *Branchia* quæ in dorso unica est, multis *aculeis* horrescit. *Bellonius* duodecim, quindecim *Rondeletius*, viginti duos, *Salvianus*, novendecim. *Gesnerus* numerat. *Cauda* in lunatam pinnam definit. Intus candidissimus est.

Peculiaris est mari, hyeme in alto degit,

æstate circa littora capitur. Diversus est ab isto ille qui in lacu *Suerinum* alluente, non procul *Oceano Germanico* visitur. Carnivorus est. *Cancellis* & aliis pisciculis insidiatur, nec locustis & cicadis parcat. *Gregalem* esse *Athenæus* *Aristotelis* auctoritate neminit. *Sexu* non distinguuntur. In omnibus enim reperiri ova *Aristoteles* auctor est. *Pariunt* ineunte æstate. Cum se sequi palmum excefferint in denticles seu *Synodontas* abire, falso *Jovius* credidit. Ad formam duntaxat coloremque accedunt, minusque solito ruffi, canescunt veluti.

Quantum ad usum copiosum alimentum præbent *Xenocrati*: nunc inter mediæ substantiæ pisces numerantur, si sint recentes, frixi & frigidi inter saporis jucundi cibos. *Aceto* & aromatibus in *Gallia* conspergere mos est. *Plinius* in cibo sumptum *Venerem* concitare & alvum sistere, quod à *Xenocrate* mutuatus est, scribit, in vino putrefactus, vini tedium adfert, cui illud propinatum fuerit.

## ARTICULUS V.

De *Acarname* & *Orpho*.

**P**iscis quem *Hicesius* apud *Athæneum* *Acarname* vocat, *Diphilo* *ἀκάρων*, *Athenæo* alicubi *ἀκαρνὸς* ex *Gallia*, *Ethymologo* *ἀκαρνὰ*, *Plinio* *Acarne*, dicitur. Scribitur quoque *ἀκαρνόν*, *ἀράκων* & *ἀράκων*, sine dubio mendose. *Mugilibus* infestum esse, si is est, quem *Aristoteles* innuit, & æstate extenuari, veteres prodidere.

*Rondeletius* pro eo piscem exhibet, album, *squamis* argenteis, ore mediocri, tenuibus dentibus, rostro aquilino *Pagri* modo, spacio quod inter oculos est compresso, oculis pro corporis proportionem magnis, aureisque pinnis candidis.

*Erythrino* adeo similis est, ut pro eo vendatur. Capitur æstate & hyeme; illa extenuatur, & laborat.

Carne est candidissima, media substantia, facile concoquitur & distribuitur, & bonum succum gignit.

*ORPHUS* *Polluci* *ὀρφος*, vel quod magis *Atticum* est *ὀρφιόν*, *Gazæ* *Cernua*, quis apud veteres piscis fuerit, difficile est conjicere, pauca enim quæ ad cognitionem ejus faciunt, reperias. *Benedictus* *Tincis* similem credidit. Alii *Capitonem* ab oculorum aspectu & rubro colore dixere, quidam quia majorem *Capitone* opinantur, sui generis piscem esse tradunt. *Gellius* ab eo qui hodie in *Græcia* ita vocatur, non distinguit. *Rondeletius* majorem hunc veter. *Orpho*, qui à *Mullo* devoratur, (viginti enim libras pendet) nec littoralem postquam dixisset, piscem *Pagro* similem, colore ex purpureo rubente, oculis magnis, dentibus serratis, *podice* adeo parvo, ut rimula vix animad-

*Arist. H. A. lib. 4. c. 11. l. 6. c. 13. l. 2. de gener. An. c. 4. Plinius H. N. l. 9. c. 16.*

*Plin. H. N. l. 32. c. 10.*

*Tab. XVIII. 7. 8. Athen. l. 7. & 8. Dipnōf. Aristot. H. A. l. 1. c. 9. Plin. H. N. l. 32. c. 11.*

*Oppian. Hal. l. 1. v. 140.*

*Oppian. Hal. l. 3. v. 185.*

*Tab. XVIII. 6.*



madverti possit, seminis meatibus carentem, pro eodem ponit; eidemque omnia quæ veteres de suo dixere, competere scribit. Bellonius denique alterum compressum magis quam teretem, squamis asperis, & corpori firmiter inhærentibus tectum: *Capite* rubeo; *pinnis* tergoris, laterum *ventris*, & *caudæ* variis coloribus insignibus; labris scabrosis, maculam in radice caudæ gerentem, quem Creteneses. *Cheluda*, *Acheluda*, & *Petro psaro* nominant, pro eodem obtrudit.

Arist. H. lib. 8. c. 13. l. 5. c. 10. l. 8. cap. 2. & l. 8. c. 15. Athen. Dipnos. l. 3. & 7. Oppian. Hal. l. 1. Elia. H. A. l. 5. c. 18.

Ut ut sit, de veterum Orpho scimus, Aristoteli & Athenæo littoralem, Æliano marinum, Ovidio pelagium esse. Numenius thalamis & cavernis delectari; Oppianus in petris cavernosis, quæ plenæ sunt Chamis & patellis, degere scripsit. Carnivorus idem. In Myrinensi Lyciæ sinu ad Apollinis templum, ad sparsas vitulinas carunculas adnotant, easdemque comedunt; brevi tempore adolescit, hyeme latet; in biennium *vitam* non prorogat, & tarde moritur, ideo ὀψιμόραν ὄψις Oppiano.

Aristoph. in Vespis.

In ciborum fuit deliciis. Nam & Dorion Opsophagus inter cæteros veluti ex piscibus, Deos ponit; & Lynceus Samius Attico Glaucisco, Ellopem & Orphum Rhodios opposuit, & Aristophanes inter regios pisces retulit. Athenæus δούλιον, πολιδούλιον, γαρίδον, δούριον, πολυδούριον, & εὐρίδον facit, quæ sequuntur transposita esse, ut Rondeletius observavit, videntur, qui enim potest aliquid esse γαρίδον & δούριον, glutinosum, & concoctu facile. Philotimus tamen inter duræ carnis pisces reposuit.

## ARTICULUS VI.

De Synodonte sive Dentice.

Tab. XVIII. 9.

**S**YNODON piscis παρὰ τὴν ὀδόντα nomen invenit, quod si prima syllaba per jota scribatur, παρὰ τὸ σινεδοὺν ἢ βλαπτεῖν τοῖς ὀδόντιν, quod dentibus noceat, ita vocatur. Gaza *Denticem*, Albertus *Dentatum*, alii *Dentalem* nominavere. Plinius Græcam nomenclaturam retinuit. In Adriatico mari in insignem magnitudinem excrescit, in littore Auratam non superat. Vulgarium pondus trium aut quatuor librarum esse solet: decem librarum pondere observavit Salvianus. *Dorsum* habet repandum; latera satis compressa. *Caput* nonnihil fastigiatum, in quo lapides, qui *Synodontides* vocantur, gerit; *rostrum* acutum, *Os* satis amplum, valdeque denticulatum, præter minores ac ferratos, superior *maxilla* quinque aliis, inferior octonis permagnis, caninis simillimis armatur. *Oculi* sunt magni, branchiæ utrinque quaternæ. In *dorso* pinna unica viginti aculeis munitur. *Cauda* est falcata. *Venter* argenteus, unde album Numenius vocavit: latera & dorsum ex albo rubent. Unde ruber Ovidio ἐρυθροπικρία Epi- charmo.

Aldrovandus duas alios fortè congeneres huic addit; quorum priori *tergus* viride, *Synciput* aureum, *branchiarum* ossa violacea. *Alteri* os intus & extra subatrum, supra id macula cærulea: sub branchiarum pinnis macula insignis, purpuraceis, aureis decorata squammis. *Venter* flavus, *squammæ* argenteæ.

Pelagium quidem Columella facit cum Ovidio, sed Aristoteli & Oppiano; quibus littoralis est, suffragantur piscatores. Probantur ex Dalmacia & Illyrico, præsertim Salana atque Tragurio Columella Punicas & indigenas nominat.

Carne tandem vescitur, & tanta cum aviditate, ut ventre in os procidat. Polypi carne inprimis delectatur, quem cubili suo extrudere non possit, ante ostium tanquam mortuus fluctuat, branchium extendentem, arripit; sed & in ostrea ac pisces innoxios grassatur: nec Boce, quod ab Oppiano proditum, parcat. Gregales sunt, & συναγείδου καὶ ἡλικίαν solent: per adolescentes καὶ ἴλας νέχοντες, separatim à reliquis natant. ὁ τέλει- στροι πάλιν κοινῇ. firmiori ætate inter se vitæ communitate junguntur. Cibo à piscatore demisso, in orbem consistente, & signum quasi eo arripiatur, dant.

Ab Antiphone inter lautissima obsonia recensentur. Hicesius copiosi esse alimenti, & difficulter excerni scribit. In Italia peculiare condimentum quod amarinare vocant. In Dalmatia concisus & semicoctus multo croco & perspicuo gelu conditur, detestatum Aponensi obsonium.

## ARTICULUS VII.

De Synagride &amp; Chromi.

**D**E SYNAGRIDE pisce diversæ sunt apud Authores opiniones. Theodorus Gaza pro eodem cum Synodonte sumit. Massarius & Gellius adeò similes, ut vix discerni queant, volunt. Rondeletius sola ætate distinguere iudicat. Diversos pisces vel ex Aristotele colligas, qui diversis in locis, duobus his nominibus utitur. De Bellonio tacebo, qui & modernos Græcos distinguere scribit. Antonius Gigas sequentem iconem pro Synagride misit.

Piscis erat insigniter dentatus, squammis undique latissimis, & facile deciduis tectus. *Capite* superius sanguineo, inferius ex albo & cæruleo variante. *Ventre* ex albo flavescente, lateribus candicantibus. Bellonius Synagridem Cyprini in modum, veluti circino ita circumductum, ut pro longitudine ac latitudine magis crassus appareat, facit. *Caput*, inquit, utrinque compressum habet, &c.

CHROMIS & CREMIS πρέμυς idem esse piscis, vel propter nominum similitudinem videtur. A grunnitu, quem edit ita dictus est,

Columella l. 8. c. 16. Arist. H. A. l. 8. c. 13. Oppian. Halient. l. 1. v. 170. Arist. H. A. l. 8. cap. 2.

Oppian. Halient. lib. 3. v. 185.

Elia. H. A. l. 1. c. 46.

Tab. XVIII. 10. Tab. XL. 11. Aldrov. de Piscib. l. 2. cap. 13.

Tab. XVII. 14.



est, quod & apud Isidorum, quicquidem cum corvo marino facit, legimus; sed isne, quem Rondeletius describit, pinnis, spinis & figura Metaurino similis, oculis tamen minoribus absque macula in cauda, toto corpore nigricante; an is, quem Bellonius, Chromis sit, dubitatur. Accedit tamen huic Aldrovandus, sola grunnitus ratione habita. Tenuibus autem is squammis vestitur ex auro nitentibus, acceruleum interdum colorem concinué vibrantibus. Binas (verba sunt Bellonii) *pinnas* gerit intergore, quarum anterior quæ minor est, &c.

In herbosis degere Ovidius author est, quia immundum nominat, & luto gaudere credibile est. Virentibus herbis vescitur. Parit quotannis semel. Exquisito esse auditu apud Aristotelem legimus. Grunnire superius dictum est.

Arist. H. A. lib. 5. c. 9. lib. 4. c. 7. & 8.

Vilem suam Chromin Rondeletius facit, Bellonii inter laudatissimos censetur.

## ARTICULUS VIII.

### De Aurata.

Tab. XIX. 2. **A**urata, seu Orata, Græce, χρύσοφρυς. Quod iis in locis, ubi in cæteris animalibus supercilia esse solent, aureo colore resplendeat, Ephesiis teste Archestrato ἡεσυχίῳ Hefychio ἑταλῆς dicitur. Ad denas libras cum maximè adolevit, vix unquam pervenit. *Dorsum* habet repandiusculum, ex ærulco nigrescens. *Latera* compressa, argentea. *Ventrem* lactei coloris. *Partes oculis* superiores auro, in adulto maximè, resplendent. *Dentes* anteriores sunt longi, rotundiusculi, ferrati, internæ utriusque maxillæ partes, plurimis ossibus tuberculis duris & inæqualibus muniuntur. *Ventriculum* habet amplum cum paucis, ut Aristoteles notavit, appendicibus. *Intestina* ampla pinguedine involuta. *Iecur* magnum pallidum, à quo *fellis* vesicula, longa, pinguedine obducta pendet. *Splenem* subatrum.

Aristot. H. A. l. 3. c. 17.

Aristot. H. A. l. 8. c. 13.

Athen. Dipn. l. 1.

Aristot. H. A. l. 8. c. 2.

Sic est marinus piscis, ut & in lacubus etiam marinis nascatur, quod tales conventis marinis feminibus, Romani replessent. Commachium Bonnoniensibus eas subministrat, & olim Velimus, Sabatinus, Vultinensis, & Ciminus eas procreabat. Sed & circa Berenicem Lybiæ fluvium, qui λίθων dicitur, inveniuntur.

*Cibus* ipsi sola caro. Tellinas & conchyliis robustis maxillis frangere; Mænide tanquam ejus usu vehementer oblectetur capi, certum ferè est. Scari modo *ruminare* asserit, sed fortè sine authore, Rondeletius.

Plinius H. N. l. 9. c. 16.

Aristot. H. A. l. 8. c. 19.

Æstate circa fluviorum ostia parit. Æstus impatientia, mediis fervoribus, sexagenis diebus *latere* à Plinio proditum est: tempus Aristoteles non expresse. Timidissimos esse captura ostendit. Recedente maximè sub Arcturi tempus mari, arborum

ramos frondibus vestitos, in arenam piscatores difigunt: accedente plurimæ attrahuntur; reciprocante ramorum tu, quiescunt, & ab imperitissimis quoque capiuntur.

Ælian. H. A. lib. 13. cap. 28.

In precio fuere olim, Ephesiæ inprimis, quas Archestratus celebravit. Sergium Romanum patritium, cognomentum inde sibi adscivisse, quod carissimæ ipsi essent Oratæ, apud Varronem Columellam, Valerium Maximum, & Macrobius legimus. De *nutrimenti* qualitate non convenit inter veteres. Mnesithæus difficulter coqui, concoctam multum alere. Celsus duriores esse. Diphilus cum Melanuro, qui succi bonitate Sargo, Hicesio iudice, minus nutriente, inferior est, proportionem habere, asserit. Ideo Rondeletius carne media esse pronunciavit, saxatili duriore. Nostra ætate marinæ & quæ hyeme capiuntur, laudantur. Lacustres pinguidiores quidem, sed lutum, quod in eo degant, olent. Apparatum in Aldrovando vide.

Macrobius Sat. l. 2. cap. 11. Colum. R. R. l. 8. c. 16. Athen. lib. 5.

## ARTICULUS IX.

### De Sargo.

Σ *Αργὺς* an *σάρκω* dicendus sit piscis, dubitatur. Is quem Melanura Hicesius accommodat, vocatur *σάρκω*. Rondeletius geminum nomen agnoscit, à multa carne id habere iudicans. Sparo squammis tenuibus, lato corpore, linea à branchiis arcuata, pinna continua affinem Bellonius pronunciavit. *Rostro* acutiore, *dorso* magis repando, *ventre* prominentiore, *dentibus* latis humanisque simillimis, lineis quibusdam, unde *πολύγραμμω*. & macula juxta caudam nigra; unde *πτελάνγραμμω*, & ὁ ῥοσφυρόσις Aristoteli dicitur, distinguitur. *Colore* alias est argenteo. *Pinna* quæ ad branchias sunt rubescunt. *Branchiarum* exterius tegumentum spineum est. Hepar subrubescit: ab hoc *fellis* vesicula pendet. *Lien* subniger est, & ferè circinatus. Ad multam magnitudinem excrescere assolet.

Tab. XIX. 1. Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 16. 17.

*Aldrovandus* binos exhibet. Prior ὁ ῥοσφυρόσις, pinnas omnes, præter eam quæ ab ano est, habet aureas; maculam juxta Uropygium violaceum, totum caput ad eundem colorem vergens.

*Alter* *πολύγραμμω* aureis & argenteis quæ ferræ figuram exprimit lineis, elegantissimè condecoratur, pleræque ad rubiginem vergunt. Gesnerus in *mortuis* lineas evanescere tradit. Ægyptio eum mari vendicat Festus, sed & in Adriatico nascitur. Pelagiusne sit, an saxatilis vel littoralis, inter Ovidium, Ælianum, Oppianum, & Aristotelem non convenit. Ita littore gaudere dicerem, ut & cautes sæpè frequenter, quod radiis solaribus ibidem commodius fruatur. Sæpe quidem *cæno* à Mullo excitato contentus est, sed & carnivorum esse certum, quia

Ælian. H. A. l. 1. c. 17. Aristot. H. A. l. 8. c. 17.



quia Lycostomo pisce inescatur. *Gregalem* Ælianus facere videtur: dum confertos capi-  
scribit. Ad motum ut ut benè *παρὰ* Oppia-  
no dicatur, in evitandis tamen piscatoriis in-  
fidiis *λινθωδὴς* est, seu quòd lineam ad-  
scopulos terat, quod apud Plinium legimus:  
seu quod vel retibus proximus spei piscato-  
rum illudat. *λινθὸν* sanè & pro voti, & pro li-  
nea cui hamus affixus est, sumitur. Plures  
sibi adsciscunt *uxores*, pro his tempore ver-  
no pugnant. Vere & autumnoparere, apud  
Aristotelem legimus, siquid aliter ab eodem  
dicitur, de Sargino non Sargo sumendum  
est. Tam vehementer capras amare Ælianus  
prodidit, ut ad illarum in aqua umbram, o-  
dore fortè illecti, adnatent, & saltu contin-  
gere conentur. Ne itaque mirere pellibus  
carum capi.

Oppian.  
Halieut.  
l. i. v.  
132. l. 4.  
v. 267.  
Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 59.  
Arist. H.  
A. l. 5. c.  
9.  
Ælian.  
H. A. l.  
11. c. 11.

Fit eorum ab Epicharmo in nuptiis He-  
bes mentio. Et sanè grati esse stomacho cre-  
duntur, probique succi. Cæterum ægriu-  
sculè, quia durioris carnis, concoquuntur.  
Hydropicis Garyopontus præscribit. Den-  
tes gestatos dentium avèrtere dolores. Ki-  
ranides fabulatus est.

Adjungit Aldrovandus Sargo *piscem, quem*  
*pro Melanderino*, Athenæo nominato, si e-  
xemplar mendosum non est, (Casaubonus  
Melanderini nomen ab aliis exemplaribus  
exulare scribit.) Rondeletius depinxit. Me-  
lanuro iste similis est. Toto corpore nigrescit,  
circa caput ex nigro purpurascit. Cauda sa-  
xatiliū more in unam latam pinnam de-  
finit. Hepar habet ex rubro candidum. Sple-  
nem nigrum, felaqueum, lapides in capite.

## ARTICULUS X.

De Sparo.

Tab.  
XVIII.  
11.

Quem Græci *σπάρων* à πὸ πῶ σπαρρεῖν, quod est  
palpitare, ut Eusthatius author est,  
Latini Sparum, seu à spargendo, seu aliunde  
vocant: hunc eundem cum *Rhyade* Aristote-  
lis, & Æliani *Aspargo*, sed perperam, Ron-  
deletius facit. Nec enim vel *σπάρων* speciale  
alicujus piscis nomen est, quod Salvianus  
opinatur; nec videtur isto vocabulo in sin-  
gulari uti. *Πισκίδες* verò, quos Aristoteles, fu-  
gere quoties vel piscium lotura vel navis sen-  
tina ejecta est, quasi foedo tactos odore scri-  
bit, & quos Gaza modo *flutas*, modo *spar-*  
*gos*, aliquando *fusaneos*, id est, *χύτας*, quod  
fusim retibus capiantur, vocat: ii sunt, qui  
frequentes quidem & simul natant, fusim-  
que & retibus capiuntur; ducem tamen,  
quod *ἀρχαίος* proprium, non habent.

Arist. H.  
A. l. 4.  
c. 8.

Ælian.  
H. A. l.  
9. c. 46.

De Aspargo nihil apud Ælianium inve-  
nies. Gyllius duntaxat Rhyades Aspargos  
interpretatus est, & multis errandi occasio-  
nem præbuit. Haud parvam cum Aurata &  
Sargo habet similitudinem. Ab illa, corpore  
minore & magis rotundo, rostro acutiore, &  
quod circa branchias nullam neque purpu-

ream, neque nigram maculam gerat, distin-  
guitur. Ab hoc verò, quod ex auro resul-  
geat, lituram in cauda habeat, capite sit ma-  
gis protenso, tres *aculeos* sub spina quæ est  
ano vicina ostendet, lienem rubrum, graci-  
lem, oblongum, rectum, in dextro latere ha-  
beat, differt.

*Littoralem* Oppianus facit, Plinius inter  
marinos recensuit. Ovidius pelagium vo-  
luit, sed & marinis stagnis gaudet, inque iis  
frequenter capitur. Gregalis est, *carnivorus*,  
venatur & marinos pulices. Æstate circa sa-  
xosa littora parit. Haud olim ignobilis in ci-  
bo. Coquus apud Antippum inter lautissi-  
mos recenset. Epicharmus inter eos ponit,  
quorum ne stercora quidem fas sit Diis abji-  
cere. Diphilus acrem esse *ἀπαλόστακτον ἀβραμὸν*,  
*δυσόμαχον*, pronunciat, elixum coctu facilem,  
*ταρηνιστὸν*, difficilem addit. Rarò ob parvita-  
tem elixatur.

Oppian.  
Hal. l. i.  
v. 109.  
Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 11.

## ARTICULUS XI.

De Mormyro &amp; Cantharo.

DE Mormyro, qui Oppiano *μормύρο*, Tab.  
Ovidio *Mormyr*, Gazæ *Mormur*, pauca XIX. 3.  
prodidere veteres. Quem Bellonius descri-  
bit, Constantinopoli & alibi, nomine veluti  
per manus tradito, Mormyrus dicitur, vide-  
turque notas ab antiquis traditas. (*ἀιοχὸν* seu  
maculosum Oppianus, *πίκτον* Ovidius no-  
minat) sibi vendicare. Piscis est corpore  
quam Aurata, Sparus, Sargus, & Melanurus  
longiore, & minus ad latera compresso. Ca-  
pite item (utor verbis Aldrovandi) tenuiore  
& cæato, rostroque acutiore. Os mediocre  
habet, dentes exiguos, labia crassa, oculos-  
que medios, branchias utrinque quater-  
nas, &c.

Oppian.  
Hal. l. i.  
v. 100.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 2. c. 19.

*Littoralem* esse, præter Arcestrati apud  
Athenæum & Oppiani auctoritatem, quo-  
tidiana piscatorum experientia testatur.  
Nullum non *cibum* attingit, parva animalcu-  
la, conchulas, & minora crustacea venatur;  
nec à terrestribus sordibus abstinet. Parit  
æstate, capitur verriculis, & plagulis, ut  
Plutarchus ait. Retibus inclusus, imis in  
vadis, sulco, crebro caudæ motu depulsis  
arenis facto, subterlabitur. *Τροχιμώταλον* Hice-  
sius facit, quia lutum olet, vilis nostro tem-  
pore habetur.

Oppian.  
Halieut.  
l. 3. v.  
126 A-  
then. l. 7.

CANTHARUS Græcis antiquis *κάνθαρος*, Tab.  
& genere scæminino *κάνθαρις*, modernis *σκίταρα*, XIX. 3.  
Gazæ *Scarabæus*, Plinio & Ovidio *Can-*  
*tharus*, forte à coloris bætici & ferruginei  
similitudine, dicitur. Squammis integitur  
parvis, ex indico splendentibus. Caput &  
circa oculos partes ex nigro rubescunt. La-  
brum superius veluti in calya infarcitur. A  
branchiis ad caudam lineæ ducuntur subau-  
reæ. Bellonius lineam armatam utrinque in  
lateribus, cyaneam esse tradit. Observati  
sunt lineis albicantibus, cyaneis, ex luteo



nigricantibus, rectis quidem, sed non ita conspicuis variegati. Internis partibus non differt à Sparo, & lapides habet in cerebro. *Verfatur* in cænosis littoribus ac portubus, in quæ loca maris sordes fluctibus pelluntur. *Pamphagus* esse creditur. Nam carnes, panis, caseus, aqua & stercus in cibum ipsi cedunt. Turgent amore foeminarum, & quia Zelotypi acerrime pro suis conjugibus pugnant, sed non aliter, quam Menelaus cum Paride, pro una tantum, quod ab Oppiano & Æliano pro ditum est. Inescantur Polypo, aut Carabo in nassam vimineam indito. Ingratum succo Ovidius dixit. Mollis & præhumidæ carnis fecit Rondeletius.

## ARTICULUS XII.

De Salpa &amp; Stromatheo.

Tab.  
XIX. 76.

**S**alpa Græcis *σάλπη* & *σάλη*, Hesychio & Phavorino quoque *βέτι*, *bos* vocatur, quod nomen ipsi ab Halionorum (maritimi populi Cariæ vicini) piscatoribus inditum est, si bene Pancratis versus apud Athenæum, correxit Gesnerus. Posset & *Chrysopleuros* ab aureo, quo per latera Salpa resplendet colore, dici. A cervice in caudam per argentea latera, aureis rubentibusque lineis, certis intervallis distinctis, decentissimè pingitur: Undo Aristoteli apud Athenæum *πρόβρυς*, *πολύραμος* & *εὐδρόραμος*, Oppiano *αἰολόρατος* hoc est, ut Lippius reddit, variis distincta tergora signis, dicuntur. Caput habet parvum & rotundum, dentes in superiore maxilla sedecim, in inferiore octodecim ferratos firmos. Oculos aureos supercilia quodammodo virescentes, pinnam in tergo unicam longam, multis spinis asperam. Caudam bifurcam, linguam mediocrem, Squammis tegitur latis & varii coloris. Ventre & lateribus candicat, dorso ex cinereo nigricat. Interanea nigerrimo peritonæo continentur. *Hepar* est magnum, subrubrum, in tres lobos divisum, cui fellis vesica appendet. Splen nigricat. Vulva bifida est, ovis innumeris plena. Bellonius raro duas libras excedere scribit. In nullo piscium genere exactiorem servat: magnitudinem Salvianus, ideo forte à Pancrate *ισομήκετος*, æquales magnitudine longitudineve, quamvis Dalechampius facta ad pisces, quos nominaverat comparatione, id fieri credat. *Duo ipsorum* videntur genera, commune unum & omnibus notum quod descripsimus. *Minus alterum* quod in Narbonensi Gallia *Virgadella*, id est virgis seu lineis distinctum nominatur, quodque in stagnis marinis reperiri, & non nisi ætate à communi differre ex Rondeletio habemus. *Locum* si attendamus, herbofa laxantur arena apud Ovidium. Oppianus *πέτρας ἀμφιέλης κύκλοις μεδαλέας*, *scopulos mari cinctos*, musco humidus, illis adscribit. Aristoteles in mari & stagnis marinis locat. *Cibus* ipsi alga

Oppian.  
Halieut.  
l. i. v.  
125.  
Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 2.  
& l. 4. c.  
8.

marina, porrum, ut apud Philosophum extat, stercus & alia foetida. Unde *σκαλοπαγί*, & *βελουχί* merdivoram, & foetidam in nuptiis Hebes Epicharmus, obscœnum piscem Plinius nominat. Semel anno & quidem autumno paulo ante æquinoctium parit, quibusdam in locis & ætate, si Aristoteli habenda fides est. Turmatim ab imò gurgite ad littora ferri, moxque alga, aliisque marinis herbis pastos, celerrimè in mare demergi, tradit Bellonius, rarò unam, plerumque plures simul capi Salvianus. Cucurbita capitur, quod ea delectetur nimium, idque uni ei ex omnibus evenire Aristoteles docuit. *Audiu* valere apud eundem legimus. Nul- lum ferè inter *cibos* habet pretium. Arche- strato semper mala, Diphilo dura & insuavis est. Platina sylvestre quid & ferinum resipit: circa Ebusam tamen capta haud spernitur. Alexandrina pariter maximè si in Autumno nata fuerit, humidum quid & album, idque non virosum emittit, ut Diphilus refert, sed & circa Mytilenem tempore messis capta haud ingrata est. Omnium tamen dura caro est, ut Plinius percoqui posse neget, nisi ferula prius verberetur.

Plin. H.  
N. l. 9. c.  
51.Arist. H.  
A. l. 8. c.  
2. l. 4. c. 8.

Huc *STROMATEUS* pertinet, piscis in rubro mari teste Athenæo nascens, Salpæ similis, & universo corpore, aureis lineis productis distinctis, unde nomen invenit. Rondeletius pro eo subsequenter piscem pinxit, sed non descripsit.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 19.  
Tab.  
XVI. 7.  
Athen.  
Dipn. l. 7.

## ARTICULUS XIII.

De Fiatola Romæ dicta.

**P**iscem qui *Fiatola* Romæ dicitur, quidam veterum Callionymum, alii *Ellopon*, nonnulli *Lycon*, Bellonius *καλλιόν* esse opinatur. Aurei est & argentei coloris, multisque lituris variegatur. Latus item est ac planus, ut Bellonius scribit, rotundum ferè & compressum, Seferino non valde absimilem, Rondeletius facit. *Linguam* habet carnosam Delphini modo, ad humanam accedentem, suisque partibus omnimò absolutam, quod inter cæteros branchiis præditos solus habere videtur. Vendicat & hoc sibi peculiare, quod *pinnis* sub ventre careat, sitque omninò inermis. Gerit quoque branchias utrinque quatuor superiorem maxillam immobilem. Caudam lunatam, lineam à capite sub ventre ad umbilicum extensam, atque utrinque in cervice maculam nigram, Squammis in eo duntaxat lineæ ductu, qui piscis latera distinguit. *Hepar* ipsi unius lobi nullo felle præditum. *Stomachus* in litteram V. efformatus, cujus infima pars, in mocronem terminatur, & ad pylorum tam numerosas *appendices*, ut nulla arte numerari possint, habet. Intestina fulcit glandulosum pancreas. Lien stomacho subest. Benè in hunc picem *καλλιχδον* Bellonius vocet, non disputo, hoc tantum addo; Ceta-

Tab.  
XIX. 8.



Cetaceis hunc ab Oppiano annumerari, dentes ferratos habere & gregatim degere, quod fortè Fiatolæ non competit. Adjicio tamen Bellonii in icone Calluchtin, quem Gesnerus pro Hepate primo habebat. Quod reliquum est, frequens est Romæ Fiatola, alibi rarus & incognitus. Rondeletius suis littoribus nunquam visum asserit. Fertur expulmone marino nasci, & optimi saporis esse.

## ARTICULUS XIV.

## De Scorpio &amp; Scorpide.

**S**Corpius piscis, qui Plinio aliquando *Scorpio*, ab insecto nomen traxit, non quod vel corporis figura id, vel colore æmuletur; sed quod, ut aculeo Scorpius terrestris, quem habet in cauda, ita hic spinis quibus in tergore & capite armatus est, venenum vulnerando infligat. Putatur à Scorpide sexu duntaxat differre, ut hic sit foemina, ille mas: sed videntur specie distingui, & Scorpis cum Scorpæna pro uno pisce habebuntur. Trilibris quandoque datur; in mari rubro ad duorum & trium cubitorum magnitudinem excrecere, Ælianus: ad tantum & apud Inoos Tzetzes scribit. Corpus habet rotundum, anteriore parte crassissimum, posteriore teniæ. Squammas tam exiles & tenues, ut nisi adverras, iis carere videatur. Solo ventre albicat, cætera rubet, unde Plinio ruffus, Numenio *ερυτρός*, Hicesio *πυρόδς*, Diphilo *κέρδς* nominatur, quia nigras quasdam Procopius notas habet, benè Epicharmus *πικρίλον* dixit. Caput ipsi magnum, angulosum, durum, osseum, plurimis acutissimis aculeis munitum. Os magnum, dentes confusos, densos, in inferiore maxilla triangulares, superciliorum loco aculeus acutissimus Cuculi instar, cum appendice cutacea molli, branchiæ utrinque quaternæ, osseo aculeatoque exprimento contritæ: juxta eas binæ latæ pinnæ, toridemque ex harum regione in ventre sed minores, in dorso unica à cervice ad caudam usque excurrent, anteriore sui parte undecim vel duodecim firmis aculeis horrida, cætera obtusa & innoxia. Cauda unica aclata pinna constat. Duo ipsius genera posuere veteres, *τεγαράδς* nempe, & *pelagium*, ut apud Athenæum legitur; sed videtur idem utrinque esse. Alii fortè duntaxat sunt littorales, & nigri; alii ruffi, & in altum quoque se effeunt. Inter littorales ergo ne sit, an pelagios ambigitur, cum & Mnesitheus apud Athenæum saxatiles esse testetur. *Carnivorus* est & Aphyis, Spatulis, Gobionibus, Cancris imprimis vescitur, nec algam spernit. *Fætiscat* in alto mari teste Aristotele; bis, eodem autore, *parit*, vere & autumno, secundum Oppianum *ἀνταρέρωνι φέρει βέλῳ, ὡδίνωνι* *quaternis sustinet telum partus doloribus*. Ictum ejus venenatum pestiferumque apud Dioscori-

dem & Avicennam legimus. Gravissimos infert dolores, quandoque & inflationem ventris accersit. Mullum dissectum & impositum remedio esse Ætius & Paulus tradidere. Rondeletius cum ipsius Scorpionis hepate, & lentisco contuso, ad vulneris ambitum applicato, expertus est. *Usus* & *in cibis* & in Medicina invenit. Hicesius apud Athenæum abstergere, excoctu facilem, multi succi, plurimi nutrimenti, quod *χρυσόδς*, id est, carnis solidæ, firmæ, callosæ, ac velut cartilagineæ (malè inter *σκληρὰ* & *χρυσόδς* referres) sit, facit. Commendatur, qui hyeme, locis saxosis, & puro mari captus est. Duritiem diuturna mortui asservatio emendat. Calore naturali evanescente, externo colliquante humidior efficitur. Archestratus in Thaso non longiorem pygone (viginti digitorum mensura est) emendum censet. *Medicinam* si spectes, jus alvum apud Plinium & Dioscoridem emollit. *Fel* ad menses vel secundas tam exceptum ab Hippocrate usurpatum. Plinio verrucas tollit, & unguium scabritiem emendat. Marcello à nebula & caligine liberat. Lapis, qui in capite è stranguriosis utiliter bibitur.

**SCORPIDEM & SCORPÆNAM** pro eodem pisce Aldrovandus sumit. Specie à Scorpio, ut supra dictum, quod colore & succo differant, ut Athenæus ait, distinguit. *Scorpidium* Psellus vocare videtur. Cinericia est Bellonio, & multo Scorpio minor, de cætero (tam etiam vivax, ut exenterato & corde carens moveri non desinat) Scorpio in omnibus ferè similis. *Vescitur* algâ & sordibus marinis. Castitatem immaculatam generi suo servat, itaque habet pudicitiam sui generis, sed venenum sui generis non habet. Non enim percutit Scorpæna sed reficit. Apud Athenæum Scorpio in cibo posthabatur.

## ARTICULUS XV.

## De Blenno &amp; Pectine Romanorum.

**B**Lennus Oppiano *βένῳ* contractè à *βένῳ*. Athenæo fortè *βένῳ*, quod præ corporis crassitie brevis (*βαῖς* idem quod minutus) Sophroni *καδῶ* potius qui idem cum Gobio, quam *καδῶ* specie similis, dicitur. Corcyrenses & Zacynthii *Cepolam* à Cepæ similitudine propter turgidum ventrem appellant, exinde *Bulbum* Plinii esse Bellonius coniicit. Rarò Gobiom magnitudine superat. Colore est vario. Licet totus ferè liveat, plerisque tamen locis rubet, quibusdam etiam flavescit. Squammis paucis, tenuibus, & tam facilè deciduis tegitur, ut tum ad hoc, tum quod ob plurimum mucus, quo oblititur, adeò lubricus sit, ut vix manibus adstringatur. Caput habet magnum, oculos eminentes, nigros.

G

Labrum

Dioscor. l. 6. c. 61.

Plin. H. N. l. 32. c. 9. Hippocrat. de morb. mulier. r.

Tab. XVIII. 12.

Ambros. Hexam. l. 5. c. 2.

Tab. XIX. r. Tab. XXXI. 3.







haberi non possent, figuris ex rapis foeminis ad earundem speciem ab Apitio dissectis, ex oleo coctis, & sale atque papavere conditis, ventrem explevit, referente Suida. Apparatum apum Aldrovandum vide. De cætero humidum & flatulentum alimentum præbent. Diphilus gravis & difficilis coctionis esse putabat.

## ARTICULUS XVII.

*De Apuis in specie, & in primis Vera, Phalerica, Membrade, Cobite, & Hep-*  
*teto.*

Tab. XIX. 12. **G**enera Apuarum præterito recensui-  
mus articulo.

13. 14. 16. *Prima est APUA VERA*, cui, quæ generatim de Apuis dicta sunt in primis conveniunt, quam Græci propriè ἀπὺν, Athenæus ἀπρίν, aliqui ἀπρίν à spuma nuncupant: Suida ἀπρίν ἢ ἀπρονήρην, quasi nullis orta parentibus dicitur. Pisciculus est vix auricularis digiti longitudinem adæquans, oculis nigricantibus. Duo ejus genera. *Album* in Hollandia frequentius; & *rubicundum*, *Aphyia Triglitis* Bellonio.

*Altera est APHYA PHALERICA*, vel ab Atticæ portu qui Phalereus appellabatur; vel ἀπὸ τῶν φαληρῶν (alba hæc est & spumea Græcis) ita dicta. Sardinis est similis minor, tenuior. Squammas in mari habet, sed statim excidunt remanentibus earum vestigiis, & iis quæ ventrem firmant. Adeo est mollis & pinguis, ut si aliquando digitis tractetur, liquefiat; aut si magna copia in navicula vehatur, supernatans oleum piscatores colligant. Vidit Rondeletius unius diei capturam, quinquaginta coronatis aureis venditam. Erat apud veteres in precio si Polluci credendum.

*Tertia est MEMBRAS*. Has Phrynichus apud Athenæum μεμβράδας, Epicharmus & Sophron μεμβράδας, Attici μεμβράδας, Trallianus μεμβρίδια appellasse videtur. Aristoteles ex Aphyia Phalerica nasci author est; & inter μονίμους pisces, id est haud migrare solidos recenset. Cum verò Phrynichus χρυσοκέφαλος cognominet, ac Aristophanes πικρόρραδας, id est, cano corpore, Rondeletius eos pisciculos esse conjicit, qui Gallis *Celerias* vocantur. Sunt corpore admodum candido, capite auri colorum æmulante, Sardinis valde similes. Coquuntur ex præcepto Dorionis, mutilato capite, si corpulentiores fuerint, & lotæ sale minuto & aqua. Contemptos fuisse Antiphanes ostendit.

*Quarta est APHYA COBITES*, καβίτες Græcis, Theodoro Gobionaria. Putatur ab ignobili quodam & terram subiente Gobio procreari. Rondeletio est ille quem Galli *Logis demer*, ad differentiam fluviatilis vo-

cant. Nunquam ad Gobionum magnitudinem accedit, alioqui marinis Gobionibus simillimus. Corpore est rotundo, pellucido, dorso latiusculo, colore candido, nigris aliquot maculis asper, caudâ variâ, oculis quodammodo supra caput positis. Pinnæ cædem illi, quæ Gobionibus, maximè illa, quæ his peculiaris, barbæ instar ex ea ventris parte, in qua binæ sunt in aliis piscibus, propendens. *Hepar* est lactei coloris, & in eo fella vesica, splen, rubet, *intestina* & peritonæum ex albo nigricant. *Cor* ex albo rufescit. Gravis est, & difficilis concoctu.

De *Encrasicholo* sequenti capite agemus. De *Aphyis Mugulum* inter istos agetur.

*Apuas MULLORUM* exiguos admodum *Mullos* arbitratur Rondeletius, qui in stagnis marinis ex putredine nascuntur.

*Aphyas MÆNIDUM* verò pisculos *Mænidum* specie sine mare & fœmina sponte nascentes esse judicat, etsi contra sentiat Aristoteles.

*HEPHETI* seu *Hepseti* nomen, ad multos parvos pisculos extenditur; peculiarem aliquam speciem esse, exinde, quod apud Athenæum pro parvo pisciculo *Aphyarum* generis ponatur. Rondeletius à Gallis *louil* appellari credit. Est digiti magnitudine, argentei coloris, corpore pellucido, dempra ea virgâ, quæ à branchiis ad caudam extenditur. Oculos habet depresso, pro parvitate corporis magnos. Os ita scissum, ut inferior maxilla superiori sit prætensa, sitque velut oris operculum.

## ARTICULUS XVIII.

*De Encrasicholo & Atherina.*

**E**ncrasicholos, Græcis ἐγκρασίχολος, quod *Tab. XVII. 15. Tab. XIX. 17. 18. Plin. H. N. l. 31. c. 8.* *χολὴ ἐν τῷ κρατί ἢ τοι κεφαλῇ* seu *bilis folliculum* in capite gerat, hoc est, quod ejus caput impensè amarum sit, unde eo mutilari assolet, dictus; aliis λυκίσκος, quod dum oscitat, amplum os aperiat, ut serpentis potius quam piscis videatur; Plinio, multorum eruditorum judicio *Lupus* nuncupatur. An Chalcedoniis ἐρίπυμος dicatur, quod Callimachus apud Athenæum prodidit, ἐγγράυλει quoque Ælianus vocat. Magnitudine est plerumque digiti, palmi longitudinem nunquam assequitur. Argenteo colore micat, tergore ad cæruleum accedit, si soli opponatur transparet, dempta argentea linea, quæ spinæ vertebra comitatur, quæ sanguinem continet. *Squammis* carere falsum, vel in sale adservatis argenteæ micant. Rostrum habet acutum; os amplum, utramque maxillam ferre modo asperam, branchias parvas duplices. *Cor* oblongum & acutum, *hepar* rubrum, maculis rotundis conspersum. Ventriculi appendices multas & nigras. Ventrem molissimum, ideoquæ plerumque absumptus in salitis conspicitur.



Ælian.  
H. A.  
l. 8. c. 18.

Ovis scatet rubentibus. Spinis caret, eâ exceptâ, quæ in dorso est, & ipsa tenuis, adeo ut vix dentibus negotium faceffat. Arenâ, spurcitiis, atque cæno vescuntur. Capiuntur hyeme à Decembri ad quadragesimam usque, in Provincia numerosissimè, noctu igne è naviculis accenso. Quam confertis turmis densi, metu insidiarum natent, de Aphyis in genere dictum est. Hanc tam confertam Lycoftomorum natationem, *βόλον* à peritis nominari, Ælianus tradidit. De *Ortu* dissentiunt Authores. Suidas & Athenæus ex Apua Cobite; Aristoteles ex Phalerica oriri tradit. Satius est sui generis piscem statuere, quàm vel species in infinitum multiplicare; vel ex Apua Phalerica duos diversos pisces generari, concedere. Nam & ex hac Membradem oriri Philosophus author est. In magno plærisque in locis habentur precio. Comeduntur & crudi & sale asservati. Minutatim concidunt, cæpam pariter tritam addunt, sic ex oleo & aceto asperso pipere sumuntur, saliantur truncato capite, & fel aufertur simul. De Garo quod ex iis, vide Rondeletium. Huc referunt nonnulli *λυκόστυμον*, cujus effigiem exhibet Tab. 47. 19.

ATHERINAM, Græci *ἀθερίνα*, & per pleonasmum literæ *ν* *ἀθερίνα*, seu *α* transverso, quem alterum Atherinæ genus in ventre habet aculeo, quod Gillio placet; seu ab aristis (*ἀνθήρις* idem est quod *ἀθήρις*, id est, arista, pars spicæ acuta, seu ut Erotianus explicat, tenuissimum illud, quod in hordeo acuminatum est) per metaphoram pro spina sumpta, quas multas & Sardinis duriores Atherinæ habent, quod Rondeletius voluit, dicunt. Posset & ab *ἀθερίσειν*, quod pro *καθαφρηνέν* floccipendere & contemnere deduci, quod nimirum *ἀθερίσειται πῶς & αὐτὴ διὰ τὸ ὀπίσθιον* ob *vilitatem negligatur*. Gaza *Aristam* & *Aristulam* vertit. Callimacho, in nomenclaturis diversarum gentium *ἰκτάρη* & *ἰκτὴρ*, sine dubio à parvitate, (*ἰκτὴρ* Adverbium Græcis sonat propè) vocatur, Romanis Laterina. Quid per suum Acerinam Plinius Medicus intelligat, difficile est dicere. Bellonius recentiorum Cernuum esse credit: ego mendum esse, & Atherinam legi debere judico. *Descriptionem* si attendas, ita de eo Rondeletius: Pisciculus est marinus, litoralis: reperitur & in marinis stagnis, Aphyis similis, dodrantali magnitudine, parvi digiti crassitudine, *dorso* spisso, ventre leviter depresso, *ore* parvo sine dentibus, *oculis* magnis. *Colore* est vario: nam venter argenteus est, dorsum fuscum, circa caput, ex flavo rubescit Sardinarum modo. Locus qui inter oculos est, cælatus videtur. *Pinnas* habet quatuor, duas ad branchias, duas in ventre, aliam à popice, præter has, alias duas in dorso. Omnes candidæ sunt. Cauda duabus pinnis constat. (contra ostendit apposita icon) Pro linea medio corpore à branchiis ad caudam pro-

tenfa, spissum, quid habet sub cute, quod non possum aliter quam fasciam. per similitudinem vocare, quæ cum cocta Atherina editur, evidendissima est, & cum lumini objicitur; quia reliquo corpore pellucida est, hâc parte opaca. An Aphyæ Meletæ mas sit, quod piscatores credunt, dubito, tum quod illæ sine mare & fœmina nascantur, hæ distinguantur sexu: tum quod mollissimo & depresso corpore sit illæ; istæ solidius & spissius habeant. Bellonius suum, quem vulgus Cræcum, Romani Latharinum, Massilienses Sencle vocant, ita describit. Pisciculus est digiti crassitudinem excedens, nequè extenso digito longior: Argentei coloris, translucente corpore, & quod soli objectum, ut vitrum transpareat, lineamque ostendit internè obscuram, rectam, à capite ad caudam, à sanguine, qui in spina profunditur, proveniente. *Oculis* est grandibus, lingua candida. Pinnam utrinque in lateribus & geminam alteram habet sub ventre, quæ piscem in partes æquales secat: ac præterea tenuem aliam, & parvam fert in medio tergore pinulam. Cæterum *Cor* gerit, ut semen oxalidis triquetrum & oblongum, pericardio perbellè inclusum: branchias utrinque quatuor: *Costas*, item utrinque decem omni capillamento teneriores: vertebrae adeo exiles, ut vix ab acie oculi perspicacissima discernantur.

*Pascuntur* in algofo littore, *ἀνὰ παρασέσταν* Oppian. *ὑπὸ χλορεαῖς βοδάγνοι* ut Oppiani verbis utar. Hal. l. 1. Quam Rondeletius descripsit, non tantum in vicino Monspelio mari, ubi Melet dicitur, sed & Massiliæ, & in stagno quod Martegne vocatur, frequentissimè capitur, & nomen Sancelez obtinuit. Aristoteles gregales facit, eodemque testes inter Rhyades circa æquinoctium vernum *πρὸς τῇ γῇ* juxta terram, alvum arenæ aterentes pariunt. Vilem in *cibo* Phavorinus fecit, & contemptum; delicatissimum suum Rondeletius, nisi spinæ negotium facefferent. Bellonius quoque quæstuosissimam suarum ob suavitatem piscationem scribit.

## ARTICULUS XIX.

*De Lavarono Bellonii.*

**P**iscis, quem Romanum vulgus Lavaronum vel Lavonum, seu à beata que Lavarono, quod non videtur, cum marinus sit, seu aliunde; Massilienses Cabassonum, Genuensēs à capitis magnitudine Capassonum, vocant; ita à Bellonio describitur. Grandiore sunt capite, quem Atherinæ, magis recurto ac compressiore ad ventrem corpore, & paulo latiore transparent, ut Atherinæ, maximamque habent cum iis affinitatem. *Squamis* multis integuntur, quæ detectæ argenteum colorem præ se ferre videntur.

Oppian.  
Hal. l. 1.

Aristot.  
H. H.  
l. 6. c. 17.



dentur. Duas in tergore gerunt pinnulas, utrimque ad latera unam. *Dentibus* carent, ut *Harengus*: *Cor* exiguum, oblongum, triquetrum, habent: *hepar* pallidum, cui stomachus subest, pisciculis & Cardibus parvis nonnunquam refertus. *Intestina* ad anum tribus revolutionibus reflectuntur. *Fel* ob ejus exiguitatem conspicuum non habent: *spinas* quoque ferunt nullas. Carnem albissimam & levissimam. Calculos duos in capite gerunt, Sefamino minores: squammas paulo quam *Atherina* latiores & numerosiores. Magnam cum fluviatili Lavareto affinitatem habet.

## ARTICULUS XX.

*De Sarda seu Sardina.*

**S**ardæ nomen, si benè ex Galeno colligo, omnibus pisciculis, qui ad salendum apti sunt, competere videtur; idque inde fortitas apud veteres credo, quòd ex Sardinia in alias regiones, eveherentur. A Sardinis & Sardellis magnitudine duntaxat & ætate differunt. Cum nondum adolevere, Sardinæ & Sardellæ dicuntur, adultæ Sardarum nomen capiunt.

Vnde Apicius Sardam farciri solere dicit, Sardenam ob parvitatem non posse. Fateor tamen, & Pelamydi longæ apud Plinium Sardæ vocabulum impositum inveniri. Qui *Trichias* & *Trichides*, quas Dorion apud Athenæum non distinguit, Aristoteli dictas, cum nullibi tam vulgaris pisciculi tam diligens naturæ explorator meminerit, credunt easque ἀπὸ τῶν τριχῶν, quasi à capillis, seu parvis illis & capillaribus quibus abundant spinulis, à quibus etiam *δελφύς* dicunt, quas recentiores Alosas nominant, deducunt, vix falluntur; nisi fortè hoc obstet, quod idem ex Membradibus *Trichides*, ex his *Trichias* nasci dixerit. Nam quod alibi *τριχία* (Sardas Gaza vocat) quædam adscribit, quæ Sardis nulla ratione competunt, ea *δελφύς* seu Alosis, competunt, ut mendum subesse, & malè Gazam vertisse sit evidentissimum. *Chalcidas* quoque marinas Sardinias nuncupari, velex Callimacho colligitur, hasque Columella intelligit, dum dicit, *Piscibus in piscinis præbere oportet, tabentes Haleculas & salibus exesam Chalcidem putremque Sardinam.*

Invenio & à Dorione χαλκιδίον dici. *Eritimum* vocari, vix ex Epeneti apud Athenæum loco χαλκιδίον τὰς (legendum δὲ) χαλκιδίον & σαρδίνιον ἐπὶ τῶν ἰσθμῶν, inquit colligi potest, Bellonius etiam cum Chalcidibus easdem ponit; sed dum fluviatiles à Celerinis sola magnitudine differre, specie convenire putat, argumento sumpto, quod Galli qui ad Oceanum siti sunt, nullum piscem Sardinæ nomine agnoscant, præter eum, qui aliunde sale asservatus, ad eos perfertur;

Celerinus verò in Gallia tam sit popularis, quam à in mari mediterraneo ipsa Sardinia, ex Aldrovandi opinione fallitur. Sunt enim Gallorum Celerini (verba sunt Aldrovandi) ab Allobrogum Celerinis diversi, illi marini sunt, & nostro & Rondeletii etiam iudicio marinis Membradibus in Aquarum genere non Chalcidibus sive Sardinis iidem; hi lacustres, & Chalcides Aristotelis, Sardella, & Aquo Fracastorii. Anglorum Sprat, & Hollandorum Sprout, ad quos fumo siccatus adferri solet, haud alium puto quam Sardam aut Sardinam sicuti & illum quoque, quem Rondeletius scribit Agathopoli magna copia capi solere, nominarique; Calliques vel Laschez; & Massiliæ Garengades, licet ipse Membradem esse velit: ut enim Calliques ex Chalcis corruptum esse videtur, ita etiam Lachez ex Laccia; quo nomine in multis Italiæ locis Alosa appellatur, cui simillima est Sardina, & ipse quoque eum Alosæ similem esse profitetur. *Harengades* verò etiam dici videtur, quod & Harengo similis sit, & similiter salita per mediterranea loca venalis efferatur. *Icones* & *Descriptiones* diversas quinque apud Aldrovandum invenies.

*Prima*, pisciculus est Aphyæ Phalericæ omninò similis, nisi paulo major, & spissior esset, à parva Alosa, ore, branchiis & oculis, pinnarum numero, situ, squamis, caudâ minimè discrepans, sed in hoc tantum quod Alosa sit latior. Sardina igitur squammas magnas, tenues habet: colore est vario, nimirum capite aureo, ventre albo, dorso cum viridi cæruleo, utroque splendido, rutilanteque dum viva è mari extrahitur: una enim cum vita viridis evanescit, cæruleoque manente; eoque habescente & splendorem suum amittente. *Intestina* habet parva & recta, Alosarum intestinis similia.

*Altero loco picta*, in qua pictor pinna nulas expressit, capitè est rubicundo, corpore toto subviridi, præter duas quæ in ea conspicuæ sunt, lineas, quæ sunt cæuleæ. Cauda ad castaneum in extremo vergit. Sardæ Flandricæ nomine missa est.

*Tertia* eodem quoque nomine, sed majoris cognomento communicata, pinna nulas habet, quarum situs (dum modo pictor rectè expressit) alterius speciei piscem esse indicat. Colore est vario viridi nimirum violaceo, paleari & ruffo. Maculæ in lateribus sunt nigrae: in pectore croceæ.

*Reliquæ duæ species*, dorso sunt viridi, ventre argenteo. Prior in extremitatibus ossium, quibus branchiæ teguntur, rubent. Oppianus dum scribit:

*Chalcides & Thrissæ passim Abramidesque feruntur,  
Et curvis habitant scopulis & littora visunt,  
Atque catervatim percurrunt aquoris undas,*

Oppian.  
Hal. l. i.



*Alternantque imas ponti, curruntque per  
aquor.*

*Hospitium mutant semper, pontoque vagan-  
tur.*

iis qui vagabundam vitam agunt, accenset. Capiuntur Mafsâ ex ervis frictis & myrrha vino odorato excepta, confecta; aliquando foliis betæ, quâ impensè delectantur. Adhibentur quidem *incibis*, sed revera, ut Hiccius apud Athenæum dicit, ἀχρηδεις & ἀχρηδεις id est squalidi, nec multum pingues, sunt, nec copiosum succum in alimentum præbent. Apicius farcire eas docuit, Galenus ad saliendum aptissimas dixit. *Medicum* usum quod spectat, in prima mensa sumptæ, alvum subducunt. Capite, in puero quodam, loco balani feliciter usus est Brasavolus. Marcellus exustas sine offe, vel fassamentum, & confrictas, si varicibus supponatur, statim prodesse scribit. Idem Sardæ caput combustum, medicamento ad gingivarum tumorem, foetoremque admiscet. Privatum contra presteris morbum valet, si Plinio credimus.

## ARTICULUS XXI.

*De Mæna.*

Tab. XX.  
4.

**M**Æna, Græcis, *Mænis*, Theodoro Gazæ Halec est; meruo ne perperam. Alecis enim nomen, vel omnibus pisciculis qui muriâ condiantur, quod Rondeletius docuit, competit; vel illis, qui apud Græcos Anthracides, seu Carbonarii vel prunarii pisces, quod in pruna & craticula commodè coqui possint, dicuntur, quod ex Hermolao discimus; vel ipsi piscium foeti, unde Plinius. *Laudatur & Clazomenegarum, Pompeique & Leptis: sicut muriâ Antipolis ac Thuria: jam verò & Dalmatia. Vitium hujus est Alex, imperfecta nec colata fax:* vel denique pisciculo fluviatili seu dulcium aquarum, quem Plinius, ad ostreas, echinos, urticas, cammaros & mullorum jecinora pervenisse scribit.

Columella R.  
R. l. 18.  
c. 15.  
Martialis.  
Epigram.  
l. 3. & l.  
11.

Columella inter parvi incrementi fluviorum animalia reponit, & piscibus majoribus præberi jubet, ut de Martiali taceam. *Descriptionem & Differentias*; quod spectat, Mænam inquit Gillius, non modo speciei, sed etiam generis nomen esse conjicio; quod varium & multiplex est earum genus. Aliæ in utroque latere nigram maculam orbiculatam habent, quas ii, qui Adriaticum sinum accolunt, vulgo Mænas sclavas appellant: aliæ leucomænides, hoc est, albæ Mænae Græcis sive Smarides nuncupatæ: itemque sunt Mænae Boopæ appellatæ. Bellonius duas observavit differentias in colore: alias enim luteo, alias lituris cyaneis aut azureis conspersas esse ait. Speusippus Mænidi similes facit Boacem & Smaridem: idem tra-

dit Rondeletius, nec non Bellonius, nisi (inquit hic) paulo latiores & breviores cernerentur, & squamis Smaride tenuioribus contegerentur, breviorique essent capite, rarissime siquidem palmum excedere, (Antiphanes quoque Mænas exiguos pisces esse dixit, & Martialis breves) lineam in lateribus rectam habere, quæ in Smaride arcuata est: pinnas tergoris, laterum, & caudæ diaphanas esse, & maculatas. Os si clausum contineat, minimum quidem apparere: sed dum hiat; rictum magnum ostendere, labrumque superbius tubi in modum, ut in Harengo infractum esse: Oculos habere rotundos, iridem subrubram: maxillæ asperitatem quandam dentium vicem præ se ferre: si desquametur albissimam argenteamque spectari: sed tergus livore quodam sub oculis in prepureum gemmante depingi.

Addit Rondeletius, utrimque magnam & rotundam maculam habere in medio corpore, quam etiam in icone expressit, Bellonius omisit, & in descriptione non meminit, nisi eam intellexerit, dum inquit, utrimque lituris notari, quod tamen non assero, quandoquidem icon mea cum Belloniana satis convenit, & ejusdem coloris lituras habet, item circum oculos. Pinnæ omnes etiam versicolores. Venter candidat. Cauda fusca est. Idem Rondeletius hyeme candidam esse scribit, vere & æstate variam: maculis cæruleis toto corpore & potissimum in capite & dorso sparsis: item lapides habere in capite maremque in eo foeminæ dissimilem, quod latior sit & porrectior, foemina rotundior: cum foetura foemina impleri incipit, maris colorem in varietatem quandam & nigrorem mutari. Aristoteles verò hanc mutationem temporis adscribit, & de Mæna simpliciter id tradit, nec foeminæ nec maris facta mentione.

*Mæna & Smaris* (inquit) *mutantur; ut ex albedine rursus æstate ad nigredinem redeant, idque maximè suis pinnis & branchiis declarant.* Ita & Plinius: *Mutant colorem candidæ hyeme Mæna, & sunt æstate nigriores.* Quem locum Massarius explicans: dixit, inquit, æstate nigriores: quia suscipiunt colores cæruleos, qui quod ad albedinem sunt obscuriores, & nigriores.

Et rursus: Mæna pisculus est digitalis longitudinis, hyeme candida, & æstate varia, picturis cæruleis obliquis. Quomodo autem colores mutant, in Merula ac Phycide (ni fellor) explicatum est. Testatur denique Rondeletius, cum aliquando Romæ Venetias venisset, Mænas se tanta colorum varietate conspexisse, ut vix primo aspectu agnosceret, quod suo in littore minus pictæ sint. Quod ad *partes internas* attinet: Mæna *hepar*, ut Bellonius observavit, fungosum ex lacteo pallefcit: sub cujus lobo dex-



## ARTICULUS XXII.

De Smaride.

dextro fel luteum oblongo vasculo includitur: *Splen niger, stomachus oblongus*. Rarò in Oceano capiuntur: in mari tam supero quàm infero frequentes esse, nomenclaturæ apud utriusque maris accolæ indicant. Mænaria insula ab earum frequentia nomen sortita est. Inter herbas in littore algofo, seu ut Ovidius, in herbosa arena *viētūare*, Oppiani fide tradimus. A carne non omnino abstinere, quidam prodidere. Gregales esse apud Aristotelem legimus. *Parit* brumâ, vel ut Bellonius, post brumam, & omnium piscium fœcundissima esse censetur. Cum foetu foemina impleri incipit, ob malignum foctorem, *πρῶτον* seu *Hircus*, ut apud Aristotelem extat, dicitur. Singularem cum vespis sympathiam habere ex eo quidam colligunt, quod illæ nassâ, in quæ mænâ cum Chalcide reperta est, capiantur, prodeunte Æliano: singulari in Xiphias odio ferri, ex eo nonnulli, quod eam balænx metu, gladio suo in terra hærentem, conficiant, ut Oppianus testatur. Inter plebeios cibos reputantur, adeò, ut acervatim, vitato etiam emptore Venetiis vendantur, tum quod parvi sint, tum quod cum uterum ferunt, exquisiti foetoris. Unde Martialis:

*Fuisse gerres aut inutiles mænâs  
Odor impudicus urcei fatebatur.*

& in Majali L. Pomponius Atellanarum Poëta, ut dicitur Agellio.

—— *Cænâ quæritat, si nemo eum  
Vocat, revortit mæstus ad mænâ miser.*

Succi tamen bonitate Gobiis præstare Hicelsius, teste Athenæo, author est; quod forte de iis, qui in littore petroso aut arenoso, & suo tempore capiebantur, sumendum est. Nam aliàs, Gobius friabili est carne, & saxalitiū non multò inferiore. Liquamen seu gari speciem ex ipsis fieri solitam, Plinius innuit, dum scribit. *Saletiam è muria salsa-mentorū recoquitur, iterumque consumpto liquore, ad naturam suam redit, vulgo è Mænis jucundissimus*. Apud Persium quoque aliquid simile invenies, sit visceribus piscium in vas aliquod injectis, & sale conditis. De usu in Medicina hæc habeto. Jus assumtarum alvum solvere; ut & falsas, si umbilico illinantur. Caputibus inveteratarum ustis ad sedis fissuras, & columellam inveteratam Galenum uti: ad uvam diu jacentem, cum gallæ & floris æris, denariis duobus, Marcellum Empyricum: ad Anginam cum melle illitis eundem. Plinius earundem cinerem, admixto sale & cunila, oleoque, vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere, testatur. Cum allio tritus verrucas tollit, & verendorum pustulas discutit. In dysenteria quem præbeant. Mænâ usum, apud Galenum invenies.

**S** Marides qui & *Marides* apud Athenâ-  
sum dicuntur. (Bellonius Græcos Anconæ se convenisse scribit, qui etiam Maridas appellabant) ex Mænarum sunt genere. Vocantur & *Leucomænides*, nempe, quia semper albæ sunt, cum Mænâ colorem immutent. Eum docti pisciculum esse volunt, quem Antipolitani hodiè *Garum*, Veneti hurrulam seu herrulam, Massilienses hiaret, Galli Narbonenses & Hispani Picarel, quod fumo induratus & salitus, linguam acrimoniâ vellicet, Neapolitani Cerrum, quod vocabulum Gaza retinuit, nominant. Rondeletius *Garum* veterum esse putat, tum earundem nomen claturarum affinitate, tum quod ex eo *garum* fiat, idque teste Plinio, optimum. Trium descriptionem Aldrovandus tradidit.

*Primus*, Mænâ & Boopi simillimus est; notis tamen quibusdam ab iis distinguitur. Boops enim lituris caret; quibus prædita Smaris est. Boopi rostrum quasi recisum, Smaridi longiusculum. Boops item quam Smaris rotundiori est corpore, quam obrem Rotundetus Romæ nominatur. Differt verò à Mænâ etiam, quod & asperiores & paulo latiores squamas habeat. Lineæ laterum utrique rectæ, sed in Smaride quadam serie, in Mænâ nullo plane ordine dispositæ: suntque argentæ & subaureæ, obscuræ, à capite ad caudam ductæ. Estque Mænâ minor, digitum nimirum vix superans, corpore item strictiore. Est denique peculiaris ei nota, quâ & à Mænâ & à Boope discernitur. Cum enim os aperit, labia exerit tanquam ex tubo pyxidatim infarcto. Pinnis alioqui, aculeis, cauda, partibusque internis Mænâ similis est: eodemque modo colorem, teste Bellonio, mutat.

*Altero loco* exhibitus piscis, Smaris Bellonii videtur. Capite est ferè violaceo, prono nempe, nam supino albicat. Eodem colore totum corpus, sed multo dilutiore tinctum est. Lineæ quinque insignes flavescences à capite ad caudam perferuntur. Pinnæ etiam flavescunt. Exiguam habet & vix conspicuam lituram.

*Tertius* Smaridis peregrinæ nomine missus, tergore est caruleo, cætera subviridi nigris & argenteis punctis conspersus. Prono capite ad violaceum vergit, supino vero candicat. Pinnæ omnes fere crocei coloris sunt, punctis conspersæ nigricantibus. *De-gunt* inter herbas in algofo littore; eodemque cum Mænâ cibo vesci, verisimillimum est. Inter fœcundas recenset Ovidius. Pastâ, ex pane, caprillo caseo, & purissimo polline, inescantur. Optimos pisciculos esse Hesychius scripsit. Optimum & suavissimum

Ælian. in  
Hittor.  
Animal.

Martial.  
l. 12.  
Epigr.  
32.

Plin. H.  
N. l. 31.  
c. 7.

Plin. H.  
N. l. 31.  
c. 9.

Galen.  
simpl. l.  
11.

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 10.

Tab. XX.  
5. 6. 7.

Plin. H.  
N. l. 31.  
c. 7.



Plin. H.  
N. l. 32.  
c. II.

mum ex iis gaviū, apud Guilielmum Pelicerium Episcopum Monspeliensem Rondeletius vidit. *De usu in Medicina* proditum, caput tostum ad pilorum deflūvia cum adipe urfino conferre; excrecentes ulcerum oras, ab ejusdem pulvere reprima, thymosque & clavos absumi. Plinius alicubi cum ptisana sumptas, vel cum fœniculo decoctas mulieribus lactis copiam facere scribit, alibi, tritas illitas, verrucas tollere, & verendorum pustulas discutere tradit.

### ARTICULUS XXIII.

*De Boopē, seu Boco.*

Tab. XX.  
8. 9.  
Tab.  
XXII. 6.  
Athen.  
Dipnos.  
l. 7.

**P**iscis, quem nos *Boopem* dicimus, is Aristoteli citante Athenæo *βοῦξ* Numenio *βουξ*, qua etiam appellatione Oppianus utitur, Speusippo & aliis Atticis *βόαξ*, seu *παρὰ τὴν βουξ* à voce, ideo Mercurio sacer habetur; seu quod *βουξ ὁ φθαλμὸς ἐχέει*, id est bubulos oculos seu magnos habeat, dicitur. Tertia est Mænis species, pedis ut Rondeletius scribit magnitudine, qui etiam *tres* describit. Prior piscis est marinus, littoribus gaudens, ex Mænarum genere, pedali magnitudine, corpore satis rotundo, non compresso, quale fere est Mugilum. *Capite* brevi, & parvo. *Oculis* maximis, pro corporis magnitudine, utpote qui totam fere capitis regionem occupent. Colore est vario. In dorso à branchiis ad caudam lineas ductas habet, alias aureas alias argenteas, minus quam in Salpa illustres: ob quas ab Aristotele in libro *περὶ ἰχθύων, ναυόγραπτον*, id est, in dorso pictus cognominatus est. In ventre nullæ apparent lineæ; sed hic squamis tegitur argenteis. Pinnæ sunt Spari, Canthari, Sargi, pinnis similes. Cauda subaurea. *Ventriculus* magnus cum multis appendicibus: intestina tenuia admodum, hepar rubrum, splen ex rubro nigrescens. Nutritur alga, carne, luto. *Altera species* in multis priori similis; suis Bogueravel appellatur, cujus cognominis significationem, non omnino assequi se potuisse ait; peritiores tamen piscatores credere, sic dici quia cum Ravelle vulgo vocatis piscibus, id est, (inquit) minutis, quique simul elixantur, & apponuntur nec propter parvitatem seliguntur; capiuntur, & venduntur. Boopi (inquam vel Mænæ similis est; rostro magis acuto, dorso ex cæruleo rubescente: oculis magnis & variis, nimirum circa pupillam nigram circulo ex aureo nigrescente: corpore toto latiore quam Boops sed brevior. Boopis hæc nostra species peregrina dorso fere est violaceo, aut amethystino, lateribus & ventre candicantibus punctis amethystinis, conspersis: pinnis omnibus flavis præter eam quæ in tergo est, cujus quidem aristæ flavæ sunt, membrana vero viridescit. *Tertiam* quia squammis ca-

ret, huc pertinere non judico. Bellonius quoque *duas species* describit, dum dicit.

*Dux* hujus piscis cognoscuntur *differentiæ*: siquidem earum *altera* minor est, & perpetuo parva, *altera* paulo major. Boces à Mænīs ita distinguere poteris, quod Mænā videas esse latiori corporis compage, nigriore colore, & utrinque lituram unam habere. Boca perpetuo parva est, & pro sua magnitudine crassiori constat capite, corpore magis tereti. Boces & Mænæ seu *Gerres* eandem corporis constitutionem, hoc est, pinnas, squamas, & capita habent. Boopes nullā liturā variantur, sed ambo tereti corpore præditi sunt. *Giruli* autem seu *Smarides* magis nigricant, & lituris variegantur. Boces teretiores sunt. *Giruli* magis plani. Bocum color hilari ac quodammodo aureo fulgore nitet, ut tergora colore ad aurum inclinante micare credas. *Gregalis* est, & litoralis piscis, herborum gaudens. Piscis est parvus, oculos pro corporis ratione grandes habens. Duos habet in capite calculos non prorsus rotundos, ut in Passeribus, sed oblongos, ut in Merlangis. *Alter Boops* Orpho aut alicubi ex rubris cognatus est. Littoralis, (inquit) pisciculus, qui Bogue & Renæu (cum icone scriptum est Bogue Renæu sine copula) Massiliensibus dicitur, is Genuensibus Ruello vocari solet. Coloris est ejusdem cum Erythrino pisce, dentibus, pinnis ac capite consimilibus, sed reliquo corpore differunt. Nam Box vulgarem Bocam refert, eodemque circino tornata esset, nisi magis ad Erythrinum accederet. Verum linea quæ corpus Erythrini inter secatur, per medium utrumque arcuata est. In hoc autem recta prætenditur, neque Erythrini gibbum habet: Dentes præterea anteriores breves & acutos ostendit, sed tam superiores quam inferiores molares sunt, ut Sargo, quod etiam pagro & Erythrino accedit. Hanc quoque peculiarem notam insignem habet, quod ejus branchiarum exterior spina ad radices nigra est. Putat Ovidii Bogyrum esse, quæ Massilienses à Boopa & Gyro, id est Smaride, nomen ipsi indiderint, sed mendum est in Ovidio, & Cercyrus legi debet, qui apud Oppianum, circa petras conchulis plenas degit. Iisdem cum Mænīs locis gaudent, eodemque cibo vescuntur. *De Carnis* ejus qualitate ita Athenæus: *Βούξ δ' ἐφθόρε, ἀπικτιόρε, διακρίσιον ὑγρὸν ἀντικὶς διουλίον, ὃ δὲ ἀπ' ἀνδρακίων γλυκύτερον, & ἀπαλότερον. Βοσ ἐλίξυς ἐλάττω, ἐλάττω τε ἐκκρινιόρε, ἰσχυρότερον, ἰσχυρότερον, ἰσχυρότερον. Βοσ ἐλίξυς ἐλάττω, ἐλάττω τε ἐκκρινιόρε, ἰσχυρότερον, ἰσχυρότερον, ἰσχυρότερον. Βοσ ἐλίξυς ἐλάττω, ἐλάττω τε ἐκκρινιόρε, ἰσχυρότερον, ἰσχυρότερον, ἰσχυρότερον.* *Bos elixus facile coquitur, facileque excernitur, jurulentum quid emittens, facilem album reddens. Assus succensis carbonibus suavior est & tenerior.*

In Provincia etiam ægris opponitur. Anconæ, Bellonii prior, multis modis condita, carnis privii tempore, potissimum Anconæ, Illyrico more, ex gelu conservata divenditur. Psellus tamen inter excrementitios pisces retulit.

Oppian.  
Hal. l. I.  
v. 140.  
Athen.  
Dipnos.



*in genere.*

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 20.  
24.  
Columb.  
R.R.l. 8.  
Arist. H.  
A.l. 4.c  
II.

Aristot.  
H. A. l.  
4. C. II.

Arist. H.  
A.1.5.c.9.

Arist. de  
Anim.  
incesso.

Aristot.  
H. A. I.  
9. c. 37.

*De Solea.*

Tab. XX.  
IO. II.  
12. 13;

*Alteram oculatam* vocat, quod licet corporis habitu, & internis partibus superiori  
H fit



fit similis: in prona tamen parte, magnas habeat maculas; oculorum effigiem cum iride & pupillâ referentes, squamæ tam tenaciter hærent, ut nisi diu in aqua calida maderit, desquamari non possit.

*Tertia* à prima, ut Rhombus à Passere, situ corporis differt, si enim juxta eodem situ componas, os ejus in sinistram, prioris in dextrum latus vergere conspicias. Haut tamen ex Rhombis aut Passeribus esse, forma ipsa, qua plane Soleæ similis est, satis arguit. Galli Polam dicunt: ipse Epicharmo apud Athenæum *Cynoglosson* appellari conjicit. Vel si Cynoglossos hujus non sit: (nihil enim certi ex tam paucis verbis, quæ citat Athenæus, colligi potest) optimo tamen jure, ut à cæteris Buglossi generibus distinguatur, Cynoglosson appellari posse, neque aliud esse genus, cui hoc nomen aptius quadret. Nam cum vera Solea suavitatis saporis Perdici comparetur, hanc ferinò plane esse sapore, viscidamque duram, contumacemque coctioni, insuaveque quid & grave olere. Nec probat Rondeletius eos, qui pabuli tantum ratione differre credunt, quandoquidem pabuli varietas, etsi saporem succumque immutare potest, ad corporis tamen habitum formamque immutandam nullam vim habet. Frequens est in Oceano. Bellonius in Mediterraneo mari etiam *cap* scribit, & à Massiliensibus Servatin appellari, quod tamen falsum esse Rondeletius asserit. Totus, ut ipse etiam ait, fusco colore est.

*Quarta* eidem Rondeletio *Arnoglossos* sive *Arnoglossus lævis* dicitur, quod quemadmodum plantagini herbæ à figura vel foliorum lævitate Arnoglossi, id est, agninæ linguæ nomen impositum est, ita species isthæc Soleæ, Arnoglossus à levitate vel figura rectè (inquit) nominabitur; squamis enim carere videtur, prorsusque lævis esse. Suis Perpeire vocari ait, & ex Solearum genere esse, ex corporis habitu, figuraque cognosci: Differre autem ab aliis, quod multis squamis tenuissimis & statim deciduis, integatur: corpore esse valde gracili, candido.

*Quintam* diminuto nomine *Ligulam* dicit, quod sit in hoc genere omnium minima, negatque majorum Solearum foeturam esse, quando quidem semper parva sit: nunquam dodrantalem magnitudinem excedens. Lineam quæ corpus dirimit, spinamque firmat vel tuetur, huic ex squamis ait esse compositam longe eminentioribus, quam in toto corpore, dempta ea parte, quæ circa maxillam inferiorem est: durior carne esse quam Buglossus lævis, glutinosique nonnihil habere: satis rarum esse piscem, & ob corporis tenuitatem vilem.

*Sextam* ac postremam Gallis *Flettam* di-

ctam quod fluitando natet, antiquis (ut putat) incognitam, solisque Oceani accolis notam, Græcorum imitatione, qui rei magnitudinem *β& & ιππo* particulis indicant, Hippoglossum appellat, quod cæteras non solum Soleas magnitudine vincat, verum etiam quatuor digitorum longitudine quandoque inveniatur. Esse autem ex Solearum genere vel ex primo aspectu judicari posse scribit: oblongo enim (inquit) contractoque est corpore; parte altera candida, altera nigricante, in qua oculi sunt. Oris est contorto; dentibus munito cithari modo; quibus Buglossi carent. Carne est dura, sed suavi, ad Rhombi naturam proximè accedente. Ossa habet spongiosa, quibus inest medulla; quæ à cupediaum amatoribus expetitur. Piscis est maris Oceani, Antverpiæ salitus, & in frustra dissectus venditur. Capitur etiam sæpe in Oceano juxta Galliæ Bononiam. Ibi hujus frustra farinæ massæ probe subacta & pasta inclusa, aromatisque condita in furno coquuntur, ut diutius servari possint & exportari. Aldrovandus, non tantum aliud Hippoglossi genus, squamis præditum minoribus, undique sibi concolor, flavescebat scilicet; quodque à latere uno lituras nigras, pinnam & caudas in extremo cæruleas, habet, exhibet: sed & alterius Soleæ genus, quod squamis tegitur latissimis, estque unicolor & albicans. Quam Bellonius *Taniam* vocat, illa tenuis gracilisque piscis est; & quod Athenæus de *Taniis* prodidit, Alexandria, Canopi, & Seleuciæ in Antiochia, frequentissimè reperitur. Benè ab Aristotelis & Rondeletii *Tania*, in qua pinnarum numerus cum Anguillis convenit, distinguitur. Omnium ferè marium piscis est, sed cum Rhombis Pontum ingredi Plinius negat, flumina ingressos multum pinguescere, Londini Bellonius didicit, in stagnis deteriores evadunt. *Littorales* sunt Oppiano, Ovidio in herbosa arena degunt. Terrâ hoc est vado maris excavato per hyemem condicreditur.

Nam quia lapides in capite habet, & corpore est tenui, frigus exhorrescit. Quantum ad *usum in cibus*, Matron Parodus apud Athenæum, mediocrem succum præbere, ut saxatiliū vicem supplere possint, scribit. Galenus Passere molliorem, perperam asserit.

Duram enim esse, vel exinde, quod diutius servetur, longa vectura putrescat, sic melior reddatur, colligitur. Facile tamen concoqui & minimè excrementitiam esse, apud Rondeletium lego. Patinam ex soleis apud Apicium vide.

Aldrov.  
Histor.  
Piscium.  
lib. 2.  
cap. 43.

Arist. H.  
A 1. 2.  
cap. 13.

Oppian.  
Halieut.  
l. i. v. 99.

Athenæ.  
Dipnosl.

Galen. de  
Alim. fa-  
cult. l. 3.  
& l. de  
Cibis bo-  
ni &  
mali suc-  
ci c. 3.

Apic. l.  
2. cap. 4.



## PUNCTUM II.

De Citharo.

Tab. XX.

14. 15.

Ælian.

H. A.

1. 11. c. 23.

Oppian.

Halieut.

1. 8. 98.

Aristot.

H. A. 1.

2. c. ult.

Ælian.

1. c.

Athen.

Dipnol.

lib. 7.

**C**itharus, Æliano *κίθαρις*, Oppiano, cui littoralis est, *κίθαρις* dicitur. Nomen à lineis quibus à summo capitis vertice, ad extremam usque caudam distinguitur, invenit. Gaza, ex Aristotele, qui inter eos, quibus complures appendices circa ventriculum exeunt, numerat, *Fidiculam* vertit. Quatuor ejus nominis pisces, explanorum genere omnes, esse, Rondeletius luculenter ostendit. Galenus planum & Rhombo similem facit, & quod Philotimus eum inter *μυλακόσαρκους* omiserit miratur. Ælianus Buglossò seu soleæ assimilât. Galeni Citharum, Rondeletius eundem esse arbitrat cum eo quem Athenæus ex Aristotelis libro de animalibus & piscibus sic delineavit: Citharus ferratis est dentibus, solitarius, alga vescitur, linguam solutam habet, cor album & latum: esseque illum Psittaceum piscem, qui Romæ satis frequens, *Folio* nominatur. Cum enim lingua piscibus à natura data sit ossea, & non soluta: vel dura, spinea & adhærens: isque unicus sit ex planis, cui lingua soluta sit teste Aristotele, contra omnium aliorum piscium naturam: haud temere sese judicasse existimat, cum ex hoc, tum quod reliquæ memoratæ notæ ex assè respondeant, hunc verum ac genuinum Citharum esse. Quod si verò quis hunc Rondeletii piscem pro Citharo non accipiat, quoniam squamosus cum sit ex Rhombis utpote lævi cute præditis, quibus à Galenio assimilatur, esse nequeat; huic responsum esse volo, assimilationem ad Rhombum, non ad corpus, sed ad carnis qualitatem, referendam esse. Ælianus vero suos Citharados squamosos facere: quamobrem etiam admiror Rondeletium suum hunc piscem Rhombo quodammodo similem esse dicere, cum neque tegumento, squamosus enim est; neque figura, oblongus enim respondeat: quare prudenter subiunxit, Buglossò similem esse, si squamas excipias, quæ Citharo magnæ sunt, Rhombi instrumenti figura. Ab hoc Aristotelis Galenique Citharo differre putat idem Rondeletius, eum qui Archestrato apud Athenæum rufus sive subflavus cognominatur, assandusque & caseo multo, oleoque condiendus esse dicitur, quique; sine sumptu apparari non potest: esseque eum quem alii verum Buglossum esse volunt, non ob figuram solum, sed etiam ob asperitatem: Est enim bovis lingua magna & aspera, quomodo buglossum herba etiam nomen invenit. Superiori similis est figura, lingua magis soluta, oris scissura magna, dentibus ferratis, squamis intectus rotundis, aquarum asperitate *Citharum asperum* etiam appellari posse existimat, buglos-

sique nomine comprehendi. Virgam habet à capite ad caudam protensam, latiusculam, majoribus squamis constantem. Partibus internis superioribus similis est. Venetiis optimus reperitur Carne est inter duram & mollem Galeno media. Stomacho ingratus malique succi Xenocrati. A Diocle assus commendatur. Rondeletius, quod salpæ modo alga pascatur insuaviorem prodidit. Apollini qui Citharam invenit, sacrum, apud Athenæum legimus.

Athen.  
Dipnol.  
lib. 7.

## PUNCTUM III.

De Rhomboide Rondeletii, &amp; Passeribus squamosis.

**R**HOMBOIDES Rondeletii, *Rhombi* nomine Romæ ab ichthyopolis venditur. Fortè melius, *rotundus Buglossus*, vel *rotunda folia* aut *lingulaca* vocaretur. Squammis parvis integitur. Oculi multum invicem distant Linea à capite ad caudam per medium corpus ducta initio sinuosa: dein recta, corpus in duas æquas partes dirimit. Corpore est exiguo & brevi: nunquam enim palmi magnitudinem superat, quantum Rondeletio licuit observare. Internis partibus à Rhombo non differt. Carne est media, neque molli nimium, neque dura. Ejus nullam à veteribus mentionem factam fuisse credit. Junius in suo nomenclatore Belgico vocat Sarde. *PASSERUM SQUAMOSORUM* tres idem Rondeletius species ponit. Priorem *Limandam* Galli dicunt, ob corporis tenuitatem, ut Bellonius conjicit, quam cum diffisis dolabra asseribus communem habet. Angli un Brut. Hic teste Junio, Batavorum Grieta est. Ego enim id non satis memini. Flavas in pinnis, quæ corpus ambiunt, & in reliquo corpore maculas habet. Linea corpus interfecans, sinuosa. Magnitudine ad Quadrantulum (de quo mox) accedit. Lucidiori aëri expositus, pellucidus videtur. Dentes teste Bellonio inter cæteros sui generis pisces, longiores habet: squammas conspicuas valde tenues atque asperas, quæque difficillime cuti adimuntur: quod cum solea quidem magis, cum cæteris vero minus, commune habet. Vento indurati ingenti quæstu ad mediterranea loca Germaniæ superioris venales feruntur. Gallis ex Britannico littore recensentes adducuntur. Italiæ planè ignoti sunt. Carne aiunt esse candida, humida, molli, parum glutinosa; non multum Buglossis sive Soleis inferiore.

Tab. XX.  
16.  
Aldrov.  
de Piscib.  
1. 2. c. 45.

Altera species Gallis *Flez*, Anglis *Phlonder* teste Bellonio, qui *Flesum fluviatilem* vocat, verum improprie; & contra piscis naturam: non enim in fluminibus nascitur, sed in mari, ex quo in flumina migrat, cæterorum planorum more. Corpore est, quam vulgaris passer, paulò longiore,

H 2

&amp; ubi



& ubi adolevit, crassiore. Squamis integitur parvis: colore est nigro. In corpore pinnisque in ambientibus maculas rufas habet. Osiculis munitur in capite, medioque corpore in parte supina.

*Tertiam* Britanni *Helbut* dicunt, Hollandi *Heilbut* vel *Eelbut*, Germani *Heiligbut*, Galli *Fletelet*, nomine (ut apparet) diminuto à *Flez*, cum alioqui sit major, cætera similis est. Utraque in Anglia & Belgio frequens: nobis, Gallisque & fortassis antiquis etiam incognita, quia ad Oceanum usque non pervenerunt, nec in Oceani piscibus cognoscendis multæ operæ studiisque posuerint. Utriusque caro candida & mollis, salubris & delicata: *Fletuletus* tamen paulo durior est.

### CAPUT III.

*De Piscibus littoralibus  
lævibus.*

#### ARTICULUS I.

*De Piscibus littoralibus non  
planis.*

#### PUNCTUM I.

*De Sandilz Anglorum.*

Tab.xxj.  
I.  
Aldrov.  
de Piscibus lib.  
2. c. 49.

**P**iscis, quem jam descripturi sumus, Anglis *Sandilz*, id est Anguilla, de arena, tum quod longo sit corpore, tum quod sese occultaturus sub arenam se citissimè mergit, dicitur, Gesnerus *Ammodytem*, vocabulo Græco vocavit. Capite est tenui ac rotundo, rostro longiusculo & acuminato: ore parvo: corpore reliquo ablongo, si latitudini conferatur. Nam cum ejus medium (caput enim & caudæ arctiores sunt) pollicis crassitudinem non superet, longitudo ad palmi mensuram extenditur. Quamobrem sicuti longis, sic etiam & parvis annumerari piscibus debet. Cum neque pollicis latitudinem, neque palmi longitudinem excedat unquam. Dorso præterea (in quo pinnae duæ reperiuntur, in eo medio una, ac prope caudam altera) subcæruleus. Ventre verò in quo præter binas, quas utrimque habet pinnae, una etiam alia post excrementorum orificium subsistit argenteus conspicitur. Frequentissimè in Britannia littoribus capitur. Sepè etiam in Bononiensi, ubi idem nomen obtinet. Quibusdam anni temporibus, seu majorum piscium injurias fugiens, seu naturæ impulsu, aqua derelicta, sub arenam penetrat: inde pedalibus & pectinatim incisilignis, ab incolis extrahitur. Pauperum duntaxat necessitatibus inservit.

Huc pertinet alter piscis *Meersuyn* id est, *Porci* marini nomine missus, quod *Porci* more rostro terram fodiat. *Lituris* & specie

corporis *Lucium* imitatur, sed aculeum rectum in fronte gerit. *Lituræ* omnes nigrae sunt. *Pinnæ* ventris, caput supinum & cauda rubent: cætera flavescit. *Marinus* ne verò, an dulcium aquarum piscis sit, non satis memini, quamobrem historia ad priorem piscem pertinet. *Marinum* tamen esse nomenclatura docet.

#### PUNCTUM II.

*De Dracone.*

**D**Raco piscis, Græcis veteribus *δράκων* *δράκων*, modernis *δράκων*, unde *Siculi*, *Neapolitani*, & *Romani* suum *Trachine* deflexerunt, dicitur. *Jovius Trachurum*, qui in cauda, non cervice aculeos habet, perperam vocavit. *Plinius* qui *Dracōnis* marini nomine duos diversos pisces, ut ex libro nono capite vigesimo septimo colligi potest, intelligit, quorum unum serpens marinus est, quem *Aristoteles* libro nono capite decimo septimo describit, ab *Araneo* male specie distinxit, quem & *Isidorus*, qui *Araneum* ita describit, ut *Draconi* huic marino omnea competant, secutus est. Quod ab *Araneo* *Aristotelis* distingui debeat, mirum non est, cum ejus *Araneus*, à nullis Græcis authoribus venenatus esse tradatur: hunc omnes post *Pastinacam* venenosissimum asserant.

*Salvianus* duo ipsius genera ponit. *Primus* piscis est oblongus, & ut *Bellonius* ait, forma pugionis modò compressa, unde à quibusdam Gallis *Poignastre* vocatur quasi pugio. *Salvianus* squammis carere dicit, item *Bellonius*, vel saltem exiliores habere, quam sint serpentium. *Rondeletius* parvas ei tribuit ac tenues, *Ælianum* (ut apparet) secutus, qui asperas habere scribit *κολιδας* quæ fere serpentibus tribuuntur, & ipse etiam *Rondeletius* sine squamis & planè nudum *Draconem* pingit. *Percam* marinam quodammodo refert capite, magno scilicet & rotundo. Os non in longitudinem, sed in obliquum, nec recta sed curva scissura fissum habet: Connexa enim latera inferioris maxillæ (quæ paulò longior est superiore, nec recta nec oblique sursum porrigitur) à concavis superioribus lateribus, dum illud clauditur, suscipiuntur. *Dentibus* ut in *Dracone* serpente id communitum est. *Oculi* magni sunt, quibus magnitudine supercilia respondent, sursum spectantes, ac adeò splendide virescentes, ut smaragdum pulcherrima viriditate superent, iidem brevi intervallo à se distant, in quo triangulum expressum & aculeos parvos cernas. *Branchia* utrinque quaternæ, quarum exteriora opercula aculeo ad caudam spectante armantur, ut dictum est: quæ opercula post articulationem cum ossibus capitis, tenui membranæque simili substantia potius

Tab.xxj.  
2. 3. 4. 5.  
6.  
Aldrov.  
de Piscibus l. 2.  
c. 50.



tius quam ossæ constant, quamobrem Draco ea cum extra aquam aërem trahit, inflat, non aliter quam nos buccas inflammas. Ad branchias *pinnae duæ*, eo situ, ut in fluviatilibus, hoc est, inferiores multo quam in marinis esse solent: inter has & scissuræ oris finem, in parte superna, duæ aliæ minores, candidæ. In cervice vel dorsi principio quinque habet *aculeos* tenues, nigros, præacutus, tenui membrana anteriori parte nigra, posteriori vero alba connexos, quibus venatum vulnus infligit, multoque perniciosius quam branchiarum aculeis. Ab hac, pinna incipit ad caudam usque continuata, quæ magna est, lata, atque adeo bifurca. Aliadenique est à *podice* ad caudam, etiam usque: qui diverso in hoc quam in aliis piscibus loco situs est: cum enim alii in medio cum habeant ventre, alii vero inferius versus caudam, in Dracone non procul à branchiis distat: unde fit quod brevis admodum ventris ejus sit capacitas interna, cum tamen carnosus sit & satis amplus *ventriculus*. Colore est vario. Dorso enim fusco est, ventre candido, lateribus lineis aureis transversis pulchre distinctis. *Alter* qui fortè non malè *Dracunculus* Plinii vocari poterit, quemque Salvianus minorem vocat, in nonnullis à priore differt. Cum enim major crebrò ad libræ unius & duarum etiam aliquando magnitudinem excrescat, (Rondeletius in Oceano aliquando cubiti magnitudinem attingere tradit) minor ne dimidiam quidem libram implet: præterea capite & corpore reliquo non rotundo, ut major; sed in latera compresso est: cujus denique latera non subluteo solum colore, quo major ille insignitus est, sed frequentibus etiam & obliquis ad cæruleum colorem vergentibus lineis pulcherrime depicta sunt. Aldrovandus *quatuor* Draconis species exhibet. *Prior* aculeo ad branchias, pinnarumque numero cum præcedenti convenit, colore vero & maculis lineisque differt. *Ossa* branchiarum colore sunt roseo, sed in extremitatibus aureo. *Aculeus* item aureus, sicuti & *pinnae*, quæ sunt ad branchias: quæ vero in pectore conspiciuntur, albicant, cæteræ subvirent. *Os* pronè quoque viride, supinè albicat. Dorsum ex subviridi fuscescit, maculis rotundis ad castaneum vergentibus densissimis conspersum. *Venter* argenteis lineis crassiusculis contrario invicem ordine oppositis decoratur. Cauda tota ex cæruleo ad amethystinum tendit. *Alter*a species in vertice insignem habet aculeum; colore est in dorso subcastaneo, ventre albo, valde maculosa. Pinna cervicis inter quatuor priores aculeos in summitate atra est, cætera fusca: quæ verò ad caudam usque protrahuntur, & cauda etiam ipsa, coloris ferè sunt violacei. *Tertia*, capite est castaneo, præter os quod pronè supineque; ferè violaceum est. Oculi, in vertice ferè ut in *Callionymo*, inter

duos locati aculeos. *Pinnæ* branchiarum & pectoris, item quæ in ventre est, roseo sunt colore: Quæ verò in cervice cernitur, ad quartum usque aculeum violaceo, cætera albicat, & rotundas, fusci coloris maculas ostendit, quemadmodum & subsequens, quæ ad caudam usque excurrit. Dorsum ad castaneum vergit, & nigricantibus maculis insignitur. Latera & venter viridescunt. *Quarta ac postrema*, magna ex parte castanei est coloris, dilutioris in capite, intensioris in dorso. Lineæ quæ à branchiis sunt ad caudam usque plane ferrugineæ. Tota pars supina candicat. *Pinnæ* ad branchias & ad pectus, rubræ sunt: cæteræ cæruleæ, sed aristas habent rubras. Cauda præterea in extremo ferruginea est. *Locum* si spectes. Bello-nius pelagium æquè ac littoralem scribit. Aristoteli simpliciter talis est. Oppiano in petris, & arenis pascitur. Lorigunculis & aliis minutis piscibus vescitur, ideoque Nicander *ἀλιππίστω*, *maris vastatorem*, Epicharmus *ἀλιμύ* nominat. Gregalem non esse vel inde conjicies, quod nunquam plures capiantur. Mirum etiam, si verum est, si manu dextro attrahere coneris, violenter reniti; si sinistra, cedere & capi, quod Ælianus prodidit: nec minus, eo tempore cum piscium genus amore tenetur, in vulnere quod iste inflixisset, pisciculos illi similes procreatos fuisse, quod multorum piscatorum testimonio narrat Gillius. Ictum ejus venenatum esse, piscatorum periculo certum est, sæpe nomas, sæpe febres & inflammationes excitat, plusque à vivo quam mortuo periculi. Remedia varii varia ostentant. Plinio nullus illitus aut in cibo sumptus prodest. Dioscoridi & Galeno Draco proprio ictui applicatus placet. *Æginæta* cerebrum piscis in potu præscribit & sulfur cum aceto imponit. Aëtius locum affectum cum plumbo fricari jubet. Piscatorum experientia jecore illito dolor mitigatur, foliorum lentisci affricu punctura curatur. Genuenses exiguum *Thlaspium* genus, quod in ipsis littoribus nascitur, admovent. Recentis piscis è capite cinis, contra omnia venena prodest, mirabili discordia, si Rondeletio credimus. Plinius, ossibus gingivas scarificare jubet, ut dentium dolores sedentur.

## PUNCTUM III.

De Dracunculo.

**D**Racunculi Plini. inter veteres meminit. Inter Recentiores à Rondeletio describitur. Est piscis marinus inquit, drantali magnitudine, cotto fluviatili non multum absimilis, rostro acutiore, & capite latiore, Rana etiam piscatrici quodammodo similis; sed Rana piscatrix ore est majore, pinnis concoloribus, quæ in Dracunculo varix sunt. Capite est magno, compresso, rostro

ÆL.H.A.  
l.5. c.37.Aëtius l.  
13. c.36.Aldrov.  
de Piscibus lib.  
2. c. 50.Tab. xxj.  
6.



prominente, ore parvo sine dentibus, sine ulla ad branchias scissura; sed hujus vice supra caput utrimque *foramen* est, ut in Hippocampo, quod, nisi dum piscis vivit, eoque aquam trahit, & emittit, manifestum est. *Oculos* magnos supra caput positos habet: capitis os in aculeos definit ad caudam spectantes. *Pinnas* longissimas pro corporis magnitudine habet, partim aurei, partim argentei coloris æmulas. Quæ ad branchias site, aureæ sunt, in radice argenteæ. Quæ in supina parte, à cæterorum marinorum piscium pinnis, situ magnitudineque dissident: nam & ori propiores sunt, & longiores iis quæ sunt ad branchias. In dorso duæ eriguntur: prior (hac in pictura vix apparet) parva est, aurea & argenteis lineis distincta; posterior magna admodum in medio dorso, papilionum alis non valde dissimilis, radiisque quinque hordei aristis similibus, membranaque constans. Radii priores longiores sunt, posteriores breviores, contra quam in membrana, quæ singula radiorum intervalla, veluti intertexta occupans paulatim crescit. Eadem quoque varia est, lineis etiam argenteis in medio duarum nigrarum sitis distinguitur. Hæc in medio dorso cavo veluti in vagina conditur. *Alia* est à podice ad caudam, etiam aurea demptis ejus fimbriis, quæ nigricant. Corpus totum sensim gracilius fit, & in pinnam longam terminatur, cujus fimbriæ nigricant. Est & picto corpore: nam ab hujus medio, argenteæ lineæ ad ventrem ductæ sunt. In maxillis partibusque anterioribus veluti punctis argenteis notatur. *Ventre* est lato, plano, candido, cuticula tantum tegitur. Capitur in Agetesi littore, in primis Caniculæ vigentis tempore. Venustas & summum Dei in eo artificium pretium ei fecere. Carnis substantia Gobionibus parvis similis est, iisdem alimentis vescitur. Ictum minus venenatum habet.

Icon Dracunculi Tabula XIV. 2.

#### PUNCTUM IV.

De Uranoscopo.

Tab. XXI. 7. Aristot. H. A. l. 8. c. 13. Ælian. H. A. l. 13. c. 4. **P**iscis, quem *Uranoscopum* seu cœli speculatorem dicimus, Aristoteli, Dioscoridi, & Æliano καλλιόνυμος, Theodoro pulcher dicitur, non tam ob corporis pulchritudinem, deformis enim est, quam vel quod Uranoscopi nomen sit pulchrum, & homine quam pisce dignius. Massilienses *Tapecon* quod, cum pessi instar conformatus sit, aliquam cum pudendis similitudinem habeat; & *Raspecan*, quod caput ob asperitatem ad scalpenda pudenda muliebria accommodari possit vocant; Oppianus ἡμεροκίτων, quod interdiu dormiat, noctuque vigilet, Hesychius & Varinus Ἀμμιδίων seu Arenarium dixere, quidam Ἀζνον, id est, castum, Athenæo vocari credunt, sed mendum subesse putat Gesnerus. Piscis est levicute, eaque

dura, & quæ facile excoriari potest, præditus: corpore fere rotundo: capite magno osseoque & duobus aculeis ad caudam spectantibus aspero, quo Ranam piscatricem quodammodo refert: vertice admodum lato.

*Rostro* quodammodo caret. *Os* alio quam in aliis piscibus fieri solet, loco situm est, nimirum supra caput, & (ut Oppianus ait) inter medios oculos; estque magnum & valde paculum & inferiore maxilla sursum maxime attracta clauditur. *Dentes* habet exiguos, *linguam* brevem sed latam, quæ internas oris partes ita occupat, ut nisi digito eam comprimas & submoveas, non videantur. Ex ea parte quæ inter linguam est, & maxillam inferiorem oritur, teste Rondeletio, *membrana* in principio latiuscula, sensum in carnosam rotundamque apophysin desinens, extra os propendens qua pisculos allicit, & allectos devorat. Eandem cum vult, retrahit, & exerit, veluti serpens linguam. Pars inter oculos interjacens depressa est concava. *Branchiæ* utrimque quaternæ sunt, quarum ossea opercula, posteriore parte aculeo robustissimo ad caudam spectante horrent. Iuxta branchiarum scissuram *pinnæ* duæ magne & robustæ, crassæ, & mucosæ & varix exoriuntur. Subsunt in parte supina duæ aliæ minores, albæ, maxillæ inferiori propinquæ. Has pinnas sequitur os veluti sternum, quod tribus aculeis horret. Succedit pinna alia à podice ad caudam. In dorso duæ sunt, quarum prior capiti propior parva est & nigra, ut in Araneo: posterior ad caudam eandem usque porrigitur, dorso concolor.

Cauda in pinnam latam definit, Pavonis caudæ, dum piscis vivit, æmulam, fimbriæ purpurascunt, *Venter* est subalbidus: dorsum vero ac partes reliquæ ex cineraceo fuscae apparent, qui colores, dum vivit manifesti sunt, alioqui unà cum vita pereunt.

A capite lineæ duæ ex squammulis constantes ad caudam protenduntur. *Ventriculus* amplus est, crassus & carnosus, cum appendicibus plurimis, intestina ter revoluta, *hepar*, candicans, à cujus exteriori parte felle vesica pendet, admodum magna pro corporis ratione, felle valde distenta, quod substantia & colore oleum æmulatur: cujus rei meminit Plinius, nulli piscium hoc copiosius esse scribens: citat autem Menandri auctoritatem in comoëditis, immemor fortasse ejusdem mentionem fieri ab Aristotele, qui nempe Callionymo in jecore vel inesse tradidit proportionem corporis omnium copiosum: addit Ælianus hunc Philosophi locum recitans, jecur ipsum tradere ad dextrum latus collocatum esse Menandrumque huic rei testimonio esse in Mesenia, his verbis: *Facito te fel habere Callionymo cepiosius*: item Anaxippum in Epidicazomeno dicentem; *nisi moveas & sicut Callionymi fervere efficias*

Aristot. H. A. l. 2. c. 15.



efficiat omne fel. Lien exiguus, rotundus atque rubens, ventriculo hæret. Vulva bifida est & longa.

Non multum excrefcit, & raro pedalem longitudinem excedit. Littoralem esse Aristoteles prodidit, post eum Rondeletius, Carne vescitur, & pisciculis apophysi illa quam extra propendere diximus, insidias fruit. Adnatant tanquam ad vermem, & capiuntur. Si cibum capto obieceris, eo usque se infarcit, ut cibus ad ipsum os redundet. Adeo vivax est, ut si omnibus internis spoliis, moveatur adhuc. Comeditur à plebeis, quia virosi odoris est, unde *Bæpæ* gravis Diphilo apud Athenæum vocatur. Nec mirum, cum cœnosus aquis vescatur. Hippocratus tamen non solum non inprobat, sed & in victu præscribit. Nonnulli felle oculos Tobiae curatos fuisse volunt. Cicatrices sanare & carnes oculorum supervacuas consumere Plinius tradit.

## PUNCTUM V.

De Trachuro.

**T** *Τραχούρος* seu ut Oppianus & Galenus scribunt *τραχούρος*, quo nomine apud Latinos veniat, ignoratur. Lacertum male vocari vel exinde patet, quod iste *κοινός*, si pro peculiari specie accipias, vocatur. Male & *σάπρον* dici Oppianus, qui tanquam diversos pisces appellat, testatur. Forma ejus nisi paulò longior esset, ovata dici posset. Cum enim ejus medium corpus latiusculum sit, deinde utroque versus arctatur, donec rostrum ore clauso, atque extrema pars caudæ carnea, acuetur. Inferior autem maxima, quæ superiore paulo longior est, cum os clauditur, non recta sed oblique sursum excurrit, unde os etiam non in longitudinem, sed in obliquum scissum est, dentibus adeo paucis & minutis munitum, ut edentulum videatur: revera tamen maxillarum pars denticulata est. Est autem ut Scombrum admodum magnum: item oculis, ut in Melanuro. Branchia utrimque quaternæ. Pinnis natat quatuor, quarum duæ majores ad branchias sitæ sunt, duæ aliæ minores in ventre: aliæ item duæ in dorso eriguntur, prior latior & brevior, in eminentiore dorso: altera paulo inferius arctior, sed longior, nam per dorsum reliquum fere usque etiam ad caudam porrigitur. Podex in medio ventre est, à quo alia denique pinna ad caudam usque demittitur. Cauda autem bifurca est, similis Acus vulgaris. In medio corpore lineam habet à capite ad caudam deductam, multis ossiculis, ita horridam, ut serra esse videatur, non rectam quidem sed media sui parte inflexam & obliquam, in cauda eminentiorem, asperioresque quam in aliis partibus, quæque ob id caudam quadratum efficiat. Squammis caret, levi tantum cute præditus. Dorso

subcæruleus, ventre verò & lateribus argenteus est, purpureoque aliquantulum ementitur, ut inde *ἀλλοπύλω*, id est, varium forte dixerit Numenius. Trachurus, cuius hic iconem damus, colore fere est albicante, aureis ubique lituris varius. Cauda ex violaceo fere ad cæruleum vergit. Ad pedalem magnitudinem perraro excrefcit. Versantur circa littora. Numerosi omnibus anni temporibus seu nassis, quod veteribus apud Oppianum sœtutem, seu retibus, quod hodie in usu, capiuntur, ut inde gregales esse conicias, & Romæ *Frieturæ* nomine, venundantur. Ælianus, equam in utero habentem, si ei cauda Trachuri appendatur, piscis mox liber in mare dimittatur, non multò post abortum pati, prodidit, vere an falso non dicam. Inter duræ carnis pisces, à Philotimo censentur, ideo Diocles apud Athenæum aridos vocavit, nec dissentit experientia, nisi fortè externa pinguidine, aut juscule tener aut jurulentus fiat.

## PUNCTUM VI.

De Scombro.

**Q**ui Græcis *σκόμβρος*, is Latinis Scomber & Scombrus, Horatio *Piscis Iberus*, plerisque nationibus, *Macarel* & *Maquereau*, non tam à Græco *μακάρειος*, quod Scaligero placet. hoc enim nomen iis potius conveniret, qui veteribus Opsophagis Dii vocantur, quam, leno, quasi, quod verno tempore parvas Alaufas, quas virgines dicunt, subinde subsequi soleant, dicitur. Corpore est terete, denso, carnosum, utrimque in acutum desinente, rostro scilicet atque corporis extremo, cui cauda annectitur: & si parva magnis comparare licet, Thynno (ut Scholiastes Aristophanis scribit) similis. Oris scissura ingens pro corporis portione, dentes exigui; caput rotundum; inferior maxilla in superiorem recipitur, & clauditur pyxidis modo. Oculi magni, aureo colore micantes. Branchia utrimque quaternæ: juxta quas pinnæ binæ, totidemque in ventre. A podice alia est, eique supra posita in dorso similis: quas ordine certisque intervallis, aliquot aliæ pinnulæ subsequuntur, quod tamen huic soli proprium non est, sed cum Thynnis, Pelamydibusve commune. Alia denique est in dorsi initio aculeis nonnullis horrida.

Cauda in lunatam pinnam degenerat. In ipsis aquis sulphurei coloris est, extra non qui cæteris, (ut Plinius ait) sed ferè cærulei, sulphureum autem colorem quem intelligat, alias explicat, inquiens: Fulmina & fulgura, sulphuris odorem habent, ac lux ipsa eorum sulphurea est. Est vero cæruleus ille eorum color potissimum in dorso: nam venter lateraque argentea sunt. Totus lineis nigricantibus, obliquis, insignis est: squamisque caret, licet apud Athenæum squammatum

Oppian. Hal. l. 3.

Ælian. H. A. l. 13. c. 27.

Athen. Dipnos. l. 7. Galen. de Alim. facult. l. 3. cap. 31.

Tab. XXIV. 9. 18. 11. Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 53.

Aristot. H. A. l. c.

Aldrov. Histor. Piscib. l. 2. c. 51.

Hippocr. lib. de affect. intern.

Tab. XVII. 12. Aldrov. de Piscib. l. 2. c. 52. Oppian. Halieut. l. 1. v. 106.



tum esse quispiam velit, negandi vocula videlicet librariis omiffa. Ad cubiti magnitudinem accedit. Sunt *mari peculiares*, & aliquando juxta arenosa litorea degunt, saepe in petris, quæ chamis & patellis plenæ sunt. Et si autem tam in Oceano quam mari mediterraneo, sinu Adriatico, & Hellesponto; capiuntur: juxta Herculis tamen insulas, prope Carthaginem novam tam copiosi & frequentes sunt, ut una earum Scombraria teste Strabone dicatur: In Oceano tanta crassitudine proficiunt, ut pari cum Pelamydibus magnitudine, authore Bellonio evadant, in Adriatico parvi sunt. Existimavit aliquis in minore maris ambitu frequentes prædas exerceri, ideo non crescere. Vix ad Tergeste ac proximum sinum comparent Scombræ: atque ilico capiuntur. In Oceani laxitate fuga moram, mora parit incrementum, ideo grandescunt qui non capiuntur. *Gregales* sunt, & à locis frigidioribus calidioribusque, tanquam Thunni, ut qui imbecilliores, dulcioris pabuli gratia, discedunt. *Beneficii* memores esse, Ælianus exemplo singulari, prodidit. Mane à piscatoribus cibati, feras combros gentiles suos cogunt, & corporum suorum abjectu ita concludunt, ut fuga sibi consulere non possint, hinc capiuntur. *Inseruiunt & mensis*. Diphilus leves esse, & facile è stomacho descendere dixit. Hicetius multum nutrire, minus vero facile excerni judicavit viscosiores & crassiores, concoctu difficiles, & excrementitios esse, experientia eos docuit. Venetiis verno tempore quo pinguioribus sunt, in delitiis habentur. Romæ ob siccitatem inter ignobiles reposuit. Quia graves & ventriculo refectionarii. *ταριχόεδα*, id est, sale inveterari scripsit Athenæus, habenturque inter *ταριχία* optimi. Veteres ex iis *garum quoddam* habebant, de quo ita Plinius. Est etiamnum liquoris exquisiti genus, quod *garum* vocaverè, intestinis piscium cæterisque, quæ objicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium sanies. Hoc olim conficiebatur è pisce, quem Græci *Garum* appellabant (ut supra ostendimus) Nunc è Scombropisce laudatissimum in Carthaginis Spartariæ cætariis: sociorum appellatur, singulisque milibus nummum permutantibus congios peno binos: Nec liquor ullus pene præter unguenta majore in pretio esse coepit, nobilitatis etiam gentibus. Scombros quidem & Mauritania, Bæticaque & Carteja ex Oceano intrantes capiunt, ad nihil aliud utiles: Laudantur & Clazomenæ garo, Pompeiique & Leptis, ficuti muria Antipolis ac Thurii: jam vero & Dalmatia. Vitium hujus (gari nempe, non muria, ut Rondeletius vult) est alex, imperfecta nec colata fæx. Coepit tamen & privatim ex inutili pisciculo, minimoque confici, Apuam nostri vocant: Foro-Julienfes piscem ex quo faciunt Lupum (super quo no-

strum judicium supra diximus) appellant. Transiit deinde in luxuriam, creveruntque genera ad infinitum: sicuti garum ad colorem mulsi veteris, adeoque dilutam suavitatem, ut bibi possit. Aliud vero ad castimoniarum superstitionem, etiam sacris Iudæis dicatum, quod sit è piscibus squama carentibus (*legendum apparet non carentibus, nam Iudæi hodieque nisi squammoses edunt, & non squamosis abstinent, ut duo gari sint genera, unum è squamosis, ut ex Lupo sive Encrasicholo, Menaque & Smaride consimilibusque alterum ex levi cute præditis, ut ex Scombris*) hic lex pervenit ad ostrea, urticas, gammaros, Mulorum jecinora, innumerisque generibus ad saporem gulæ coepit sal tabescere. Hæc obiter indicata sint desiderii vitæ & ipsa tamen nonnulla usus in medendo. Hujus usus apud nos desit, apud Turcas Constantinopoli non item: quia pisce plærosque frixos vendunt, iis intestina & branchias eximunt, immituntque muria, ut in garum vertantur. Sociorum vero *Garum* vocatur, seu quod *ganeones* & *lurcones* eo sociatim uterentur, ut quidam Galeni scholiastes putat, seu quod à fociis populi Romani, Hispanis nempe deferretur. Fæcosum ac plane foetidum fuisse, facile Martialis indicavit, dum dicit.

*Unguentum fuerat, quod Onyx modo parva gerebat,*

*Nunc postquam olfecit, Papilus, ecce garum est.*

Usus in Medicina si spectes, arquato morbo correptis comestis opitulari Ælianus scribit, in aceto putrefactos mulieres strangulatu oppressas excitare Plinius.

Ælian.  
H. A. l.  
12. c. 46.  
Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 20.

## PUNCTUM VII.

*De Colia sive Lacerto.*

Piscis quem *κολίας*, *κοιλίας*, & *κοχλίας* in vulgaris Aristotelis exemplaribus, seu apica varia, quam *κόλιον* aut *κοιλίαν* dici, nescio quo authore Bellonius credit, quod variegata latera habeat, unde *καλίστρον* Athenæo, seu aliam ob causam vocatur. Theodoro *κολα*, seu *Monedula*, & *Graculus*, Latinis ut C. Celso, Columellæ, ac Martiali, *Lacertus* audit. Magnam eorum cum Scombris affinitatem esse, non tantum inde colligere licet, quod ab Aristotele & Columella semper simul nominentur: sed etiam quod Lemnicolæ magnitudine duntaxat à Scombris differre asseruerint, & Plinius Coliam Lacertorum minimum faciat, quod & apud Athenæum, qui Sardam Coliæ magnitudine esse scribit, habemus Pariunt semel anno. In cibis laudantur, qui in Propontide antequam pariant, Amyclani, Hispani, quos Sexetanos (Sexi authore Plinio, Boeticæ Hispaniæ oppidum est) Martialis vocat, ex quibus forte Salsamentum. *Gaditanum*,

Tab.  
xxviii.  
12.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 2. c. 25.

Aristot.  
H. A. l. 9.  
c. 2. l. 8.  
c. 13.

Colum.  
mel. R.  
R. l. 1. c.  
13.  
Arist. H.  
A. l. 5. c.  
9.  
Aristot.  
H. A. l. 8.  
c. 13.  
Galen.  
de Alim.  
facult.  
Martial.  
Epig. l. 7.  
Athen.  
Dipnos.  
l. 3.

Scaliger  
in Exer-  
cit.

Aristot.  
H. A. l.  
9. c. 2.  
Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 12.  
& 13.  
Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 15.  
Ælian.  
H. A. l.  
14. c. 1.

Plin.  
H. N. l.  
31. c. 8.



ditanum, cuius apud Hippocratem mentio, & Parii seu Pariani, unde Parium apud Ar-  
chestratum nutritrix Coliarum dicitur. De  
Carnis qualitate non conveniunt Authores.  
Xenocrati est stomacho ingrata, arida, mali  
succu, excretu facilis, & copiose nutrienda.  
Athenæo glutinosa, acris, mordax, & deter-  
rioris succu Cornelio Celso, gravissimi ali-  
menti. Saliri solitas apud Martialem inve-  
nies. Muria ad dentium dolores Medici ut-  
untur. Patinam ex Lacertis apud Apicium  
vide.

## PUNCTUM VIII.

De Sauro.

**Q**uem Saurum Græci vocant, hunc plæ-  
rique Latini *Lacertum* vocant, A Tra-  
churo distingui vel exinde patet, quod &  
Oppianus de Trachuro & Sauro tanquam  
de diversis piscibus agit, & Speusippus apud  
Athen. Acui & Sphyrænæ similem esse, quod  
Trachuro non convenit, scribat. Duo ejus  
esse genera Ælianus tradit, videlicet *nostras*,  
& *peregrinum*, in rubro mari nascens: *Nostras*  
caput habet (inquit Salvianus) tenue & ro-  
tundum; rostrum oblongum, & acutum. Os  
magnum plurimis atque exiguis dentibus  
munitum: *Oculos* mediocres, rotundos &  
aureos: *Branchias* utrimque quaternas: pro-  
pe quas binæ & parvæ sunt *pinnæ*, utrimque  
scilicet una: alia duæ & majores in ventre;  
in medio dorso una haud magna quinque  
semitæ aculeis horrida erigitur, aliaque una  
multo minor in medio dorso caudæ vicina  
reperitur: è cuius regione ab ano, qui in hoc  
pisce caudæ satis proximus est, alio paulò  
major imò ventri hæret. *Cauda* in unam lu-  
natam pinnam degenerat. Corpus oblon-  
gum est & rotundum. Unde non ineptè à  
Speusippo in secundo similitum, Sphyrænæ,  
Acus & Saurus similes esse dicantur. Sphyr-  
ænæ enim satis similis est hic noster Saurus:  
similis & Acui, si acus illam rostri dempseris  
tenuitatem. *Ventre* est subalbido, lateribus  
luteis, dorso ex viridi nigricante, maculis  
quam plurimis virentibus, rubeis, cæruleis,  
luteis atque nigricantibus, dorsum, caput, &  
latera, nonnullorum serpentum instar, variè  
admodum pingentibus: Quamobrem non  
solum ore, rostro, capite, atque reliqua cor-  
poris figura, sed colorum etiam varietate  
proximè ad eò ad terrestres Lacerti accedit  
similitudinem, ut ei simillimus, si pedes ex-  
ceperis, videri possit. Venter habet  
oblongum & satis magnum: appendices non  
multos: intestina mediocria: hepar bifidum,  
& subrubeum: Lienem subatrum. Pedali  
mensura majorem adhuc non vidimus. Ab  
hoc nostro Sauro aliquantulum diversus est,  
qui in rubro mari reperitur, quem his ver-  
bis describit Ælianus: Rubri maris Saurus  
(interpretis reddit Lacertum) est, cuius ma-

gnitudo ei qui nascitur apud nos, æqualis est  
virgatus, spectatur, lineis nimirum aureolis  
circumdatur à branchiis ad caudam perti-  
nentibus, quas media argentea distinguunt:  
ore est hiante, maxilla inferior eminet in su-  
periores, virides oculos habet, quos aureo  
fulgore palpebræ ambiunt. Ab hac delinea-  
tione non omnino abhorret *peregrinus iste pi-  
scis*, supinè subviridis, prone castaneus, lineis  
sive lituris, maculisque orbiculatibus subviri-  
dibus decoratus. Rictum oris habet maxi-  
mum, Lacertorum terrestrium plane æmu-  
lum & validissimis dentibus instructum.  
Branchiarum opercula flavescent, punctis re-  
ferta ferrugineis. Pinna tergoris & branchia-  
rum, & cauda ex ferrugineo rubent. Quæ ve-  
ro in ventre sunt, ejusdem fere cum ventre  
sunt coloris. In mari vivit, & cœnosis locis  
delectatur. Carne vescitur, nec à putridis  
abstinet. Aristoteles inter gregales reposuit:  
sed cum in mari mediterraneo singuli ca-  
pantur, solivagos melius dixeris. tam rarò  
capiuntur, ut vix annis singulis Romæ in foro  
piscario bis deni capti videantur. Inter pi-  
scis molli carne præditos Philotimus repo-  
suit; inter mollis & duræ medium, Gale-  
nus. Editur assas & frixus. Alexis apud  
Athenæum, branchiis exemptis, cæsis spi-  
nis, lotum atque incisum, & lasere probè  
pulsatum, caseo, sale, & origano imple-  
dum esse docet.

Athen.  
Dipnol.Ælian.  
H. A. l.  
11. c.  
49.Oppian.  
Hal. l. 2.Galen de  
Alim. fa-  
cult. l. 3.

## PUNCTUM IX.

De Corace Rondeletii, Milvo

ejusdem, &amp; Boopis ra-

ra specie.

**C**ORAX Rondeletii, Romæ nomine  
cum Lyra communi, *Capone* vulgò à  
capitis magnitudine dicitur. Piscis est ma-  
rinus, corporis forma Milvo Rondeletii si-  
milis, aculeorum pinnarumque magnitudi-  
ne discrepans. *Ossa*, branchias integritate,  
cælata, in aculeos desinunt. *Pinnæ* quæ ad  
branchias, minores quam in Hirundine  
Rondeletii, majores quam in Milvo sunt,  
ex viridi nigricantes parte interiore, exte-  
riore albescent, cum maculis rubescentibus.  
*Dorsum* ex cæruleo nigricat, latera rubescent.  
*Venter* lactei est coloris. *Caput* est magnum:  
locus inter oculos cælatus. In dorso *virgas* ex  
officulis contextas, instar Cuculi habet: in  
eodem pinnas duas: prior est brevior, cum  
aculeis longioribus, acutioribusque, poste-  
rior longior, cum longe minoribus aculeis.  
Linea simplex à capite ad caudam ducta est.  
Palato minus est flavo quam Milvus. *Ven-  
triculum* parvum habet cum multis appen-  
dicibus, *intestina* tenuia, *hepar* ex albo ru-  
bescent. Carne est, si Athenæum sequimur,  
duriore: si Celsum, teneriore, dura tamen.

Tab.  
XXII.  
l. 2.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 2. c. 56.



Aldrov.  
de Piscib.  
l.2. c.57.

**MILVUS** Rondeletii, qui Gallis *Lucerna*, quod noctu luceat, piscis est marinus corporis forma Corvo per similis, corpore magis rubro, *capite* minus lato, utrinque compresso. *Pinnarum* numero caudaque similis, magnitudine & colore dissidens. Quantum ad *colorem* attinet, parti pinnarum quæ ad branchias sunt externæ, nullæ maculæ rubræ insunt: interna ex viridi non nigricat, sed pinnæ istæ partim flavescent, partim nigricant. Linea à branchiis ad caudam ducta simplex non est, neque lævis ut incorvo: sed ex acutis brevibusque aculeis horret. Non squamis, sed cute aspera contegitur. *Partibus internis*. Mullo imberbi similis. Palatum parvum flavum est. Carne est dura & sicca.

Tab.  
XIX. 6.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l.2. c.58.

**BOOPIS** species ita à Rondeletio describitur: Rarus est piscis, cujus nomen neque à piscatoribus nostris neque ab aliis potui unquam extorquere propter raritatem. Palmi majoris est longitudine, rotus à squamis nudus, ore parvo, oculis valde magnis pro corporis ratione; in pronis partibus pinnam habet ad caudam usque continuam, cauda lauta spissaque est. Ad branchias & in ventre binas pinnas habet. Sapore, carnis substantia, oculis Boopem refere.

## ARTICULUS II.

*De Piscibus litoralibus lævibus planis.*

### PUNCTUM I.

*De Passere lævi.*

Tab. xxij.  
7. 8. 9.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l.2. c.47.

**P**asser lævis, Aufonio *Plateffa*, aliis *Pecten*, quod ejus pinnæ rectæ & parallelæ pectinis speciem præ se ferant, Hollandis Scolle, dicitur. *Bina* eorum apud Gallos *genera*. *Unum*, quod communiter *Plya* vocatur, & magnitudine excellit. *Alterum*, quod alibi *Cariet*, alibi, à quadrata corporis figura *Quarret*, *Quadratuli* nomen sortitum est. *Ætate* tantummodo differre, à quibusdam proditum; ex corporis forma, quæ *Quadratulo* magis quadrata, & pluribus maculis ruffis sive subflavis, ostendit Rondeletius. A Rhombis situ differunt. Si hos ita in latus componas, ut oculi in cælum suspiciat, & mentum deorsum versus spectet, pars supina erit dextra, si Passerem similiter constituas, supina pars erit læva. Ita *marinus* est, ut & dulcium quoque aquarum sit studiosissimus: In Oceano tamen numerosior quam alibi reperitur. Juxta Livoniam sunt pinguiissimi, & inde vento indurati ad mediterranea exportantur. Saxatilibus *Mnesitheus* accenset. Ovidius in herbosis. Oppianus *ὁ πολλοὶ καὶ ὑπερανέσσει* *degere* credit. Vadum, ubi piscatorem sensu petere, terræ adhærescere, aquam,

ne videatur, turbare, Alberti M. fide habemus. Carnem ejus mollem Philotimus dixit, sicciorem Diocles, duram & probi succi Xenocrates, mediam Galenus. Optimi marini, qui etiam nigriores, secundum qui in stagnis albidiores & lutum resipiscentes, locum fortiuntur, mollissimi & insipidi, qui in fluviis vixere. Nonnulli in cibum, cum jam putrescere, & malè olere incipiunt sumptos, alvum perturbare asserunt.

Gesner.  
de Aquatilibus.

### PUNCTUM II.

*De Rhombo.*

**R**hombus piscis, à figura quadrata, cujus latera omnia sunt æqualia, anguli verò obliqui, nomen sortitus est. Nonnullis *†††††* dicitur, ut ex Plinio & Athenæo, qui Romanis Rhombum vocari testatur Græco nomine piscem, qui aliis Græcis *†††††* nuncupatur, colligimus. Duo sunt ipsius *genera*, *Aculeatum* unum, *læve* alterum. *Illud* prona parte multos habet aculeos, circa caput, quod grandius & elatum est, & ab hoc caudam versus maximè. Magni in Oceano & mari mediterraneo capiuntur, ideo forte Rhombus latior est patella Martiali. Rondeletius vidit, qui quinque cubitos longus erat, latus quatuor, spissus pedem. Optimos Adriaticus sinus maximè circa Ravennam alit, & hos veterum exornasse mensas arbitratur Platina. Celebrantur & Attici circa Eleusyniam, quos Lynceus Samius Psettarum nomine dignatus est. Ei qui *verus esse* putatur, pinnæ & cauda in extrema rubescunt; Cætera est unicolor, subvirides, rotundis punctis stellulisque undique plenis. Omnium *locorum* & temporum piscis est. Ovidius in herba algosa, Jovius circa pinguiorem terram extremosque littorum margines versari scribit, in fluviorum ostiis frequentissime piscibus insidiantur. Voraces sunt, & piscium, cancrorum imprimis avidissimi. Abditi pinnas exertas movent, specie vermiculorum. Terra, seu vado maris per hyemem condi, à Plinio sub nomine psettæ proditum. Tardissimè propter corporis latitudinem moventur. Inter delicatissimos olim fuisse cibos, ex Horatio, & Juvenali potest colligi. Tempore Jovii, *Aquatilem Phasianum* quidam appellare erat solitus. Galenus inter pisces mollicarnes retulit, sed aliter Xenocrati, & Villanovano visum. Ille duræ esse carnis, & difficulter concoqui ait. Hic inter crassos viscidos excrementitios, reposuit: nisi forte superiores de lævi, cujus pulpa candida & pressa quodam humore succulenta; hos de aculeato, qui revera duri or, locuti sint. Vivus impositus medetur lieni, si remittatur in mare, si Plinio credendum.

Tab. xxij.  
10. 11.  
12. 13.  
Aldrov.  
de Piscibus l.2. c. 48.

Plin. H.  
N. l. 9. c. 42.



# HISTORIÆ NATURALIS

## DE

# PISCIBUS.

L I B E R I I.

De Piscibus, qui in mari & fluminibus degunt.

### TITULUS I.

De Squamosis.

### CAPUT I.

De Salmone.



**P**ISCIMUM, qui in mare æque ac fluminibus degunt, alii quam longissimè à mari recurrunt, & ad fluviorum originibusque penetrant, alii in marium proximis morantes, mox

id regrediuntur. Utrorumque quidam sunt *squamosi*, alii *Laves*. Ex illis sunt *Salmo*, *Lupus*, *Latus*, *Alosa*, *Ziga*, *Albis fluvii*, *Mugil*, *Capito* *Anadromus* *Gesneri*, *Caper*, *Sturio*, *Galeus* *Rhodius* & *Cataphractus*.

Tab. XXXI. 12.

Plin. H. N. l. 9. c. 18. **SALMONIS** solus inter veteres Plinius mentionem facit. Aufonius hoc nomen adultæ ætatis ut Sarionis seu quod melius Farionis mediæ, & Salaris primæ imposuit, illud tamen Truttæ convenit. Circa Rhenum & apud Helvetios ætatis tempore ad Jacobi usque festum vocatur, *Salmi* / inde ob festum Andree Lachsi *Lachs* / nomine gaudet. Cum *Essoce* Plinii eundem, quod Georgio Agricola placet, vix credo, cum alibi enim suo nomine appellet, & per *Essocem* Lucium intelligere videatur. An *Anchorago* *Cassiodori*, difficile dictu, nam à Rheno duntaxat venire scribit. Apud Græcos nullum invenio nomen, qui ait *Salangem*, cujus piscis tanquam delicati mentionem facit Hesychius aut *καλαράδρον* vocari posse putant, suo judicio fruantur. Descriptionem si spectes. Piscis est sat magnus. Bicubitalis quidem ut plurimum est: apud Missenos tamen & Dessaviæ à XXIV. libris ad XXXVI. accedit, in Helvetia circa Tigurum graviores capiuntur. Basilea quinque aut sex pedes longos dat, nec temere Cetaceum piscem dici posse Bellonius reliquit. *Squamis* tegitur exiguis, & maculis ita notatus, ut totus ferè piscis subrussis & luteis notis insignis videatur, quia verè in capite iis caret. ideo *frontem lubricum* Poëta dixit. *Os* habet amplum, &

valde denticulatum; nam præter id quod maxillæ magnis & validis armatæ sunt dentibus, palatum etiam quadruplici eorundem ordine munitur, linguaque hamatis dentibus horret. Hunc quadruplicem dentium ordinem Bellonius huic pisci præter aliorum fluviatilium morem, peculiarem esse ait, & cum cerasse serpentem communem: additque plures esse inferiori maxilla, quam in superiori. *Tergus* colore fere est cæruleo, aut ex cæruleo, nigricat. *Oculi* magni sunt. *Narium* foramina utrinque gemina: *Branchie* utrinque quaternæ, quarum opercula lata, & rotundis puniceis maculis plena sunt. *Pinna* juxta easdem binæ, totidemque in dorso, quarum prior in medio fere dorso est, altera caudæ proxima, cutacea, carnosaque. In ventre tres sunt, binæ fere in medio, tertia à podice qui in imo ventre est. *Caudam* in unam latam, & rotundiusculam pinnam desinere Salvianus ait. Rondeletius verò bifidam esse testatur, indeque Salmonem jure *πάλουρον* nominare posse putat. Quoad internas partes, *Cor* angulatum est, ventriculus oblongus & angustas, hepar in nullos lobos divisum: rubrum Rondeletius tradit, Salvianus & Bellonius pallescere dixerunt: huic vesicula fellis ex viridi nigricantis annexa est. *Splen* ex rubro nigricat. Alvus ipsi prodiga nutat, & opimato abdomine fluit venter. Gesnerus à faucibus patulis duos se observasse *meatus* scribit, deorsum protensos, unum ad ventriculum, quem oesophagum vocant; alterum anonymum, (cujus usum ignorat, quandoquidem nihil in eo reperit, nisi forte ruminat (inquit) hic piscis & alimenti sui partem ibi repositam habet) qui cute candida & tenui constat. De *Maris* & *femine* differentia ita Aldrovandus. Foeminam à mare differre Rondeletius & Salvianus volunt, quod illa rostrum habeat magis aduncum, hami modo, indeque vulgo in Gallia Beccard appellari. Bellonius verò dum dubitat, num sit diversa species: foeminam esse interea insinuat, inquiens: Est & alius prægrandis *Salmo* (foeminam esse autumant) quem vulgus Gallicum ab ejus ore prægrandi Beccard vocare solet: alii à ferendis ovis *Bortiere* (Portière forte nimirum à portando.)

Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 1.



Differtis à mare Salmone, quod labrum inferius in hami modum aduncum habeat. In superiore enim labro foramen est ad palatum tendens, in quod hamus maxillæ inferioris se recipit, pixidatimque in tubi modum insinuatur. Aliialiter de hac rostri curvitate sentiunt. Gesnerus testatur suos pisces in mare tantum incurvari insigniter, in foemina perparum. Rondeletius quoque mari recurvum esse ait, sed foeminæ magis. Quidam vero eruditus in epist. ad Gesnerum, in qua de Albis fluvii piscibus ad ipsum scribit utrumque sexum id ceu quid præter naturam pati arbitratus inquit: Salmo in Mulda (hoc flumen ex Albi ingressus) si obstaculum seu præcipitium aquæ juxta Dessaviam, secundo ac tertio frustra saltu superare conatus fuerit, vadum petit, eoque in loco sub lapidibus & saxis delitescens, emaciatur, & contabescens maculis rufi seu ænei coloris impletur & rostrum inflectit in magnum hamum, eo quidem majorem quo diutius manserit. Verum tamen credit vir ille doctus idem ei tandem contingere, etiam si obstaculis omnibus superatis ad summas fluviorum partes eluctatus fuerit. Ex rostri itaque curvitate sexus non satis tuto distinguitur, tutissime vero ex ovis. Addit Bellonius foeminam crebrioribus mare, iisque subrubris & rufis orbiculis in cute variegari: atque in Lepradis (de quo suo loco diximus) modum multis coloribus fugillari. *Marinus* magis quam fluvialis piscis est. Nam & in iis duntaxat fluminibus quæ in mare se exonerant reperitur: & observatione notum est, si supra annum in eis perseveraverint, insipidos fieri; si diutius, post annum secundum ceu sideratos interire. Observatus in Albi adeo tabidus, ut exanguis & nullis ferè intestinis apparet; nati vero ex eo pisciculi, nec longiores nec crassiores digito evadere, quamdiu ibi vel juxta stagnantibus aquis immorabantur. Uberrima eorum in Bothnico mari versus Lappones captura, circa solstitium in extremis littoribus circa Thornam tanta magnitudo capitur, ut fortissima retia pondere suo rumpant. Apud Vestrogothos quoque, in provincia Vermelandia, in qua dulcium aquarum locus certum millibus passuum in longitudine, & quadraginta latitudine patet, magna Salmonum est copia.

In Albi quoque, Vistula, Duna, Multavia, Sala, Mulda apud Misenos habentur. Rhenus & Mosella gratissimos alunt. Minus commundati quos Scaldis, Thamesis, Garumna, Sequana, & Ligeris exceperunt. In Rhodano, qui capi existimant, falluntur. Hoc præter Rondeletium & Scaliger Pater prodidit. In Occidentalis quoque Indiæ fluminibus numerosissimi capiuntur. *Cibum* ipsi Salvianus pisciculos tribuit. Alii ante XXV. Julii pediculis aquaticis vesci; à partu obvios pisciculos comedere, eosdem-

que in ventre repertos, prodidere. Nonnullis in dissecto spissus quidam humor, subflavus, & lapillus candidus, visus. Quidam in majoribus nihil unquam, in parvis nescio quid reperiri tradunt, illos sola aquæ turbidiore victitare opinantur. *Vita* est tenacissima, sub uno corde pulsante, recenter captorum indicio, plures in frustra dissecti à piscatoribus venduntur. Robertus verò Constantinus, exenterati, aquosa sanie aspersum, ultra diem vivere vidit. De *Partu* proditum, per autumnum & hyemem, ad veris interdum initia, in fluviiis, & minoribus rivis lubentius parere. An & in Oceano nemo tradidit. Scrobs excavatur. Ova pisorum magnitudine foemina ponit: mas rore genitali irrigat. Ova paulatim augescunt, & spiritu vitali inflata, ultro per aquam deferuntur, & Salmulos producant. Salmulos mares aliquando genitura plenos reperiri, & cum foeminis adultis coire, eorumque ova rigare, cum in Salmulis foeminis nulla ova reperiantur, admiratione dignum est. De eorum *Saltu* ita Gesnerus: Muldam flumen præ cæteris diligit Salmo, & (ut quidam putant) ab aqua Albis fluvii qua cum permixta in mare se exonerat, discernit. Itaque plurimi eo in loco, ubi Mulda in Albim influit (Dessaviam vocant, quod oppidum est Principum Anhaltinorum) capiuntur, hoc modo: Ad Muldæ in Albim ingressum Principes vallum sive obstaculum quoddam excitarunt, ut ita redundans aqua ad molendina reverteretur, octo cubitis aliquando altius: vallo graves & magnas arbores imposuerunt, & perticis magnis intus cancellarunt, ne Salmo transiliat. Inter perticas alicubi nassæ sunt collocatæ. Hunc locum cum attigerit Salmo, qui per Albim ascendit, saltu adversus aquæ præcipitium se proripit in altum, ubi vel in nassam incidit, & capitur, vel arborem perticasve contigit, indeque violenter in Muldam se trajicit. Hoc si prima vice non successerit, secundo etiam tertioque experitur, & si ne tum quidem transilire aut assequi altitudinem valli potuerit, vadum petit, inique sub laxis delitescens emaciatur. ac contabescit. Si tamen flumen Albi augeatur & crescat, adversus illud subinde fontium & originis cupidus ascendit, parit, & consumptus tandem macie ac siccitate moritur. Adeo verò nativus huic pisci saltus est: ut Salmunculi etiam, si in vase aliquo venales cum aliis permixti in aqua fuerint, aqua eis adempta exilient, unde & ab aliis piscibus dignoscuntur. Alii saltus causam in Robur, quidam in Hirundines, à quibus mense Junio & Julio infestantur, nonnulli in loca abrupta conscendendi libidem, conjiciunt, quod apud Hectorem Boethium invenies, Singularem in *cibi* habent gratiam, ita ut omnibus piscibus præferantur, suavitatem si spectes. Habenda tamen ætatis, loci, & temporis anni



Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 18.

anni ratio est. Salmunculi, qui sex vel septem digitos non excedunt, Aprili & Majo in diliciis habentur: adulti, tenuiores in fluviis evadunt, si ea non longè subiere. Moderatum exerciti, si longius progressi sunt, nimio labore tabescunt. Plinius Aquitanicis palmam detulit, Rhenanis Albertus, qui mense Majo suavissimè eduntur. Miseni post Pentecosten placent. Partui vicini, cum & rostrum curvatur, & maculae aerei coloris gerunt, damnatur. Salitos & infumatos bona Europæ pars distrahit.

N. Icon. Salmonis Salviani ad Tab. 31.

## CAPUT II.

De Lupo & Lato.

Tab.  
XXIII.  
3. 4.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 2.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 2.  
Athen.  
Dipnos. l.  
7.

**Q**uem Latine à voracitate *Lupum* vocant, Lucill. Catillonem vocavit, is Græcis λαβράξ aut παρὰ τὴν λαβράτιδα, ut Athenæus author est, ab ipsa vehementia: aut quasi λίαν βόρξ, valde vorax, ut Eustathio placet, vel διὰ τὸ κίχλιον αὐτῶ τὸ σίμα, & ἀδρῶς & ευχερῶς ἀλίσκεται quod illi os hiet, & repente cumque impetu avide voraret, ut Suidas vult, dicitur. Nec *Lucium* esse, quod Philadelphus voluit, quod hic in fluviis & lacubus degat; nec *Sturionem*, quod Volateranus & Poggius Florentinus tradidere, quod hic squamis careat, nec carnivorus sit; nec *Lacciam* seu *Ciepan*, quod hæc dentibus distituatur, certum est. Piscis est squamosus, squammæ argenteæ sunt, mediocres, & ferratæ, quæque carni & inter se validissimè cohærent. *Rostrum* habet oblongiusculum, *Os* cum hiat valde patulum. *Linguam* oblongam, si Athenæo ex Aristotali fides, ossilem, & adhærentem. De *dentibus* non conveniunt scriptores. Carere Massarius, & Rondeletius, quod ob oris magnitudinem facile prædam devoret, tradiderunt; tenues confuso ordine undecunque Bellonius posuit, plurimos, tenuissimos, multiplici ac vario ordine dispositos, pectinum instar, quibus lanarii utuntur, Salvianus. *Oculi* sunt magni. *Branchiæ* utrimque quaternæ. Harum operculum duobus ossibus constat, quorum superius postrema sui parte squamatim committitur. A summis branchiis per utrumque latus linea fere recta ad caudam ducitur. *Pinnas* Aristotele teste, binas habet parte prona, totidemque supina. Quæ prona parte capiti proxima est, octo vel novem acutis & inæqualibus aculeis tenui membrana colligatis horret: altera unico tantum. Contra supina parte caudæ vicina aculeos habet ternos. *Cauda* in unicam pinnam degenerat. In parvulo, ut diximus, nigræ apparent *maculae*, quæ in paullo adultiore prorsus delitescunt, Grandiusculus enim argenteus est, dorso tamen paullo minus quam ventre candido. Locus etiã colo-

rem mutat, nam qui in mari capitur, ex cæruleo candicat, in ostiis fluviorum, totus albus est. *Carnem* habet secundum Iovium lacteam, secundum Bellonium rubescentem, seu is diversæ speciei, sive Oceanus aliquid mutat. *Cor* triquetrum, ut Athenæus ait: *ventriculum* amplum, & longum: appendices binas maximè conspicuas; *jecur* subflavum, in duos lobos divisum, quorum dextro fellis vesica committitur; *Lienem* rubrum & longum, *intestina* lata nec multis complicata anfractibus: *folliculum* plurimo aëre tumidum, spinæ dorfi validissimè annexum. Bellonius è pusillo *magnum* ac cetaceum, Salmonis more vadere solere testatur, ut ex Oceano libras quindecim nonnunquam pendere visus sit. Salvianus ad viginti libras, aliquando excrecere observavit. Quomodo Columella quosdam sine macula, varios alios faciat; & quid Plinius per suum Lanatum, intelligat, facilè hinc colligi potest. Ita marinum esse piscem, ut & λιμνοθάλασας, & ostia fluviorum non refugiat, Galenus præter Oppianum author est. Sed & in dulcibus, Letho nempe Lybiæ circa Berenicem fluvio nasci, Athenæus memorat: nihil de Columella, qui Velinum, Sabatinum, Vulsinensem, & Ciminum, eosdem procreare inuere videtur, dicam: secus n. insequenti sentire creditur capite. In dulci portu quem Phaharium vocant, longè majores vulgaribus reperias, apud Miletum quoque prægrandes & plurimos, ut apud Aristophanis Scholiastem & Suidam legimus. Archestratus apud Athenæum *δεσπιδας* vocavit. Solet & mediæ cryptum penetrare saburræ. Qui in fluviis capitur, *Lane* à Martiale nomen accepit, & expressè de iis Plinius. In Lupis in amne capti præferuntur. In Tyberi amne inter duos pontes tanti precii, ut Philippus, apud hospitem Cassino in oppido, authore Columella *Lupum* sibi in cœna appositum gustabundus expuerit, dicens: Peream nisi piscem putavi: quasi innueret, solos Tyberinos lupos piscis nomine dignos esse. Lucillius isti Catillonis quasi Catillorum liguritoris nomen, teste Macrobio, imposuit. Solet enim cloacas subire, & obvia quæque devorare. In India exundantibus in agros fluviis, in planis camporum vagantur, & ab aqua destituti prædæ sunt. *Vescitur* carnibus præcipuè, nec piscibus, vel corruptissimis escis parcat. In exenterati ventre serpens aliquando inventus est. Tangit & algam, & stercore: *Ἀλλύμον ἰχθυον* Oppianus vocat. Iis maximè locis qua flumina in mare exeunt, ova *parit* æstate & hyeme, ideo alicubi bis idque inter fusaneos solus facere creditur, sed posterior partus infirmiorum. Sublimes *natant*. Athenæo sunt *μονήρεις* solivagi, Aristoteli *χύται*, fusiles seu fusanei. Mugilum, Luporumque capturam uno retis jactu centū aureis coronis venisse,

Colum.  
mell. R.  
R. 1. 18.  
l. 17.  
Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 17.  
Galen.  
Alim. 1.  
3. Op-  
pian.  
Halieut.  
l. 1.  
Colum.  
mella R.  
R. 1. 8. c.  
16.

Colum.  
R. R. 1.  
8. c. 16.  
Varro R.  
R. 1. 3.  
c. 3.  
Inven.  
Satyra. 5.  
Ælian.  
H. A. 1.  
16. c. 12.  
Arist. H.  
A. 1. 5.  
c. 10.  
Arist. H.  
A. 1. 6.  
c. 17.  
Idem l.  
5. c. 9.  
Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 151.  
Arist. H.  
A. 1. 5. c.  
2.  
Plin. H.  
N. 1. 32.  
c. 2.  
Oppian.  
Halieut.  
l. 1. Plu-  
tarch. l.  
utra ani-  
mal.



Rondeletius oculatus testis est. *Solertia & ingenio* non destitui, docilesque sequentia docebunt. Rete circumdati harenas arant cauda, atque ita conditum transeunt rete. Et quamvis minus in providendo solertiæ quàm mugiles habeant; magnum tamen robur in poenitendo habent. Nam ut hædere in hamo, laxant vulnera, donec excidant insidiæ, quod præter Plinium, Oppianus, Ovidius & Plutarchus tradidere. In Eloro amne tam mansuetos esse, ut è manibus porrigentium cibum capiant, Nymphodorus auctor est. Et quia lapidem in capite hyeme sibi infensissimum se habere sentiunt; idè in abditos se tum gurgites demergunt, qui in sublimi natant, frigore congelati moriuntur. Cur inter alios pisces cum Mugile, Salpa & Chromide *clarissime audire*, post Aristotelem Plinius scribat, & in vado vivere addat, nescio, nisi fortè sublimem natatum in causa ponat. *Capiuntur* sæpenumero dormientes fuscina. *Inimicitias* cum Mugile & Squillis gerunt. Caudam illi prærodere Nigidius apud Plinium auctor est. Pugnantes invicem sæpè Puteolis, præsentè Bessarione, Perottus vidit. Statis tamen mensibus concordēs sunt, & in unum gregem, si abundè cibarii, coeunt. Ab his cornu quod fronte exit, punctis interimitur, quem Oppianus & Ælianus describere: Magni olim apud Romanos opsophagos æstimii erant. Plinius post Elopen & Acipenserem præcipuam iis & Afellis auctoritatem tradit. Archestratus Milesium *διόπριδα* & quidem *διὰ τὸ πολύτιμον* vocat, & Tripatinum summam cœnarum luxuriam ingrediebatur. Sed maximi, lactes, cerebrum & epar fiebant. Illo Eliogabalus rusticos in mediterraneis pavit. Hujus gratia, Hermæus Ægyptius piscium institor, non nisi exenteratum vendebat. *Carnis qualitas* non nisi loci, temporis, & Ætatis ratione habita, definiri potest. *Locus* si spectetur, in mari puro qui sunt, boni sunt Hicesio succi, sed pauci nutrimenti, sanguinem consistentia tenuiorem gignunt, & diutissimè citra putredinem, inprimis si nive circumdantur, servantur. Inter duos pontes Romæ capti, ob vitiosam aquam, graviter olent, & faciliè putredinem concipiunt. Illaudati, qui in piscinis habentur. *Tempus* si respicias, deteriores sunt dum in utero habent: summa hyeme & Januario captis gratia, nisi fortè nimio exercitio soliditatem carnis acquisiverint. *Lanatas* Plinius dixit, si ventrem attenderis quo mollitiæ & pinguedine blandiuntur. *Ætatis* ratione, tenelli suaves & stomacho grati sunt, copiosè nutriunt, & faciliè per corpus descendunt: mediocres optimo se commendant callo. Apparatum alibi vide. Ægris in albo jure aut ex aceto optimè elixantur. An quod *σπερμαλόγοι*, à Pythagora rejecti fuerint, dubito, Plutarchus certè postquam sic sentientium sententiam exposuisset,

patrocinari ipsis videtur. De usu in Medicina pauca occurrunt. Tantæ est, si Marcello credimus, adversus strumas efficaciam, ut ad quamlibet corporis partem admotus, earum vitium persanet. Lapilli capitis dolorem levare, Euporistæ auctor tradidit.

L A T U S, inter Nili pisces à Strabone numeratur. Esse & marinum Archestratus apud Athenæum prodidit. Candidissimus est, ducentarum sæpe librarum magnitudine, & quovis modo paratus suavissimus. Rondeletius pro eo, Coracino ac Umbræ simillimum substituit. Tarentinus *Latili* piscis meminit.

Strabo. Geogr. l. 25.

### C A P U T III.

De Alofa, & Ziga Albis fluvii.

A *Lofa* nomen, huic de quo jam acturi sumus pisci, post Strabonem Ansonius ex vulgari imposuit, Gregorius Tiphernas in Strabone, & Theodorus Gaza in Aristotele, *Σπάραν* quam moderni Græci *σπάραν* fortè quod spinis seu aculeis aliquando soleat inhorrescere, ejus nomine donarunt. Rondeletius Archippo & Mnesimacho *Σπάραν* appellari tradit; quam tamen à Thrissa diversam, ut Trissam cum Trichide eandem, Gesnerus, *varium* ut Panthera & Pavo Aristoteles facit. Nec *Lupus* est, quod Platina voluit; quod hic Mugili caudam prærodat, illam edentulam sciamus; nec *Clupea*, piscis magnus, qui crescente luna albus est, decrecente nigrescit, corpore minimum aucto à propriis spinis interimitur, in Areni Galliæ fluvio nascitur, in capite lapidem grano similem, qui ad quartanas sinistro lateri decrecente luna alligatus facit, & Attilem Padi, venam quandam in faucibus ejus mira cupiditate appetens, morsu exanimat, ob rationem eandem. Universi corporis figura, si cum latitudine conferatur, oblongiuscula apparet, & in latera ita compressa, ut imus venter, rectâ lineâ præacutis aculeis & constructâ, & propterea non asperâ solum, sed ferræ etiam modo secante (si adversa deducatur manus) terminetur, *Spinis* sive *aristis* etiam scatet innumeris, & inter vescendum admodum molestis; quod cum Trichidibus quoque commune habet, unde Albertus, & Murmellius latinum ejus nomen Aristosium sive Aristosum confinxerunt. *Caput* habet in latera valde compressum, *rostrum* acutum. *Os* cum maximè hiat, admodum patulum, edentulum, atque omnis asperitatis expers. *Branchiæ* utrinque quaterne. *Squamis* tegitur magnis, tenuibus & faciliè deciduis. In capite supra oculos, utrinque veluti gemmæ smaragdinae relucet. *Lingua* nigricat, superiores mandibulæ deorsum prominent. *Ventre* & lateribus argentum æmulatur. *Dorso* verò & capitis vertice ex albo flavescit.

Tab. XXVII. 3. 4. Strabo. Geogr. l. 15.

Aristot. H. A.

Plin. H. N. l. 4. c. 4.

Arist. H. A. l. 3. Plin. H. N. l. 9. c. 70. Plin. H. N. l. 9. c. 62.

Galen. de Alim. facult. l. 3.

Romæ



Strabo  
Georg.  
l. 15.

Romæ cum maximè aucta bipedalem mem-  
suram non superat. *Marinus* est piscis, sed  
ex mari ineunte vere cum in utero habet,  
subintrat, inchoante æstate revertitur. In  
Tyberim delapsæ strigosæ sunt, & quadam  
marine saluginis ariditate parum amabiles,  
paucorum dierum mora, Tyberinis undis  
pinguescunt. Laudatas Arnus & Umbro in  
Hetruria, Liris & Volturnus in Campania  
præbent. Gallix & Hispanix flumina maxi-  
mas, Mosa in Hollandia suavissimas. In A-  
quitania ob frequentiam *plebis obsonium* Au-  
sonius vocat. In Arvernix fluvio juxta Ma-  
rignensium oppidum, supra mille ducentas  
uno retis jactu capi, Rondeletius author est.  
In Euripo reperiri negat Aristoteles. Burdi-  
galæ & Lugduni seculentiores quàm Mas-  
siliæ venduntur. *Pariunt* in fine æstatis in  
mari. Athenæus *μυρίμυς* Thrissas dixit, Op-  
piano, alternant vias Ponti curruntque per  
æquora, Hospitium mutant semper, Pon-  
toque vagantur. Figulus veris adventum  
Mosellanis nunciare, & mense Majo toni-  
trubus, adeò terreri, ut plurimæ in ripa  
exanimatæ reperiantur, scribit.

Oppian.  
Hal. l. 2.

Ælian.  
H. A. l.  
6. c. 32.  
Porphyr.  
περί ἀποχῆς  
l. 3. Au-  
son.

In Arvernix Oppido Maringnesio ad tes-  
tudinis sonos ad natasse, & saltasse Ronde-  
letius vidit, quod & de Thrissis Æliano &  
Porphyr. proditum, nec de mendo in A-  
thænxo, qui Trichidi hoc quicquid est ad-  
scribit, dubitandum est. In nullo apud Ve-  
teres fuisse *precio*, Ausonius testatur. Post-  
quàm pingues evasere, succum mediocriter  
bonum, & qui faciliè distribuitur gignunt:  
sed quia glutinosioris alimenti excrementa  
non faciliè atteruntur, ideò ab ipsis exhalationibus,  
intempestiva somnolentia induci-  
tur, & sitis excitatur. In pisculariis Bava-  
rorum legibus, teste Gesnero, interdicitur,  
ne duobus palmis vel septem digitis, pro-  
pter aristarum & parvitatem & multitudi-  
nem capiantur. Vida prudentissimum, quod  
non nisi obesus, maximeque idoneo tem-  
pore, cum esu carniū interdicitur, appa-  
reat, dixit.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 5.

*ZIGA* Albi fluvii, qui & *Goldtsch* ab  
aureo circa caput colore dicitur, sic à Kent-  
manno describitur: Zige piscis est tenuis &  
siccus, paucæ carnis: colore pulchro, argen-  
teo, dorso tamen subfusco, oblongus est,  
non ita latus, ut solent esse pisces Goldtsch  
dicti, qui in Marchia capiuntur: longitudo  
enim ejus ad latitudinem quintupla est. *Ca-  
put* ejus si foris aspicias, Harengi capiti non  
dissimile est, nisi quod in parte superiore  
oris scissuram habet. *Lingua* ejus parva, quæ  
colore nigricat. *Dentes* utrinque ad latera in  
faucibus, mandibulis duabus duri adnati:  
sicut in ejusdem fluminis piscibus (de Capi-  
tonum fluviatilium genere) Jeseno & Dibe-  
lo, ut vulgo nominant. *Caput* & oculi ad  
aureum colorem, paucō viridi permixtum,  
accedunt. In summis lateribus utrinque

maculæ quaternæ nigræ digeruntur, quarum  
prima ad summas branchias, ultima paulò  
sub initio pinnæ dorsi. Ex Oceano in Albim  
*subit* hic piscis & paulatim consumitur ac  
deficit. *Capitur* ut plurimum in hoc flumine,  
à festo Pentecostes usque ad Divi Johannis  
diem quo tempore Sturio migrat.

A Sturione enim è mari in Albim pellitur.  
Quanquam autem ad velocitatem & fugam  
præ omnibus in Albi piscibus, comparatus  
sit; mollis est tamen & quam primum ex  
aqua in aërem subductus perit. Maximi hu-  
jus generis in Albi apud nos (Misenos) dua-  
bus cum dimidia libris (sedecim unciarum)  
ad tres cum dimidia (quod tamen rarum est)  
perveniant. Sive *assius* sive *elixus*, non boni  
saporis est. Si tamen præparatum, sale intus  
aspergas, tum in fumo aut sole leviter sices,  
& ita buturo innunctum super craticula as-  
ses, melius (ut in hoc genere) sapit. Et quo-  
niam aridi hi pisces sunt, sunt qui in aqua eli-  
xant, deinde exemptos condunt jure è buty-  
ro, zinzibere, aqua & modico aceti, sicuti  
etiam alios quosdam pisces siccatos condire  
solent, ut Truttas, Thymallos, Lucios, &  
Cyprinos latos. Quomodocunque paretur,  
nullus tamen in Albi piscis æque ferini aut  
virosi saporis est, & à quo etiam nomen ei  
impositum conjicio, ut Zige, id est, Hircus  
dicatur, hircum enim præsertim insolatus,  
olet. Capitur & in lacu Severinensi Alosam  
Gesnerus credidit, metuo ne perperam.

## CAPUT IV.

## De Mugilibus.

**H**istoriam Mugilum, nomenclatura-  
rum diversitas obscuram facit *κεσρδς*,  
*λδνίσκω*, *κέφαλ*, *ἰῆσις*, *παραίς*, *μυλίν*, *σάρκ*,  
*χελών*, *βαλχ*, *σαλδς*, *δακτυλδς*, *κεφαλίν*, *βλεφίας*,  
*πλδτες*, que apud Aristotel. & Athænxum,  
ex Hicesio, Dorione, Eutydemo, Pole-  
mone invenies, præcipuæ sunt *κεσρδς*, A-  
ristoteli & generis & speciei nomen est. Aristot.  
H. A. l. 5. c. 11.  
Hicesius speciei, Dorion generis duntaxat  
mentionem fecit, & in *marinum* & *fluviati-*  
*lem*, illum iterum in *Cephalum* & *Nestis*,  
divisit. Appellationem *ἀπὸ τοῦ κέσρδς*, seu te-  
lo, belli Persici tempore invento, sortitus  
est, quod eo teli modo in anum immisso apud  
Athenienses publicè adulteri pœnas luerent.  
*Leuciscis* seu Alburnis & Albulis ab albo co-  
lore nomen impositum est, perperam *γλαυ-*  
*κίσκος* dicuntur; Galeno sunt fluviatiles, Galen. de  
*κέφαλ* generis quidem nomen est: sed Alim. fa-  
cult. l. 3.  
quia *παρὰ τὸ βαρύτερον πλὴν κεφαλὴν ἔχειν* nomen ob-  
tinuit, nec id omnibus magnum, non omni-  
bus etiam competet, nisi fortè ideò di-  
ctum esse putes, quod in metu capite  
abscondito totum se occultari credat. Ari-  
stoteli, sanè aliquando peculiaris & *unica*  
*Mugilum species est*: aliquando *duas* sub se  
*species* complectitur; nec fortè malè Mugiles  
mari-

Tab.  
XXIII.  
4. 5.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 6.

Aristot.  
H. A. l.  
5. c. 11.  
Aristot.  
H. H. l.  
8. c. 2.

Galen. de  
Alim. fa-  
cult. l. 3.

Aristot.  
H. A. l.  
9. c. 17.  
Arist. H.  
A. l. 8.  
c. 2.



marinos in Cephalos & *νῆσις* distinxeris. *Νῆσις* epithetum est omnibus Mugilibus commune, quod omnibus carnibus abstineant. *Περαιας* speciei nomen est, sed speciem Cephalo alteram, quæ mucosuo suo vivit Epithetum, & idem cum *μυζίνε* videtur. *Sargus* seu ut apud Aristotelem *σαργίνος*, quid sit, dubitatur, Rondeletius eundem cum *νῆσι* seu jejuno facit, Aldrovandus discernit. *Chelones* cum Bacchis Hicesio iidem, & Plinius Banchos inter Mugiles recenset, sed cum Myxone eisdem facit. Rondeletius Bacchum quintam quandam speciem Hicesio esse, insinuat. *Σελυνδς*. Salviano cuneatus, Gesnero Cunealius, quod *λαγάρδος* & *τετραγόνος* *gracilis & quadratus sit*, ita dictus, à solo Eutydemo inter Mugiles reponitur. Alii *σφινκίς* legunt, ut à *σφίγξ* vespa, non *σφίλι* cunco, isti pisces dicti fuerint. *Δακίλις*, nomine Salvianus minorem aliquem in eodem genere ab Eutydemo ponit, alii *διδακίλις*, sed perperam legunt, cum duos in latitudine digitos non excedat: nec alii fortè fuerint, quàm quos Padi accolæ Canistrellos, quod in Canistris vœnales ferri soleant, vocant.

*Cephalinus* quibusdam cum Blæpsia, teste Dorione idem, nisi mendum sit, & pro Blæpsia *βλέψα*, quod idem quod *μύξα*, ut Galenus scribit significat, legi debeat, & sic Cephalinus inter species Nestium numeretur.

*Platarum* nomen Cestreis à quibusdam imponitur, si Polemoni libro de fluminibus Siciliae credimus. Actum de illis in capite de Murænis. *Species* Mugilum seu Cestriorum sunt quinque, apud Aristotelem, *Cestreus* nempe propriè dictus, *Cephalus* cognomento Chelon seu Labeo, *Cephalus pereas*, sive translitoranus, *Sargus* sive *Sargo*, & *Myxa* seu *Muco*. Caput nonnullis est magnum & depressum, *rostrum* breve ac retulum, ut Capitonibus, aliis minus & rotundius, *rostrum* magis extensum & acutius, ut Cheloni. *Os* omnibus parvum, rotundiusculum & edentulum. *Squamis* omnes teguntur. Cestreus magnas & crassas habet, quæ numismatis speciem mentiuntur. *Pinnas* utrinque binas gerunt, illos si excipias, quos lacus Sipharum gignit, quibus teste Aristotele, una tantum utrinque est, & supinis carent. Præter binas illas pinnas, quæ utrimque consistunt, unam habent abano; in dorso duas, quarum altera aculeata est, altera aculeis caret; ad caudam spectans. Omnes à branchiis *lineas* aliquot subscuras ad caudam deductas habere videntur, etsi haud æquè in omnibus sint conspicuæ. *Dorso* sunt subnigro: *ventre* vero candido. *Ventriculus* teste Aristotele carnosus est: cui parte altera plures appendices exeunt: altera una tantum, ut idem ait. Rondeletius longè alium esse scribit quam in carnivoris piscibus, den-

sum nempe & carnosum instar ventriculi avium, foris planum, intus rugosum, figura verticilli vitrei, quod mulieres fusis appendunt. *Intestina* quoque crassa sunt, pinguique & ingyros acta; in quibus splen latet, ut idem observavit, & sub pinna locum aëre plenum reperit. Hepar pallet; parvum, & tanquam manu ventriculum amplectens. *Fel* rufum sive flavum, aqueæ consistentiæ. *Cestreus* ejusdem Rondel. hepar ex albo rubescit: caro mollior, laxior, minus candida, minusque pinguis quam Cephalo, additque gulam habere; ventriculum in longam appendicem desinere, semper inanem esse, uti & intestina. Lapis quem Cestreus in capite gerit, *Echinus* & *Sphondylus*, ab echinata specie dicitur. Lineæ quæ à branchiis ad caudam ducuntur, Cephalo breviores sunt. *Chelon* sive Labeo nigricantes à capite ad caudam æqualibus spaciis distantes protensas habet. Habet & labra crassa, spissa, prominentia, unde *χελώνος* *Labeonis* nomen. Capite est paulo minore quàm Cephalus, oculis prominentioribus, sine pellicula illa concreta, quam veluti palpebram habet in capite. Marinos pisces esse nullum dubium, sed an omnes fluvios & stagna subeant, incertum. Capitonum alius translitoranus Aristoteli, quasi in alto mari degat. Galenus in stagnis quoque nasci scribit. Ut ut sit, Cestreum propriè dictum esse judico, qui longius à mari, ut in Nisum ita in alios fluvios recedit. Cephalo in ejusdem vicinia, propter dulcem aquam & limum morantur. Etsi autem aquas ament, ab imbris tamen adeò vehementer læduntur, ut *visum* amittant, ut Aristoteles prodidit. Cephaloni inprimis oculi per hyemem albescunt: ipse tum & macer & cæcus, quod in Nauplio terræ Argivæ agro accidit, capitur: inprimis, si hyems asperrima fuerit.

Marinos à fluviatilibus, spinarum numero & quantitate distinxit Galenus, plures his & minores innuens: certius indicium sapor ipse suppeditat. Acriorem & pinguedinis expertem Cephalum dicunt qui præstantior.

De Cibo non convenit inter authores. Carne abstinere Aristoteles tradit, vivente duntaxat Oppianus & Ælianus. Idem Cestreum alga & limo vesci scripsit. Gulosus autem maximè est & insatiabilis, idè in proverbium abiit, aviditas sæpè tanta, ut cauda verberando excutiat cibos.

Tanta iisdem salacitas, ut in Phœnice & Narbonensi provincia, coitus tempore è variis marem linea longinqua per os ad branchias religata emissum in mare eundemque linea retractum, scœnimæ sequantur ad littus, rursusque foeminam mares partes tempore.

De ipsorum *Generatione* ita Aldrovandus. Quod ad ortum generationemque eorum per-

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 7.

Galen. de  
usupart.  
l. 8. c. 6.

Aristot.  
H. A. l.  
6. c. 13.  
Arist. de  
part. l. 4.  
c. 13.

Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 2.

Strabo  
Georg.  
l. 15.

Aristot.  
H. A. l.  
8. c. 19.

Ælian.  
H. A. l.  
1. c. 3.  
Oppian.  
Halieut. l.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 17.



pertinet: scribit Aristoteles esse qui omnes sponte oriri opinentur, quorum opinionem refellit, quoniam unicum tantum eorum genus sit, quod non coitu, sed ex limo arenave enascatur: cæterorum veræ foeminae ova, mares semen genitale habeant. Pariunt autem eodem teste semel anno: sed an eodem omnes tempore, difficulter ex ipso colligas; alias enim Capitonem vere parere tradit ultimum, quoniam novissimè ejus foetus appareat: alias omnes Decembri mense gravescere ait, tricenisque diebus gerere, & in iis Capitonem quoque enumerat, alias Cestreos ait inter primos partum accelerare, parere hyeme, locis iis maxime quæ flumina exeunt, dum uterum ferunt, præcipue graviter laborare; ideoque fieri, ut tunc potissimum ruant in terram ac excidant: feriri porro gravi stimulo agitados in terram, atque omnino in temporis motu perpetuo incitari, donec pariant, sed requiescere à partu continuò.

De Ingenio & aliis hoc habe. Tam veloces esse, ut jejuni transversa navigia superjacent, & ubi dispositas piscatorum sensere insidias, retia supervolent, ut veluti sagittæ arcu emissæ videantur. Curvos hamos habere suspectos, ideo postquam diu circumnavatare, cauda prius escam percellere, & quod avulserunt deglutire, mox ore in angustum collecto, summis tantum labris ac vellicatim escas stringere. Irritati, in sublime feruntur, & effugia quærunt; si aberrare, quiescunt, & necem prostrati expectant. *Usus in Cibus* quod attinet, Hicesius omnes Leuciscos & Mugiles boni succi esse, facile excerni, nec multum alere, scribit, nempe si mari puro capti sunt: Nam qui in cœnosis locis, quales tum illi, qui in Istruria in Prillino lacu apud Orbatellum ad mediterranea deferuntur, tum hi, quos Padusæ atque ipsi luculenti Fossæ Clodiæ canales viscere prætenere, Ferrariensibus & Venetis copiosissimè præbent, pinguedinem humanæ naturæ infestissimam habent. Aristoteles in fluentis & lacubus, quod pinguiores fiant, præstare dixit. Lynceus Samius hyeme post partum laudat.

Æstate lutum quod stagna exsiccentur, olent. Septembri, quod luto putrescente pinguiore evadant, insalubres sunt. Optimi qui circa Abderam, deinde qui circa Sinopem capiuntur. Romæ maxima ovorum gratia, quæ teste Iovio, geminis folliculis circumcisa parte semines, recentibus Cephalis eximuntur, & nomen *ἰὸν πρῆχον, ovorum salitorum* apud Græcos obtinere. Quantum ad *Medicinam*, Ventriculus Mugilum, seu in cinerem redactus, seu in fumo siccatus, & vel vino albo, vel aqua absynthii ablutus, & in cibo sumptus, ventriculi exsoluti vires non minus quam ventriculi gallinarum potus interna reficit. Elixus in

vino & ex aceto sumptus vomitum compefcit; prodente omnia Rondeletio. Lapilli in cerebro contra Nephritim valent.

## CAPUT V.

*Le Capitone Anadromo Gesneri.*

Capitonem Anadromum, Gesnerus & Kentmannus descripsere. Nasutus, inquit, ille, videtur, prominente & carnosa superiore oris parte, ut in nostris fluminibus, is quem Nasi nomine descripsimus: cui etiam reliqua corporis specie per omnia adeò similis est, ut discrimen nullum animadvertam, ne colorum quidem ferè, nisi quod Albinus hic Nasus magis albicat, noster fluviatilis, vero magis fuscus est. Sed noster plane fluviatilis est, Albinus è mari ascendit: præterea noster vilis & plebeius est, Albinus vero inter laudatos, præsertim assus. Hoc etiam notandum, cum Albinus alio nomine *Blicca* dicatur, longe alium piscem eodem nomine à nostris vocari, de quo egimus inter albos pisces. Miseni etiam Zertam dicunt, quod nomen etiam Polonis usitatum audio. Zerta inquit Kentmannus, piscis longiusculus, argentei nitoris, *squamis* parvis tegitur, dorso subfusco: *pinnis* quæ ad branchias sunt & parte supina rutilis, pauco cæruleo admixto. Linea utrinque à branchiis ad caudam tendit, in qua puncta fusci coloris digeruntur. Caput crassiusculum, oculi pulchri, magni, albicantes, nares magnæ non procul ab ore. Os molle prorsus, in quo nec dentes sunt, nec alia asperitas, sed ab initio gulæ seu faucium, maxilla utrimque valida, dentibus senis oblongis vallata. Maximi hujus generis pisces qui apud Misenos capiuntur, bilibres sunt. Libram XVI. unciarum dico. Anno toto ex Oceano in Albim ascendit hic piscis, maxime vero circa Pentecostem, qui tempore parit, migrare solet, tunc etiam ad cibum præfertur, quod foeminae ovis plenæ sunt. Manent & pariunt in Albi, proficiuntque ipsi & soboles: augentur enim & pinguescunt. Vescitur omne genus pisciculis, qui nullis præsertim spinis & aculeis rigent: item muscis aliisque insectis, quibus intra aut proxime supra aquam potitur. Habetur inter optimos qui in Albi sunt, assari solitos pisces. Caro enim ejus optimi saporis est. Ritè etiam elixus non male sapit. Desquamatus nempe, exenteratus & elutus, in aquam fervere incipientem immittitur, conditusque ac salitus ad juris ferè consumptionem coquitur, quomodo permulti etiam alii fluviatiles pisces elixari solent. Sunt qui juri haud fere consumpto copiosum butyrum addunt, eoque liquato piscem inferunt. Potest & aceti aliquid affundi, & Zinziber aspergi, pro cujusque palato. Assus vel simpliciter, vel cum embammate è cœpis minutatim concisis, vino, croco, saccharo & Zinzibere, sapidissime estur.

K

Nec

Tab.  
XXIII.  
6  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 7.

Plutarch.  
l. utraque  
animal.  
Oppian.  
Hal. l. 2.



Nec despicuerit desquamatus, in frustra concisus, quæ in polenta aut secalis polline volvuntur, atque ita in butyro sive crudo sive liquato frixus. *Hæc omnia Kentmanus.* Addit Gesnerus non in Albitantum, sed Sala etiam apud Misenos flumine Zertam capi.

## CAPUT VI.

*De Capro sive Caprisco.*

Tab.  
XXIII.  
7.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 8.

**C**Aprum & Capriscum eosdem Salvi-  
nus, diversos Rondeletius facit. Maxi-  
ma hic nominum affinitas, & uterque du-  
ram pellem habere traditur. An vere *καπρίσκον*  
Strabonis, & aliorum, & *μῦς* Op-  
piani & Æliani sint iidem, dubitari potest.  
Equidem Athenæus Aristotelis *καπρίσκον* *χοῖρον*  
vocat; alii tamen *σκαρίον*, quidam *σκαρίον* legi  
debere opinantur, nonnulli *Chalcidem* pi-  
scem vocalem & in dulcibus aquis habi-  
tantem credidere. *Porcus* etiam Niloticus  
Strabonis potius porca fluviatilis minor est,  
piscis rotundus, spinis in capite noxiis, *ἔν*  
vero *ψομμάδιδα*, quasi in Arena fodientem  
facit, quod terestris suis more rostro are-  
nam fodiat, Numenius facit, eandemque  
cum *σκαρίον*, cui Simeon Sethi eas in nutrien-  
do facultatis rationes attribuit, quas alii  
fere Rhombo tribuunt, Aldrovandus po-  
suit. Salvianus cum *καπρίσκον* & *χοῖρον* eundem  
judicat, *μῦς* denique inter *σειλάχην* seu cartila-  
ginea Athenæus ex Aristotele recenset,  
inter quos, quis Caprum rostrum retulerit?  
Athenæus eundem cum Capris, cum ait  
*καπρίσκον καλεῖται μῦς* esse censet. *Descriptionem*  
*ejus* ex Salviano, eamque accuratissi-  
mam damus. *Capser*, inquit, *Molæ* piscis  
instar, *caput* utrinque admodum compres-  
sem habet: *Oculos* rotundos, atque in superio-  
ris capitis parte locatos: *Os* parvum, & val-  
de denticulatum: utraque enim maxilla  
octonis dentibus validissimis, magnis, latis,  
non ferratis, sed continuis, atque humanis  
simillimis minuta est. *Branchiis* utrinque  
quaternas non osseo & de articulato (re-  
liquorum squammatorum instar) operculo  
sed cute contextas, nec lata, sed modica scis-  
sura (*Molæ* piscis more) pervias habet. Nec  
si Aristot. dicat: *Habent quibus paucissima*  
*sunt, singulas branchias utrinque easque du-*  
*plices, ut καπρίσκον* (sive *Aper*, ut Theodo-  
rus vertit) *aliis binæ utrinque sunt, alteræ*  
*simplices, alteræ duplices, ut Congro.* Suspiciari  
debemus hunc nostrum piscem Congrum  
non esse, cum neque etiam verum sit, quod  
binæ utrinque branchiæ Congro sint. Et  
propterea mirari potius convenit, cur hæc  
ita tradiderit Aristoteles. Utrinque una  
tantum *pinna* & rotunda ad branchias con-  
spicitur: nam illis, quæ in piscibus aliis u-  
trinque in ventre sunt conspicuæ, caret pror-  
sus. In dorso fere medio tres, membrana  
inter se juncti reperiuntur *aculei* robustissimi

& magni, quorum prior reliquorum duorum  
tripulus est, quosque omnes non solum ubi  
vult, deprimit, sed in sulcum etiam osseum,  
in dorso ob id sculptum, recondit. Depressi  
autem & reconditi uti quam facillimè simul  
eriguntur, ita eorum unus duntaxat erigi ne-  
quit. Et pari ratione erecti omnes deprimi  
possunt, cum eorum unus nequeat; suntque  
ea arte fabrefacti, ut cum prior & major  
quantumvis impulsus deprimi nullo prorsus  
pacto possit: postremi tamen depressione,  
quæ facillima est, statim deprimitur, non se-  
cus quam in arcubalistis vocatis, in quibus  
parvo ac inferiori ferreo vecte compressus,  
tensus ilico remittitur arcus: ob cuius simili-  
tudinem hic piscis noster Romæ *Pesce balestra*  
vocatur. Et quod majore dignum est admi-  
ratione, si postremus aculeus non prorsus  
deprimatur, sicuti prior quoque proportio-  
ne duntaxat deprimitur, sic ibidem etiam ita  
rursus consistit atque obfirmatur, ut nullo  
impulsu ulterius deprimi possit, nisi reiterata  
postremi depressione. Hos ternos aculeos  
pinna sequitur, ad caudam usque deducta.  
*Osse* autem valido, lato & recurvo, ex cordis  
loco ad eam ventris partem, quæ è branchia-  
rum regione est primum reflexo, deinde per  
ventrem sub cute usque ferè ad podicem  
extenso, ibidemque postremo in acutissi-  
mum & conspicuum aculeum desinente, tota  
anterior ventris regio roboratur atque muni-  
tur. Quæ verò inter prædictum aculeum &  
podicem, ventris portiuncula relinquitur,  
plerisque aliis longè minoribus, sed satis ro-  
bustis atque ferratis aculeis armatur. A podi-  
ce per ventrem reliquum ad caudam usque  
alia singularis pinna deducitur. *Cauda* quæ  
non sensim, ut reliquorum piscium, sed re-  
pente extenuatur, in unicam & latam pin-  
nam degenerat: *Ventriculum* habet amplum,  
& crassum: intestina lata & valde reflexa: he-  
par subalbidum, cui fellis vesica hæret.

Corio tegitur squamoso, cujus tamen  
squamæ serpentis potius quam piscis viden-  
tur; nam præterquam quod eo ordine sunt  
commissæ, ut lineas, cancellatim sese inter-  
secantes constituent, firme etiam & valide  
adeo hærent, ut desquamari nequeant; un-  
de ita durum & asperum efficitur ejus co-  
rium, ut vix diffecari queat. Rondeletius sese  
expertum esse scribit, ne acutissimo quidem  
gladio penetrari posse, utque ligna & ebo-  
ra eo poliri possint. Quamobrem jure Ælia-  
nus atque Oppianus marino Muri pellem  
præduram tribuere; & Athenæus Aristotelis  
testimonio, etsi apud Aristotelem id nunc  
non legatur, inter pisces qui aspera cute re-  
guntur, *καπρίσκον* recensuit. Quod ad *colorem*  
attinet, ex livido viret, nonnullis parvulis  
notis cæruleis & rubentibus maculis quam  
plurimis insigniuntur. Estque totius piscis  
figura valde compressa, & lata, atque fe-  
re orbicularis. Ad multam magnitudinem  
non



non excrefcit, duas enim libras raro excedit, unde merito Oppianus & Ælianus eum haud magno corpore effe dixerunt. Hactenus ille. Non maris duntaxat, fed & fluviorum accola eft, ut Plinius & Aristoteles fcripfere. In amne Acheloo grunnitum habet. Vefcitur carne, cancris, fquillis atque testatis. *Solivagus* eft, & raro capitur. Pugnaciffimum effe, tum quod pelle prædura tegatur, tum quod dentium robori confidat, Ælianus & Oppianus fub nomine Muris marini prodidere. Carnem habet duram & fuavem. Virus namque olet. Athenæus inter *σκληρότατα* retulit.

CAPUT VII.

De Sturione.

**P**iscis quem nos Gothico vocabulo Sturionem, quasi *στυριον* quod rostro fuo proræ rostratæ speciem gerat dicimus, is Græcis nostri temporis *εὐρίχτις* quasi Oxyrinchus, Cypriis teste Bellonio *Morona* vocatur. Nec eft veterum *Lupus* quod Poggio Florentino placuit, ut capite quarto hujus tituli inuimus: Nec *Attilus*, ut Franciscus Philephus voluit, cum Attilus is fit, qui hodie ab accolis Padi, veteri fervato vocabulo Attina, Adilo & Ladinò vocatur, piscis ipso Sturione amplior, effigie, fapore, pretio & tota fere natura ab eo diflimilis: Nec, *Turfio* Plinii, quod credidiffe Theodorus Gaza creditur, cum hic Carchiæ, id eft, Caniculæ, ut Archeſtratus apud Athenæum comprobat, species fit, & cum Turfo five Phocænæ in Ponto catulos pariat, hic oviparus fit, & ubique nafcatur. Nec *Hycca* feu *Hysca* ut Hermolaus Barbarus in epiftola ad Cortufium prodidit, cum vel ipfe Athenæus, qui folus Hyccæ meminit, qui piscis Hycca fit ignoret, & duntaxat, à Callimacho facrum piscem, à Cyræneis *Erythrinum*, ab Hermippo Smyrnæo Hyccam Julidem vocari fcribat.

Nec *Delphinus*, ut Carolus Figulus voluit, quamvis in multis quoad formam conveniant, quod ifte omnium veterum autoritate, inter cetos referatur. Niloum tamen Delphinum, de quo apud Solinum leges, quemque Delphino potius fimilem, quam Delphinum Marcellinus vocat, Sturionem exiftimare, nihil forte oberit.

Nec *Oxyrinchus*, veterum, cum hic Carnivorus fit, & hamo, ut apud Athenæum legimus, capiatur. An pro Oxyrincho Caffio Æliani, haberi debeat, comparatio oftendere poterit. Circaffi fane cæterique Mœotidis accolæ, Sturionem Oxyrinchum vocant, fi Gefnero & Scaligero credimus. *Silurum veterum* effe Salvianus contra Manardum apud Aldrovandum oftendere conatus eft, quem prolixiffime agentem vide.

Aufonii effe nullum dubium, & ita Sturio à venantio Fortunato Pictavienfis Epifcopo, qui duobus poſt Aufonium feculis vixit, vocatur: Veterum non effe, tum ex eo colligas quod non tantum teſte Juvenale & veteri ejus interprete, fed etiam Antiphane & Theodoro Sinopenfi apud Athenæum, vilis apud eos piscis fuerit; tum quod eum in Garumna non invenias, quod & Scaliger monuit. *Γαλαζίαν* feu *γαλεζίαν* vocari Galeno crederem, niſi eandem in Græciæ mari, in quo Sturionis dantur, naſci, negaret. Acipenferem effe, qui ab Elope & Anthia diſtinguitur, Rondeletius erudite oftendere conatur, quem ſequitur Junius: obſtare ejus ſententiæ videtur, quod rarus inventu, & unus omnium ſquamis ad os verſis contra aquam nando meare, apud Plinium dicitur, & id Nigidius Figulus, referente apud Macrobiū Sammonico Sereno, confirmet. Aldrovandus Sturionem Acipenferem Romanis cum recens & in Italia captus eſſet vocatum fuiſſe; Silurum Græco nomine cum ex peregrinis Græciæ in primis oris allatus, opinatur. *Descriptionem* ejus Paulus Iovius hanc dedit. *Corpore* eſt tereti oblongoque, inter rotundos & planos ambigente, ut qui ſubtus quodammodo planius fit, dorſo verò ſemi rotundo. *Caput* quadratum eſt, & ad effigiem parvæ pyramidis prætenſum. *Os* illi eſt ſine maxillis, ſine dentibus, diverſum penitus ab reliquorum piſcium forma, idque ſub mento in ipſa prope jugulum parte, ad ſimilitudinem fiſtulæ arundinacæ rotundum, ſemperque patens, & cartilagineum & ſummè candidum; cujus hiatum in procerioribus haſta brachii haud facile impleret: cæterum totum caput dura potius & calloſa cartilagine quam certis offibus conſtat, quod ex lento quodam & præpingui mucore concretum eſſe videtur. *Naribus* omnino quæ illi prætenues ſunt ſupra roſtrum, refrigeratur. Sunt autem branchiæ utrimque quaternæ oſſeo operimento, non ſecus quam ſquamofis piſcibus contactæ. *Oculos* habet parvos. Ex roſtro gemina barba, ut in Mullo dependet. Toto dorſo craſſiores quædam ſquamæ oſſea duritie certo numero ordineque diſtinctæ, intercurrente ſpinæ acie, ad elegantiam eminent, ut in magnificentioribus valvis hodie videmus, quas ferrei atque inaurati clavi certa ſerie confixi decentiſſimè figurant. Cæteræ corporis partes cuticulari & ſcabro admodum operimento potius quam perpetuis ſquamis integuntur, idque ab ſubviridis atrique coloris ſpeciem. *Venter* cute levi & argentea tegitur. *Linguam* habet craſſam & duram, *gulam* unde quaque rugoſam. *Pinnae* ſunt ad branchias duæ & totidem in ventre ad podicem: præter quas in dorſo prope caudam alia unica erigitur, è cujus fere regione imo ventri alia etiam una ſubnectitur.

Juvenal. Scalig. 14. & 24.

Scalig. in Lect. Aufon. 1. 2. c. 1. Galen. de Alim. facult. 1. 3.

Plin. H. N. l. 9. c. 17. Macrob. Satur. 1. 2. c. 12.

Arist. H. A. l. 4. c. 9. Plin. H. N. l. 11. c. 51.

Ælian. H. A. l. 9. c. 41.

Tab. XXIII. 8. 9. 10. 11. Aldrov. de Piſcib. l. 4. c. 9.

Plin. H. N. l. 9. c. 9.

Ælian. H. A. l. 17. c. 32.



*Cauda* vero in duas pinnas degenerat, quarum superior crassior atque duplo longior extat. *Ventriculus* est carnosus solidusque atque pertinaciter inhærescens tergori, ut nisi discissus divelli inde possit. *Oesophagus* in rugas contractus. *Hepar*, in duos lobos oblongos pallidi coloris dividitur, quorum dextro vesica fellis validissime connectitur. *Lien* subruber: *intestina* crassa, & ternis gyris convoluta. Magnis piscibus annumerari debet, cum crebo & plerisque in locis centum librarum, & alibi longe major capiat. Ego aliquando Ferrariæ Sturionem mercatus sum centum & quadraginta librarum, donavique Illustrissimo pariter ac Reverendissimo Ioan Baptistæ Compegio Episcopo Majoricensi Domino meo nunquam satis celebrando, qui paucis ante diebus ut labores meos promoveret, mille aureos donaverat. Quantum ad *Differentias* refert Bellonius, Ponticorum, Adriaticorum, Gallicorum, & Germanicorum inter se esse differentiam, quæ magnitudine, crassitie, cutisque asperitate, & subnigro, subflavo, aut argenteo colore distingui possit: Sequanicum & Ligerinum adultum interdum tres orgyjas excedere, Galeum piscem pinnis & forma referentem, exili corpore, hirra sursum pelle, deorsum plana ac levi: apud Ferrarienses, & Bononienses argenteo colore fulgentem, dorsum, & latera tribus veluti carinis distincta ostendere. Scaliger quoque tria Sturionum genera, in Occa Sarmatiæ fluvio tradi scribit, & pretiosissimum illum, qui Bialarybitza vocatur, ponit: sed Herbersteinius Bialarybitzam à Sturionibus distinguit. *Locum* si attendas, In Ponte, & circa Mœotidem paludem frequentissimus est, inde ova in molem coacta, salita, & cadis conclusa, per Turciam & Italiam distrahuntur. Tyrreno & Adriatico mari si Bellonio fidis, rarò visitur.

Major tamen in fluminibus, quæ nonnisi quinque aut sex dierum itinere subintrat, quam Oceano, Tyberim si excipias, in quo parvi capiuntur. In Albi (hunc circa Penteosten gregatim, authore Kentmanno ingrediuntur) capti, ducentas interdum libras singulas sedecim unciarum appendunt. Captus tempore Iohannis Frederici Electoris sexaginta supra ducentas librarum pondere, quem totidem florenis Princeps redemit. In Ligeri quoque & Rheno delicatior. In Tanai, Danubio, Rheno, Tibisco, Vistula, Garumna frequenter capitur. *Cibus* Sturioni non pisces & conchyliæ, edentulus enim, sed fordes & mucus, quidam sed perperam aëris tranquillitatem ei ad cibum sufficere crediderunt.

Dum escam quærit, suis more terram sub aquis fodere. Isidorus prodidit. Cum branchiis omnino latis careat, naribus refrigeratur, & si quam hauriendo recipit aquam,

eandem prono ore statim regerit. De ejusdem *Robore*, ex relatione Kentmanni ita Gesnerus: Sturio in aqua validissimus piscis est: & in terra quoque cum ventri innititur. *Cauda* concussa hominem utcunque robustum prosternit, ubicunque contigerit, perticas etiam magnas & ligna per medium frangit. In terram extractus, lapides aliquando tantavi cauda ferit, ut ignis exiliat, attritu nimirum ossiculorum, quibus toto corpore mucronatus horret. Quamobrem cautè tractandus est à piscatoribus, ne vel crura eis confringat, vel retia disrumpat. Peritiores in aqua captum reti ad ripam impellunt, ita ut rete, non adversum, sed ad latus ei sit: secus enim rete vel sextuplex laniaret. Cum ripam attigere, caput ejus omni contentione in altum levant, & piscem totum in latus declinant: sic enim robore suo nocere non potest. Videtur cum Solmone Amicitiam colore. Ducem enim istorum piscatores vocant. Zigam è mari, pulsam, per flumina persequitur, sed frustra: Agilis enim hic & velox prævenit. Tanti olim *in cibis* apud Romanos, Trajani tempore, si excipias, æstimii, ut cum tibiis & coronis in coenis circumferretur, & Gallonii mensa teste Horatio, eo famosa fuerit. Mare tamen foeminis præstant, hæ ovis plenæ probantur. Poggius Doctoris Poggii filius caput commendavit. *Caro* duriuscula est, præpinguis, viscosa, & ægrè concoquitur. *Hepar* adeo dulce, prodente Alberto, ut nauseam nisi felle tingatur, pariat. Græci sale inveteratos tribus nominibus insigniunt. *Rachis* ipsis dorsi portio pleuræ, costæ & latera; *hypocelium* alvus cum pube. Caviario, quod ex ovis paratur, Græci & Turcæ vescuntur. Iulio II. Pontifici mirifice idem placuit. Paratur & ex Cyprinorum ovis in Iudæorum gratiam. *De usu in Medicina* nil occurrit. Quæ enim de Siluro Plinius, huic vix competunt.

## CAPUT VIII.

*De Galeo Rhodio.*

**D**E Galeo Rhodio ita scribit *Aldrovandus*. Rondeletius hunc piscem, cujus modo icon exprimetur, Galeum Rhodium esse eruditissime ostendit, propter maximam nimirum cum Acipensere sive Sturione similitudinem, non solum quoad corporis speciem & partes, verum etiam quoad gustum, & saporem, dempta, inquit, unica differentia, quæ non nisi ab iis potest percipi, qui citra ingurgitationem hujus cibum sumpserint, quique exquisito gustatu fuerint: ferinum enim quid resipit, quod tamen etiam non nisi paucissimum esse potest: nam Archestratus, qui in nullis non terrarum Orbis angulis gulæ cupedias diligentissime perquisivit, id observasse in eo non videtur, quan-

Haftenus  
Iovius.

Macrob.  
Salmon.  
Arche-  
strat. apud  
Athen.

Tab.  
XXIV. r.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 10.



quandoquidem Acipenseri plane eundem esse credebatur, ut Athenæus tradit, qui illius sententiam refellit. Athenæi verba non solum Acipenseri à Galeo Rhodio discrimen indicant, sed verum Galeum Rhodium hic depingi comprobant: Archestratus, inquit, qui Sardanapali vitam vixit, de Galeo Rhodio scribens, eundem esse opinatur cum eo, qui apud Romanos cum tibiis & coronis in cœnis circumferebatur, vocantque Acipenserem. At hic quidem Acipenser parvus est, & porrectiore rostro, & figura triangulari magis quam ille. Et paulo post, Archestratus de Rhodiensi Galeo loquens, amicis patrio more consulens, ait: Galeum in Rhodio quem Vulpem vocant, si tibi vendere noluerint, vel mortis periculo rape. Nominant illum Syracusani *κύνα πύρα*, id est, canem pinguem. Hæc ille. Quod si Galeum Rhodium cum Sturione seu Acipensere contuleris, nullum planè comperies; (inquit Rondeletius) qui ei similior sit eo quem proponimus; his exceptis quod Sturio est longiore rostro & corporis figura magis triangulari. Nam alioqui Sturionem totius corporis figura, tergi ossibus acutis, & clypeorum modo efformatis, aliis item in lateribus dispositis, pinnis, cauda, ore in supina parte sito, omnino refert. Is quemadmodum Sturiones, relicto mari, amnes subit. Reperitur enim in Pado, & Rhodano, & pro Sturione venditur; nec ab eo distinguitur, nisi ab exercitatissimis & exquisiti gustatus hominibus. Hanc differentiam docuit ipsum Guilielmus Pelicerius Monspeliensis Episcopus, vir singulari doctrina præditus: tum ex capite crassiore, & rostro brevior, obtusiorque; tum ex gustu Galeum Rhodium sive Vulpem deprehendi. Ferinum quid recipit, quod de Sturione dici non potest, carneque est durior: à quo sapore Galei & Vulpis nomen habet, Galei enim & Vulpes ex Galeorum genere ferini sunt saporis & ingrati. Si tamen in dulci aqua diu nataverit, in cibis haud aspernandus est. A nonnullis eodem Rondeletio teste *Cops* vocatur, eoque nomine designatum atque optimè figura expressum ad ipsum Ferraria misit doctissimus medicus Antonius Musa Brasavolus. Alii nominis affinitate decepti *Copso* appellant. Est enim id nomen alterius piscis.

## CAPUT IX.

De Cataphræto.

Tab.  
XXIV.2.  
Schon-  
veld.  
Ichtyol.  
P. 31.

**P**isci huic Schonveldius nomen imposuit, sicque eum descripsit: Est palmarum duorum longitudinis ad summum, Capitis fere triangularis, depressi, angulosi, ac lati pollices vel digitos duos, cujus duo latera tuberculis plerisque horrent in ambitu, anteriora quæ os spectant cirrhus multos te-

nuissimos alunt, posteriora aculei, retrorsum spectantibus minacia sunt. *Rostrum* habet resimul, quatuor apiculis munitum, quorum duo anteriores instar Lunæ cornutæ vel semicirculi se rotundant, reliqui post hos suis aculeis retro conversis conspiciunt. *Os* in supina parte semicirculare habet, parvum, ad incisuram ejus utrinque binis, sub mento pluribus tenuibus cirrhis barbatum.

*Truncus* proxime caput depressior, octagonus est, prope caudam sexagonus, prona parte fuscus, nigris lituris intersparsis, circa ventre plenum, in cujusque medio *podex* est, albicat. Totus *squamis* offeis contextus est, in quarum medio tumor durus, reduncus, erigitur, qui in omnibus continuatus corpus angulatum efficit, quod versus caudam valde gracilescit. *Pinnas* circa branchias habet latiusculas duas, sub ventre totidem, sed longe minores, binis fibris constantes. In *dorso* inter squamarum extantias concavo, duas contiguas, parvas, omnes nigris lituris pictas. *Cauda* in pinnam subnigram exiguum & rotundam desinit.

*Dentes* nullos habet, sed horum loco labia aspera, & in faucibus ossicula aliorum in morem hirta. Frequenter circa Nortlandiam insulam Oceani Slesvicensi Ducatui subiectam frequenter & per totum annum, in ostio Albis & Ederæ sæpe capitur. Incolæ Steinbicker, Muller, & Bursbol vocant.

*Vicitat* squillis & aliis pisciculis. Habetur ob carnis dulcedinem in deliciis.

## TITULUS II.

De Lavibus.

## CAPUT I.

De Husone.

**H**A CTENUS de *ποδάμο θαλασσίῳ* piscibus *Tab. XXV. 1. Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 11.* *Isquammosis* egimus, sequuntur non squamati seu *Laves*, *Huso* nempe, *Eperlanus*, *Lampetra*, *Anguilla*, *Orbis* & *Holosteus Bellonii*. *Husonem*, quem à domo quasi Hauso, Germanis dici Bellonius opinatur, Plinius fortè *Marionem*, quem Danubio Porcullo marino similem extrahi dicit, vocat; quidam *Esocem*, appellarunt. *Æliano* ni fallor est Antaceus, Germanicus. Magnitudinis est viginti quatuor pedum, & tantæ, ut vix biga à tribus vel quatuor equis trahi possit. *Vadianus* magnitudinis pondo quadringentorum minimos quinquaginta, frequenter centum, ducenta, trecenta, vidit.

*Dorsum* habet asperum. Nullum os in capite, si Alberto fides, si aliis multa, in corpore parva & pauca, cartilaginea potius, quam solida. Loco *spinæ dorsæ* cartilago est, quæ foramen habet magnum & vacuum, à capite ad caudam tanquam terebello perforatum. Adipem pinguedini immixtum sicut



Ælian.  
H. A. l.  
14. c. 26.

porcus. Similia de suo Antacæo Ælianus. Cum ætate processerunt, ad maximi Thunni magnitudinem, in Istro accedere scribit, & tam pingui abdomine esse, ut eorum ventrem lactentis suos foetus scrophæ ubera dicas, sicque aspero corio tegi, ut eo perpoliantur hastæ. Addit item capitis medio à medulla ad caudam mollem & strictam membranam pertinere, ex qua ad assum solem efficcata, flagella ad concitanda jumenta efficere possis. E Ponto Danubium subit, & per centum quinquaginta milliaria Germanica, adversis suavisque undis progreditur.

*De ejus captura, ita quidam ad Gesnerum mercator:* Mitto tibi, inquit, Husonis piscis effigiem vivam. Is in Danubio, nec ubique nec tempore quovis capitur, sed quando migrat. Terra argillosa & pingui gaudet. *Capitur* fere ab autumno usque ad Januarium, spacium decem milliarium inter Viennam & Posonium, Presburgum vulgo vocant: ubi ad insulam Schutam nomine, cum arce minutissima, ultimus hujus piscis capturæ locus est.

Viennæ die Veneris plerumque quinquaginta vel septuaginta, & aliquando centum Husones, veniunt, qui integri fere distrahuntur. Copiosissima eorum captura fit in Vualachia juxta Chiliam non procul ab ostiis Danubii, quibus in mare Ponticum se exonerat. Inde falsi exportantur in remotas regiones.

Vadianus mensibus Octobri & Decembri captos Viennæ invehi scribit. Timidius est, & à minimo etiam pisciculo in fugam vertitur. Sturio se ei per lusum affricare solet, in latebres profugum ejicit, & ventrem lancinat, dumque unus fugit, alter persequitur, aquarum agitatione se produnt, & capiuntur. Captus lacte vel vino *potatur*, non ut diutius vivat, nec citius inebriatur, quam sextarios quatuor ebiberit.

*Gregatim* natant, & tubarum cantum sequuntur, ad eum postquam accessere, irretiuntur. In aqua tanto robore pollent, ut piscatorem cauda ictum è navi dejiciant; elato ex aqua capite, mortuis similes apparent. De Antacæorum captura, vide Ælianus.

Quantum ad *usum in cibis*, vitulinæ in dorso, porcina in ventre saporem habet. magna pars falsamentis cedit, lactibus nihil dicunt delicatius, sed & ova in cibum expetuntur.

## CAPUT II.

*De Eperlano.*

Tab.  
XXIV.  
3.  
Aldrov.  
de Piscib.  
1.4. c. 12.

**I**N fluviorum in Occanum, (verba sunt Aldrovandi) influentium ostiis, ut Rhodomagi & Antwerpiæ frequens est piscis, teste Rondeletio qui *Eperlan* (quam vocem

vulgarem secutus Eperlanum ceu latinum nomen fecit) dicitur, à nitido & splendido (inquit) colore, quo unionem (perlam) refert.

Cæterum si à perla ipsi nomen est, verendum est appellari eên peerl; nam Eperlam Belgi, cum vocabulum non est; & Bellonius Epelanum nuncupat. Ait tamen etiam, Atherinæ modo transparenere. Hic Angliis *Schmelt* vocari scribit ab odore. (violam enim gratissime redolet, quamobrem quidam *violam* vocari posse censent, argumento quod Ælianus ab odore thymi Thymallum piscem nominavit,) vel à pinguedine. Gesnerus priorem etymologiam probat, quoniam Smelle Anglis sit odorari.

Smel tamen apud Belgas est liquefcit, & proprie de pinguedine dicitur, à quibus Angli fortè nomen mutuaverint. Uterque *duo ejus genera* esse scribit, *marinum* unum, *fluviatile* alterum. Sed Rondeletius marinum litorale esse, Bellonius saxatile dicit.

Rursus Rondeletius Eperlanum in marinum & fluviatilem distinguens, figura corporis nihil vel parum differre innuit, ideoque unicam iconem exhibuit: Bellonius contra duas, admodum diversas; quare suspicari licet fluviatilem Rondeletii à marino non differre. Bellonius marinum item, partim marina, partim fluviatili aqua gaudere tradit, & Rondeletius quoque ex mari ad fluvios ascendere insinuat, dum in Sequanæ ostiis optimum esse scribit, & in Angliæ fluviiis.

Apud Neustricos Caudebeccanos Angliæ dopulos uberrimus est; major tamen proventus circa vindemias, quo tempore est delicatissimus. Tereti ac tenui est corpo is compage, nonnunquam dimidium pedem æquante. Rondeletius ad pedis magnitudinem aliquando accedere innuit.

A sinos parvos refert, unde ex eorum genere esse judicarunt, quos refellit Bellonius, propterea quod glabro sit corpore. *Oris* hiatus satis magno est.

*Dentes* habet in maxillis, & in lingua. Truttam præter cætera dentibus refert. *Lingua*, ut ait Bellonius quasi gemina, hoc est, (inquit) in cujus radice posterior quædam appareat, in qua multo plures dentes sunt, quam in anteriore. *Pinnas* habet easdem quas Salmonum genus, maxime posteriorem illam dorsi pinnam subrotundam & pinguem. Prior totum piscem in æquales fere partes dividit. *Cauda* bifurca est. *Branchiæ* sunt utrimque quaternæ, decolores, & *violam* olentes.

Transparenti est corpore dempta linea nigra, quæ spinæ internæ parti inhæret. *Calculos* habet in capite rotundos, albos, quosque facillè forinfecus propter piscis transparentiam per cranium videre posse Bellonius tradit (qui diligentissime de internis. Eper-



Eperlani partibus egit) sub posteriori cerebri parte sitos, ubi medulla in cerebro definit. *Cor* branchiis semicircularibus & fimbriatis est admodum vicinum ac scutiforme: definit quoque in angulos, rubrumque est, cui molles ac sanguineæ sunt carnunculæ, quæ huictanquam aures in terrestribus famulantur. Illæ enim moventur cum corde, quod septo ab hepate dirimitur: unius tantum lobi, in longum demissi ad secundum latum. *Stomachum* definientem in mucronem habet in V. literam efformatum: *Lienem* admodum rubrum, seminis Atriplicis in modum latum.

Cumque stomachi dextrum latum sursum usque ad hepar reflectit, illic geniculo intercipitur: ubi *apophyses* duas latas emittit, quæ veluti secundum ventrem constituuntur. Aliud post hunc subsequitur, quod nec pylorum nec jejunum, neque ileon commode nominare possis; siquidem sine anfractibus recta ad anum procedit. Sed rectum geniculo intercipitur, estque ruberrimum. *Mesenterio* nullam admixtam pinguedinem habet, quo stomachus & intestina obsidentur, ut nihil aliud in ventre, quam adipem esse dixeris.

Caridibus, culicibus, Aphyis, cestro, lendibus, millepedibus, pediculis & ejusmodi dejectamentis vescitur. Carne est molli & friabili. Æstatis fine vel autumnii initio capitur.

## CAPUT III.

## De Lampetra.

**L**ampetra, non tam à lambendis petris, quam ab *Alabeta* Plinii. Nilidis lacus piscis, qui *αλαβή*, quod manu propter lubricitatem capi non possit, dicitur, vocatur. Doctiores Plinii & Ausonii Mustelam esse opinantur, nec tamen vel ex *marinis Aliani* quas jecorino simillimas esse pupillis oculorum ad cyaneum colorem accedentibus, mento quam jecorini majori, quam Chremetis minore, algas depascere, saxatiles esse, & omnium cadaverum in quæ incurrit oculos conficere, idem author scribit; vel ex *Mustelis*, qui Aristoteli cæterisque *γαστροί*, qui flumina nunquam subeunt, & vivipari sunt, esse judico. Sed nec ex *Muranarum* genere esse credo, quamvis Dorioni apud Athenæum Muræna fluviatilis haud ineptè dicatur, quod illæ Branchiis integriscareant, quas Lampetræ velut cartilaginem obtinent.

*Lumbricum marinum* Plinii non esse, exinde quod pinnis omninò careant, colliges. At ex *Vermibus aquaticis* ejusdem esse, quos in Gange Indiæ Statius Sebosus, haud immodico miraculo attulit, branchiis binis, sexaginta cubitorum, cæruleos, qui nomen à facie traxerunt, eisque tantas vires, ut elephantos ad potum venientes, mordicus comprehensa manu eorum distrahant, Rondeletius credidit.

Idem ex *ελιδναί* seu Hirudinibus Strabonis, quas in quodam Lybiæ fluvio septenum cubitorum perforatis branchiis, ita ut respirare possent nasci scribit, quod sanguisugarum instar faxis & navium clavis hæreant, opinatur. *Tineas fontanas*, de quibus apud Plinium, quod Hermolao placet, non esse, certum, quia illæ ex insectis. *Flutam seu Plotam* quod quoque Rondeletio visum, dici posse, quod nisi in summa aqua natat, ut ærem attrahat, facile suffocetur, concedimus. An *Anguilla copæa* sit, cujus Archesstratus apud Athenæum meminit, dubito.

Quamvis enim sit ex ossis seu *ἀπὸ ὀστέου*, quod Anguillæ vulgari non competit: in eo tamen, quod Anguillas Copaidas Agatharchides prodigiosæ magnitudinis esse scribit, diversa à Lampetra esse videtur. Echeneida Oppiani esse, Rondeletius censuit, nec abhorret ab ea Echeneidis descriptio, quam apud Oppianum vide. Bellonius quoque nautis præcipuè infestam esse ait, temonibus triduum fere inhærendo, caudamque in contrarium vertendo, recensque picatæ navis lateribus picem lambendo sic infigi, ut nautas ab itinere remoretur.

De *Generibus* ut dicam, non unum Lampetræ genus est. Sunt quæ è mari flumina subeunt, sunt quæ à falsis aquis omninò abstinent.

*Marinarum* triplex genus est, majus, medium Germanis & Belgis Prick dictum, & minus à Salviano depictum, qui, licet ætatis ratione tantum differre quispiam suspicari possit, quoniam colore tantum & magnitudine à majori differt, differre tamen, & specie ostendit, cum majores semper & maculosæ & bicubitales; minores contra sine maculis & pedalis tantum reperiantur: Prick vero cubitalem magnitudinem haud superet, transversalibusque & nigricantibus lineis solum insigniatur.

Rursus ipsi majores haud ubique æquè magni. Testatur enim Jovius in Arno & Tyberi ad generosum habitum adolescere: in omnibus autem Galliæ Cisalpinæ rivulis, ipsisque præsertim Ticini atque Adduæ emissariis multas reperiri pretiosas admodum, quanquam minimi digiti crassitudinem minimè superent.

Et Platina in Cisalpina (Gallia) parvas, in Hetruria mediocres, Romæ ex Tyberi permagnas capi tradit: nisi dicamus, haud recte ab his scriptoribus isthæc observata esse. Omnibus sive marinæ sint sive fluviatiles, commune est, Ceteorum more *fistulam in cervice habere*, per quam cum navibus aut faxis hærent, aquam ad branchias attrahunt. *Spina* item omnibus cartilaginea à capite ad caudam usque deducta, chordam Galli vocant, quæ vere tenerior, ætate durior est, & insuavior.

*Branchiarum* numero, figura & ordine con-



conveniunt, ore item & *pinnis* & totius corporis figura. Murænis valde similes sunt, si caput excipias. *Os* enim neque in longum neque in latum scissum est, sed excavatum velut in hirudinibus quas sanguisugas vocant. Gesnerus ab oculorum instar, qui ad servandos nummos loro contracti clauduntur, constricto lignum aut lapidem ita apprehendere ait, ut fugere videatur, idque tanta vi, ut ægrè avellatur, cucurbitularum medicinalium similitudine. Marginem item oris rotundum fibris quibusdam laciniosum esse, quæ nimirum ut firmitus hæreat, sugatque efficiunt. In cavo illo sparsi sunt *dentes*, plurimi flavi, acuti, hamati, quorum interiores majores esse idem Gesnerus observavit, eosque circiter viginti ordinibus distinguere; & tanquam à centro ad circumferentiam digeri, ordinibusque singulis quaternos, quinos, senosve inesse. Esse & in ipso oris recessu duplicem *dentium* minorum ordinem, quorum major, inquit, omnino feram denticulis utrimque denis refert, eos denticulos continuos esse, cæteros cutim habere interjectam. In ejusdem cavi imo teste Rondeletio particula est contraria occursum foramen interius occludens. *Cor* habent sub branchiis & foraminibus reconditum, cartilaginea membrana, spongiosa ac prætumida inclusum, subrotundum, ciceris crassitie: *hepar* oblongum, cæruleum, unius tantum lobi. *Felle* carent. *Intestinum* omnibus unicum, rectum, minimè complicatum; reliquum corporis in foeminis matrix ovis referta occupat. Pinnis lateribus carent; nullasque ad natandum habent, sed flexuoso corporis impulsu aguntur, & *pinnulis* membranaceis iter derigunt, quarum una ferè supra caudæ extremum erigitur, altera paulo superior est. Lævi cute teguntur, quæ in majori nigricat pronè, supinè candicat, ad latera, & in dorso subluteis ac nigricantibus maculis conspergitur, quibus minor caret. Gesnerus majori maculam ait esse albicantem in vertice, in medio oculorum interstitio; & contiguum ei anterius foramen parvum membrana parum prominente circumdatum. *Prickæ* cum majori colore convenit, sed pro maculis quales diximus, transversales habet lineas. Omnes utroque gutturi latere *septem foramina* habent, quibus aquam acceptam reddunt. Platina linguam Lampetris tribuit, Rondeletius habere negat. Salvianus & Bellonius non meminerunt. *Oculos* rotundos & profundos habent. In majori cæruleam pupillam aureus circumambit circulus.

De *Lampetrarum migratione* & hoc habet, Veris initio migrare, & circa Donati diem, qui est dicemus septimus Februarii, nullas amplius apparere, sed aut recedere, aut corpore rellquo tabescente, licet capitis moles relinquatur, interire.

Initio Maji optimas, ab eo tempore irrequieto motu emaciari, & pleræque ante partum mori, parientium sobolem evanescere; nec unquam circa Argentinam apparere; adultas, quæ non pereunt, cum fluvio aqua secunda, Majo mense auferri, Argentinensium piscatorum relatio est. In mari & fluminibus parvas parere, eoque tempore quo in fluminibus capiuntur, in mari etiam capi, reliquisque anni temporibus vel in abditis locis latere, vel à littoribus in altum pelagus longè secedere; majores in fluminibus rariores esse, Salvianus auctor est. *Vescuntur* aqua & musco. Quidam esca quadam composita in frontibus & aquis dulcibus eas nutriunt, & servant. Spumarum indicibus comperiri solent: capæque perpetuò in aqua immergi, cum qua ex longinquis partibus in urbes deferuntur.

*Usus in Cibis* quod spectat, Albertus dulcem & in salubrem vinoque condiendum, Alexand. Benedictus optimi succi, facit. Salernitani crassum & viscosum, minus tamen Anguilla, & quia veneni aliquid habent in vino submergendas donec moriantur, posuere. Romæ olim proximam à Scaris quibus principatus debebatur habuere mensam. *Scribit Platina Romæ aula fortassis offensus*, bene à natura factum esse, quod Romæ ex Tyberi permagnæ capiantur, & delicatissimæ, quoniam vallatæ ibi gulæ inter se auctis pretiis certant. Emi (inquit) frequenter Lampetras quinque, sex, septem aureis, & olim à laticlavio viginti, cum alter secum auctionaretur, emptam scimus: nec passa est ingenua gula tantam audaciam gratuitam esse. Dispensato enim, quod sui ipsius arrogantiam & fastum (nolo dicere stultitiam) imitatus esset, certum aureos dono dedit, ne secundo ad certamen singulare provocatus, timidus ac infractus animo succumberet.

Cæterum non quovis anni tempore, nec quovis loco tanti fiunt. Scribit enim Jovius Romanis, id est, Tyberinis præcipuam nobilitatem à magnitudine & sapore esse adeò ut denis sæpè aureis veniant, ipso præsertim vere: & rectè quidem, quoniam incipiente æstate, spinalis medulla iis nervi instar durior efficitur; & marinæ, hoc est, quæ in mari capiuntur, aridæ semper ac velut agrestes judicantur. Jovius delicatiore condimento, multo majorem quam ab ipsis pulpis nobilitatem accipere scribit. Necari enim solere in vino cretico, eique myristica nuceos claudi, & foramina illa (branchiarum utrimque septem) totidem caryophyllis adimpleri in reganoque convolutam in spiras, additis avellanis tritis, medulla panis, oleo, vino Cretico, aromatibusque ad temperatiores prunas certis momentis sedulo excoqui, quo condimento, inquit Leo x. in minori fortuna, joci causa; ut convivium exhila-



exhilararet, Marianum cucullatum, falsum, & ridiculum hominem decepit.

Namque funem instar Lampetræ incoctum, multoque illo jurulento immersum, grandi in patina apposuit, ut notam omnibus ejus edacitatem, gulamque eluderet: qui jam magna pultarii parte absumpta pseudolam petram agressus, diu multumque cum ea maxillis ac dentibus inhærente colluctatus, cachinnum cunctis collentibus, facetissime respondit: utinam sic mihi sæpius illudatis. Nam in hoc condimento non modo funes, sed & ipsas catenas (quibus infani vobis similes vinciuntur) & cum voluntate quidem absumerem.

## CAPUT IV.

## De Anguilla.

**Q**uem piscem Latini Anguillam ab anguis similitudine dicunt, illa Græcis veteribus ἐχέλις, ἀπὸ τῆς ἐλυσθαι, quod commoto cœno felicius capiatur, modernis ἄχελυ, vocatur. Lacedæmoniis ἀγκυλάτης dictas, apud Hefychium legimus. Est ex piscibus καθαρόμοις, qui in aquis dulcibus geniti, ad mare descendunt.

Duo ipsarum sunt genera, Majus & Minus. Illi caput brevius, crassius & latius, color fuscus: in profundo degit, & aqua deficiente sæpe in limo, ut inde effodiatur, occultat. Ad mare nunquam descendere, sed semper in vallibus degere, quidam affirmant. Mares Rondeletius vocat. Huic, quod Anguilla simpliciter dicitur, caput longius & acutius, & in mare descendit. Læves sunt in universum & lubricæ, ut manu teneri non possint, si inclusæ tenentur, quacunque caudam exerere possunt, eadem totæ evadunt. Aristoteles eis quaternas utrinque branchias, sed simplices tribuit.

Alias quoque branchias pauciores minusque continentes habere scripsit. Athenæus verò ex Theophrasto exiguas. Cuticulæ qua hæ reguntur, parvula in est rima, quæ causa est, quod in turbidis aquis facilè strangulentur, & in aëre diutius vivant. Teste eodem Aristotele gulam quæ paucis piscibus contigit, habent, licet exiguam, ventrequæ sunt exiguo. Fel jecori hæret. Hoc magnum est, illud aqueum. Pingue inest paucis, plurimæ eo carent. Hippocrates tamen pinguedinem habere scribit, eandemque naturæ hominis inimicam: cæterum hæc pinguedo à carne separata non est: quare alias dicebat Philosophus: seorsum enim à carne non pinguescunt: unde parvum eis in omento seivum esse solet. Tergus earum quam Murænis crassius teste Plinio: cujus locum de pinnis hujus piscis, ubi lubricis pro lubricis legebatur, restitui in

Lampetra ex Aristotele, qui longorum vel lævium alios ut Anguillam & Congrum binas pinnas, alios ut Murænam nullas habere scribit. Has juxta branchias hære idem asserit, supinisque pinnis carere. A medio dorso & ab excrementi meatu veluti limbus cutis potius, quam pinnarum substantia superiores corporis patres ambit.

Ventriculus & intestina in longum prætenduntur. Color omnibus haud idem. Variat enim aquarum, in quibus degunt, ratione. Quæ puram & defluentem incolunt, ventre (inquit Salvianus) sunt candido, dorsoque cinereo sive subcæruleo: quæ vero in impura & stagnante commorantur, ventre sub albo, dorso vero subviridi vel subnigro apparent: os habent satis apertum; dentibus, parvis, acutis minutim, multiplici ordine. Magnitudo quoque non ubique eadem. Plinio atque Solino testibus in Gange ad tricenos pedes augentur: & Athenæi Pausaniæque testimonio Copaidæ, item Strymonia eximia magnitudinis esse dicuntur. Archestratus Copaidas apyrenos vocat: Gesnerus & Dalechampius Lampetras intelligi volunt, quoniam hæ pro spinis cartilaginem habent. Magnas vel ad brachii crassitudinem capi audio in aqua mortua (ut appellant) Gallia Narbonensis. In Italia ad viginti libras aliquando accrescunt; sed quæ superant, nunquam inventæ sunt.

Locum, si spectes marinarum quoque Dipphilus & Epicharmus apud Athenæum meminere, non quod ibi nascantur, cum paucæ & nondum adultæ nunquam, magnæ & adultæ raro ibi reperiantur; sed quod, ut Plinius, Aristoteles & Oppianus confirmant, maria ex fluminibus subeant. In nullo amnium qui Danubium influunt, reperiri; in omnibus, qui Rhenum, licet ex uno aliquando cum illis fonte scaturiant, Naucleus & Albertus prodidere. Frigiditas Danubii fortè in causa, cujus aquæ ante fauces Alpium ab Occidente in Orientem fluunt; major pars ex Alpibus descendit, & à parte Aquilonari, ante Alpes delabitur. Copaidum, quæ ἀπὸ πύλων, πυρίδας, Pollux & Aristophanes commendant. Prodigiøsæ eadem interdum magnitudinis à Bæotiis hostiarum more coronabantur; aspersaque mola, cum precibus Diis immolabantur. Rhegiæ, quas Lethus circa Berenicem fluvius sibi vendicat, sesquialteræ ad illas, quæ ex Macedonia & Copaide lacu habentur. Suus iis & qui in freto Rhegii, & in Mæandro fluvio capiuntur honos. Strymonia quoque, Elori amnis, & qui ad Euclea fluvium, in precio fuere. Pars Britannia Anguillarum terra à copia, quamvis ibi non degant, dicitur. Ad Aquas mortuas brachii crassitudinem æquant. In stagno Monspe-liensi Eatera dicto, trium vel quatuor cubitorum sunt longitudine. Ex Tarni fluvio, qui

Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 3.  
Athen.  
Dipnos.  
1. 7.

Athen.  
Dipnos.  
1. 7.  
Arist. H.  
A. 1. 6 c.  
14.  
Aldrov.  
de Piscib.  
1. 4 c. 14.

Athen.  
Dipnos.  
1. 7.



non solum auget, sed efficit Garumnā, qua parte in eum erumpit, tanta copia defertur, ut una die XVIII. in nassis inventa sint. In Mintio amne quandoque mille glomeratæ capiuntur, ut apud Cardanum extat. Malè ergo *ἐν ταῖς διαδρυσταῖς λίμναις, in stagnis promanantibus*, ut Scaliger vertit, reperiri negat Aristoteles.

Scalig. ad  
Arist. H.  
A. l. 6. c.  
15.

De ortu dissentiunt Authores. Plinius, Anguillas atterere se scopulis, ea strigmenta viviscere, nec aliam earum esse procreationem scribit. Secundum Aristotelem, in dissectis neutrum sexum, nec vel ova vel semen deprehendas; in temporibus siccis, sed post imbres, idque ex iis, quæ vocantur *γῆς ἐν τῇ τῆς terra intestina*: quæ fiunt in cœno & putredine; maritimis quidem locis, quæ algam producant; in stagnis verò & fluviis propè ripas, quia tepor sive calor istic putredinem gignit. Plinio Athenæus & Oppianus ex veteribus, ex recentioribus Rondeletius adstipulantur. Illi complexas coire, & strigmentitium, quid emittere, ex quo cum in limo fuerit, *ἐν τῇ βορβόρῃ ἐν τῇ ἰλύϊ* *σπυρσπυρσὸς οὐψίας*, animal generetur, prodiderunt. Hic inferiore ventris parte vulvam in fœminis, semen in maribus esse, multa pinguedine perfusas non apparere, corporum complexu coeuntes à se visas scribit. Utroque id fieri posse modo credo. Nam & Berniciæ in Scotico Oceano ex verme nascuntur, post ova excludunt. Eadem & Rondeletii sententia. Addit enim, cum equus mortuus in stagnum Megalonix injectus fuisset, innumerabiles paulò post ibidem visas Anguillas. *Nutritum* ipsarum sunt, radices herbæ & cuncta quæ in limo offendunt, visæ, ranis, vermibus & piscium partibus vesci. Paxamus hirudines, Homerus cadavera, quidam se ipsas invicem, Plinius edulia si quæ apponuntur, devorare, testantur. Purissimam tamen aquam impensius amant, ideò in quadam Britannia parte, ut Albertus ex Beda refert, in ortu Cosmico Plejadum hoc est XV I I. Calend. Junii, quod tunc propter ventos, qui initio veris è terra erumpant oppositos aqua nunquam luto turbetur, ingens ipsorum copia; & à turbida abhorrent adeò, ut Athenæo teste, cum ventis turbatur suffocari, & quidem propter exiguas branchias, soleant. In exiguis aquis mori dixit Aristoteles, hyemem malè ferre, Plinius.

Athen.  
Dipn. l. 7.  
Oppian.  
Hal. l. I.  
v. 156.

Arist. H.  
A. l. 8.  
c. 2.

Arist. H.  
A. l. 8.  
c. 2.  
Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 21.

Arist. H.  
A. l. c.

De reliqua ipsarum natura hæc habet. Noctu pasci, interdum limo quiescere, ideo separatim ab aliis degere piscibus; exanimis piscium more non superfluitare, ut apud Plinium legimus, quod ventre sint exiguo, pingue paucis insit, plurimæ eo careant, ut Aristoteles tradidit, aqua tranquilla efflare, id bullarum indicio colligi eodem genere motus, quo serpentes in terra, id est ce-

lerrimè, moveri, ita ut dum Phalacrocorax integras devoravit, mox per intestina delabantur, idque vel novies aliquando fiat, in sinu detentas, hominem aliquando ita circumplecti, ut nonnunquam suffocent. Annis septem vel octo, quod branchias pauciores minusque continentes habeant, & paucum humorem admittant, vivere; extra aquam ad quintum, sextumve diem si loco umbroso, & frigido; (si à sole tangantur in terra brevi moriuntur) reponantur, à motu non impediuntur, & ventus septentrionalis aspiret; excoriatas & in partes sectas fat diu. Tonitrua denique adeò timere, ut defundo ad superficiem enatent, frigoris adeò impatientes esse, ut cum Anno 1625. omnia gelu & glacie rigerent, in terram proreperent, & intra fœni cumulos se abderent.

Athen.  
Dipn. l. 7.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
2.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
21.

*Discipline* non omninò expertes esse videntur. In Jovis Lebradii namque fonte Anguillas è manu vesci & in aures additas, à veteribus proditum Plinius refert; & in Arethusa Chalcidensi, Anguillæ & Mugiles mansueti in auribus tum argenteis ornati accipiunt à largientibus cibos; à sacerdotibus viscera & caseos, ut Athenæus scribit, & Ælianus, item Plutarchus, qui sacras hæc Anguillas vocari ait. Nymphodorus denique in Eloro amne tradit Lupos esse, & Anguillas magnas adeò mansuetas, ut è manibus etiam porrigentium panem capiant: quod & Apollodorus scribit in Chronicis. *Hospitaliter* eas tractant, Ardea, Corvus aquaticus Phalacrocorax ex avibus: ex quadrupedibus Lutra, quæ tamen amputato plerumque capite discedit, ut piscatores prodidere.

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 2.

Ælian.  
H. A. l.  
14 c. 8.

Quantum *ad usum in cibis*, delicatissimas olim fuisse certum est. Mænander inter paucas sumptuosissimi convivii, quæ talento ferè constarent cupedias enumerat. Phitetarus miseros divites, qui parcè viverent, & Anguillas non ederent, dicebat. Alii cœnarum Helenam, voluptatis reginam, præ Diis honorandam, &c. dicebant. Sybaritæ, iis, qui eas piscarentur aut venderent, immunitatem, teste Athenæo, decreverant. Hiccius denique succi bonitate cæteris præcellere, stomachoque gratas esse reliquit. At medicis quamvis carnem mollem habeant, succo tamen lento & pituitofo abundant, inflammationem pulmonis, quod pinguedine hominis naturæ maximè infensa oblinantur, inferunt; superflua humiditate, quam partibus alluunt, turbidam & sonoram vocem reddunt, & secundum quosdam, nescio quid, quod nisi eximatur in periculum vitæ conjiciat, habent, ideo fortè caput, cauda, & à quibusdam oblonga, quæ nigricans per dorsum fertur vena, abscinduntur. Platina ubi præparationem Anguillarum eximiam dedit, subjungit acutissimè,

Athen.  
Dipn. l. 12.

Hippoc.  
l. 2. de  
Diæta.  
Gal. de  
Alim. l. 3.



simè, sic paratas hostibus apponendas, quod nihil boni in se habeant.

His noxis infringendis, veteres betæ involutam, ut vitiositate sua humidum detergeret, comedebant: Salernitani vinum fortè hoc est generosum & crassum, quale est rubeum præscribunt, nam si tenuè biberetur, Chylus in venas ante perfectam coctionem abiret & in corpus raptus Cachexiam excitaret; icem accidit, nisi pedetentim, & parum velut pitissando hauseris.

De Ufu in Medicina tantum observavi apud Authores, *Pinguedinem* in elixatione supernatantem unguentum ad plagas ingredi, de tosta destillatam, aurium & nervorum doloribus mederi; glabro capiti illitam capillos restituere; cum pinguedine anseris, succo rutæ, absynthii, hederæ terrestres, & Cynoglossi subactam, ad vulnera præstantissimam esse: Fumum ex salitarum cute exceptum; tormina ventris ex dysenteria sopire; in vino putrefactam vini tædium parere. Evisceratam, tusam, & in olla vitrea coctam, cum pinguedine ac liquore, qui in fundo vasis remanet, hæmorrhoidum cruciatus egregiè lenire. Cingari Anguillas Equis per anum inferunt, ut obesiores, & agiliores videantur. Hippiatri quidam equo asthmatico Anguillam vivam ori inferunt, ut per intestina elabatur. Alii & parvam imponi jubent purgationis causa. Nec propterea mortis periculum esse ajunt: quin Gesnerus asserit nautam sibi notissimum vivam integram deglutiisse, integram per alvum, vivam reddidisse. Idem author est, aliquos aureum & cholobaphicum colorem ex felle Anguillarum, aliorumve piscium vel boum parare: miscere autem aceti modicum & cum creta subigere in massam. Prætextatos earundem tergore verberari solitos Verrius teste Plinio tradit, & ob id multam his negat institutam. Prætextatos appellans impubes, eos nempe qui frugem aratro quæsitam nocte furtim secuissent, aut depopulati essent.

## CAPUT V.

De Orbe.

**H**Ujus piscis solus meminit Plinius. Durissimum esse piscem, inquit, constat, qui Orbis vocetur: rotundus est, & sine squamis, totusque capite constat. Gesnerus Apuleji, *Cranium* esse opinatur, quod ad cranii formam magnitudine, rotunditate, & dentibus humanorum similibus accedat.

Tria ipsius genera descripsit Rondeletius, quartum addit Aldrovandus. Primus qui Orbis simpliciter figura, si caudam demas, sphaericus est. Squamis prorsus caret, cutequæ tegitur admodum dura; quam asperam efficiunt aculei duri, quibus tota conspersa est. Rostro caret: Capitisque nullum ap-

paret vestigium, quin (ut Plinius ait) totus capite (malim ventre) constare apparet. Os habet parvum, dentes vero magnos & latos, utrinque binos. Supra os duo exigua sunt foramina, olfactus, auditusve instrumenta: Oculi mediocres. Circa corpus medium unica est & semicircularis utrinque *branchiarum* scissura; prope quam etiam utrinque unam haud magnam, sed rotundam pinnam habere Salvianus ait, & in icone exprimit. Rondeletius unicam esse ait, ut in Caprisco. Hic & in summo dorso pinnulam pingit qua Bellonii icon & Salviani quoque caret, & ipse in descriptione non meminit. Eam tamen etiam videre est in icone ad skeleton efficta à Gesnero, quæ hic exhibetur. Posterior corporis pars in *caudam* brevem & rotundam, inque latam & fere lunatam pinnam desinentem degenerat; in cujus parte media atque superiore, pinna una erigitur, altera quoque inferiori parti hæret. Color ei cineraceus, lineis quibusdam latis & obscurioribus ex pisce medio exortis posteriori ejus partem ad caudam usque pingentibus. Est maris Ægyptii accola, ex quo Nilum quoque subit, & in ejus ostio, quod Saiticum vocatur, capitur. Ob insolentem corporis detractum corium tomento impletur, & in domibus ornatus causa suspenditur; suspensus, rostro cæti partem à qua flat ventus indicat. *Alter Scutatus seu Scutifer* dicitur, & in Septentrionali Oceano capitur.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 16.

Est corpore terete, mucoso, capite magis exerto quam superior: oris scissurâ majore, dentes in eo sunt plures & minores; oculi parvi, & exquisite rotundi. Branchiarum rimam multo majorem habet: intra has pinna duas. Subest prosterno os illud, quod scuti specie esse diximus. Neque prona neque supina parte pinnae habet, cauda in unam latam desinit. A capite ad caudam usque ossa ovi figura disposita sunt inter quorum intervalla aculei interjacent. Piscis est rarus & non edulis. *Tertius est Echinatus seu Muricatus*. Aculeis totus hic Orbis riget, ut manu tollere non possis, nisi cauda extrema apprehensa. Capite est multo minus exerto quam proximè descriptus, corpore magis rotundato & majore, in quo nullæ sunt pinnae præterquam in cauda, quæ in unam desinit. Sunt qui Hystricem ab aculeis, non inepte appellant. Possit etiam nonnullis videri Æliani *Sagittarius*, quem rubri maris piscem esse scribit. Sagittarius in eo mari procreatur, & quoniam erinacei speciem & similitudinem habet; firmis & bene longis armatur aculeis. Sed de hac re judicent ii, qui maris rubri pisces viderunt. Nihil temere de rebus parum compertis affirmare volo. *Quartus*, quem Aldrovandus edit, quod ad oris figuram potissimum cum Scutato convenit, *Stellatus* sive

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 4. c. 27.

Ælian.  
H. A. l.  
12. c. 25.



*Asterias* cognominatur, quod totus confusus sit stellis seu asteriscis: differtque à cæteris, quod neque ad branchias, neque in caudæ exitu pinnas habeat, sed ultra tergus medium, nisi pictoris id incuria factum sit. Pinnæ etiam caudæ in extremo viridi sint colore.

## CAPUT VI.

*De Duobus piscibus Orbibus annumerandis.*

Tab.  
XXIV.  
13. 14.

**O**Blongi quidem hi Pisces sunt, Orbibus tamen, annumerari posse censet Gesnerus, tum quod mucrones ut illi in corpore eminentes habent, tum quod à mucro, quem similiter ore emittunt, vulgo *Snottoif* quasi *Myxini* aut *Mucrones* appellantur. In prioris effigie color erat circa dorsum, qualis interrestribus ranis videtur: circa latera & inferius ex subcæruleo & viridi permixtus. Antverpiæ cinereo colore capi audio. Sic ille. Alterum & hic quoque depictum, *Snottoif* nomine missum, ex icone, sive ea, inquit, naturalis, sive aliquid etiam in ea artificiosum est, sic delineavit. Longa est dodrantem & palmos duos, lata palmum unum, circa medium præcipue ad caput attenuatur, sed magis ad caudam: *dorsum* medium fastigiatur, punctis notatur variis, subrotundis, & eminentiis exasperatur triangulis, per tres aut quatuor ordines digestis per intervalla. Oris hiatus, figuram fere ovalem refert. Pinnæ ad branchias binæ, una in fine dorsi, altera in fine ventris, inter quas corporis pars extrema veluti discreta, & articulo distincta videtur. *Cauda* tripartita, sive natura, sive potius arte. Mucosus admodum est, inquit ille qui misit, non osium, non carniū quicquam habet: mucoso tantum lentore expletur. Captu difficilissimus. Nam ubi hamum vel retia fenserit, suum illum mucum evomendo, lubrica reddit omnia, contractoque orbem exuvio præfilit. Mollem quidem & mucosam carnem, & eminentias trigonas, cum aliis *Snottoif* communes habere videtur.

## CAPUT VII.

*De Holosteio Bellonii seu Ostracione Gesneri, & Catani.*

Tab.  
XXV. 7.  
8. 9.

**D**E hoc Pisce sic ex *Gesnero* & *Bellonio Aldrovandus*. Hunc quoque à mari Nilum subire, etsi ignoremus, marinum tamen esse ex corii duricie conjicimus, qua testam fere ostreaceorum imitatur, unde cum ob hoc, tum quod ὀστρακίαν à Strabone inter Ni-

loos pisces numeratur (in vulgaribus Strabonis codicibus impressis legitur ὀστρακίαν, sed interpres Latinus ὀστρακίαν legisse videtur, vertit enim ex testaceis, imperite: & in epitome scribitur ὀστρακίαν.) Gesnerus *Ostracionem* hunc piscem nominandum conjicit. Bellonius vero non aspernando nomine *Holosteion* appellavit, quasi totum osseum. Forma (inquit hic) ad pentagonum accederet, pedalis interdum longitudinis. Incolæ ab interaneis protinus emundari curant, deinde vero testam eam duram (testaceum corium) quæ contegitur, multos annos incorruptam servant, ut inde lucrum consequantur, quod à negotiatoribus externis novitatis gratia hujusmodi piscis emi sit solitus.

Cæterum dum vivus est penicillum in cauda habet, & pinnas supra & infra caudam: ac rursus pinnam aliam utrinque; oculos albos, os parvum. Color ejus lactescit, & velut in pallidum languens. Is quem ego in musæo jam multos annos inter rariora reservo, & hic depictum ostendo, ab eo quod supra rostrum conspicitur tuberculo (nasum appellare liceat, piscem ipsum ab eo *Nasum Niloticum*) ad extremam usque caudam vix implet duos dodrantes. Totus est *pentagonus*, totusque item ex articulis ferme pentagonis (ut icon ostendit) constat, qui coctione, imo per se temporis diuturnitate dissolvuntur. Branchiarum scissura semicircularis: juxta quas utrinque pinna est, parva quidem si corporis magnitudine comparetur, sed perquam robusta: post podicem alia similis planæ sed brevior. Uropygium totum cutaceo corio tegitur, ut quod mereris, in ostreaceum totius corporis tegumentum ita infertur, ut à lateribus ei annecti non videatur; quin haud aliter corpori affixum est, quam navi clavus; oportuitque cutaceum esse, ut mortui promptus, idoneusque foret. Oris rictus pro corporis portione exiguus; in quo dentes utrimque fere octo, non absimiles dentibus murium. Utræque maxilla cutaceo etiam, non ostreaceo corio quod ad modum ineptum fuisset, constat.

Habes hic hujus generis piscem alium æque duro tegumento præditum, sed qui dimidio minor est, non pentagono corpore, sed ventre triplo quam tergore, latiore, lateribus quodammodo concavis: cujus item articuli non pentagoni, sed fere rotundi, & orbiculati, & in singulis asteriscus venustissime spectabilis. Eminentia quæ in medio dorso est, non pinna, sed plane ossea substantia gibbi specie. Pinna vero in ejus conspicitur extremo. Cætera superiora similia habet, præterquam quod naso (ut vacabam) caret, & oculi sub majoribus tuberculis latent.



# HISTORIÆ NATURALIS

## DE

# PISCIBUS.

LIBER III.

## De Piscibus fluviatilibus.

## TITULUS I.

De Piscibus fluviatilibus squa-  
mosis.

## CAPUT I.

De Trutta fluviatili.

Tab.  
XXVI.  
I.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 12.



Antum de Piscibus  
ἀντὺμ ποῖς & καθὰ ποῖς.  
Fluviatiles sequun-  
tur, & hi *vel mere*  
*tales, vel qui etiam*  
*in aliis dulcibus aquis*  
*vivunt, vel lacu-*  
*stres.* Inter *Fluvia-*  
*tiles* eosque squamo-

fos primus est *Trutta*, Ambrosio *Trocta*, à trutendo *Platinæ*, quoniam semper in adversum & impetuosum flumen nitatur, adversas undas superare. Itali *Torrentinam*, quod in torrentibus & rivis montanis abundet, vocavere. An veteribus fuerit cognitus incertum. *Theodonem* Ausonii *Figulus* putaris, *Rondeletius*, *Gillius*, & *Bellonius Salarem* ejusdem. *Jovius Lupum varium Columellæ*, *Gesnerus Athenæi Pyruntem*. *Figulo* obest, quod *Theodonem*, *Salarem*, & *Farionem* unum piscem faciat. *Salarem* parvum esse *Salmonem* superius dictum, & *Poëta* clarissimè indicat. Nec *Trutta Lacustris* seu *Salmonata* erit, cum hæc in lacubus nascatur. *Lupos* inter duos pontes in *Tyberi* capi diximus: *Truttas* suburbani amnes ex *Reatinis Sublaqueanis*que quotidie suggerunt. Illi frigus vehementer pertimescunt, frigidioribus duntaxat locis gaudent. Quod verò *Ælianus* in *Astræo Macedoniæ* fluviò pisces τῶν ῥέων καθὰ ποῖς gigni, & peculiare quasdam muscas circa summam aquam volitantes appetere; piscatores, pro his muscis purpurascere lanâ hamum vestire, & gallinaceas pennas duas cerei coloris addere, ut pisces decipiant, prodidit, egregie *Truttis* conveniret, si nomen additum fuisset.

De *Pyranthibus* credit *Gesnerus Mnesitheum* apud *Athenæum* loqui, cum ait: Ex fluviatilibus optimi sunt, qui in rapidissimis fluviis versantur, οἱ τε πορφυροί. Hi enim non

gignuntur nisi in rapidis & gelidis fluviis & facilius quàm cæteri fluviatiles concoquuntur. Convenirentquæ ista *Truttæ* nisi *Causabonus* pro οἱ τε πορφυροί scribendum esse οἱ τε πορφυροί ἰόντες, ita, ut sensus *Athenæi* sit, optimos ex piscibus fluviatilibus illos esse, qui in fluminum locis, qua maximè aquarum impetus vergit, quæque rapidissima sunt, quod plus exercitii habeant, vivunt, putaret. De ipsarum *Forma* sic scribit *Aldrovandus*:

Sunt *Truttæ* & *Salmoni* multa communia; formanempe tota, & corporis partes externæ & internæ: caro rubicunda, squamæ exiles, macula seu puncta, magnitudo, formæ mutatio, circa rostrum præsertim, ac simul nominis: (in *Truttis Salmonatis* peculiariter) ascensus ad summas aquas saltuum vis & agilitas, suavitas in cibo: quamobrem non est mirum si ex *Truttis* illis, quas *Germani Lachsforen* appellant, aliqui ætatis progressu *Salmones* fieri puta verunt: *Pinnis* etiam quatuor natant, quemadmodum *Salmo*. *Cauda* vero maxime invicem distinguuntur. In *Salmonibus* enim ea gracilescit, in *Truttis* semper lata est: in illis pinna caudæ longa & bifida, ut in *Alofis*; in *Truttis* brevis & non divisa. Hic accedit rostrum acutius in *Salmonibus*, quam in *Truttis*. Rursus partibus internis à *Salmone* & *Umbra* fluviatili non differunt, nisi quod ventriculi appendices plures & evidentiores habent. *Cardanus* formam *Truttis* omnibus communem esse tradit, quod quidem de fluviatilibus verum fuerit: nam quæ *Salmonata* cognominatur, non parum ab iis differt, ut cuilibet icones conferenti notum esse potest. Quæ flavescent & item nigricant, ab *albis* differre *Rondeletius* testatur, quoniam illis rostrum sit acutius, & veluti in fronte macula nigra. Præterea *albas* minores esse & carne minus flavescente.

*Fluviatilis*, corporis forma *Lupo* (inquit *Salvianus*) persimilis est, rostro tamen minus extento, magis retuso & paululum recurvo. Ore etiam paulo minore. *Alba* testante *Rondeletio* capite *Mugilem* quodammodo referunt: brevi nimirum, subrotundo, carnoso, vel potius pingui, coloris lactei. *Maxillæ* & *lingua* acutissimis dentibus armantur. *Sylvius* sex eorum ordinis esse scri-



bit, primum labris connatum, alios quinque à labro in pharyngem abscedentes; in quo tamen dentes sint in contrarium hamati, & qui cibum ex ventriculo regredi prohibeant. Idem ait, branchias utrimque quatuor dentibus hamatis & asperis & duris contumaces habere: que verba non satis precipio, Cardanus & Bellonius sex inquirunt in lingua dentes habere: addit Cardanus & certo ordine dispositos: scilicet duos ante, totidem in medio, ad latera positos reliquos juxta radicem. Qui vero in oris rictu sunt, eorum Bellonius, quinque ordines in superiori parte palati facile posse scribit enumerari. *Pinnas* duas sub ventre superiori tergoris oppositas, & duas ad radices branchiarum habet, unam rursus versum caudam proxime ad anum, quod idem è regione est superioris in dorso, quæ longo minor est & cutacea. *Oculos* habet rubentes. *Corpus* squamis parvis tegitur, & cute quæ facile rugatur, & carne divellitur, absceditque. *Dorsum*, imo totus fere piscis ex albo flavescit guttis, quales diximus. *Cauda* in brevem & latam pinnam degenerat. *Pinna* tergoris, iisdem quibus corpus maculis conspersa est. Cubitalem magnitudinem non excedit.

*Differentias* à coloribus duntaxat sortiuntur. Bellonius ex Rilla Neustriæ flumine variis notis pictas videri, aliis atque aliis multum diversas, tametsi in eodem tractu cæperis, scribit. In Santonum & Bojorum fluviis, reperiuntur, ut Rondeletius prodidit. Captam alicubi flavi coloris & admirationi fuisse, apud Gesnerum legimus. Subnigræ, maculis rubentibus notatæ, quem colorem ex senio contractum, quod eæ maximæ sint, Rondeletius putat, in Misnia sunt vulgares. Sunt ibidem *Lachsforen* dictæ, nomine ex Salmone & Trutta composito, quæ aureis maculis pinguntur. Subnigras rivi ad Crottendorsum, & fluvius quem Nigram aquam vocant, Suarceburgum oppidum alluens, alit. Multis in locis optimæ reperiuntur, & quamvis in majoribus fluviis reperiuntur, in minoribus tamen frigidioribus, saxosis & inter montes delabentibus potius quam contra se habentibus, nasci & degere constat. In altis item montium rivis, etiam tenuibus & exiguis aquis, Truttæ factis magnæ & pulcherrimæ habentur. Ascendunt enim altissimæ, cum & contra aquam luctari magna vi, & saltu se promovere, ad tres vel quatuor ferè cubitos interdum, in ascensu queant. Ex quibus efficitur, ut haud falsa esse credamus, quæ de iisdem Paulus Jovius scribit, eas adversos amnes vel. è præruptissimis etiam cautibus decedentes, incredibili impetu subire. Ab Nare enim fluvio in Velinum lacum, qui hodie Pedelucus est, stupendâ velocitate volucrum modo ascendere credi; qui lacus ab altissimo montis vertice certis primò coarctatus angustis, & mox

tota aquarum mole præcipitatus, nec subiectis quidem cautibus madefactis, veluti è cœlo in ipsum profluentem Narem effunditur. Idem in Gardonis fluviis fieri experientia docuit.

*Vescuntur* aquarum dejectamentis, phryganiis vermibus, locustis aquaticis, & piscibus. Percarum sobolem, Fundulos, & Phoxinos læves, tanta sæpè aviditate appetunt, ut supra aquam elatæ in scaphas aliquando incidant. *Auro vesci* vulgus credidit. *Pariunt* mense Octobri, in modicis quas excavavere scrobibus. Laudantur vehementer in *Cibis*, maxime si in frigidioribus & purioribus amnibus procreatæ sunt.

Quæ adverso eorundem impetu fatigantur, atque occurrentibus in æqualium vadorum petris illiduntur castigatiora sumina, & aridiusculas carnes ostendunt, sed recenter captæ comedi debent: mortuæ enim paucissimis horis, quia ob pinguem teneritudinem ocyssimè putrescunt, saporis gratiam amittunt. In Malacca regione Indiæ, salitæ ad commeatus servantur; Cajuba vocant.

## CAPUT II.

### De Trutta fluviatili altera.

**H**UCH apud Bavaros (inquit Gesnerus) nuncupatur piscis boni saporis, Truttis nonnihil cognatus, cum alias ut pictura ostendit, quam ad vivum expressam Achilles Pyrminius Cassarus, præstantissimus Augustæ Vindelicorum medicus ad me misit; tum quod pinnulam illam adiposam similiter in fine dorsi habet, & punctis variatur: sicut & icon nostra, & quæ in libro Bavaricarum constitutionum publicato habetur, præ se ferunt: in quo etiam mensura hujus pisces proponitur, duodecim aut tredecim digiti, quibus brevior vendi non debeat. Augustæ, ut audio hic piscis vocatur, *ein Rot / Kottle* à colore rubicundo, quæ nomina nostri Umblis (ut Sabaudi nominant) lacustribus tribuunt. Voracem esse ajunt, in cibo Truttis inferiorem.

In Carinthia Huchæ rubræ (Rot Huechen) quædam cognominantur in fluviis, eas Salmoni comparant: carne etiam rubrâ & boni saporis esse ajunt, & saliri, ut inveterentur, solere: quod quomodo fiat Balthasar Stendelius ad finem lib. 4. Opsopœjæ suæ Germanicæ docet. Colores hujus piscis in pictura nostra hujusmodi fere apparent. Aureolus color passim aspersus est, copiosius tamen circa branchias & oculos. *Pinna* circa branchias rubicundæ sunt: cæteræ omnes, sicut & *cauda*, fuscæ & maculosæ punctis partim nigricantibus, partim aureis. *Dorsum* fuscum est, utrimque ad Indicum vel cæruleum colorem vergens, ubi & punctis nigris creberrimis distinguitur. *Linea* nigra & recta fere

Tab.  
XXVI.  
2.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 13.



re à branchiis ad caudam fertur. Latera media maculis quibusdam subcæruleis per intervalla distinguuntur. *Venter* candicat. Circa *rostrum* & branchiarum opercula roseus fere color, &c. In capite etiam viridis aliqua ex parte. Huchas istas quidam icone nostra inspecta in quibusdam Germaniæ locis ali, in piscinis nobis referebant: & in Traga flumine Carinthiæ reperiri, ætatis progressu in Salmones converti (specie rostri nimirum) sicut & lacustres Truttæ, quanquam & aliæ Truttæ Salmonum speciem præ se ferunt.

## CAPUT III.

De Thymallo.

**T**hymalli solus Ælianus inter Græcos, Ambrosius inter Latinos mentionem faciunt. A Thymo quem olet ita dici, Salvianus contendit. Bellonius Thymum vocavit. Itali Temarum, quasi temerarium, quod stolidus piscis, dicunt. Truttarum generis esse, cum pinnarum situs, tum totius corporis figura indicant. Eratque Ælianus Truttis, si eas notas sibi habuisset, potius quam vel Lupis vel Cephalis, quorum communem & mediam speciem similitudinemque gerere scribit, assimilaturus: quanquam & his non absimilis multum: similior interim Mugili, quam Lupo. Caput pro corporis ratione parvum, in acutum tendit. *Os* aperitur non longo, sed quadrato ferè hiatu. *Ventre* est prominentiore. Rondeletius latiore, magisque ventrosus pinxit, quam par est. *Pinnas* duas habet ad branchias, duas alias in ventre inferiore, à podice unam. In dorso prior magna est, maculis multis, pulchrè varia: infra partim nigris, partim subrubentibus, supra rubicundis tantum. *Cauda* in duas latas pinnas desinit. Rondeletius corpore ait esse cæruleo: Bellonius verò tergus ex livido in opacum tendere, & Gesnerus fuscum id, vel subcinereum facit: Atqui hic exprimitur, Rondeletius scribit: fierique potest, quod vel loci, vel ætatis ratione variet. Lineas per latera rectas habet, quarum quæ ea dividit à superiori branchiæ angulo spineo oritur, & rectà ad caudam defertur: sunt & aliæ per totum corpus non paucae, singulæque per singulos squamarum versus, non rectæ, sed innumeris veluti arcubus, minimis triangulis undulatæ; quod veluti operosum pictores nostri, inquit Gesnerus, non indicarunt. Obscurè sanè & in meo pisce quem ad vivum depictum in musæo refero, pictor eas expressit. Latera præterea modo pluribus modò paucis punctis & lituris nigris temerè asperguntur.

Vidisse se idem Gesnerus in fine Decembris aliquando singulis tantum utrimque ad branchias *lituris* insignem scribit; aliumque initio Junii, uno altero puncto vix apparente. *Squama* ex ejusdem observatione, sin-

gulæ fere <sup>per se</sup> sunt, hoc est, rhombi figuram imitantur. Latera enim, inquit, earumque utrimque circuli segmentum referunt, supra vero infraque in cunciacumen tendunt, quod tamen in iconibus suis expressum negat. *Branchias* habet utrimque quaternas, & ut Bellonius addit, Harengi & Sardinæ modo, solidioribus horrent, uncinatisque ossiculis constant. Idem Bellonius *linguam* ostendere albam scribit, dentibus carere, immo ne ullis quidem rudimentis eorum peditum esse: è contrario Gesnerus pro dentibus, inferius superiusque labrum exasperari, limæ instar, introrsum proficitur: & Bellonium haud bene istæ exanimasse apparet: nam alias *Lavaretum* Gallice dictum piscem, ossicula ad fauces atque Oesophagi ingressum utrimque habere senis hinc inde denticulis ait, ut in Themolo conminuta; cum alioqui in Thymallis, & in Lavaretis suis nihil quicquam tale reperias. *Ventriculum* habet mediocre, intestina crassiuscula, pinguedine multa obvoluta; & ut Bellonius ait, apophyses plures ex pyloro dependent, à quo statim sequitur intestinum unum gracile, rotundum, quod ad rectum tendit, in quo excrementa recipiuntur, & ad anum deferuntur. Idem Bellonius, *cor* tam exiguum habere scribit, ut ne inesse quidem ei credatur. *Splenem* Salvianus subrubrum facit, Gesnerus in suo quem manibus tractavit, ferè nigricare asserit. Bellonio teste hic tam magnus est fere in hoc pisce, quam hepato, quod in nullo alio pisce (inquit) unquam videram, oblongus rubra pinguedine mixtus. Unicus hepato lobus est, ut idem Bellonius observavit, statim ubi gula finit, stomachum amplectens. Salvianus *felle* carere putat: Bellonius vero tam exiguum id esse tradit, ut vix rudimentum aliquod ejus appareat: & Gesnerus quoque suum Thymallum felle caruisse negat, sed flavo vel subaurei coloris id habuisse. Bellonius folliculum piscium natationi accommodatum plenum semper vidit, ac per spinam delatum. Cum maxime augetur, ad cubitalem *magnitudinem*, teste Æliano, excrescit: etsi qui crebrius capiuntur, minores sint, & ut Salvianus ait, libram non excedunt. Longitudo ad latitudinem ferè quintupla est, cauda etiam computata, ut Gesnerus advertit in eo quem manibus tractans descripsit, latus enim erat digitos tres, longus quatuordecim. *Gaudent* puris frigidis & saxosis aquis, in quibus circa saxa reperiuntur: nec ulli magis in montanis & præcipitibus fluviis, Truttas si excipias, capiuntur.

*Gignunt* eas in Germania Rhenus, Limagus apud Helvetios, & Floha apud Misenos; in Italia Ticinus; Abdua & Ambra. In Pado rarius capiuntur. *Vicitant* insectis aquaticis, dejectamentis mille pedibus, pediculis, caridibus, pulicibus aquaticis ac

Ambros.  
Hexam.  
l. 5. c. 11.

ter-

Tab.  
XXVI.  
3. 4.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 14.  
Ælian. H.  
A. l. 14.  
c. 22.



Ælian.H.  
A.l.c.

terrestribus. Ælianus alia quàm culice escā capi posse negat. Volaterranus Thymallo vesci, & solus quidem inter scriptores, voluit. *χρυσόψου*, id est aurivori dicuntur, seu quod minutula auri fragmenta propter splendorem appetant; seu quod cum majori pretio vāniant, obsophagorum aurum absumant, & loculos ex hauriant. *De odore ejus ita Ælianus*. Ejus capti odor non indignam admirationem habet: non n. ut cæteri pisces pisculentum quendam mittit odorem: imo vero existimes te ejus gentilem herbam, recentem ex terra lectam manibus tenere. Tanta sanè odoris suavitate fragrat, ut qui cum ipsum non videt, gratissimam apibus herbam, unde nomen duxit, in manu late re putet. Ambrosius de eo, qui gratam redolet suavitatem, dici facile scribit. Aut piscem olet aut florem: Omnibus sui partibus commendatur in *Cibis*: quibusdam tamen interiore tunicā maxime blandiuntur. Circa Albim præferuntur Truttis. In Athesi & Addua captos tenerrimos Salvianus fecit. *Majo* mense maxime appetuntur, & loco marinarum saxatiliū præscribuntur à Medicis.

In *Medicina*, Adeps hujus piscis laudatur, tum contra auditum gravem, si mense Majo in vasculum conjectus soli exponatur, & quod distillat, auri immittatur, tum contra oculorum pterygia, ungues, ruborem, fervorem, &c. si quotidie binæ guttæ cum pinna instillantur. Vidisse se puellam chemosi affectam Gesnerus inquit, quod malum aliquando exanthemata puerorum sequitur, hoc remedio per septuaginta fere dies continuato, (ut quotidie gutta instillaretur) curatam, rubore mox primis diebus sublato. Addit insuper, habere & pharmacopolas apud suos hunc adipem; & ab iis maxime ad oculorum remedia, ut maculæ in eis deleantur, peti solere, deinde etiam ad curandas igne vel aqua adustas partes.

#### CAPUT IV.

*De Umbra fluviatili.*

Tab.  
XXVI.  
5.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 15.

Umbra fluviatilis Aufonius ex veteribus in Mosella sua meminit, Gesnerus pro eadem cum Trutta fluviatili, quod ista in Mosella in primis ubi se in Rhenum exonerat abundet, accepit. *Rondeletius ita descripsit*: Piscis est non solum nomine, sed & colore marinis (Umbris) similis, à quo utrique nomen. Corpus enim est opaci loci modo subfuscum & subobscurum, cubitalem magnitudinem non excedens. Galli Narbonensis, demptis Monspelienfibus, Umbram vocant. Piscis est ex Truttarum genere, Carpioni Italico corporis aspectu affinis. Pinnis & earum situ à Trutta non differt. Duas itaque ad branchias habet, duas in ventre; ab ano unicam, in medio dorso priorem

majorem, posteriorem minorem, subrotundam, & pinguem, squamas parvas, & maculosas similiter habet. Carnis substantiam, partesque internas omnes easdem. *Capite verò à Truttis differt*, quo Carpioni (Italico, Gesnerus) similis est: capite enim longiore est, quam Trutta, ore minore nec tam hiante, rostro non acuto, sed obtuso, maxime in maxilla inferiore, sine dentibus, & sine magna maxillarum asperitate. *Oculis* est patulis, cornea tunica aurea, pupillā nigrā. Corpus à medio sensim gracilescit, in caudam latiusculam, & pinnam bifidam, latissimam deficit. Ad branchiis ad caudam linea recta (hanc in pictura non expressit) per medium corpus producta est. *Branchiæ* intus sunt quaternæ; *Ventriculus* longus & spissus pinguitudine quæ lacte candidior est, obductus, à quo multæ apophyses pendent. *Hepar* rubet, cui alligata est fellis vesica, *fel* nigerimum est, *splen* longus & niger. *Intestina* sine gyris ullis ad anum demissa sunt. *Vescitur* terrā, aquā limo, unaque, cum his, & cum arena auri laminulas haurit: ob id vulgus auro nutrici Umbram credit: & revera in ventriculo & intestinis aurum reperiri certissimum est. Carne est sicca & alba, qualis est Truttarum parvarum caro. Hyemē latet: æstate cum Truttis capitur: cui cum in succo & substantia, permultisque aliis similis est, Truttarum generi & tractationi subjecimus. Pura aqua maxime delectatur. *Hæc Rondeletius*, nulla coloris facta mentione, quem Bellonius non tacuit: totum hunc piscem sub ventre argenteum, esse scribens: dorsum verò terfissimum habere ex livido opacum.

#### CAPUT V.

*De Barbo.*

Barbi quoque solus inter veteres Aufonius meminit. Nomen ei Cutacei illi Cirri quæ barbæ quodammodo similitudine ex utroque hujus piscis labro dependent, fecere. Bellonius haud incongruo vocabulo *Mystum* vocat, & Græcorum vulgo *Mystacatum* vocari scribit. Sunt qui cum Mullis marinis piscibus, qui & ipsi barbati confundunt. Corporis figurā Mugiles fere refert, aut Squalos, nam si latitudinem spectemus, oblongiusculus est rotundus, in laterā modice compressus. *Differt à Mugilibus*, quod pinna quæ in medio dorso, firmiori aculeo innixa est: pinna ventris magis sunt flavæ; caudæ pinna rubescit: Rostro item est longiore & acutiore, cartilagineo & pingui. *A Squalo* etiam perspicuis quibusdam notis differt. Nam cum in extremo rostro Squalo sit os, infra rostrum in inferiore parte illud Barbus habet; unde & superior ejus maxilla paululum prominet: Labra item longe crassiora sunt quam Squalo, caputque compressius. Postremò è superiores rostri extremo duæ ap-

Tab.  
XXVI.  
6.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 16.



appendices, ex lateribus duæ aliæ propendent: quibus & Squalus & Mugiles carent. Est autem appendiculum earum substantia cutacea quidem, sed mollis, lubrica, teres, subrubra. *Venter* est colore lacteo, latera argenteo. *Dorsum* ex albo flavescit, nigrisque quibusdam ac parvis maculis conspergitur. *Branchias* habet quaternas: quarum rima admodum parva est: quamobrem extra aquam satis diu vivit. Ab iisdem linea ad caudam porrecta, minus evidens est, quam in aliis. *Dentibus* caret. *Oculi* parvi sunt, pupilla nigra, quam ambit aureus circulus. *Fel* adhæret jecori. *Intestina* in spiras contorta, plurima pinguedine oblita. *Uterus* oblongus est & bifidus, ovis innumeris refertissimus, cum prægnans est piscis. Pondere plerumque libræ unius, quandoque duarum, raro trium. Salvianus ad octo libras excrevisse observavit. Bellonius frequenter in Nilo capi testatur, sed quomodo Lucius Italicus, inquit, à Gallico differt, sic Nili Mystus à nostro diffidet. Noster enim Mystus oblongus est, & quasi teres: Niloticus vero crasso & recurvo est corpore: Ejusdem tamen coloris sunt: & eodem modo barbis quatuor, seu mystacibus exornantur. Niloticus nostrum Cyprium ipsâ formâ ferè æmulatur: ventrem enim habet expansum. Tantâ crassitudine in Nilo proficit, ut eum Memphis libras viginti pendentem viderim; quo in loco Mythus vel Mystus dicitur.

De loco ejus & Natura hæc Aldrovandus habet: In lacubus quidem nascitur; sed cum multo frequentius nascatur in fluviis, fluvialis potius, quam lacustris erit dicendus. Scribit Salvianus paucos esse lacus, qui Barbis abundant: plurimos vero esse qui eis carent: contra in omnibus fluviis gigni atque ali: ideoque jure inter suos Mosellæ pisces Barbum recenseri ab Aufonio. Albertus author est, à piscatoribus sibi relatum, ova ab eo custodiri, ne ab aliis devorentur: additque se observasse in cavernis domus suæ ad Danubium sitæ, quotannis post æquinoctium autumnale congregari hosce pisces, tantaque copia convenire ut manibus etiam capiantur, ita ut meo tempore, inquit, incolæ loci aliquando decem plaustra fere manibus ejecerint. Nam hoc genus piscis frigus non sustinet: quare semper languidus hyeme invenitur; æstate verò mundus & sanus est. Hæc ille. *Vescitur* algis, cochleis & piscibus, & ne suo quidem generi parcere dicitur. Albertus cadaveribus capiquoque scripsit. *Degunt* gregatim, *pariunt* inteunte æstate prope litora. Gesnerus ex piscatorum observatione sub collibus & ripis prominentibus libenter versari asserit, & porcorum instar fodere, ita ut aliquando in cavernis inhæreant, & pereant: pinnaeque eorum ab hirudinibus nonnunquam infestari, quas saxis affricantes in fundo aquæ depellant, aut

rapidiora fluminis loca petant, ut aquæ impetu elidantur. Apparet verò cum Squalis quandam occultam exercere *amicitiam*. Nam quemadmodum in quovis lacuum, fluminumque Barbus, ibidem fere semper, & Squalus reperitur; ita è contrario ubi Squalus, ibi semper etiam Barbus, ut Salvianus refert. Claustra fert, & in piscinis æquè Squalus parit & pinguescit.

Quoad *usum in cibo* Cardanus eum omnino rejicit. Aliis, si in saxosis & puris fluminibus capitur benè sapit, concoctu est facilis, laudati succi, carnis candidæ & mollis, sed plurimis spinis firmatæ. Majocirca Rhenum ad Julium laudari, Augusto in Helvetia, Gesnerus prodidit. Salvianus in eunte vere sapidiores dixit. Aufonio grandiores natu, majore in pretio. Nonnulli propter mollem carnem vino prius imponunt. *Ova* venenata, Majo imprimis mense Platina author est. Gazius scribit, cum experiundi gratiâ, duos duntaxat de ovis hisce bolos comedisset, nihil inde aliquot horis postea noxæ percepisse: demum sub horam coenæ, plurimam in ore ventriculi sensisse inflationem, quam ut dissolverem, inquit, anisum sumpsi, sed frustra. Post horam faciem apparuisse tanquam in syncope, ita ut astantes & admirari, & de mea salute timere inciperent. Se interim magnam non solum in stomacho & ventre, sed omnibus membris externis alterationem, & inæqualem quandam intemperiem in unaquaque carnis parte sensisse. Tum supervenisse passionem cholicam, donec infra supraque simul pluries ova purgarentur, magna cum anxietate & virium prostratione, & maximo vitæ periculo. Idem apud Gesnerum invenies. Sunt qui credant tum esse malefica, cum salicum, quæ fluviorum ripas obsident, floribus in aquam decidentibus vescuntur; sed quia nec salicibus nec aliis Barbi partibus istavis, præstat culpam in idiosyncrasiam conjicere.

## CAPUT VI.

De Capitone.

## ARTICULUS I.

De Capitone Aufonii, seu Squallo veterum.

**P**iscis, quem hic descripturi sumus; à magnitudine capitis, *Capito* Latinis dicitur. Apud alias nationes varia invenit nomina, quæ apud Aldrovandum, Gesnerum & Bellonium vide. Tab. XXVI. Aldrov. de Piscib. 15. c. 17.

Quis sit apud veteres, difficile est dictu, Bellonius *Theдонem* Aufonii, quem nullo spine nociturum acumine dicit, Rondeletius Capitonem ejusdem, Salvianus Alburnum Aufonii, & Galeni Lencesium, Aldrovandus Squalum, ut Romæ vocatur, esse putat.



Marino Capitoni Mugilibusque aliis corporis figurâ similes est: dorso tamen minus lato & corpore compressiore. In dorso item unicam duntaxat *pinnam* habet, Mugilum verò genus duas, unam videlicet in ejus medio, alteram inferius caudam. Mugiles denique lineas quasdam habent suboscursas à branchiis ad caudam productas, quibus carere omnino Squalum Salvianus scribit: unam tamen ei lineam esse Gesnerus proficitur, sed quæ leviter appareat. Idem Salvianus ait habere porvum, Rondeletius contra crassum & magnum: id quod pleræque etiam vulgares nomenclaturæ indicant. Rursus uterque dentes habere negat. Rondeletius ostantum asperum esse ait: Gesnerus verò dentes ejus latere in faucibus asserit, maxilla ferè semicirculari, supernè leviter aduncos, ordine duplici, exterius quinos, interius binos. *Dentes* enim ei tribuit Albertus his verbis: Piscium omnium dentes valde acuti sunt, exceptis perpaucis, qui in lateribus gutturis, mandibulas habent, ut pisces fluviatiles magnis vestiti squamis, Barbellus (at huic squamæ sunt exiguæ) Monachus, & alii quidam. Hi enim habent dentes latos aliquantulum, magis ad conterendum cibum, quam ad dividendum idoneos: quamobrem etiam omnes æquales sunt: & ideo naturâ abscondit eos in gutture, ut clauso ore aqua non suffocet mandentes hos pisces. Tales autem dentes maximè habet Carpo (ut Cyprianus) piscis. *Labra* sunt satis crassa. *Oculi* nigri, in circuitu aureoli; tempora subflava; *Os* rubicundum, *branchiæ* utrimque quaternæ, geminæ colore totus est argenteo: dorsum tamen minus quam venter & latera pollicent. *Squama* splendida sunt, albicantes, angulosæ, latæ, cute ultra medium obductæ, minimis variante punctis. *Aristis* in carne multis abundat, quarum etiam in Capitone meminit Aufonius, qui item à squamarum magnitudine squameum cognominavit, dum canit:

*Squameas herbosas Capito interlucet arenas,  
Viscere pratenero fartim congestus aristis.*

Gesnerum cum circa Octobris calendas unum ovis gravidum magnum item & præpinguem inspiceret, nullas in eo apparuisse aristas testatur. Quare vel non omni tempore, vel non omni ætate in iis reperiri credendum est. *Ventriculum* parvum habet, intestina parva, *hepar* ex albo rubescens, fel in medio viride, *vesicam* geminam aëre plenam, *peritoneum* nigricans. Circiter libram plerumque implet, aliquando tres & quatuor, aliquando sed rarissimè, octo aut novem. Non tantum in fluminibus sed & in lacubus, sed & iis paucis degit. In Lario invenitur, in Constantiensi non item. Ab Aufonio inter Mosellæ, à Bellonio inter Strymonis pisces refertur; sed nec claustra refugit. Dulci piscina inclusus, crescit, pingue-

scit, & prolem propagat. Expressè Varro. In tertia parte quis habebat piscinam nisi dulcem? & in ea duntaxat Squalos & Mugiles pisces? Servari diu & in aqua pura potest, si eandem sæpius mutaveris, vas ad summum repleveris, nec quicquam aliud injeccris, alias suffocantur. *Vescitur* cœno & sordibus, ideo un Vilain in quibusdam Gallicis locis dicitur: scarabæis & animalculis, qui in aquæ superficie natant; gryllis quoque campestribus, & uvæ acinis, & muscæ genere, quod propterea Aletmuggen Helvetii dicunt; cerebro denique bubulo, ideò à piscatoribus hamo subtiliter alligatur. In locis litoribus proximis, in fine veris & sub æstatis initium *parit*. Mense Majo parere ab uno latere, ab altero Cerasa quæ Helvetii Amarella vacant, matura sunt postea, aliqui Gesnero teste prodidère. Inter *gregales* esse censentur. *Usus in Cibis* si spectes, inter viles censetur. Carne quidem est candida, sed insipida ac molli, & quæ mox extra aquam flaccescit, plurimis abundans aristis; utrumque tetigit Aufonius dum canit:

*Viscera pratenero fartim congestus aristis,  
Nec duraturus post bina trihoria mensis.*

Improbantur præ cæteris, qui in lacubus, & in magnis cœnosisque fluminibus capiuntur, quamobrem Romæ, quod vel ex proximis lacubus, vel ex Tyberiafferatur, parvi fit, cum aliqui Tyberinus in ligneis vastis diu vivus conservetur. Contra, in limpidis, parvisque ac saxosis fluviis torrentibusque captus, haud omnino aspernari debet, maxime ubi adolevit.

Major enim factus, minus mollis est, ut hic etiam, sicut de Barbo diximus ex Aufonio in senectâ præferendus videatur. Commendantur apud nos verno potissimum tempore, cum prægnantes sunt: Alii tradunt per totam hyemen admitti mensis posse, & vere etiam usque ad initium Maji: æstate non probari.

Gesnerus apud suos commendari scribit mense Decembri, placereque circa Calendas Octobris, quo tempore unum ovis gravidum, inquit, reperi: magnus is & præpinguis erat: ova quoque sapiebant palato: nec ullæ apparebant *spinæ*. Idem caput in eo præferri asserit.

## ARTICULUS II.

*De Capitone fluviatili seu Squalo minore.*

**F**Requens in fluviis est, Inquit Gesnerus, vulgo nominatus *ein Bass* / in lacu juxta Tugium *Ganghass* / vel communiori nomine *Weisfisch* / quasi albus piscis, item alio nomine *Bassfisch* / à Mense Majo, quo præferuntur, quod nomen Alaûsis, quoque attribui putat. Italicum hujus piscis nomen nisi *Stretta* sit, (à corpore longiusculo fortè, & stri-

Varro R.  
R. l. 3. c.



stricto id est, minime lato) in Lario lacu, & in Verbano *Gravetta*, aliud se nescire profitetur. Hæc verò cum scripsisset, piscator Lucarnensis in Verbano vocari ei asseruit, *Letta* vel *Aletta*.

Conjicitque eundem fortè esse qui Papiæ *Cabacello* dicitur. Germanicum *Haszle* / videtur lepusculum significare, fortè quod agilitate ac celeritate natandi lepores repræsentet. Ipse Cephalos aut Mugiles fluviatiles minores vocat, quod fluviatilem Cephalum sive Squalum magis quam Leuciscos referat, adeo ut icone opus esse neget. Pisciculi, inquit, sunt molles, duos aut tres palmos longi, albicantes, per dorsum in viridi nigricantes, cauda & pinna dorso glaucis; cæteris rubicundis minimè lati.

*Squamulis* tenuibus, argenteis branchiis ternis. Caro eorum aristis referta est, ut & Mugilum fluviatilium majorum. Ex his qui in fluvio apud nos capiuntur, oculis rubere audio, qui in lacu non item. Observavi postea lacustres superna oculorum parte flavere.

*Dentes* in faucibus utrinque couditos habet, ut Capito fluviatilis, in mandibula curva, exteriori ordine quinque majusculos, interius binos minores, omnes fere in summo leviter aduncos. *Parere* incipiunt medio Aprili; vel paulo ante. Suo tempore (Majo & Aprili præcipuè, deinde Junio & Julio: à Majo quidem mense etiam *Weisfisch* alicubi nominantur) satis grati in cibo, & salubres habentur. Aliquando verò vermes eis innascuntur, (*Ligulas* nostri vocant, & *Præstel*.) & omnino insalubres sunt. Hyeme macri sunt ac minime placent. Fluviatiles etiam lacustribus præferuntur. Elixari debent in vino fervido. Circa initium Novembris ova in hoc pisce reperi, quæ magis quam piscis placebant. Idem *Capitonem fluviatilem* Cæ-  
R-ULEUM cognominant differentia causa, quem Germani, Saxones potissimum, *Iesen* appellant. Quidam Alausam interpretantur, sed male, quoniam è mari fluvios non ascendit: Capitur in Albi, & in Danubio quoque, ubi *Ientling* vocatur. Cum Capitone fluviatili similitudinem habet, sed colore est in dorso & in aliquibus capitis partibus cæruleo. Præfertur assus. Germani ad Viadrum *Jesitz* appellant, Marchici ad Viadrum *Jese* scribunt: alicubi *Brasfisch* dicunt, hoc est piscem assari solitum, per excellentiam. Poloni *Jaszez*, Hungari *Zompo*. Non est in magno pretio, neutiquam salubris, quod pinguiusculus sit, & non, saxatili modo friabilis: suavis tamen satis, quantum ad gustum. Estur frigidus, assus potissimum, quamvis & elixus, & aliis modis. Longitudo ejus cubitum non excedit, nec latitudo tres aut quatuor digitos. Post Pascha potissimum capitur.

## ARTICULUS III.

*De Capitone fluviatili rapace*  
*Gesneri.*

**H**OC genus Capitonis, Miseni Rappe vocant, id est corvum, ut Kentmannus Gesnero communicata icone significavit, quòd is volucris instar vorax & rapax sit, quamobrem Gesnerus rapacem cognominavit. Tab. XXVI 8. Aldrov. de Piscib. l. 5. c. 20.

Piscis (inquit Kentmannus) est candidus, argentei splendorus, dorso tamen fusco, & subcæruleo, *Squamis* tegitur latiusculis, tenuibus & perspicuis, quibus pellicula tenuis argentei nitoris substernitur, quæ per squamas translucens, piscem velut argento illitum ostendit, quales etiam cæteri pisces, quos communi nomine albos cognominamus (*Weisfisch*) apparent. Piscis est longus, crassus, & carnosus: caro *aristis* plena. *Longitudo* ad latitudinem quintupla. *Dentes* ei non in ore, sed in faucibus sunt (ut aliis quoque hujus generis) longiusculi, utrinque septem, è mandibulis prognati. *Ventriculus* & *intestina* simul, piscis longitudinem non æquant. Revolutio eorum triplex est, ita ut in summo ventriculus sit, inde tedius intestinum incipiens revolvitur, duas sub eo helicas efficiat.

Tegit hæc dextro latere *jecur* (in quo vesica fellis longa conspicitur) altero *lien*. Vesica in eo aëre plena, oblonga est, ut in Lucio, Cyprino, &c. Maximi qui apud Misenos capiuntur, ad sex aut septem libras, (xvi. unciarum) accedunt.

Addit Gesnerus sese audivisse *branchias* molles esse, ut in Salmone: *pinna* coloris è fusco punicei. Nomen à rapacitate tulit.

Est enim velut prædo vehemens in aquis: nec minus ferè quam Silurus (Glanis) & Lucius, aut etiam amplius, damnosus est vorandis piscibus: quos dum persequitur, in ripam aliquando expellit, & simul etiam ipse interdum impetu in siccum delatus, relinquitur. Hic piscis in Albi nascitur; non aliunde subit, & toto fere anno (sed rarius & per intervalla quædam) capitur. A partu valde augetur, & pinguescit. *Parit* autem circa annuntiationem Divæ virginis: quo tempore à stationibus suis catervatim procedunt, magni & parvi: duobus aut tribus diebus ante aut post illum diem: idque ita fore certum est. Quod si nihil impediat, sexaginta, plus, minus, uno retis tractu, interdum capiuntur. Piscis est *callidus* & extra hoc tempus, quo propter partum gregatim natat, difficilis captu: nisi vel nimii ventorum flatus, quo minus piscatores & retia trahenda audiat, efficiat: vel aqua pertubata, visum ejus impediat: aliàs enim inter scamna, quæ arenâ accumulans, manet, nec facilè retibus



includitur. Cæterum extra pariendi tempus hamo ferè *capitur*, hoc modo: Quoniam vorax est piscis, Phoxinus aliufve pisciculus hamo infigitur, & sic linea per aquam, ultro citroque agitur, eo in loco, ubi hujus generis pisces degere conjectura est: Hi cum pisciculo pariter hamum devorant, & capiuntur. Piscis est admodum laudatus & boni saporis, tum assus, tum elixus. A plerisque tamen parvi æstimatur, quod idoneum coquendi modum nesciant: nam nisi ritè coquatur, sive asses sive elixes, in partes aliquot dilabitur: quod si integrum servare velis, non in fervidam, ut alios plerosque pisces solemus, aquam, sed ab initio statim in frigidam præparatum immittes, ut pariter cem aqua concalcat: tum condies, saliesque, & ad juris ferè consumptionem coques. Assandum verò, desquamabis, exenterabisque similiter: deinde sale deligenter consperges & perfricabis, per & duas horas in sale relictum, tandem assabis: ita bonus & grati saporis piscis erit.

Sunt qui pisces assari solitos, simpliciter assent, ovis (aut lactibus) solum non exemptis & salviâ infarcta. Alii ova seu lactes, cum hepate & liene exempta, minutatim concidunt, adduntque multum piperis ac caryphyllorum, salem, uvas passas minores, vitellum ovi, hanc impensam in piscem infarciunt, & assant, putantque ita salubriores fieri.

#### ARTICULUS IV.

*De Orfo Germanorum seu Capitone sub-  
rubro Gesneri.*

Tab.  
XXVI.  
9.  
Tab. II.  
7.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 12.

**O**Rfum Germani vulgo ein Orff/ genus hoc Capitonis vocant, (inquit idem Gesnerus) quod mihi videre nondum contigit, præterquam Augustæ Vindelicorum olim in piscina quadam, ubi mihi intuenti Cyprini colorem præ se ferre videbatur, aqua forte visum meum mutante. Ibidem depictam iconem clarissimus medicus Achilles Pyrminius Gassarus mihi communicavit.

*Dorso* est rubicundo, ventre albicante, *squamis* (ut apparet) magnis & latis. Assi laudantur, præcipue Aprili, & Majo mensibus. Linea à branchiis ad caudam, an probè adeo recta (præter plerorumque piscium morem) expressa sit inquirendum. Germanicus liber qui Bavaricas Constitutiones continet, eadem forma piscem hunc delineatum proponit, digitos 12. vel 13. longum, quâ longitudine inferiorem capi non liceat: cum vulgarem Aufonii Capitonem, vel novem digitos longum capere concessum sit: unde hunc (Orfum dico, qui tamen ab Orpho marino pisce toto genere differt) ad molem multò majorem excrescere conjecerim.

In diversis Germaniæ partibus aliter at-

que aliter (proximis tamen se vocabulis) nominatur, Orff/ Orffe/ Dorffing/ Wurffing: alicubi etiam Elfr/ idem ni fallor. (Apud Hollandos Elfr est Alofa:) Intempestive captum, spinulis seu aristis redundare ajunt. Duorum *generum* hunc piscem esse audio: assatos alios carne alba esse, qui Augustæ vulgo *Weißfisch* appellantur: alios rubicundâ vel flavescente, Truttæ Salmonatæ instar. Piscem Norinbergæ quoque in Begniza fluvio frequentem esse ajunt; præferri genus illud, cujus caro rubeat: in superficie discrimen non apparere: *squamas* paulo latiores esse, quam in Thymallo: carnem siccam, & friabilem, salubrem, ut vel purpureis concedatur, minus suavem quam Truttarum. Bellonius quoque visa apud me hujus piscis effigie, forma ad Squalum (id est Capitonem fluviatilem) eum accedere ferebatur. Piscem audio lautum, & in pretio esse; muscis vesci. Cyprino minus lautum esse, sed crassiorem: non in aquis fluentibus, nec in lacubus, sed in piscinis fermè reperiri, apud Vindelicos, Norimbergæ, & alibi. Sunt qui *Pigo Picone* pisci Larii & Verbani lacus eum comparent: & similiter certo anni tempore è squamis ceu clavos quosdam emittere mihi retulerint. Ad Cyprinos ne igitur magis an Capitones pertinet, judicandum illis relinquo, quibus in promptu hi pisces sunt.

#### CAPUT VII.

*De Leucisco.*

**L**Euiscis nomine omne Mugilum genus Hicefio apud Athenæum venire superius, ni fallor, diximus. Galenus suæ speciei piscem *fluviatilem* & *lacustrem* facit. Salvianus Squalum esse, ideò quòd eum Galenus τὸν γαύρον ἐξυτέραν habere scribat (sed perperam, Legendum enim est, κεφαλὴν ἔχον μικρότερον ἐξυχοτέραν) credit; Modernis Græcis *Leucorinus* dicitur. Bellonius, *Albicellam* commodè vocari posse scribit. Apud alias nationes, Germanos inprimis, varia fortitur nomina. In Germania, circa Argentinam ein Lauck/ Helvetiis diminutiva voce *Laugele*, quo nomine Gelenus dici conjiciebat (inquit Gesnerus) quasi λευκιλλον, id est Albiculam, tanquam olim sic appellassent Græci, & ab iis mutuati essent Germani. In quibusdam Helvetiorum lacubus, ut juxta Tugium & Bielam *Uvinger* vocitatur, ut à Sabaudis circa Neocomum *Vengeron*.

Diversus tamen ab his piscis est Vageton in Lemaño dictus, cui Helvetii à rubore pinnarum nomen posuerunt. Brelenpes etiam *Onhopt*, id est, acephalos nominant hos pisces: amputatis enim capitibus, sicatos, alio venales mittunt: cum minimi densis agminibus natant. Helvetiis *Seelen*/ id est animæ dicuntur.

Acronii lacus accolæ nominibus variant;

*Gra-*

Tab.  
XXVI.  
10. 11.  
12.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 22.  
Galen. de  
Alim. fa-  
cult. l. 3.  
Bellon.  
de Aqua-  
til. l. 2.



*Grafig* Lindaniæ vocant: *Uberlingæ* *Laugelle*; *Constantiæ* dum parvi sunt, *Zienfische* vel *Grafing*: adultiores, *Agonen*, *Agunen*, *Lagenen*. Ajunt enim pisciculos esse vix longiores palmo, *squamosos*, quibus multi abstineant, quod circa latrinas pascantur: suo tempore tamen commendari.

Æstate, inquit, innascuntur eis vermes, quos vulgus, *Nestel*, nominant, quo tempore insalubres habentur.

Ova gerunt usque ad Junium, deinde pariunt. Non solum autem inter se, sed cum illis etiam piscibus latis lacustribus, quos Helvetii *Kotten* vocant, & cum Scardulis sive Cyprinis latis *cœunt*, unde piscis genus enascitur, inter utrumque parentem medium, *ein Dittfisch*.

Sed alius est Agonus in lacubus Italiæ, & Germanicum nomen *Grafing* cavendum, ne quis cum diverso fluviatili pisciculo confundat, quem *Greszling*, vel *Kreszling* nominant. In Dunensi Bernensium Helvetiorum lacu, *Blauvinling*, id est, cæruleus, hoc genus *Leucisci* dicitur: nostri longè aliud lacustre tantum genus sic vocant. *Glyssen* à splendore factum, commune est piscibus illis qui vulgo dicuntur *Laugelen* aut *Swalen*.

*Squamis* mediis tegitur, quæ lineolis distinctæ sunt. Nonnulli cum priore *Rondeletii* *Leucisco* confundunt, sed corporis, inquit hic, latitudine differt, rostroque est acutiore, alioqui pinnis, earum numero, & situ similis est, Romani piscatores à *Squalo*, teste *Bellonio*, non distinguunt: neque enim adeò exactè pisces fluviatiles, ut *Galli*, internoscunt. Etenim *Leuciscus* aspectu multo hilarior, quam *Squalus*, minoribusque squamis contegitur. Albo colore nitet, & veluti inter squamas striis rectis interstingitur. Caudam bifurcam & pinnas albas profert, neque ita latas, ut *Squalus*. Hic præterea *Leucisco* major evadit. *Alburnus* eidem similis est *Leucisco*; tamen est paulo latiore corpore, & squamis elatioribus, ac labro inferiore melius infarcto. Est etiam nonnihil discriminis in linea, quæ utrinque corpus interfecat: siquidem *Leucisco* non tam arcuata est, quam *Alburno*, & *Alburnus* rotundiori corporis compage constat, ad *Cephalum* magis accedente. *Bellonius* nulla ait habere *dentium* rudimenta, verum fortassis haud diligenter inspexit, *Gesnerus* namque in faucibus utrinque mandibulam curvam quinis armatam denticulis reperit, ut in *Bellero*. *Albertus* utrinque mobilem in faucibus mandibulam habere ait. In *Pado* (ut *Gesnerus* observavit) dodrantem nunquam excedit; crassitie fere æquali per totum corpus; à capite ad usque caudam. Os aperitur in oblongum, nec prominet mandibula superior. Addit item *Gesnerus* apud suos paulo majores capi in fluvio quam in lacu; longiusculos esse, non latos, *Hafelis*

non dissimiles specie, paulò breviores, si bene meminit: Dorsi colore esse fusco, flavo, & viridi ferè permixtum esse. *Pinnas* albicare, vel nimium rufi admixtum habere, lineam qua terminatur laterum color, instar iridis resplendere ex flavo, & viridi colore. *Rondeletius* quoque ex fusco partim viridem esse, partim flavum dicit, *ventriculumque* habere parvum, hepar magnum, & in hoc felle vesicam: denique multum *pinguescere*. Quo loco in cibis haberi debeat, apud *Galenum* legimus, qui conditam seipso meliorem effici, quod quicquid in sapore est mucosi abjiciatur; meliorem recentem, diutius in muria servato, scribit. Testatur *Bellonius*, nondum provecti magnum numerum veris initio capi, modicoque sale conspersum atque exiccatum, *Byzantium* deferri, vendique *Majo*, *Junio* & *Julio* mensibus. Eorum capturam majorem fieri ex *Epiri* lacubus, *Venetosque* his maximè uti, ad seque navibus adferri curare, & eodem vocabulo cum *Epirotica* lingua, quæ *Scouranicos* dicit, *Scourancas* nominare: quæ cum *Leucorinis*, inquit, majores sunt: ambo tamen pisces sale conspersi & fumo infecti atque exiccati, ad externos mitti, ut nostri *Harengi* foreti, consueverunt. Sic *Bellonius*. *Gesnerus* commendari scribit *Aprili* & *Majo* mensibus, *Februarioque* non insuaves invenisse, quo tempore lactes in mare pleni erant, eodemque mense à suis laudari. In Italia quidem, hyeme in primis capi. Veru tostos, sale, aceto, olivo, pipere, & cinnamomo conditos *Grapaldus* laudat: & *Rondeletius* denique molli suavique carne esse tradit, & pinguedinem ejus aurium doloribus succurre, & cum felle ejusdem permistam oculorum caliginem abstergere.

*Bellon.*  
de Aquat.  
til. l. 2.

## CAPUT VIII.

De *Leucisco* primo *Rondeletii*.

HÆc *Leucisci* species, in Italia *Lascha*, in Gallia *Hardon*, quod facilè per longum tempus in vasculis aquatilibus servari possit, alibi apud Italos *Dorada*, quod in eo tractu caput ejus aureo colore fulgeat, Helvetiis *Roterigle*, quasi *trytrophthalmos* dicitur. *Bellonius* *Sargum* *Sargoniæve*, qui inter marinos *Mugiles* fluvios subeuntes, ab *Aristotele* recensetur, perperam vocavit. *Capitoni* seu *Cephalo* fluviatili corporis aspectu, pinnarum numero, situ, figura, squamis similis: sed capite est minore, corpore latiore. Dorso cæruleo cervice virescente, ventre candido, oculis flavescens. *Dentibus* caret. Imò palato ossa habet. *Bellonius* ad *Cyprini* magnitudinem unquam accedere negat: aitque corpore quam *Squalus*, compressiore esse, pinnasque habere subrubras, parvos item *Gardonos* pinnam caudæ longiorem exerere quam *Leuciscum*:

Tab.  
XXVI.  
II.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 23.

*Bellon.*  
de Aquat.  
til. l. 2.



scum : (sic vocat piscem proximè præcedentem) & antequam in extremum pinnæ, quæ bifurcata est, desinat, rotundari : Latiusculis squamis contegi, ipsoque capite magis ad Leuciscum quam ad Squalum accedere. Oblongius & paulò crassius habere corpus, quam Abramis, ac denique tergore esse magis quam Squali nigricante, & auri colorem referente. In Ambra Melegnarum alluente numerosè capitur. Sed & Peni sinus lacus delicatissimos profert. Alacres sunt & vivi di omnes ova habere, & foeminæ esse creduntur. Solidiuscula illa & ruffa. Partus Aprilis inchoatur, & ad Maji pergit medium. Laudantur antequam pariunt, Januario, Februario, Martio & tota hyeme mediocriter : sunt qui Aprilis, & Maji commendant. In vinum fervidum immissi elixantur. Rondeletius carne esse fluxili & parum nutriente dixit.

## CAPUT IX.

De Oxyrincho Rondeletii, Corvo  
Nilotico & Naso Alberti  
Magni.

Tab.  
XXVI.  
13.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 24.

**O**XYRINCHI nomen inter polysema censetur. Diphylo apud Athenæum Mugil est, fluviatilis; idem, ut Rondeletius insinuare videtur, cum superiori Gallorum Gardono : Straboni, Æliano, aliisque inter Nili pisces recensetur : eidemque Æliano rubri maris quoque piscis est, ac denique maris Caspii, ut in Sturione dictum est. A quibus omnibus differt, (ni fallor) Oxyrinchus iste Rondeletii, Antverpiensibus *Hautin* vocatus, rostro longo, tenui & maximè acuto, unde Oxyrinchium rectè à se appellatum fuisse putat, nisi mavis, inquit, Sphyrænam fluviatilem vocare, quia marina Sphyræna rostrum simile habet, molle & nigrum. Squamis melioribus tegitur. Pinnae in dorso tres habet, in æquali spatio à sese distantes : totidem in ventre habet, quot Barbus. Quærendum nunquid idem sit, qui Frisiis *Snepel* appellatur, à Scolopace ave, puto, quam Snepam dicunt; Galli verò à rostri proceritate *beccassam*. Gesnerus in Albi fluvio quandam quoque piscem *Sneppelfingen* vocari tradit, sed à superiori diversum; parvum nempe, & candidum, Capitoni fluviatili similem.

Tab.  
XXII.  
14.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 25.  
& 26.

**CORVUS** Niloticus, corporis figura Mugilibus similis est, sed caput pro corporis portione (longum enim dodrantes duos) parvum *Maxilla* inferior superiore brevior. *Pinnae* ad branchias, utrimque una breves : in tergore ultra medium alia oblonga : in supina parte à podice alia : in ventre una, de pisce hoc, quod præterea dicam, non habeo.

**NASUS** ab oris figura seu naso valdè crasso, nomen sortitus est. Nasonem vel Nasutum benè dixeris : & quia labrum seu rostrum superius crassum, sinum obtusumque habet, non malè Græce Pachyrinchus & σιμύρ, Latine Simus vocabitur. Genere Squalo ac Leuciscis fluviatilibus adscribendum esse; & corporis totius figura indicat, & Albertus quoque attestatur Monacho, hoc est, Capitoni fluviatili similem esse, inquit, sed tenuiorem, naso valde crasso. Et Gesnerus esse tradit, qui fluviatilibus Barbis hunc piscem comparant, quoad ad corporis speciem : aliquos piscibus Erffen vulgo dictis apud Germanos. Ipsi vero specie, squamis & colore Capitonem fluviatilem referre videtur : sed ad eam magnitudinem, inquit, non perveniunt. Lonicerus duorum triumve palmorum magnitudine esse ait, & oris formam peculiarem habere. *Venter* eorum intrinsecus nigerrima membrana ambitur : unde joculari nomine Germani hunc piscem, scribam cognominant. *Os* modice deorsum vergit. *Lapidem* habet in capite, teste Alberto, Capiuntur in fluviis & rivis. Libenter enim in rivos ascendunt, inquit idem Gesnerus, in lacum non veniunt, nisi ad initium ejus tantum, præsertim vere. Albertus Danubii piscem esse ait, & aquarum in Danubium influentium. Cæno & spurcitiis vescitur. Caro alba & laxa est, spinulis referta, ut & Capitonis & aliorum multorum fluviatilium, præsertim circa caudam. Verno tempore præferuntur & pinguescunt. Apud Helvetios tamen Novembri mense laudantur : si modo unquam laudandi sunt. Nam caro eorum semper laxa & insipida est : quamobrem assarè eos potius quàm elixare coqui solent. In Rheno præstantiores habentur. In libello quodam Germanicè vulgato de piscibus, Februario & Martio & cum salices stillant, eos præferri legimus. Hæc ferè Gesnerus.

## CAPUT X.

De Gobio fluviatili.

## ARTICULUS I.

De Gobio non capitato.

**G**OBIO fluviatilis est duplex. Unus non capitatus, alter capitatus. **NON CAPITATI** Dorion apud Athenæum inter fluviatiles meminit, fortassis & Aristoteles, dum eos in fluviis pinguescere scribit. Mediolanensibus Varira, fortè quasi varius. Vbique enim rotundis nigris maculis distinguitur, vocatur Germanis *Kressling*, aliis Leutesser, quod cadaveribus submersis vescatur. A Gesnero ita describitur : Gobio noster, ein *Gressling* / quem nuper captum in lacu, inspexi, mense Januario ovis gravidus erat : barbatulus, cirris singulis

Tab.  
XXVI.  
15.

Tab.  
XXVI.  
16.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 27.



singulis in angulis labiorum perbrevibus. Pupilla oculorum nigra, ambitu candicante. *Macula* à capite caudam versus per media utrinque latera nigricantes, rotundæ, magnæ proportionem, circiter decem, singulæ deinceps digeruntur: & similiter per medium dorsum. Cauda etiam maculosa est, & dorsi pinna. Vesica bifida, magna proportionem. Longus est plerumque quinque aut sex digitos. *Fel* habet subviride, caudam bifurcam. *Os* cum aperitur rotundum & veluti è præputio se exerens, deorsum nutat. *Lapilli* in cerebro perexigui sunt. Hæc ille.

*Squamis* tegitur parvis. Quamvis ab Ausonio, qui eum *Barbi jubas* æmulari cecinit, fluviatilibus accenseatur, in lacubus tamen quoque capitur. Degit in fundo & cœno, unde Fundulos quibusdam vocari etiam diximus. Vescitur musco vel alga, item arenulis, & hirudinibus minimis lacuum. Creditur cadavera hominum submersa depasci, unde nonnulli anthropophagum dicunt: quæ res aliis fortassis ansam præbuit, ut ex cerebro equorum procreari dixerint, quo quidem in aquas abjecto vesci, à ratione non est alienum, nam & Bellonius testatur calvariis bubulis in aqua projectis oblectari, ejusque gnaros Ligeris accolas, calvarias eas studiosè adservare iis denique in Ligerim immerfis, Gobios allicere, ut facilius eos postea capiant. Idem testatur Rondeletius. *Capiuntur* autem facilè & magna in copia, inquit Gesnerus, circa ripas lacus nostri retis genere, quod Stofzbaren appellant.

Aliquando bis aut ter anno *pariunt*. Æstate vermiculis quibusdam in ventre vitari dicuntur, teste Alberto. Rondeletius *carne* ait esse molli insipida, virus nonnunquam respiciente: fallique medicos, qui Gobiones fluviatiles agris apponi volunt, his eam inesse succi bonitatem existimantes quam Galenus in marinis commendat, ab hisce enim illos hac dote multum superari. Cœnum aliquando respiciunt. Author de natura rerum, salubriores esse ait, ubi aquas arenosas in nutrimentum habent. Et Gesnerus elixum satis solidum esse testatur, nec contemnendum in cibo.

N. Ad Gobiones referimus piscem Rheac Mæni alumnus rariorem, quem *Obresz* seu *Obresz* / q. *Obkresz* / Piscatores vocant Ambire enim videtur inter Gobionem & Percam. Hujus iconem, exhibet Tab. 31. ea figura ac magnitudine, qua cum duobus sociis captus est non procul Francofurti, 16. April. 1649.

## ARTICULUS II.

### De Gobio capitato.

Gobio Capitatus nomen istud à Capite pro corporis ratione maximo accepit.

Non tantum apud Italos, sed & inter Germanos varias sortitus est appellationes. *Gropp* dicitur inter Helvetios, *Cop* vel *Kop* in Carinthia, *Kaolrapp* in Franconia: alicubi *Mul*, circa Tridentum (qua parte Germanice loquuntur) *Tholimann*. Saxones & Miseni à capite, quod ferè globi instar rotundum habet, sed compressum, varia ei nomina fecerunt: *Keuling*, *Keulingk*, *Kulheit*, *Kaulheupt*. Anglice à *Bulbed*, à capite taurino, quasi Bucephalum dicas, nempe ob magnitudinem, non similitudinem formæ. Rondeletius & Bellonius *βούτιον* vel potius *βούτιον* aut *βούτιον* Aristotelis esse volunt; sed cum is duntaxat in fluviis sub saxis stabulari, quod & aliis competit, scribat, nihil definiri potest. Cremonensibus *Bot* vel inde vocatur quod Bufonem, qui Botto vulgo, deformi oris ictu referat. Pisciculus est ranæ piscatrici similis, si parva magnis (inquit Rondeletius) conferre licet, corporis figura & colore. Capite enim magno est, lato & depresso. *Oris* magno hiatu, sine dentibus: sed pro iis labra instar limæ aspera habet; *pinnae* binas ad branchias, rotundas, & ambitu pulchrè cristatas: duas alias inferius parvas, longiusculas, albicantes in medio summi ventris: aliam ab ano ad caudam: in dorso quoque geminas, non singularem, ut Rondeletius scribit, qui aliam fortè speciem, inquit Gesnerus, nobis ignotam vidit: nam & cauda quam suo attribuit Cotto, proportionem multo longior est, quam in nostro. Ex his dorsi pinnis brevior, quæ capiti propior, altera longior caudam versus, quam tamen non attingit: idque in fluviatili & lacustri genere similiter. *Oculi* sursum spectant. Branchias quaternas habet, *hepar* magnum sine felle. Si corpusculum spectes, ventriculum magnum. *Fœmina* ovis immodicè turgēt, quæ in pectore in globos collecta, geminas veluti mammillas præ se ferunt, & membrana vestiuntur nigricante. *Lapillos* in capite habet. Qui in lacubus degunt, (ut Tigurini lacus exemplo ostendit Gesnerus) non solum magnitudine inferiores sunt *fluviatilibus*: raro enim ultra digitum medii longitudinem excrescunt; sed specie etiam differunt; etsi vulgus forte non discernat. Nempe, colore magis albicant, cum illi nigriores sint. (Corpus varium est, partimque albicantibus partim fuscis punctis, & maculis etiam nigricantibus transversis distinguitur) *Spinulis* circa branchias pluribus & acutioribus, brevissimis tamen illis, & visum pene latentibus horrent; quibus digitum etiam, si retro ducas, configuntur. *Pupilla* oculorum aliqua ex parte pulchrè virefcit, & gemmæ instar resplendet, præsertim ad solem. Elacu in fluvium non migrant: neque fluviatiles in lacum Gustus etiam suavitatem fluviatilibus longe sunt deteriores. Icon quam dedit Aldrovandus Gesneri est, diversa nonnihil ab ea quam Rondeletius exhi-

Bellonius  
de Aquat.  
lib. 1. 2.



exhibuit, pinna dorsi singulari, & cauda penicilli instar, longiuscula: unde suspicari licet, aliud genus Cotti circa Monspelium haberi. *Degunt* in rivis frigidis ac montanis, & fluviis præcipitibus, sub lapidibus & inter Saxa. *Carnivori* creduntur, & à se mutuo devorari certum est. Mense Martio circa festum Paschatos *pariunt*. In aquæ fundo non tam natant, quam subito impeditu teli instar se vibrant, & quo volunt trajiciunt. Gesnerus testatur, legibus piscatoriis licere, eos capi in flumine à Calendis Novembris usque ad Pascha: extra verò illud tempus, nec retibus, nec fuscina, neque alio modo licere: hamo autem nunquam. Nassis uti permissum esse, à die D. Marci usque ad exitum Maji, non arctius tamen contextis, quam ut Gobii capitati evadere queant. Coctos esse suavissimos & origratissimos cum ovis, quæ pingua, copiosa, delicatissima, Matthiolus prodidit. Carne molli, Rondeletius, dura Albertus fecit. Apud Helvetios fluviatiles duntaxat, & quidem circa brumam & Januario mense in deliciis sunt, quidam à Calendis Decembris ad Calendos Aprilis commendant; omnes, capita, quod spinis tantum cuteque constant, rejiciunt. Placent & frixi:

## CAPUT XI.

## De Aspero Pisciculo.

Tab.  
XXVI.  
18. 19.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 29.

**H**Ujus Rondeletius meminit, eidemque à maxillarum asperitate cognominatum inditum, aitque Lugdunensibus *Apron* appellari propter squamarum asperitatem, Rhodanoque peculiarem cæterum non quovisejus loco, verum in ea fere parte reperi, quæ inter Viennam & Lupdunum interjecta est. Pisciculus, inquit, est *capite* latiore, quam Gobio, in acutum desinente: ore medio, *dentibus* caret: sed maxillas asperas habet, foramina ante oculos. Colore est rufo, maculis nigris latis, à dorso ad ventrem oblique descendentibus varia: Pinnas ad branchias, & in ventre similes cum Cottis habet, sed in dorso dissimiles: duæ enim sunt à sese sejunctæ. Vulgus ait pisciculum hunc auro *vesci*, quia arenam cum qua nonnunquam aurilaminæ sunt, haurit. *Carne* est sicciore quam Gobio.

Tab.  
XXII.  
19.

Ad hunc referri potest, & *is piscis Danubianus*, quem Iulius Alexandrinus ad Gesnerum dedit. De eo ita Gesnerus: Forma quidam tota; & singulæ ferme corporis partes, inquit, in utriusque pictura convenire videntur, nisi quod pinna ab uno in nostra iconce nulla est, pictoris forte incuria. Nulli enim piscium, opinor, hæc pinna deest. Rondeletius *Lacertum* peregrinum suum sine ea pinxit, quam Salvianus eidem addidit. Bellonius in sola Tænia hanc pinnam se non reperisse mihi retulit. Piscis quem exhibemus,

Germanicum nomen est *Zindel*: velut alii scribunt, *Zinde*, *Zindel*, *Zinne*, *Zingel*. Ungari *Kolcz* appellant. Icon ad me missa, digitos XII. longa est; quam longitudinem in hoc pisce mediocrem esse audio. Colore est, partim è fusco rufescente, partim nigris *maculis* satis magnis per intervalla distinctus: quarum aliquæ à dorso ad ventrem, qui cinereus est, oblique tendunt. *Oculis* color Indicus: & aliquid sub eis rubri. Audio eum ad libræ pondus, id est, unciarum XVI. accedere: (alii etiam trilibrem fieri retulerunt) *caudam* adeo duram habere, ut vix amputari possit: pinnas in dorso aculeatas in capite Percæ instar, (icon nostra pinnas molles, non aculeatas, præ se ferre videtur) nostrum acuminatum; carnem candidissimam. Sunt qui forma & colore Cani marino comparent: alii Lucio, præcipue quidem capite: absque *squamis* esse ajunt, instar Anguillæ. (Rondeletius Asperum suum à squamarum asperitate vulgo Gallicè *Apron* dictum ait) Lautissimum esse addunt simul & *saluberrimum*, omnium Danubii piscium, ita ut vel puerperis apponatur, & divitum duntaxat mensas oneret: quod equidem miror, si squamas non habet: ferè enim omnes qui *squamis* carent, minus salubres existimantur. *Ferunt* eum Danubius & Tibiscus. In Danubio prope Bosoniam magna ejus copia capitur. Viennæ etiam non deest; & in Baviaræ fluviis, ut Isara & Leisaca: hic quidem è lacu Ammelsee fluit in Rachelsee lacum, & inde rursus in Iseram fluvium. In piscinis servari non potest. Eiusdem piscis effigiem illi, quam dedimus, similem, coloribus tantum diversam (ventre & pinnis albicantibus) Raphaël Seilerus Jurisconsultus doctissimus, comes Palatinus, clarissimi Augustanæ reip. archiatri Geryoni filius, ad me misit: in qua similiter nulla ab ano pinna, nullæ squamæ apparent.

## CAPUT II.

## De Cobitide fluviatili.

## ARTICULUS I.

## De Cobitide Rondeletii.

**T**Riplex invenitur *Cobites*, fluviatilis Rondeletii nempe, Aculeata, & Barbatula. De illa ita ex Gesnero, & Rondeletio Aldrovandus: Idem Rondeletius fluviatilem hunc pisciculum antiquis, qui defluviatilibus parum fuere solliciti, indictum, *Cobiten*, *Cobitidem*, fluviatilem nuncupavit, quod marinæ, inquit, persimilis sit, cum alioqui neque situ neque numero pinnarum cum marina conveniat; quare similitudo isthæc ad Cobitidem barbatulam potius pertinet: ad hæc Cobitis marina lævis est, uti & Barbatula; contra squamosus, quo de loquimur, piscicu-

Tab.  
XXVI.  
20.  
Aldrov.  
lib. 5. de  
Pisc. c. 9.



pisciculus est, nisi figura exhibita nos fallat, quod quidem suspicari licet. Ipse enim Gallis *Loche franche* vocari aſſerit, vel quod totus lævis sit, & aculeis careat; vel quod mollior sit, & salubrior: quamobrem Cobiten forte hunc pisciculum, inquit Gesnerus vocat, quod ad Gobionem fluviatilem Ausonii accedat, non ad marinam Cobitin. *Degit* in rivulorum & fluviorem ripis, digitali magnitudine, rostro satis prominente. Corpus flavescit, & maculis nigricantibus notatur, subrotundum est & carnosum. *Pinnae* duæ sunt ad branchias, duæ in ventre, unica ab excrementi meatu, unica in dorso. Gesnerus cum hoc piscitio idem putat, vel saltem simillimum, suis Ryſerle nuncupatum; Digiri, inquit, longitudinem parvi excedit, colore per dorsum è cæruleo virescente, per latera & ventrem candido. In Silo torrente capitur ad Tigurum circa lapides: & ex eo Limagum amnem ingreditur, inter lautos pisciculos habitus Rondeletio suus Cobites carne est humida, & viscida: si in aqua sordida & cœnosa nutriantur, pinguescit; sed multo insalubrior redditur. Pro Cobite Rondeletii nos aliam iconem dedimus, ejusdem ni fallor, piscis.

## ARTICULUS II.

De Cobitide aculeata.

**C**obites *aculeata*, quæ Mustela parva imberbis dici posset, Gallis est Perce, quod Petras quasi videantur perforare (duos habent in branchiis aculeos, utrinque unum, ad caudam spectantes, dentium cerasitis longitudine, quibus sese impellunt, ut minima inter lapides foraminula subeant) Germanis Steinbeis, seu Dacobythus, Oxyrinchus non incommode, aliis. Pisciculus est inquit Albertus, eodem colore quo Fundula. Non est autem rotundus, sed quasi columnalis compressus, & habet spinam acutam juxta os, qua cum recurvato capite vulnerat manum se tangentis. Bellonius quoque & Rondeletius aculeum in operculis branchiarum utrinque unum habere tradunt. Albertus branchiis ipsum carere omnino ait; cujus errorem detegit nuper Georgius Fabricius, qui parva foramina circa oculos eis, sicut in Lampredis, inesse observavit, teste Gesnero, qui pisciculum esse ait exilem seu tenuem, & oblongum. Fundulo, de quo mox, similem, paulo longiorem: nam quatuor aut quinque digitos æquare solere: maculosum, capite acuto & deorsum vergente. Rondeletius spinam internam duram quam in precedenti rigidiorē esse monet, ideoque inter edendum molestiorem esse: sæpius vero etiam ichtyopolas parum cautis imponere, & pro levibus vendere, cæterum imposturam inter edendum facile deprehendi. *Degit* in aquis fontanis & rivis præcipue. Ex his vero mi-

grans cum alios fluvios, tum Albi maxime subit, ut Gesnerus refert, qui & apud suos nullum aut certe rarissimum esse scribit, circa Argentinam vero frequentiorē, & ex Georgii Fabricii testimonio in Misena optimos capi in Mulda prope Doblam oppidum: in herbis, algis & cœno *degere*, atque inde *viſitare*. Majo mense cum Fundulis parere, aliquando vel bis vel ter. Rostro lapidibus mordicus se affigere, & aliquando vasis etiam, licet æneis, quibus in foro piscatorio à mulieribus, inquit, injiciuntur, ita ut fugere videantur. Esse quando complures gregatim hærentes inveniuntur. Rebus angustis, id est, quorum perangustæ sunt maculæ, capi, cum aliis pisciculis circa ripas fluminum. Bellonius pisciculum esse scribit admodum *vivacem*. Eidem delicatissimus est: contra insinuare nobis videtur Rondeletius in cautis pro lævi Cotitide obtrudi iniquis, fraudemque edendo detegi: & Gesnerus vilissimos vocat, carne tenaci, Fundulis multo ignobiliores. Aprili mense & Majo minus improbari; præferri gravidos: frigi debere butyro: Misenos circa bacchanalia, & Martio mense eos commendare; antequam migrent, quod tum ovis gravidi sint: præstantiores apud eosdem non in Albi, sed in Mulda capi.

## ARTICULUS III.

De Cobitide Barbatula.

**C**obitis ista *Barbatula* nomen à Cirris tenuibus è rostro barbæ modo dependentibus obtinuit. Albertus M. Fondelam, Germani Grindelam vocant. Gesnerus Mustelam fluviatilem dici posse putat. Indicis digiti crassitudine est, inquit Bellonius, quinque digitos longa (pinguis Lochia) tota puncturis seu punctis distincta: notæque in tergore & lateribus habet, nunc grandes, nunc parvas ac nigricantes, quibus ipsa etiam quoddammodo pulla apparet; sed ventre candido. Pinnam utrinque unam in lateribus gerit: item in ventre duas, in tergore vero summo unam admodum parvam: item sub cauda ad anum alteram. Pinna caudæ rotunda est: reliquæ omnes, obtusæ & latæ. Cirris quaternis, utrinque, duobus (Barbi modo) tanquam mystacibus insignis est. Os habet parvum sub longo *naso*: ejusque *intestinum* statim à stomacho (quem hepar fovet) reſta per ventrem ad anum ducitur. *Fel* dextro hepatis labo adsutum: *Lienem* insignem, & rubrum habet. *Cor* sub branchiis, suo pericardio obvolutum, *ova* singulari vesicula, ut aliis piscibus bicorni folliculo conclusa. Hæc ille. Duo *genera* esse hujus pisciculi Georgius Fabricius Gesnerum in epistolâ monuit. *Unum* commune, quod in deliciis habetur, & insigni magnitudine apud suos (Misenos) capitur in Flohi amne:

N

alterum

Tab.  
XXVI.  
21. 3.  
Aldrov.  
l. 5. de  
Piscib.  
c. 30.

Tab.  
XXVI.  
22. 23.  
Aldrov.  
l. c. 31.



alterum & tenuitate corporis, & colore & sapore diversum, quod à Saxis nomen est consecutum, Steinsmirlin. Limpidis & saxatilibus *locis* gaudent, quamvis & circa ripas & in cœno, unde Mossgrundel dicuntur, reperiantur. Plurimi in rivis quibus, majora flumina ingrediuntur, capiuntur, idque præcipue Februario, Martio & Aprili. Gesnerus medio mensis Maji *captos*, ovis gravidos vidit; aitque post Pascha *parere* incipere: quamvis non desint, qui vel singulis mensibus eos parere asserant. De *Ufu* ipsorum in cibis ita Aldrovandus: Tam delicatus pisciculus est, ut Lonicerus inter omnes ferè primatum tenere scripserit. Teneros tamen præsertim & nuper natos in deliciis haberi, Gesnerus ait, eosque cum jure coctos ex eodem, quod mireris, cum pane cochlearibus edi: quas delicias, inquit, aliquando circa summum Aconium lacum gustavi. Salubres vulgo existimantur, ita ut medici etiam ægrotis alicubi eos permittant. Esse sane solidiuscula carne, & odore non piscofo, ut alii plerique sed magis grato, idem Gesnerus asserit, & cum exigui sint, nec pingues, non multum replere: præferri à Misenis majores, & qui à saxis denominantur: colore saporeque differre, corpore tenuiore, carne duriore, & quæ in elixis tenacius spinis hæreat: Commendari maxime à natali Domini usque ad Pascha, quoniam tum parere incipiant: alios Februario, Martio, Aprili mensibus eos præferre, usque ad initium Maji. Teneros verò nunquam non laudari, maxime si cum apio, petroselino, edantur. Vino calido injecto elixari debere, idque brevi tempore & sub finem modico aceto affuso, ad ejus fere consumptionem coquendos, quomodo Gobii capitati etiam parantur:

## CAPUT XIII.

De Phoxino squamoso.

Tab.  
XXVII.  
5. 6.  
Arist. H.  
A. l. 6. c.  
13. 14.

**Q**uid de Phoxino Aristotolis statuendum sit, ex ipsius verbis colligere difficile est. Statim enim ac natus est ova habere, & semel in anno in stagnis fluviorum & arundinetis lacuum, quæ *ποταμίδας* vocant, ova ponere dixit. Rondeletius eo nomine *duos* squamosos *pisces* describit. *Unus*, quem in Picardia sub nomine Rosiere vidit, dimidiati pedis longitudinem nunquam superat. Corpore est lato & compresso, oculis magnis, colore luteo, bramis minimis, corporis specie simillimus. Semper uterum *ovis* refertum habet, ideo cum illis nasci piscatores tradunt: *Alter* vocatur à rubore caudæ, Rose. Reliquo inquit corpore cæruleo est, paulo major, minus læso corpore, *ovis* semper plenus, etiam maximus. Cum priore eundem esse conjicit, qui apud Helvetios Bambela vocatur. Gesnerus, Pisciculus, inquit, est tres aut quatuor digitos longus, sex quidem digi-

tis longiorem non vidi. Caput ei crassiusculum pro sua magnitudine, nigricans, iris oculorum crocea: qui color etiam ad pinnarum initia omnia spectatur, in pinnæ dorfi quoque initio, in majoribus & adultis. *Pinnarum* ad branchias articulus veluti carunculam quandam habet, in aliis parum, in aliis valde croceam (in aliis si bene memini, rubentem) pro ætatis nimirum & sexus differentia, fortassis & aquarum & regionum, in quibus degunt. *Squamas* habet albicantes. Linea fusca obliquè à capite ad caudam fertur. Pinna in dorso medio unica est, binæ ad branchias, totidem in medio ventre, alia post anum. In principio caudæ macula atra notatur, & aliis minoribus, singulis, ad initia pinnarum utrinque. Dorsum & latera nonnihil flavescent. Sapor in *cibo* subamarus: Reperiuntur influentibus solum aquis, ut audio: non etiam in lacubus & cœno, ut læves, quos è rivis, lacus & flumina majora ingredi diximus: unde eos, læves, nostri à rivis Bachbammele nominant. Idem in Glatto flumine apud Helvetios, parvo ac cœnoso, ab iis qui caneros captant, subinde inveniuntur, & abjiciuntur. A bacchanalium vel quadragesimæ initio usque ad Calendas Maji nassas non angustius contextas, quam ut Gobi capitati & Bambelæ exiis evadere possint, in flumen immittere piscatoribus nostris licet. Bambelam nostram Itali quidam, ut audio, eodem quo Gobium fluviale nomine appellant, Varon. Verbanum vero accolæ circa Lucarnum Stornazzo, vel sterniculo.

## CAPUT XIV.

De Bubulca Bellonii, &amp; Putilo fluviali Gesneri.

**P**roximo Bubulcam Bellonii subjicimus, quia cum priori illi, quem Rosiere Piccardi vocant, cognatam Gesnerus facit. Ita verò de eo Bellonius: Sordidus admodum & vilis pisciculus Gallico vulgo è re ipsa Bouviera nuncupatur: aliis Peteuse, etymologia à bombis obscœnis tracta. Piscis est Sequanæ alumnus, non tamen usque quaque frequens, ut qui non semper appareat. Nam quomodo Verones pisciculi nusquam Augusto, Septembri, & Octobri tibi, aut saltem raro apparebunt: sic Bubulca sero in conspectum venit. Plurima vere *capitur*. Bremmam aut Castagnolam marinam toto habitu æmularetur, nisi corpore esset minimo. Planus enim & latus est: sed & argenteo nitore refulget, atque orbicularem magis habet formam, quam in longitudinem protensam. Trium digitorum longitudinem excedit, neque sequi digitalem latitudinem. Soli objecta, *nigri* nihil habere comperitur, quam in linea, quæ spinam comitatur ad caudam. Parvam in tergore gerit pinnulam, oculorum pupillam, omnem

Aldrov. l.  
5. de Pis-  
cib. c. 32.

Gesner.  
in Phox-  
in.



omnem nigredinem superantem. Squamis tegitur magnis, & latis. Carneum quiddam, ut Cyprinus (quatenus parvum magno licet conferre) in fornice palati ostendit, *branchias* utrimque quaternas simplices, ac sub ventre totidem, caudam bifurcam. Ore est parvo, dentibus vacuo. Pisciculos istos respui credo propter fellis magnitudinem, quod vix possint exenterari, quin eorum *fellis* vesica disrumpatur: quo per totum corpus diffuso, plurimum amari in vescendo sentiuntur: id autem sub hepatis lobo dextro coloris Smaragdini, magnitudine pisi continetur. *Folliculum* vento plenum in *utero* gestat geniculo interceptum: *lienem* stomacho inhaerentem, rubrum atque orbicularem. Hujus etiam intestina multis in gyrum revolutionibus & infractibus circum voluta sunt. Haftenus Belonius.

Tab. II.  
7.  
Tab.  
XXVI 9.

RUTILLO *fluviatili* à rubro pinnarum colore nomen Gesnerus, ad differentiam Erythrini veterum imposuit. Circa Comum in Lario lacu, inquit, Piota, ut circa Verbanum quoque dicitur: à Germanis Oceani accolis Roddovu vel Roddau: Sabaudis circa lacum ad Bielam & Neocomum, Vingeron, vel Vengeron, unde Germanorum Wingeron, vel contra, (quo tamen nomine Lucernæ accollæ Leucisci speciem intelligunt eam quam Vendosiam & Dardum Gallis dici indicavimus) Anglis, Roche, Polonis, Pstrega. Piscis è foro ad Gesnerum delatus, latus erat ad digitos quatuor, longus duodecim. Pupilla nigerrima, iride aurea, labiis subrubris: colore in cauda, pinnisque in ventre & ab ano sitis, cinnabarino: nam cæteræ minus rubri habent. Linea à summis branchiis caudam vertus obliqua, cauda bifurca: Supercilia & circa branchias locus, aureo colore nitent. Squamæ latae, striatae, validæ. Dorsum fuscum, venter pallidus: pinnæ quaternæ: *fel* viride, *vesica* gemina: *caro* aristis plena. In faucibus maxillas utrimque habet; recurvas dentibus minutas quinis, qui ab interiore parte singuli ferræ instar asperantur: quod in aliorum piscium dentibus nondum memini animadvertisse. Piscis hic apud nos Helveticos, *lacustris* tantum est, satis *vivax*. In nostro & Acronio lacubus, abunde capitur. Piscatores Constantiæ, & circa Acronum ajunt eum aliquando cum Cyprino lato *coire*: inde Hybridam, (*ein Halbfisch*) gigni, qui inter utrumque ambigat. Rutilo major aliquando, minor autem Cyprino lato. *Parit* Junio mense. Muscarum fluviatilium (sive lacustrium) genus est quoddam magnum, oblongo, terete, varioque corporis alveo, has infigunt hamis ad inescandos Rutilos. Februario Martioque mensibus apud alios Germanos, Novembri apud nostros *in cibo* præfertur. Majo rursus deterior fieri, & imminui incipit. Parari jubent peritiores instar Cyprini, & vino frigido immissum eli-

xari. Haftenus ex Gesnero. Putatur cum Vangerone Rondeletii esse idem. Hic autem corpore Ballero, (de quo suo loco) rostro Mugilibus similem esse ait, rostro tamen esse longiore. Dentibus carere: pinnas ad branchias duas habere subaureas, in medio ventre duas alias croceas; ab excrementi meatu unicam, in dorso aliam. Caudam in duas desinere hasque à squamis initio integri, etiamsi non adhæreant. Cyprino & corporis specie & carnis substantia succoque affinem esse, & vilem haberi.

## TITULUS II.

De Piscibus fluviatilibus lævibus.

## CAPUT I.

De Attilo Padi.

Tantum de Piscibus fluviatilibus squamosis, sequuntur Læves, inter quos præcedat *Attilus*, in Pado inertia pinguis, ad mille aliquando libras catenato captus hamo, nec nisi boum jugis extractus, ut Plinii verbis utar. Piscis est Cartilagineus, Sturioni magna ex parte respondens. Hujus enim more *ossa* gerit clypeatâ, sed ea tempore dicitur abjicere, idque in causa esse cur alii sine ossibus, alii cum ossibus depingant: post quæ, *pinna* dorfi est unica, cui parte supina subjacent duæ, quales omnino sunt Sturioni. Cauda etiam in duas deficit. Os clausum ad obliquam lineam incisum est, sed apertum & hians rotundum. Ante illud pendente rostro *appendices* carnosæ & molles. Branchias opertas habet, ad quas pinnæ sitæ sunt. Quomodo vero à Sturione, quem Franc. Philolphus Attilum esse credebat, differat. Coelius Calcagninus perquam eruditè docet his fere verbis: Quod à me percontatis, an Attilus, quem Ladanum vulgaris nomenclatura solet appellare, is sit quem Italia Moronem, Usonem Pannonia vocat: paucis respondebo, me eundem non existimare, vel ex Plinii testimonio, qui eum Pado vult peculiarem esse; quo loco de propriis quorundam annium piscibus ait. Sed ego, & tecum agam liberalius, non modo te ad Plinii, sed ad oculorum etiam tuorum testimonium provoco. Totamque itaque Attili effigiem ac membraturam quantapotui brevitate perstrinxi. Et quia non satis perspicue id fieri posset, nisi noti alicujus piscis exemplo uteremur Hyccam sive Sturionem, qui nullo ferme loco non nascitur, mihi proposuisti. Qui licet in mari natales habeat, solet tamen adversus amnes mira subire voluptate, donec jam præpinguis redeat. Moronis sive Usonis exemplo nondum dixi, quod neque ii pisces non cognoscantur, neque mihi eorum imago satis memoriæ inhaereat. Sic ergo accipè: Attilus hoc differt ab Hicca sive Sturione, quod Sturio pelagius

Tab.  
xxviii. 2.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 1.

Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 15.

Ælian.  
H. A. l.  
14. c. 26.



est. Attilus amnicus est, & Pado peculiaris. Sturio non temere visus æquare quatuor talenta Attica, id est, trecentas libras: Plinius scribit Attilum ad mille libras, id est, supra XIII. talenta excrevisse. Quæ magnitudo sane insignis & raro perspicua. Attilus cum ad certam magnitudinem excrevit, *squamas* hispidas abjicit, quas per quinque versus dispositas gerit, in summa scilicet dorsi spina ex utroque latere geminatas, & sibi quasi parallelas, extremus versus pinnas attingit. His abjectis tactu lævis evadit, nec habet quod unguem offendit. Contra Sturio semper hispidas squamas suas tota æstate retinet: Caro Sturionis callum habet, & mirifice palatum oblectat. Attili contra, fluxa est, & mollis, & palato parum jucunda. Existimant piscatores *προτομὴν*, id est, partem priorem Attili, ad posteriorem vix eam habere proportionem, quam quatuor ad unum. Tota nix hujus piscis sita est in *capite*, & parte capiti attigua. Quæ observatio etsi ad Sturionem etiam, aliosque pisces pertineat, authore Aristotele & Plinio: cujus verba sunt, videlicet capita piscibus portione corporum maxima, fortassis ut mergantur, tamen in Attilo nescio quomodo præter cæteros luculenta est atque admirabilis. Parvi sunt *oculi* Attilo, in tanta mole capitis. Sturio & Attilus habent os in parte prona, (supina dicere voluit) eo prope in loco, cui in cæteris perfectioribus animantibus, respondent, omoplateæ. Os utrique sine dentibus, sed Sturioni ferme orbiculatum. Attilo multo majus, & ad lineam obliquam incisum, quo aperto, vasto illo hiatu pisces devorat, quos respirando *κατὰ διαστολὴν* (ita piscatores putant) contaxit. *Loca* pisculenta maximè frequentat, hyberno præcipue tempore vorticosas voragines, ad quas pisces frigoris impatientes, teporis gratia se recipiunt. Rostrum Sturioni resimum ac latiusculum, ad imaginem fere Delphini & Oxyrinchi; Attili planum, & paulominus quam in mucronem desinens, Attilo tergicolor albicans & lanosus. Sturioni vergit in glaucum. Hæc itaq; Coelius. De ejus cum clupea inimicitia ita Plinius: Minimus hunc piscis, appellatus Clupea, venam quandam ejus in faucibus mira cupidine appetens, morlu exanimat.

## CAPUT II.

De Antaceo Borystheneis Rondeletii,  
& Stellari.

Tab.  
xxviii. 5.  
Tab.  
XXV. 5.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 2.

**A**Ntacæi pisces dicuntur prægrandes, inquit Rondeletius, & vastæ magnitudinis in Mæotide & Borysthene; quos aliquando in ostiis in glaciæ concretos effodi author est Strabo. (Nec alios, ut conjicio, Solinus intelligit, inquiens: Apud Nuros nascitur Borystheneis flumen, in quo pisces egregii saporis, & quibus ossa nulla sunt, nec aliud quam Cartilaginis tenerimæ. Nec

dubito, quin Plinius de his loquatur his verbis: Et in Danubio Mario extrahitur porculo marino similis. Et in Borysthene memoratur præcipua magnitudo nullis ossibus spinisque interstitis.) Ex his falsamenta fiebant, præsertim ex maxillis & iis quæ circa palatum sunt partibus, quod eæ partes aliis suavitate præstarent. Ex his igitur unus est, quem hic proponimus rostro oblongo, acuto, *oris* vasto & rotundo hiatu in supina parte Bellonius similem figuram exhibet Attili nomine, nisi quod unicam ei tantum in dorso pinnam appinxerit. Ingentis, (inquit) est magnitudinis: Cætera Sturionem tam internis quam externis partibus refert, hoc dempto, quod pro eminentioribus ac callosis illis elatis tuberculis, quibus Sturio quinque carinis præditus est; hic stigmatis tantum lividis sessilibusque maculis in cute minus aspera, ad latera sit distinctus: Præterea unicam tantum *pinnam* ab ano ad caudam gerit. Sturio autem duas habet. Cæterum *os* Attilo prominet oblongum, fistulosum, sublongo etiam naso. Hactenus Bellonius, qui deinceps nonnulla de hoc pisce scribit, quæ vero Attilo conveniunt.

ANTACÆUS STELLARIS in Danubio prope Straubingam captus, & depictus, ad Gesnerum missus est. Colorem ubique ferè cæruleum ostendebat, venter erat candidior ad roseum inclinans. Spinæ in dorso & stellæ pallidi coloris puncta etiam passim ex pallido albicantia, vel fusci Indici coloris. Cognatus huic est, qui ick vel Tick vocatur, & in Danubio circa Pestam vel Budam capitur, mole corporis quæ ad XXV. libras accedat, cute varia undiquaque stellata, sed rostro longiore & graciliore quam vel in Hufone, anserino fere simili.

## CAPUT III.

De Ichtyocolla.

**I**chtyocollæ meminit Plinius ex veteribus dum inquit: Ichtyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium, idemque nomen glutini ejus. Quidam piscem Judaicum vocari scribunt, quod nomen Zyganæ apud Parisienses competit, alii Antacæm ab Herodoto, à Pomponio Magnum vocari dicunt, nonnulli Plinii Marionem appellant. Bellon. Tanais accolis *Barbotam* dici, quod quaternis veluti barbis ad labia sit communitus, prodidit. Nec alium Dioscorides intellexit, cum gluten ventrem esse piscis cetacei, laudarique candicans, ratione Ponticum scripsit. Tale enim & hodie exeique intestino ex Ponto mittitur. Est autem Piscis cetaceus figura oblonga ac prope tereti. Ossibus ac spinis caret, capite est crasso & lato, ore magno & in promptu posito: è superiore maxilla 4. apophyses carnosæ, velut barbæ dependent, unde Barbotta dicitur. Oculos parvos

Tab.  
XXIX.  
16.  
Plin. II.  
N 1. 32.  
c. 7.

Diosc. M.  
M. l. 3. c.  
102.

habet



Bellon.  
de Piscib.  
l. 2.

habet pro corporis magnitudine. Bellonius ait hoc à Sturione atque Artilo præcipue differre, quod rostro careat, magnum oris rictum præ se ferat, sitque sublutea, dura, lævi ac glabra cute convestita carne. Bina antè oculorum canthum, parva atque aperta foramina habet: pinnas in tergore duas (quas aliter Rondeletius, aliter Bellonius pingit) ad caudam erectas. Branchiæ veluti spineo tegmine communiuntur. Sturionis modo: Cauda quam huic magis bifurca, præcipua à cæteris piscibus nota discernitur, quod paulo supra spineum operimentum branchiarum, quodam ad ejus latera impresso foramine pervius sit. *Folliculus*, sive vésica, ex qua glutinum fit à capite ad caudam, per spinæ longitudinem extenditur. *Carne* est secundum Rondeletium prædulci, & glutinosa admodum, ob id salituræ idonea, qua melior redditur & rubescens Salmonis modo, atque etiam durior, quam ob causam aliquandiu maceranda, priusquam coquatur. Eam Tanais & Ponti accolæ Romam & Venetias transmittunt, illucque in foro piscatorio venditur. Ichtyocola authore Plinio epinyctides tollit, erugat cutem, extenditque in aqua decocta horis quatuor, denuo contusa, colluta & subacta ad liquorem usque mollis. Ita præparata in vase novo conditur, & in usu quatuor drachmis ejus, binæ sulphuris, & anchusæ totidem, octo spumæ argenteæ adduntur, aspersaque aqua teruntur una. Sic illita facies, post quatuor horas abluitur. Idem alibi. Lethargicos (inquit) coagulum vituli adjuvat in vino polum oboli pondere: idem Ichtyocollæ. Valet ad conglutinandas omnis generis chartas, atque instrumenta musica, reliquaque lignaria incrustamenta, quæ tessellato, imbricato, & vermiculato opere fiunt.

## CAPUT IV.

De Glanide.

Tab.  
xxvij. 8.

**P**iscis, qui Aristoteli & Pausaniæ Glanis, Plinio sæpe Silurus, aliquando Glanis, Glanus, & Glanius vocatur. Ab Æliano Siluro explicatur. Veteres sequuntur recentium plurimi, interque hoc Gesnerus & Schonfeldius, nos quid sentiremus, superius diximus. Nomen à Glanide Italiæ & Cunnæ fluvio accepit, si Stephanum sequimur, ejusdemque vestigia apud Byzantinorum vulgus, qui hodieque Glangnum, teste Manardo, vocant, quasi Glanum, retinet. Descriptionem quod attinet, sunt ipsi spinæ pro ossibus non Cartilagine. *Corpus* fuscum, nigris maculis plenum, squamæ nullæ, corium satis crassum, & lubricum. Caput grande, depressum. Os obtusum. Oculi parvi. Rictus amplus & ad capitis latitudinem patulus. Labia superiora gemino, inferiora unico ordine denticulorum confusaneorum, in-

trorsum reclinatorum aspera, quibus prædam retinet. *Fauces* binis utrinque ossiculis, limæ instar asperæ sunt. A labro inferiore dependent barbulæ quatuor, tenues, oblongæ, pallidæ, à superiore duæ, ejusdem coloris, duræ, longissimæ, prætenturarum instar, quas ante se modo exerit, modo componit. *Pinna* illi in dorso post cervicem unica est, parva, quatuor aut quinque fibris elata, post branchias duæ: quarum primæ, faucesque proximè spectans, aculeo constat ossæo, duro, quo infestos sibi pisces arcet, &c.

*Venter* magnus est, deformis, & subalbidus, obscurè fuscis lituris conspersus. *Cor* inter branchias utrinque quaternas situm est, à reliquo diaphragmate separatum, quod gula ampla perforat, à qua ventriculus dependet, & intestina, quæ unica revolutione in anum desinunt. Ventriculo incumbit *Epar*, ex rubro pallens, duobus lobis distinctum, cui vesicula fellis diluti aquei, adhæret. Dorso adjacet vesica simplex, peritonæum candidum est.

Ad multam magnitudinem excrescit: non solum enim ducentarum librarum, sed major etiam capi solet. Gesnerus testimonio eruditi cujusdam Ungari in Tibisco, qui Daciæ fluvius Danubio miscetur, aliquando captum fuisse scribit septem vel octo cubitorum, plaustrum occupantem: eum in fluvio annis sedecim sub culina Viri cujusdam nobilis latuisse: hamo tandem inescatum esse, dum fæturam suam custodiret: ubi se captum sensit exsiliisse, secutos impetum ejus pisces ad milliaria duo, denique defatigatum cœpisse: barbas eum supra infraque os habere, rictum latum, caudam versus attenuari. *Dentes* habere instar pectinis illius quo lanæ vestes depectuntur, à carduis denominati vulgo: squamis carere: in aquis cœnosis *versari*. Ipse vero Gesnerus dentes habere negat, sed labia limæ instar exasperari, atque ita prædam faciliè retinere: retentam mandere & comminuere: ei opus non esse, sed faucibus & gula maximè patentibus integram vorare. Idem & in Viadro apud Silesios tantum esse scribit, ut captus, impositus currui, plerumque ultra currum emineat. Variat ab isto ille cujus Gesnerus Iconem sub Siluri tertii nomine ponit. Piscis, inquit, Similitudinem aliquam cum Mustelis fluviorum & lacuum habet. Oculi sunt parvi: barbulæ fuscæ, non longæ, è crassiusculis paulatim attenuantur, binæ superiore labro, ternæ inferiore. Pinnæ ad branchias binæ, in dorso nullam ostendit pictura; sed tantum carunculam quandam mucronatam eminentem, qualis & in Mustela palustri majore, eodem fere loco vesitur. In ventre vero una & continua longissima pinna ad caudam usque albicat, maculis distincta fuscis. Corpus à capite retrorsum subinde attenuatur, finis latiusculus & obliquus est, &

Schon-  
feldt. Ich-  
tyol. pag.  
69.



quid mireris nullam caudæ pinnam habent. Os magnum & latum. Capitis colore cæruleo subviridis; reliquum corpus viridi & flavo colore mixto pingitur, sed maculas etiam diverſi coloris habet. Hujus generis duos in ſuo ſtagno civis quidam aluit, qui cum ante annos triginta ſex, (verba ſunt Stuibii ad Geſiterum) ad Hundsfelden in Rheno cum aliis piſcibus illis quos Argentinae vocant Ruſelken, ſimul naſſa capti eſſent, vix digiti longitudine, & Argentina in forum adveſti, à cive quodam raritatis gratia empti, in piſcinam conjeſti ſunt, in qua alter ab eo tempore uſque adeo excrevit, ut jam ſex cum dimidio pedes meos (hominis mediocriſ proceritatem aut amplius) longitudine contineat. Caput qua craſſiſſimum eſt, filo complexus, duorum pedum & dimidii fere circumferentiam deprehendi. Alter huic per omnia ſimilis, ſed longitudine longe eſt inferior. Major ille piſcibus quibuiſvis, excepto carpine, ſive vivis ſive mortuis, veſcitur. Hyeme nihil quicquam guſtare unquam viſus eſt. Cornua quæ ſupra & infra os habet, quotannis decidunt, & rufus nova ſuccreſcunt, ſicuti cerviſ.

Ælian.  
H. A. l.  
12. c. 29.

Reperiebatur in pluribus fluminibus tempore Æliani; temporibus Plinii præcipue in Moeno, niſi Rhenum velis legere. In Æno graſſatum quem quidam Moeno & Rheno ſubſtituunt prope Viſbium, quod ad ejus amnis oſtia conditum Aventinus prodiſ, tanquam loco magis cœnoſo, veriſimile eſt. In Cydno Ciciliae fluvio procreatos ſed minutos, quod ejus confluenſ nitidus & frigidus apud Ælianum habetur. Pyramus, Sarrus, Orontes plurimos produciunt, quia limoſi nec pauciores in Ptolomæorum fluvio, Apamienſi ſtagno. In Bubafſto Ægyptia circueſaluntur plurimi. Strabo, & Athenæus, dum Siluros in Nilo eſſe ſcribunt, Glanides intelligunt, non Sturiones. Nam qui è mari fluvios ſubeunt, præter Delphinum Mugilem & Aloſam, nullus alius Nilum intrat propter Crocodilos. Plinius dum maris peculiarem facit Gladinem, fallitur. Exprefſe Schonfeldius: Fluviatile hoc animal eſt, nec unquam aquam ſalſam ingreditur: ubi circa Hamburgum capitur, ſtatim Albis ex aquis pluviis aut nivalibus exæſtuantis metu eſt, quas ut paſſim ex locis montoliſ, ſtagniſ ſeu lacubus collectas, fugiens, Silurus cedit, & partes Albis ſpacioſiores ſequitur: Reperitur & in Iſtro, Tibiſco, Viſtula. In Helveti. ſtagniſ pauciſſimæ capiuntur in Bernenſibus Neocomenſi & Moretano aliquando. Veſcitur carniſ; nec minoribus duntaxat piſculiſ ventrem implet, ſed & in majores, imo homines & equos graſſatur. Captum in Pannonia fama receptum, in cuius viſceribus humana manus ornata annuliſ reperta ſit. Puerum in Danubio ad Poſoniam natantem ab hoc piſce devoratum, & in capti viſceri-

bus fragmenta ejuſdem reperta, à fide digniſ Pannoniſ prodiſtum eſt. In ejus, quem ſub culina viri cujuſdam Nobiliſ latuiſſe ſupra diximus ventre, caput humanum cum dextera manu & tribus annuliſ aureiſ inventum eſt. Ariſtoteles dentiſ duntaxat valere, & ἀγνιστοφάγον eſſe ſcripſit. Cauda concuſſa, piſces præſertim minores ori admoveſt. Caniculae exortu ſideratur, & alias fulgure ſopitur. De Coitu & partu apud Ariſtotelem legimus. Cohærentes foetus edere, ſicut & ranas. Majores profundis aquis parere, quippe nonnullos etiam ubi ſenſum pedum altitudo ſit: minores, lociſ brevioriſ ferè ad radiceſ ſaliciſ, aut alteriſ arboriſ cuiuſpiam, juxtaque arundineſ, atque etiam muſcum. Tardiſſimum eiſ ex oviſ incrementum: atque idcirco aſſidet maſ, quadragenos, quinquagenoſque dieſ, ne devoretur foetus ab occurrentiſ piſcibuſ. Eodem quoque die, aut etiam poſt, capiunt ova incrementum, quæ contigerit ſemen. Glanii ad ervi magnitudinem. Quantum ad Uſum in cibiſ, Salvianuſ duram carnem habere ſcribit. In Germania & Polonia pinguiſ eſt, & boni ſaporis: laudaturque; in cibo tum recens, tum ſale condituſ. Circa feſtum Johanniſ optimuſ eſt, trium libraruſ imprimiſ Obſonatoreſ venam candidam, quam per ſpinam, doſi tenuiſſimo tectam involuero, tranſire, Benediſtuſ Martinuſ ſcribit, tanquam venenatam eximunt.

Ariſt. H.  
A. l. 9.  
c. 37.  
Ariſtot.  
H. A. l.  
8. c. 20.  
Ariſtot.  
H. A. l.  
6. c. 14.

## CAPUT V.

### De Barbota Gallorum.

**A** Glani, licet maximo piſce, non malè de hoc parvo dicetur, ob corporiſ barbæque ſimilitudinem. Galli vulgo Barbotam vocant, non à barbiſ (inquit Belloniſ) aut arunco, ſed ex hoc, quod Galli barborare, cœnum & lutum roſtro, anſerum modo commovere dicunt. Ipſe Clariam fluviatilem vocat, ſed cum Lota Lugdunenſium de quo ſuo loco; implicat. Anguillae, aut Congri modo glabram cutem habet, atque idem caput. Cirro recto breviſque & ſimplici in maxilla inferiori barbatur. Continuum in tergo pinnam gerit mollem, ad caudam (quæ illi rotunda eſt) deſinentem. In nonnulliſ duaſ pinnaſ, ut in Icone, quam à Bellonio miſſam ex Rondeletio exhibemus; in tergo videas: quarum exigua eſt, quæ capiti magiſ eſt vicina, ſed & inter anum & caudam ruriſ aliam pinnam gerit: unam præterea utriſque in lateriſ circa Branchiaſ, quaſ utriſque quaternas habet: duaſ vero ſub ventre capiti multum propinquas. Cæterum duaſ in inferiori maxilla habet denticulorum ordineſ admodum parvoſ: atque in ſuperiori maxilla totidem, ut nihil quam aſperitaſ in eiſ ſentiatuſ: nam alioſ etiam in fornice palati gerit. Terguſ & latera fulvum vel ſublividum colorem ha-

Tab.  
XXVII.  
9  
Bellon. de  
Aquatil.  
l. 1.

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 11.



habent: *venter* autem albicat. Semipedalem non excedit longitudinem. *Hepar* lobum oblongum ad sinistrum latus demittit, sub quo est *Stomachus*. In pyloro apophyses, seu cæcos viginti quinque connumerare potes: *lienem* quoque videas, neque dextro neque sinistro, sed in medio spina stomacho inhaerentem. *Anus* ejus propinquior est capiti, quam caudæ. *Intestina* pluribus quam tribus inflexionibus non circumducuntur. *Ova* in bicorni vulva fert utrinque permulta. Huc ferè Bellonius. Vita & moribus cum *Lota* Lugdunensium convenit. *Hepar* magnum habet ac delicatum; Carnem quam *Lota* glutinosiorem: mucore & cœno vescitur, in eoque delitescit.

## CAPUT VI.

*De Mustella fluviatili & lacustri.*

Tab.  
xxviii. 6.  
7. 8. 9.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 7.  
Cardan.  
Variet.  
Rer. l.  
17. 37.

**Q**Uam nos Mustellam vocamus, illam Jovius inter Larii pisces Trisium Latine dixit. Mediolanenses Bottam vocant, seu quod utri similis sit, ut Cardanus scribit; seu quod capite ranas referat. Insubri alii Botetrissias dixere. Specie fluviatiles è Lacustribus apud suos differre Gesnerus asserit; Esse enim minores, colore nigricare, carne albiore, solidioreque in cibo lautiores; duabus per dorsum pinnis, quamobrem separatim etiam describit. Cæterum corpus ait esse utrisque lubricum sine squamis (licet quibusdam, inquit, squamulæ minimæ radendo appareant) flexuosum, quod caudam versus attenuatur veluti in taniam. Coloris varietas maculosa, pinna ab ano ad caudam ferè, oblonga. Binæ omnibus ad branchias, & binæ aliæ eodem circulo inter caput & ventrem: pupilla *oculorum* alba, pars ambiens nigra. Branchiæ quaternæ simplices. *Caput* magnum, latum, & veluti compressum. In cerebro lapilli. Os grande rescissum. Barbulae circa os infra supraque; numero & magnitudine differentes in diversis generibus. *Dentes* nulli, sed veluti in lima exasperatum os. Voracitas, piscium quos devorare possunt. *Caro* mollis & dulcis. *Iecur* magnum in delitiis. *Vesica* (aut folliculus) nulla, *intestinum* parum anfractuosum, fere simplex. *Stomachus*: ab eo ventriculus, & in circuitu multæ appendices. Iam vero *Botarissiam fluviatilem* fœminam (eam intelligit quam nigricantem modo dixi.) Januario mense diligenter contemplatus his verbis (ex quibus tamen etiam nonnulla aliis hujus generis speciebus conveniunt,) descripsit. Piscis est forma & flexibus serpentem ferè referens: Capite lato, caudam versus valde attenuatur. *Brachia* ei quaternæ. *Pinna* ad latera brachiarum utrimque una nigricat: & aliæ duæ paulo inferius in pectore parvæ albicant à podice exorta una oblonga, paulo citra

caudam definit: item in dorso oblongior alia, ultra medium dorsum continua tradit: & alia ante ea minor caput versus, quam pictor in Icone per incuriam non expressit. Pinnæ omnes molles sunt & sine spinis. Caruncula sub mento, pili instar prominet. *Cauda* non bifurca, sed circularis, nusquam omnino divisa, sed ubique sibi instar membranæ continua: Colore vario, è fusco & nigro dorsum tenerum albicat: latera juxta dorsum minimis punctis nigris in colore subalbido distincta sunt. *Os* aperitur hiatu rotundo, totus piscis sine *squamis* & viscosus est. Maxillæ minimis *denticulus* ferratæ. Color subalbidus (linea subalba nimirum) à capite incipiens oblique per latera caudam versus procedit. Nam cauda in colore nigricante variat. Membranea vero caudæ extremitas partim nigricat partim subflava est. *Lapillos* duos in capite gerit, albißimos & bene duros, figura & magnitudine granorum oryzæ. *Lacustris* modò in Trissia in Griffiolacu capta ab eodem considerata hujusmodi erat. Longa dodrantes duos cum palmo: filum ambiens Ventrem trium palmorum. *Denticuli* minimi, frequentes, ut serpentium. Superior pars oris duos ordines dentium habet, unum scilicet interius in medio, cui nullus respondet infra. Sunt & in intimo oris recessu, duo denticulorum ordines seu in maculis duabus. Branchiæ quaternæ. *Squamula*, rotundæ minimæ, quæ dum pellis cultro raditur, apparent, in parvis generibus v. tum fluviatili, tum Lacustri luteo minore nullo prorsus, per *cutim* passim ceu foramina, ceu puncta cava rotunda, conspiciuntur; quæ si quis caput versus validè radat, albißima videntur: sin iterum caudam versus, rursus obscurentur. In ventre meatos duo; unus excrementi, alter genituræ: qui compressus lacteo focco manabat. Et rursus alias *alia ex lacu* hujusmodi: subflava, punctis nigris, barbula à mento demissa, albicans. Ante initium pinnarum in dorso carnosæ particula, mollis, teres, intusque cava, prominet. Inde mox sequitur pinna brevis, longitudine pollicis: deinde una continua, octo vel novem digitos longa, ab ea nudum pinnis dorsum est, per tres fere digitos: cum sequuntur aliæ duæ parvæ, triangulares fere, inter quas digiti propemodum spatium intercedit: ex quibus infima & ultima, minor & caudæ conjuncta est. *Fel* subviride: vesicula ejus tum jecori tum intestinis affixa. In ventriculo pisces duo integri erant, uterque digitos septem longus, tres latus: nec aliud quicquam. Pondus totius, uncie quinquaginta. *Costæ* pellis subviridi & deformi colore erat, caro albißima, bona, satis solida. *Iecur* album, non ut in minoribus subruffum, grande, suavissimum. In *alia Trissia parva*, *fluviatili*, forte digitos decem longa, pinnæ dorssi inquit, sic sunt: Primum, caruncula illi brevis non est, sed pin-



pinnula digito brevior: & minimo spacio intercedente, alia duos digitos longa: deinde post spatium duorum digitorum, alia paulo brevior, media, & mox cauda. Rursus ab hac differt alia, paulo longior, (ut semel animadverti: non enim simpliciter hæc accipi debent, quod ad magnitudines & colores) cui minus erat flavi in corpore, plus nigri, & ejus splendidioris. Primum enim pinna illi brevis est, deinde una longa continua usque ad initium caudæ: Ergo magna Trissia lacustris; præter carunculum illam, pinnas in dorso quaternas habet, ex minoribus, nigricans binas; luteola verò major ternas, minor binas: si modo species duæ sint luteolæ: quod accuratius considerandum est: Minoribus lacuum Trissis pinnae in dorso binæ, adeo propinquæ invicem sunt, ut unica putentur: Colore fusco, non pulchro. Differentia à pinnis certior: nam colores multas ob causas variare possunt. In Rheno supra Acronium lacum aliquando ad tres libras sedecim unciarum accedunt. Constantiæ tanta capta, ut drachmis duabus cum dimidia venderetur. Captæ & Pragæ aliquando, pulcherrimæ, coloribus distinctæ, flavo, croceo, candido, roseo, atro, oculorum pupilla nigra, parte ambiente cærulea. Nigriores circa ripas fieri, magis in profundo flavas, quibusdam placuit. *Carnivora* sunt, nec ullus piscis pro sua magnitudine majores pisces devorat. Profunda petunt, adeo, ut Albertus scribat, in lacu circa Constantiam ad trecentos passus sub aqua hamis extrahi: sæpe cum ranis extrahuntur; quæ quia illis ore adhærent, tanquam ex fugendi cibi gratia, ideo ore cum ranis aquaticis coire, quidam prodiderunt. *Parere* incipiunt Decembri, alicubi & Januario. Solæ piscium fenestrate *obscantur*. Maximè commendantur *in cibis*, illæ in primis, quæ in puris rapidisque fluviis degunt; quod candidiorem ac solidiorem carnem habeant. In jecinoribus tanta saporis gratia est, ut apud Thuringos olim comitis cujusdam Bichlingorum matronam, omnes, dicant, principatus sui reditus in eorum delicias consumsisse. Laudantur hæc præcipuè ante Natalem Dominicum: circa partum improbantur, quod hoc tempore nonnullis in aquis grandinosa fiant. *Ova* ajunt semper valde noxia esse, quibusdam in locis, ut circa Neocomensem lacum Sabaudia. Caupones aliqui excisis jecinoribus, pisces vivos aquæ reddunt, confuto prius vulnere. *Ventriculum* hujus piscis cum suis appendicibus miras habere vires tradit Encelius. Inveteratum enim, ut fit (inquit) in Saxonia à matronis, trahere mirifice secundas hærentes aut relictas in partu, in potu datum: & magni momenti esse ad omnia vitia matricis. In Suevia passim in Cauponis & diversoriis parietibus hærentes hi ventriculi circa Zetarum fornaces visuntur, ab

edentibus illuc rejecti, ut exsiccati ferventur, & cum potione aliqua hausti à colios cruciatibus liberent. Colligi ajunt & oleum ex hepate ad solum vel ad fornacis calorem suspenso, intra vas vitreum: clarum id & flavum esse, adversus oculorum suffusiones utile, item nubeculas & maculas, quæ ab angulis oculorum nasci incipiunt.

N. *Mustelæ marinæ* Iconem vide, Tab. 46.

## CAPUT VII.

### De Pisibus Fossilibus.

**P**iscium Fossilium & Veteres & moderni meminere. Ex illis ita de eorum natura & ortu Theophrastus: Pisces alicubi fossiles sunt, ut circa Heracleam & alibi in Ponto. Nascuntur autem circa fluvios, & aquosa loca, quæ cum siccantur (certis temporibus) paulatim, pisces subinde humorem sectando terram subeunt: qua demum siccata, remanent in ea, veluti vivi sepulti, velut animalia quædam in suis latibulis hyeme condita durant, sine sensu ferè & motu torpida. Quod si loca illa priusquam denuò aqua accedat, fodiantur, pisces illi moventur. Sic & in Ponto contingit pisces glacie & gelu occupari, neque sentire, aut moveri prius, quàm in ollas coquendi injiciantur. Præcæteris autem Gobio hoc accidere videtur. Ferè autem fossiles pisces fiunt, eo quod ab inundatione fluviorum, in locis quæ resiccantur, vel ova, vel alia principia gignendis idonea piscibus relinquuntur. Nonnulla enim non ex ovis oriuntur, ut Anguilla & Centriscus. Et hoc in Heraclea, circa Lycum fluvium contingit. Principia autem hæc in terrâ relictâ, perficiuntur, durantque. Neque absurdum est hos pisces durare.

Multa enim hujusmodi animalium exiguo egent nutrimento, sicuti serpentes quoque & quæ latibulis se abdunt. Primum scilicet ipsa ova humore è terra manante, deinde eodem nati ex ovis pisces nutriuntur. Ad magnitudinem tamen aliquam eos crescere neque verisimile est, neque fertur, cum & loci angustia & alimenti penuria impediunt. Cæterum durare in aëre hi pisces non æquè valent, ac illi qui ab aquis ad pastum egrediuntur; qui scilicet exigua refrigeratione, & quæ ab aëre eis præstari possit, indigent; nam vel ipsa branchiarum angustia indicat, non multa refrigeratione eis opus esse; quamobrem & Anguilla tum in aëre multum temporis vivit, tum in aquis turbidis illico suffocatur. Et similiter fossiles pisces à terra eos ambiente, quantum satis est, refrigerantur. Sed quod circa fossiles in Pophlagonia pisces contingit, peculiarem & abditam rationem habet. Illic enim profunde admodum multos & bonos pisces effodi ajunt: cum neque inundare aquam

Tab.  
xxvi ij. 8.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 9.



aquam animum iis in locis neque aliter colligi animadvertatur, unde semina & principia generationis relinqui dicimus. Reliquum est, ut sua sponte nascantur, idque continuò. Neque enim coire inter se possunt. Aut igitur hoc fieri existimandum est ratione loci, qui humidus sit, & omnino ferax huiusmodi piscium propter certam humidi calidique commodationem. Oriuntur autem & alii quandoque quidam pisces spontè; aut humores quosdam alicunde manare cogitandum est, qui generationis principia secum adferant: quæ mox locus idoneus & recipiat & alat. Præterea hoc inquirendum de utrisque, tum illis qui in aëre vivunt, tum fossilibus, utrum in aquam immissi vivere valeant, aut in proprio duntaxat loco, qui eis naturalis sit, sicuti sua & marinis & fluviatilibus aqua. Nam ex his quoque non nisi pauci mutationem sustinent. Nam qui in aquis resiccatis terram fubeunt, & qui glacie gelati detinentur, iis familiarum esse humorem magis quam aliis (è fossilium genere) constat. Ergo piscium alii simplicis naturæ videri debent, alii amphibii secundum Democritum, ut & aliæ quædam animantes. Utuntur enim aëre quædam (ex aquaticis) ut prædictum est. Theophrastum sequitur Plinius, dum inquit: Circa Heracleam & Cromnam (aliàs additur, & Lycum amnem: probè nimirum, mox enim sequitur) eodemque Lyco amne, & multifariam in Ponto unum genus esse Theophrastus prodit, quod extremas fluminum aquas sectetur, cavernasque faciat sibi in terra, atque in his vivat, etiam reciprocis annibus ficcato littore, effodi ergo: motu demum corporum vivere eos approbant. Circa Heracleam eandem eodemque Lyco amne decedente, ovis relictis in limo generari pisces, qui ad pabula petenda palpitent, exiguis branchiis, quod fieri non indigo humoris, propter quod & Anguillas diutius vivere exemptas aquis. Ova autem in succo maturari, ut testudinim. Eadem in Ponti regione apprehendi glacie piscium maximi Gobiones, non nisi patinarum calore vitalem motum fatentes. In his quidem, tametsi mirabilis, est tamen aliqua ratio. Idem tradit in Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis terrenos, altis scrobibus, in his locis, ubi nullæ restagnant aquæ, miraturque & ipse gigni sine coitu. Humoris quidem vim aliquam inesse, quam (qualem &) puteis arbitratur, cum in nonnullis reperiantur pisces. Quicquid est, hoc certe minus admirabile talparum facit vita subterranei animalis, nisi forte vermium terrenorum & piscibus natura est. *Neotericis* est piscis fossilis ille, quem Germani *Beisker*, alii *Peisker*, quidam

Meerputten vocant. *Duorum* sunt *Agricolæ generum*. *Majores* nempe, & *minores*. Sonum omnes edunt acutum. E fluminibus, quæ currunt in locis paludosis egressi, per riparum venas longius, & interdum in proximi oppidi cellas, neque subterraneas penetrant. Quidam Eruditi *Mustellam fossillem* vocant, eamque ita descripsit Fabricius: Longitudine est palmi crassitudine digiti, quanquam multò majores etiam reperiuntur. (Agricola palmos quatuor longos majores esse scripsit.) Dorsum coloris cinerei: cum punctis multis, maculisque transversis, partim nigris, partim cæruleis. In lateribus linea utrinque nigra & alba. Venter flavus cum maculis albis; & punctis rubris ac nigris, ita parvis ac si acu factæ essent. Ab ore carneæ particulæ eminent, quos nando extendunt; extra aquam contrahunt. In Misena trans Albim duobus locis, quod scio fodiuntur. Ad Polnitium amnem; prope Orlantem: & ad Dobram rivum prope Hanam oppidum. Item in pratis ad Rederam fluvium copiosè effodiuntur, si flumen inundet. Ex terræ cavernis etiam ingrediuntur lacus & paludes: Cum aquæ extra ripas excreverunt, è terra prodeunt: aquis autem residentibus, in pratis campisque relinquuntur, & ubi greges sunt, relictis vorantur à suis. Sordes amant, & in cloacas, quæ alia purgari ratione nequeunt, injecti, omnia consumunt. Cum in rivis paludibusque capiuntur recentes, solent à tenuioribus etiam mensis adhiberi. Serviunt imprimis fraudi agytarum, qui eos alunt, & vitris inclusos multitudini ostentant pro serpentibus, quia forma à parvo serpente non multum figura differunt. Sunt qui eos spirare putent. Ubi enim plures hujus generis pisces simul sunt, spuma supra eos effertur. Vitro inclusi ore angusto, *crescunt*, & suo quodam succo vivunt usque ad semestrem.

## CAPUT VIII.

*De Lampetra Fluviali, & Vario, seu Phoxino levi.*

**Q**UAM nos *Lampetram fluviatilem* dicimus, in Tholosanis Chatillou, à titillatione, quod cum manu tenetur, quasi titillationis sensu variis fluxibus videatur contorquere se & elabi; Germanus Neunaug seu *ινίοφθαλμο* dicitur. Marinis, inquit Rondeletius, partibus internis & externis & colore similes, sola magnitudine differunt: quædam enim magnitudine: aliæ vermibus terrestribus crassioribus assimilantur. Caro est tenax, *spina* nulla; pro spina dorsi, unus

Tab.  
xxvii.  
IO. II.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 9.



continuus nervus cavus, quo humor albus continetur, simplex, absque ullis nervorum costarumve ramulis. Intestina tenuissima. *Ventriculus* vix apparet: nec mirum cum solo suctu vivat. Foramen in capite supra, sicut *Lampetræ* majores, habet. In fluviis & rivulis in quibus capiuntur, nasci vel inde liquet, quod nullis marinis *Lampetris* ibi aditus patere possit, cum neque illi in mare confluant, neque mare cum iis ulla parte sit conjunctum. Capiuntur sæpius reti cum Variis sive Phoxinis pisciculis. Vescuntur luto & aqua, iisdem Locis degunt quibus vermes: Autumno in brumam usque in Albicapiuntur, torrentur recentes in craticula, aceto condiuntur, & vasis ligneis exceptæ, in varia loca distrahuntur. Vernis quadragesimo jejuniis gratum delicatulis obsonium. Salitæ item leviter, fumo indurantur. Carne sunt satis molli & glutinosa, quod quantulumcumque est vitii, conditum & coctum facile beneficio corrigitur, nisi aquæ in qua vixerunt vitio, plus solito virosæ fuerint.

Tab.  
xxviii. 1.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 10.

VARIUM seu PHOXINUM lævem, Romani *Morellam* quod nigris punctis & tenuissimis lituris sugilletur, Insuores Sanguinerol à rubore, dicunt: Rondeletius à Græcis quibusdam *ερυρόψαλμον* vocari scribit. Germ. *Stütz*. Diversis toto corpore coloribus depingi hunc pisciculum ex diversis imprimis nomenclaturis ostendi potest. Dorsum (inquit Rondeletius) aurei splendoris est, venter argentei, latera purpurascunt, Cauda in pinnam auream & latiusculam deficit. *Cute* lævi integitur, punctis notata, nigris nempe. Pinnae laterum multum ad ventrem tradunt: quarum radices, quæ corpus pertingunt, rubro sunt colore perfusæ, inde sanguinaria dictus. Nigricat quoque in tergoribus per intervalla. Linea quæ latera utrinque fecat arcuata est. Digiti longitudinem seu palmum, nunquam excedunt. Circa lacuum & fluviorum oras aquis stagnantibus capiuntur reticulis Bellonius *ovis* semper prægnantes esse asserit, ideoque Aristoteles Phoxinum esse autumat. Gesnerus vero sexu distingui dum ait, coire invicem etiam insinuat; quin, quod si (inquit) Phoxini, minimi isti pisciculi sint; nil mirum si propter parvitatem mediocres etiam ex eis nuper nati videantur. Verum nec ipse Aristoteles simpliciter nuper natos, sed verbis *ὡς εἰπὼν*, id est, prope dixerim, additis, gravidos capi tradit. Verisimile est autem tantillos pisciculos, sicut & mures inter quadrupedes, brevi tempore perfici & generare posse. Carne est molli & satis suavi: sed non nisi evisceratus coquendus est.

## CAPUT IV.

De Salmerone, seu Salmerino.

**T**RIDENTINI, piscem sibi peculiarem, *Salmerinum* vel nomine ab Salmone detorto, quo cum carnis rubedine convenit, vel quasi Salmonem lacustrem, nuncupant. Aldrovandus à Cardinale Madrucio acceptum ita descripsit: Corporis forma pinnarum, numero ac situ cum Truttis ac Salmonibus fere convenit: Cæterum squamis caret; etsi squamosum esse profiteatur Salvianus: Capite est rotundiusculo, retuso rostro. *Oculorum* pupillam nigram aureus, qui in mortuo postea fuit ruberrimus, circulus ambit: ac quam maxime splendens. Ante eos foramina duo, auditus vel olfactus instrumenta, rotunda, manifesta. Oris maxilla inferior nonnihil recurva, Unco sursum vergente: estque tota ea mandibula alba. Lingua ejusdem coloris, item palatum. Totum os insigniter dentatum. Piscis ipse rotundus potius, quam latus est. Pinne sunt numero septem, omnes sine aculeis: quinque supino binæ prono corpore, juxta branchias duæ, totidem in medio ventre, quinta ac postrema à podice, longæ omnes ac latæ. Quæ ad branchias sunt, triplici colore prædita. Ubi enim longiores sunt, hoc est, in ipso exortu, albicant, mox totæ rubent, exceptis nervis, qui nigricant, reliquæ tres sicuti in exortu magis quam illæ alben, ita quoque rubedo in his intensior est, nigredine vero plane carent. Priores quatuordecim nervis constant, subsequentes novem, novissimæ decem: quæ vero in medio fere dorso conspiciuntur, duodecim nervos habet, altera non longe à cauda, iis caret, mollis & cutacea, ut in Truttaceo genere: malèque ceu nervosa à Salviano expressa est: utraque dorso concolor, id est nigricans. *Cauda* Lunata est, ejusdem coloris, non rubra, ut ille ait. Podex in imo ventre juxta exortum posterioris pinnae. A branchiis ad caudam linea exilis, recta ad caudam usque fertur asperiuscula. Latera nonnihil albicant, & nunc rotundis; nunc oblongis, iisdemque nunc majusculis, nunc exiguis maculis subfulvi coloris consperguntur. Totus venter coloris ferme crocei, aut vulgaris minii. *Uterum* habet admodum procerum atque latissimum, utpote qui totam corporis capacitatem occupat, ovis refertus ejusdem fere magnitudinis, vulvis auroque resplendentibus, margaritas aureas diceret. Intestina alba, pluribus circumvolutionibus intorta. *Iecur* breve, latum, unico duntaxat lobo constans, flavescens. Vesicam fellis invenire

Tab.  
xxviii.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 11.



venire non licuit. *Lien* majusculus ex atro rubens. *Ventriculus*, longus & carnosus. Caro, ut in Salmone, rubra. Longitudo totius piscis à capitis initio ad caudæ extremum, Spithamas binas explet. *Locum* si attendas, in lacubus Tridentinorum montium capi innuit. Salvianus in frigidissimis & saxosis fluminibus nasci prodidit. *Vesit*ur pisciculis, & in horum defectu, recrementis. Quin singuli capiuntur, ideo solitarios esse concludimus. Coit in fine Novembris & Decembris. Piscis est, si quis alius delicatissimus. Caro ei tenera quidem, & quæ brevi tempore putrescit, sed minimè viscida, satisque friabilis.

## TITULUS III.

*De Piscibus, qui præter fluveos alias quoque dulces aquas incolunt.*

## CAPUT I.

*De Perca Majore.*

**P**Antum de Piscibus Fluviatilibus, tam squamosis quam lævibus sufficiat, sequuntur illi qui præter fluvios alias quoque aquas dulces incolunt: *Perca* nempe *Major*, *Perca fluvialis minor*, *Scrollus*, *Pungitius Alberti*, *Alburnus Ausonii*, *Epelanus fluvialis*. *Lucius*, *Cyprinus latus*, *Ballerus*, *Tinca*, & *Lota Gallorum*.

**PERCÆ MAJORI**, quæ Germanis Baers & Bersich, corporis figura lata & compressa est: rostro prominenti non aliter quam marina, verum non adeo acuto: Ore etiam ut illa mediocri, imò pro corporis ratione parvo. Dentibus caret, sed labia habet denticulis horrida, ut Bello-nius testatur. Squamis tegitur parvis ac aridis, quæ difficillime à corpore avelluntur, maximèque ancillis fastidio esse solent. Color ei varius, venter nempe; Corpus reliquum fere cineraceum, nigricantibus quibusdam ac latis maculis à dorso descentibus (non aliter ac in marina) latera depingentibus. Pinnæ ac cauda rubescunt. In *femina* verò nihil, vel parum saltem. *Pinnæ* in tergo duæ, quarum quæ capiti proxima, major est & aculeata, posterior minor sine aculeis: totidem ad Branchias quos Rondeletius altiores esse putat, quam in reliquis fluviatilibus: totidem item in ventre: quæ vero ab excrementorum est orificio, aculeo crenato vellatur. Branchias habet utrimque quaternas easque duplices, id quod Aristoteles quoque vidit. *Cauda*

bifurcatim dividitur. Ad majorem *magnitudinem* excrescit; quam marina: nam & trilibris aliquando capi solet, inquit Salvianus: in Lario lacu ad pedalem etiam, teste Jovio, magnitudinem. In Suerinensi vero lacu ulnam id est cubitum æquare Gesnerus intellexit. Ventriculum habet mediocrem; intestina pauca & tenuia, *hepar* subpallidum: à cuius majori lobo vesica pendet, in qua fel est tenue & aqueum: *Lien* subrubet. *Lapillos* habet in cerebro. Plinius eam mari & fluvii communem facit, sed perperam. In dulci enim aqua vivere & usu, & Aristotelis Ausonii-que testimonio, qui eum cum Cyprino, Glanide & aliis nominat, constat. Ælianus in Danubio capi scribit. Rhenus eo caret, forte quod altiores aquas amet. Præcipua in Verbano lacu & Pado flumine producit, prodente Platina. Fama est Larii lacus Percas fuisse advectitias & inquilinas, tralatis scilicet è lacu Eupyli, qui Lambrum emittit amnem, seminibus. In omnibus *jecur* grandine affectum est, nec quoquam alio vitio laborant. *Devorant* alios pisces tum proprii generis sobolem. *Pariunt* circa littora & frutices ut Aristoteles prodidit, in Helvetiis lacubus verno tempore in profundo, Aprili & Majo mensibus, ut Gesnerus. Partus tempore facile capiuntur in Sleia, & frequenter, hinc à littoribus ad pastum excurrunt, vaganturque locis spaciosioribus. Circa Johannis festum rursus capitur, dum littora ex profundo repetit. Lucio læso opitulari, fabulosum puto; nec ille huic parceret, nisi propter pinnae cogeretur. Gesnerus narrat, pisces in Lemanno lacu observasse, Percas hyeme emittere per os *Vesiculam* quandam rubram ex ore pendentem quæ vel invitas, inquit, supernatare cogit: conjectant autem id ab eis fieri præ iracundia, quod in retia inciderint: hoc enim tum maxime pati, cum retia trahunt pisces: sed mirum esse quod hyeme tantum id ipsis accadat. De ipsarum *salubritate* diversæ sunt Authorum opiniones. Rondeletibus dotibus illis quibus marina instructa est carere, scribit. Gesnerus Rhennas, & quæ in fluviiis & lacubus majoribus purioribus versantur probat: quæ in minoribus minusque puris aquis degunt, non item. In Gallia summam alendis febri- citantibus dignitatem obtinent, si Jovio credimus; In Italia quæ in Lario lacu laudatissimi, eadem ad pedalem magnitudinem crescunt, & maturescentibus præsertim uvis, ab ipso pingui & præteneris intera- neis commendantur. In Germania quovis anni tempore, April. & Mart. mensem si excipias, laudantur. Ausonius in pretio habitam fuisse testatur alibi inertem gustu prodidit. Minimas quas *Hornas* cognomi-  
nant,

Arist. H.  
A. l. 6. c.  
14.



nant, coqui peritiores vino calido immer-  
fas elixant. Majusculæ propter spinas &  
aculeos pinnarum dorsi, vescentibus mo-  
lestæ sunt: in minimis propter teneritudi-  
nem non curantur. Parvulæ etiam, butyro  
frigi solent, frequentius quam ulli alii pi-  
sces. Circa Verbanum lacum Percas mo-  
dice apertas, verubus ligneis transversas  
inserunt & assant: semissas butyro illinunt.  
Ibidem omne genus pisciculorum ad solem  
inveterant, maxime vero Perculas. Vul-  
nus aculeis pinnarum dorsi inflitum, non  
facile sanatur.

## CAPUT II.

### De Perca Fluviatili minore.

Tab.  
XXIV.  
8.  
Aldrov.  
l. 5. c. 34.

**P**erca fluviatilis minor, quibusdam Cer-  
nua, & Acerina medici Plinii, Straboni  
Porcus Niloticus, quia porcum continente  
spinarum serie admodum setarum menti-  
tur, Trago Aurata fluviatilis, quod ex-  
tra aquam educta ac suo humore deterfa,  
aureo fulgore in Cæruleum abeunte insignis  
sit; Cajo Anglo Aspredo, Pictorio Aspretilis  
dicitur. Piscis est toto corpore asper, pin-  
nis spinosus.

Percæ forma & magnitudine, colore per  
summa fuscus, per ima cum pallore flavus;  
duplici per maxillas semicircularum or-  
dine notatus: oculo ex dimidio superiori  
fuscus, ex inferiori subaureus, pupilla ni-  
ger. Linea per dorsi longitudinem porre-  
cta, & veluti filo transverso corpori affi-  
xa singularis: notis per caudam atque pin-  
das nigris maculosus: quæ, pinne, cum  
ira subest, inhorrescunt: cum animo con-  
quiescunt, resident. Bellonius scribit nul-  
lum alium Channam exanimem melius ex-  
primere: mortuum enim hiare & oris ri-  
ctum apertum tenere. Idem ait, recens  
captum hilari quadam ac subvirenti opaci-  
tate ceu pavonis torqueus, refulgere: imo  
vero extra aquam eductum, ac suo humo-  
re deterfum, aureo fulgore in cæruleum  
abeunte insignem esset. Percam plurimum  
æmulari, nisi transversis lineamentis (quæ  
Percæ insunt) careret: oreque magis ef-  
fet recurto. Hoc potissimum signo digno-  
sci, qui spineum branchiarum tegumen-  
tum, crenatum ut in Lupo & sua rima lu-  
xatum habet. Ubi autem linea quæ pi-  
scium latera fecat, ad branchias incipit,  
ibi aculeum caudam spectantem ut in Dra-  
cone marino videri. Sed & hoc à Perca  
dissidere, quod Perca duas in tergore  
pinnas habeat. Cernua (sic vocat) uni-  
cam tantum, nullisque dentibus, sed ne-  
que lingua manifesta præditam esse, squa-  
masque habere quadrangulas, robustas,  
crenulis tenuibus in gyrum incis, quæ

Bellon.  
Aquil.  
l. 1.

piscem Scabrum admodum efficiant. Radiis  
denique solaribus objectam, maculis ni-  
gris per dorsum distingui percipi: at to-  
tam sub ventre candicare. Cæterum non  
advertit Bellonius extremis branchiis, id  
est, branchiarum margini alterum paulo  
inferius aculeum adjunctum esse, quod  
observavit Gesnerus, qui tamen neutrum  
in duabus, quas dedit, iconibus expressit.  
Sunt enim inquit, perexiles: ut in mediis  
etiam branchias denticulatæ aliquot spi-  
nulæ crenatim (ut ita dicam) apparen-  
tes, si de proximo intuearis: superius mi-  
nores & frequentiores: inferius majores,  
paucæ & majoribus intervallis. Sunt au-  
tem illæ, inquit, digestæ in margine por-  
tionis cujusdam branchiarum, quæ à parte  
subjecta deduci & elevari potest. Est &  
supra branchias spinea pars obliqua, utrin-  
que versus occipitium se colligens tantil-  
lis serrata denticulis, ut tactui magis quam  
visui pateant. Item alia pars supina trian-  
gularis superinnata, à branchiarum scis-  
sura, statim supra pinnas ibidem, retror-  
sum spectatur & in brevissimum sed acu-  
tum spiculum definit. Idem Gesnerus  
squamas rotundas esse negat, sed rotun-  
das esse fere ut in aliis piscibus ait. Pin-  
nam etiam dorsi unam esse oblongam &  
continuam, ut Bellonius dixit, & Cajus  
in communicata icone probe repræsenta-  
vit: differre tamen partibus: nam ante-  
riorem iculeis constare quatuordecim,  
quorum primi duo breviores propius jun-  
cti sint, medii longiores, longitudine pau-  
latim ad ultimum usque decrescente: par-  
tem posteriorem, molliorem esse, fibris  
non aculeis distinctam, brevior, & ab  
antere intervallo quodam inchoato di-  
scerni. Jam vero tres esse pinnas in supi-  
na parte, unam post anum, & binas sum-  
mo ventre quæ nigris lituris, ut cæteræ  
omnes non distinguuntur. Ferunt ama-  
re torrentia. In Hollandia copiose in sta-  
gnantibus aquis capiuntur. Rarus est in  
Tamesi, plurimum in Ranello, quod  
Oxonium præterfluit. Cum natat Gobii  
& Cottæ more universas pinnas movet, si  
Cardano credendum. In vivaria con-  
jectus, pisces alios exurere, quod ipsis  
aculeis molestus sit dicitur. Hyeme la-  
tet, in quadragesima commendatur. La-  
pilli quos in cerebro gerit, adversus reum  
lapillos & pleurit in commendantur.

## CAPUT III.

### De Scrollo, & Pungitio Al- berti.

**S**CROLLUS Danubianus piscis est. Co-  
lor in Icone, quam Raphaeli Seilero ac-  
ceptam

Tab.  
xxviii.  
15. 16.



Aldrov.  
l. 5. c. 35.  
& 36.

ceptam Gesnerus refert, dorso fuscus est, lateribus subviridis, plurimis punctis fuscis intervenientibus: quales etiam in pinna dorsi (cujus aculei albicant) conspiciuntur: venter candidus est. Initium pinnarum ad Branchias rubet, &c. Raro longior fit, quam figura ostendit. Quoquo modo paratus, in cibo optimus est.

**PUNGITIUM** Alberti, Rondeletius *aculeatum* vocat. Author de rerum natura *Spinochiam*. Pisciculus est, inquit Albertus, minimus, qui lanceolas (aculeos) binas habet in radicibus pinnarum ventris. *Mas* sub gutture rubet, *femina* rubore caret. *Squamas* non habent. Piscatores hoc genus piscium sponte *generari* ajunt, & ex ipsis alios omnes, hac observatione inducti, quod in lacunis novis primo statim anno inveniantur, & postea sequentibus annis pisces alii diversi, quanquam nulli fuerint immixti.

## CAPUT IV.

*De Alburno Ausonii & Epelano fluviatili.*

Tab.  
XXIX.  
13.  
Bellon.  
Aq. l. I.  
Aldrov.  
l. 5. c.  
37. & 38.

**ALBURNI** meminit in sua Mosella privatim Ausonius. Bellonius circa Vercellas in amne Lagogna Ticinum influenti, *Scavardinum* à piscatoribus appellari scribit, Germani *Wassfischlin* / & *Isotaugen* / id est, *εἰσὺν ὅσῳ δαλμύ* dicunt. Piscis est & fluviatilis & lacustris, Alphyis albis similis, oculis magnis, rubescentibus, dorso virescente, ventre candido. Bellonius lineam utrinque esse ait arcuatam, quæ ejus latera dividat. Sed Rondeletius duabus distinguere profitetur, altera à branchiis ad caudam ducta, medium corpus dirimi: alteram minus evidentem à radice pinnæ branchiarum orta deficere, priusquam ad caudam perducta sit. *Nare* est parum refina. Pinnas easdem habet quas Gobio. Capite est parvo: corpore latiusculo, sed depresso, vixque ad duorum digitorum latitudinem extenditur. *Felle* caret. Argenteis tegitur *squamis* ac tenuibus. Carne est molli & parum pingui. *Vorax* est piscis, quam ob causam facile hamo capitur; unde Ausonius prædam puerilibus hamis, recte dixit. Observavi Alburni duas alias species, quarum prior tergo fere ad castaneæ colorem vergit: altera ad cœruleum. Utriusque pinnæ & cauda etiam ad castaneum vergunt. Cætera argenteo colore resplendent.

Tab.  
xxviii.  
17.

**EPELANUM** fluviatilem Bellonius Sequanicum cognominat, à Galliæ fluvio, ubi abundat, additque sic vocari quasi excellanum à præstantia, qua cæteros sui generis

pisciculos excedit. Ferrarienses *Borbulum* vocant, Alburno simillimum atque hoc tantum ab eo dissidentem, quod ruffas radices pinnarum Gardonis & Veronis modo habet, ac lineam, quæ latera ejus secant, versus caudam admodum inflexam & velut arcuatam. Quinque digitorum longitudinem, pollicis latitudinem interdum exuperat. Pisciculus est *odoratus*, de bonitate & principatu cum aliis omnibus contendens. Rothomagenses *Ovellam* eo argumento nominant, quod semper ovis prægnas sit. Epelanum si suas *Squamas* habentem conspicias, præ nimia albedinis terstitudine tibi refulgere videbitur. Squamis autem exutus *tergus* ostendit variis coloribus emicans, in iridis aut arcus cœlestis morem. Marino crassior est & brevior.

## CAPUT V.

*De Lucio.*

**LUCIUS** vel *καρπὸς τοῦ λύκου* à lupo, vel à lucendo dictus est. Nulla ejus apud veteres Græcos mentio, & ostendit egregie contra Philelphum Salvianus Oxyrinchus Niloticus quod Bellonius vult dici posset, nisi Plurarchus eundem marinum, tanquam è mari Nilum intraret, faceret. Esocem Plinii, quem in Rheno magnitudine excellere putat, haud difficulter concedi potest, & videtur abinde Belgicum Snock originem suam traxisse. Apud Anglos & Gallos diversa, pro diversitate ætatum fortitur nomina. Corporis figurâ oblonga est, eademque ideo oblongior videtur, quoniam piscis latera nodice dilatantur.

Tab.  
XXIX.  
1.  
Aldrov.  
l. 5. de  
Piscib. c.  
39.

Dorsum latum est, & fere quadratum, perpetuoque æquale donec ad postremas pinnas ventum sit: & cum reliquis fere *Squamosis* piscibus dorsum ipsum magis aut saltem æque atque venter extuberare solent: huic uni venter, quam dorsum magis extuberat potissimum ubi pinguior sit factus, quod tamen aliquando ichthyopolarum impostura etiam fieri Romæ observavit Rondeletius, piscium quorundam ventres in farcire tradens vilibus herbis, atque ita cœu pinguiore carius vendere. Caput habet macrum osseumque ac quadratum. Ossium seu *spinarum* in capite formas diversas reperiri ajunt: unam vulgo cruci comparant, aliam lanceæ, tres alias clavis seu paxilis, passionis Dominicæ instrumentis. Author obscurus de natura rerum scribit, Lucium in cerebro lapidem crystallo similem gerere, sed hunc cum ævum in longum duxerit. Gesnerus vero testatur sese in capite Lucii etiam parvi, lapillos geminos candidos reperisse. Rostrum habet longum & rectum maximum, Anserino rostro compareret Rondeletius.



*Maxilla* inferior superiore longior est, & cochlearis modo excavata. *Dentes* in eo plurimi, haudque uno modo dispositi, ut & Albertus ait, diversarum acierum; nam in maxillæ inferioris anteriore parte dentes parvi sunt, in os recurvi, in superiore maxilla nulli sunt, qui cum ea latior sit, dentes extra os prominentes & inferioribus non occurrentes inutiles forent. Horum igitur loco natura (inquit Rondeletius) duos dentium ordines palato infixit. *Oculi* coloris auri sunt æmuli, ante quos duo foramina in unicam cavitatem coeuntia: *Corpus* squamis tegitur parvis tenuibusve adeo, ut iis carere videatur, & cum iis coquatur, & inter edendum, si parvus sit piscis, negligantur: sin major, duriores & evidentiores abjiciantur. Venter albicat, dorsum vero ex subflavo nigrescit, à quo lineæ plurimæ latæ, non recte, sed multipliciter inflexæ, obliquæ potius quam transversæ, in aliquibus vero minus & flavæ & conspicuæ deducuntur, totumque piscem pulcherrime pingunt. Pinnis natat quatuor, duo sunt ad branchiarum ima: qui pinnarum situs est fluviatilibus piscibus communis, ut facilius in aqua suspendantur & efferantur: contra altius sitæ sunt eadem pinnae in marinis, quia dulcis aqua tenuior est, & liquidior, marina crassior & spissior: ob id hæc pondus magis sustinet, illa minus: Inferiore ventris loco duæ aliæ sunt magnæ & validæ. In dorso nulla est, sed non procul à cauda duæ sunt, una superior est nigris maculis notata. Cauda brevis, in duas pinnas desinit similiter pictas. *Linea* medium corpus dirimens vix cernitur, quia ex minutis punctis constant. *Ventriculum* ita gutturi continuatum habere Albertus scribit, ut aliquando eum rejiciat aviditate glutienti piscem. Rondeletius permultas ejus ait esse appendices, in quibus chylus confectus servetur, ne ob gulæ laxitatem facile rejiciatur: Vidi ego magnitudine insigni Lucium, qui alium, & ipsum insigniter grandem ventre contineret, & hic rursus murem aquaticum, ut latissimum habere ventrem necesse sit hoc genus piscium. *Intestina* tribus longis convolutionibus constant. *Hepar* ventriculum complectitur, in quo vesica est felle viridi distenta. Nullæ pulpis earum *spinulae* intercurrent, ut aliis fluviatilium plerisque. In lacubus & stagnis ubique ferè reperitur, obscuras verò ulva cænoque lacunas obsidet. In mari nunquam visitur, in ostiis Rhodani & stagnis marinis aliquando, sed tabidos capi Rondeletius author est, sed & in fluminibus nonnullis haberi Ausonius in Mosella sua prodidit, in Tiberi vix quotannis denos, Salvianus. Nec difficulter dignoscuntur. Arctiori enim sunt corpore toti argentei,

flavisque illis lineis carent. Tam est vorax, ut non tantum in pisciculos alios, & ranas, sed & animalia quædam grassetur. Narravit mihi, inquit Rondeletius, quidam vir fide dignissimus, vidisse se mulæ, quam iter faciens in Rhodanum potatum duxerat, labrum inferius, à Lucio dentibus apprehensum, cujus de morfu cruciatam & territam inde fugisse, & crebra capitis quassatione Lucium in terram dejecisse, quem ille palpitantem & in aquam redire conantem cepit, domumque tulit. Anseris pullos duos in ejusdem repertos ventre se vidisse, quidam Polonus testatur, idem & fulicam inventam, & pedem ancillæ in piscina ab eodem admorsum prodit. Tam avide pisces persequitur, ut præ nimio celeritatis impetu, supra aquas elatus, in scaphas incidat, quod me vidisse, cum Anno M. DC. XXXI. in meo ex Anglia reditu, Landsberga notus scapha veherer, memini. A proculo seu minore perca abstinere quidam credunt, alii apprehenso capite devorare, ne si cauda arriperet, à squamis & spinis lederetur, opinantur. Albertus captum dentibus conterere, mortuum in ventrem propellere, vivum non devorari, prodidit. Summam ranæ cum Lucio antipathiam, eleganti Historia expressit Dubravius, quam vide. *Vitam* ei longissimam ex Lucio Frederici II. Imperatoris. cognosci potest, quem in stagno quodam vixisse CCLXII. annis ex annuli ærei, quem cum stagno eum Imperator inderet, in branchiis sub cute abdiderat, inscriptione Græca colligitur, quæ talis est: *Εγὼ ἐκείνῳ ἰχθὺς ταύτῃ λίμνῃ πάντοτε καὶ ἐπιτεθείς διὰ τὸ κοῦντὸν φεδέρην β. τὰς χεῖρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὁκτωβρίῳ*, id est, *Ego sum ille piscis huic stagno omnium primus impositus per mundi rectoris Frederici II. manus, die Quinto Octobr.* Fuit enim inventus iste annulus in capto eo Lucio anno salutis M. CCCC. XCVII. ut testatur Conradus Celtis referente Gesnero in sua Epistola nuncupatoria. De ejusdem *vivacitate* ita Cardanus: Mirum est illud, quod à tot audiivi viris, ut impudentius fuerit tot testibus mendacium non credere, quam veritatem adversus eorum auctoritatem tueri: Lucium scisso ventre ostendendi lactis causa; inde confuto atque inter Tincas in vivariis reposito, sanare humore earum dum se illis Lucius ventre affricat. Martio Aprilique mensibus *ovis* turgent & pariunt, perguntque ad Junium usque. Alii è Tincarum semine generari credunt. Quidam & sponte & ex alieno semine provenire, quod neque soli neque fati procreentur in eis, opinantur. Ex ovo editos, à quibusdam piscibus intra Branchias foveri, Encelii nugæ

Dubrav.  
de pisci-  
nis p. 33.



nugæ sunt. Quantum ad *Usum in cibis* Jovius inter obsonia plebeja recenset. Poggius etiam ex Cymino lacu, & quidem præpingui, nullam unquam inesse gratiam scripsit, nisi cum solus in maxima convivarum inedia prandiis aponitur. Thrasyminus lacus laudatioris profert. Braccianus, qui olim Sabatinus, inferiores. In Gallia tamen, Germania & alibi tanta putatur salubritatis, ut Adamus Lonicerus etiam puerperis concedat. Pinguiores tamen sunt Julio mense & Octobri laudatioris, quibus Cyprini soboles: in piscinis esse deteriores cum semina spargunt. Ab Arnolfo inter duræ carnis pisces recensetur, sunt qui caudam & partem posteriorem præferunt. Mediæ ætatis meo judicio optimi sunt. Ova piscatores circa Argentinam tanquam medicata abjiciunt. Gesnero sunt æque ut Barbi noxia. Apud nos absque periculo in usu. *Usum in Medicina* quod spectat, Mandibula in pulverem redacta in Calculo, urinæ difficultate, & pleuritide usurpatur Saliti ossa pulverizata spodii vicem præstant, & ulcera exsiccant.

## CAPUT VI.

## De Cyprino.

**C**YPRINUS Oppiano *κυπρινός* dicitur. Nomen forte à Cypride, ut Gesnero placet, quod fecundissimus sit; fortitus est, ut *καυδωτός* apud Athenæum, vel à squamis seu latissimis & maximis, ut Rondeletio visum, seu ita firmiter vallatis, ut lapidis ictus facile repellatur, ut Bellonius credit. *Carpam* Cassiodorus vocat, Brasavolus ob magnitudinem *Reginam*, *Carpionem* alii. Crassior est magis quam longior, nec ulli piscium magis quam Tincæ similis. Superius enim *labrum* rotundum est ac croceum, ex quo utrimque (Tincæ instar) gemina barba pendet, longior una, mollis flavescens, in acutum deficiens; *Μέσσηας* (inquit Rondeletius) possis appellare: brevior altera, & ideo minus evidens, nigricans. Capite est brevi pro corporis ratione, Tincis hac etiam parte similis. Ore medio, labris adiposis, carnosisque; *lingua* caret: sed ejus loco palatum carnosum dedit natura saporum percipiendorum causa: quod evulsum, linguæ formam adeo referre Salvianus & Rondeletius ajunt, ut non solum vulgus, sed etiam viri docti (Albertus linguam sapidissimam esu dixit, improprie itaque) linguam vocent, & linguam veram esse perfectè defendant. Imperfecta tamen piscibus esse linguam, & carnosum Cypriano palatum non modo vetustati & Arist. visum, sed & experientia,

quæ substantiam illam palato affixam inferiori parti nullo modo hærentem, necullo pacto solutam aut liberam testatur. Gesnerus tamen testatur sese linguam (ut vocant) separatam à palato, in parva etiam Carpa duos digitos latam vidisse, linguæ in quadrupedibus proprie dictæ figura: substantia quoque & gustu saporeve simili. Usum quoque ejus & facultatem gustandi, similem esse, inquit, dixerim. Quare linguam appellare, nihil prohibere putat, quoniam ut lingua sit, vel dicatur, neque locus aut situs facit, cum aliæ etiam partes situ diverso nomen idem retineant. *Dentibus* carere hoc genus piscis Rondeletius asserit, horumque vice os palati medio infixum planum habere, læve, triangulare: ex adverso, in parte inferiore ossa duo incisa, in gulam recurva. Bellonius vero Cyprinum dentes quidem in ore non habere ait, sed tantum in ingressu faucium; & Gesnerus intra fauces ejus dentes latere asserit, sed neque vel oculis diducto ore, neque tactui immisso digito apparere. Esse autem in maxillæ recurvæ medio dentes qui nos fere accumulatos charadum instar, situ & magnitudine inæquales tres majusculos, duos exiguos præduros, cavos, superficie summa lata sive plena, obtusa, sed lineis quibusdam exasperata, unum tantum & candidiorem cæteris & superficie lævi in mucronem brevissimum fastigiata. Idem Gesnerus lapillum in capite habere tradit juxta linguam, candidum, durum, ad minimi numismatis magnitudinem, interdum paulo majorem. Habere & in medio capitis substantiam quandam majusculam, crassam, cordis fere figura, duram sed tenacem & flexilem, dum recens est, sub dentibus mordentis, tanquam in acetabulo quodam repositam, similiter ut Leuciscus fluviatilis, quem Gardonum vocant Galli. De hac forte sensit, (inquit) Encelius, & improprie lapidis nomine appellavit, his verbis: In Carpæ faucibus reperitur gemma seu *lapis*, forma triangulari, magnitudine proportionem piscis, coloris candidi extra, intus flavi, *Oculis* est mediis, ante quos sunt foramina. *Pinnis* natat latius. Duæ sitæ sunt ad branchias magnæ, in medio Ventre duæ: inter quas & caudam alia est unica: quæ serrato aculeo & valido innittitur: inter hanc & præcedentes est excrementi meatus. Ex medio dorso unica erigitur, ad caudam ferè continua, robusto etiam incisore aculeo fulta. Cauda lata est ex nigro rubescens; ut & postrema pinna. Ipse vero colore est flavescens, maxime cum senit. Junior enim colore magis est ad fuscum inclinante. *Branchias* utrinque quaternas, duplici ordine, novissima excepta habere Cyprinum testatur Aristoteles: Gesnerus vero

Bellon.  
Aquat. l.  
I.

Tab.  
XXVII.  
11. 12.  
Tab.  
XXIX.  
2. 3. 4. 6.  
Aldrov.  
1. 5. c. 40.  
Crassio. l.  
12. E.  
pist. 4.

Arist. H.  
A. l. 4.  
c. 8.



vero quaternas in ea se reperisse tradit, sed omnes duplices. *Squamis* magnis, validisque tegi, ideoque Lepidotum Dorioni vocari. Eas etsi *ἀργυρεῖς* id est, argenteas vocaverit Orpheus, docti haud necesse propterea esse putant, alias esse statuendum, cum de coloribus Poëtæ sæpe loquatur improprie, & epithetis aliquando abutantur; creditque Gesnerus commune hoc squamarum epitheton esse, quod ut facile credo, ita hic *ἀργυρεῖς* si quis splendentes vertat, eum peccaturum non puto. Ipsæ autem ad aureum inclinant. Sunt qui hunc piscem pro sua magnitudine, plus sanguinis habere dicunt, quam cæteri pisces, ideoque minus frigidi temperamenti esse probabile videri. *Ventriculum* mediocre habet; *Hepar* subrubrum, cui sub nigra *fellis vesica* hæret, & *intestina* admodum pingua, *splenem* magnum. Crebro quinque & sex librarum pondere reperitur, aliquando etiam viginti: Jovio vero teste in Lario lacu ducentarum quoque Maximum enim ajunt, qui in eo nascuntur piscium. De loco non convenit inter authores. Plinius marinum facit, Oppianus littoralem. Aristoteles inter fluviatiles reposuit, Ælianus in Danubio quoque capi scripsit. Dorion inter fluviatiles & Lacustres collocat. In Lario lacu admirandæ magnitudinis capi, Jovius author est. Larius, inquit, lacus, ob longitudinem à Virgilio maximus nuncupatus, pisces longe omnium maximos Troctas (Trutas) centum aliquando librarum pondere, & Bulbaros ducentarum; Sed Bulbari illi ingentes videri potius liquidis ac perspicuis in undis quam capi retibus possunt, cum ea impotenti impetu plerumque dilacerent. Subeunt solstitii diebus umbrosos specus in rupibus Licinianis, quæ sunt in adversa Larii ripa contra insulam, Euripumque illum gemmeum à Cœcilio Plinio celebratum. Eos industrius quidam sacerdos sagittis arcubalista emissis, cum in profundo quiescentes fuscinis atque tridentibus attingi non possent, vulnerare conabatur, neque tamen sagittæ longo alligato funiculo, nisi aversi officiebant, cum illa squamarum serie thoracati earum ictus facile repellerent. In lacubus Alobrogum maximi quoque proveniunt. Alicubi in piscinis & vivariis includuntur, alicubi in paludes & stagna conjiciuntur, in quibus plurimum proficiunt. Ut vero scribit Albertus: Hic piscis in aliquibus aquis generat, & in aliquibus grassatur & crescit, sed obtime valet in fundo argilloso, tritico primo seminato, & postea argilla desuper spersa, & postea aqua superfusa. De partu & quæ circa ipsum eveniunt, isthæc fere Aristoteles prodidit. Cyprini &c. vide Scaliger. Sponte etiam nasci & Rondeletius ex experientia comprobant.

Vidi inquit ille, in aquis, in cava loca & montibus septa receptis, & collectis sponte generatos Cyprinos, in quæ loca nec rivus, nec stagnum, nec palus, nec lacus, nec fluvius ullus, nulla denique aqua præter cœlestem influxisset. Fœminam lacore suscipere, inde futura ova concipere falsum est. Herbis, luto, muro, & aliis vescitur. Athenæus carnivorum dixit. Astu plurimum valere, & ut reti capiendus evadat, varia machinari Albertus atque autor de natura rerum tradunt: primum enim circumeuntem, foramen querere: hoc non reperto transilire conati, vibrato in aërem corpore: aliquando sub reti, suffodiendo scilicet in fundo, effugium querere: alias herbam aliquam ore tenere, atque ita retinere sese, ne trahatur à reti: alias caput fundo ingerere, haud ignarum, rete, dum nisi caudam tangit, elidi. Refert Gesnerus se cognovisse ex homine fide digno in Palatini regione Germaniæ, in loco cui nomen à Michaelē & campo vel agro, in fossa circa arcem Carpam esse, quæ centesimum vitæ annum attigerit, unde longævum piscem esse conjicere possumus. Carne sunt in universum molliore, nec tamen ita insalubres, quod humiditas non sit viscosa, præsertim eorum, quod in rapidis & puris aquis nascuntur. Martio in primis commendantur. Majo & Junio, quod genituram vel emittat vel recens emiserit, non item. Mas fœminæ præstat, majusculus minori. Caput à ganeonibus expetitur, propter linguam forte, quæ si assetur, prædulcis est, & bene cum succo citri apparatus. Ex ovis Caviarium rubrum apparatus, quod Judæis dicatum est. Medicinam si spectes, lingua vim augendæ Veneris habet. Lapillus de capite, crudo pisce extractus, febricitantium æstum sedat, & sanguinis è naribus fluxum cohibet.

## CAPUT VII.

## De Cyprinis Monstrosis.

**M**iram hanc piscis speciem Lugduni in foro piscatorio vivam aliquando venditam, nullus fuit (inquit Rondeletius) qui non demptis capite & Rostro Cyprinum esse judicaret. Nam squamarum figura & Colore, pinnis earumdem situ, cauda idem plane est cum Cyprino. Pinna dorsi initio aculeum incisum habet, ut in Cyprino. Eundem aculeum habet alia pinna quæ excrementorum meatum sequitur, quæ rubescit, item caudæ pars ei respondens. Tota cauda lata est, ut in Cyprino. Duas alias pinnas habet ad branchias, similiter duas in ventre. Caput habet non protensum, ut Cyprinus, sed Delphini capiti

Tab.  
XXVII.  
10.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 41.



piti simile, rostrum satis longum, sed obtusum, quale revera pictura repræsentat. Ex superiore rostri parte juxta oris scissuram appendix carnosæ utrimque una dependet, ut in Cyprino, hac superior est alia brevis & vix apparens, nisi propius inspicias utrimque etiam unica. Hæc Rondeletius *Similem huic monstroso Cyprino*, sed barbulis insignem, quas in suo Rondeletius non expressit, Gilbertum Cognatum Nozerenem ad se misisse testatur Gesnerus, in Nozerethano stagno repertum, anno salutis 1554. In Cognati vivario novem tantum diebus vixisse. Verum longe pulcherrimum fuisse nec specie coloribus ratum & admirandum Cyprinum illum, qui anno Domini 1546. Omburgi in Ditione Comitum Palatini, Marchionis Ioachimi Brandeburgensis captus & Augustam missus est ad Carolum V. Cæsarem in comitiis illic agentem, qui eum Sorori Mariæ donavit, coctum etiam colores retinuisse. Picturam ejus sibi communicasse Io. Thanmyllerum juniorem chirurgum Augustanum peritissimum, in qua longitudo, inquit, apparet trium dodrantum: latitudo digitorum novem, quæ est in medio dorso ad ventrem medium. Pinnæ dorsi initium partim aureo, partim rubro colore est, deinceps v. pulcherrimè cærulea: reliquis pinnis omnibus color aureolus, ut capiti etiam magna ex parte ac ventri, sed passim etiam rubedo intervenit, quæ barbulas quoque quaternas tingit. Dorsum ex viridi cæruleum, latera superius viridia, inferius aurea, &c. In summa suavissimis floridissimisque coloribus undiquaque adeo eleganter pictus atque distans est, ut vel cum rubri maris elegantissimis quibusdam, maximique variis piscibus certare posset. Narrat item captum esse aliquando apud suos Cyprinum hermaphroditum, in quo utriusque sexus notæ (hoc est & genituræ & ovorum vasa) comparuerunt. In piscinis vero contrarium quandoque reperiri, nempe neutrius sexus Cyprinos, nec mares nec fœminas, & hos forte esse, quos sponte nasci Rondeletius author est. Idem Gesnerus hac quoque forma Cyprinum alium captum esse testatur in Acronio sive Constantiense lacu, prope Retz, duos fere dodrantes longum in præsentia illustris & Generosi viri Comitum Wolff de Schamburg. anno salutis 1545. idibus Novembris Picturam ad se misisse Archillem Pyrminium Gassarum medicum eo tempore præstantissimum. Pronam partem nigro colore pictam fuisse, latera fusco, supinam luteo. Spectabilem in eo præcipue faciem, æmulam humanæ latitudine sua, nec non oculis, ore, naso, buccis ac mento. Hæc scripserat, cum eundem piscem Rephaël Seilerus juvenis Augustanus clarissimi medici Geryonis filius, cum omnimoda eruditione, tum juris scientia & comitis Palatini dignitate nobilis, pictum ad eum dedit, cum

descriptione hujusmodi: Piscem hunc omnino qualem depictum mitto, fuisse captum in flumine Austriæ (quod vocant die Eris) in ditione comitis Julii de Hardegg prope urbem Retz anno 1545. mense Octobri, viri quidam eruditi & graves, mihi veluti testes oculati confirmaverunt. Faciem non averfam, prout reliqui, vel obtusam sed repræfiam, ab aliquo in planum aspectu tendente, cum temporibus utrimque latis, oculis binis, naribus, ore, mandibula, omnia effigie humana habuit. Pinnis, squammis, cauda, totoque corpore posteriore, ipsaque adeo magnitudine atque colore Carpam præ se tulit. Rete captus est solus, & ob raritatem ac maxime quod sensibus etiam ignotus esset, diu conservatus, & veluti miraculum quoddam passim asportatus.

## CAPUT VIII.

*De Cyprino Lato Rondeletii.*

**C**YPRINUS latus Germanis *Bresem*, Italis *Scarda* seu *Scardula* dicitur. Bellonius *Abramidem* veterum nullo fundamento adjecto arbitratus est. Cyprino adjungitur, quia est squamis, corporis specie & vita similis. Piscis est maximus & latissimus, *Capite* parvo pro corporis magnitudine, dorso repando & cultellato, corpore compresso, *squamis* magnis tecto. Linea à branchiis ad caudam ducta curva est. Ad branchias pinnæ duæ sunt, in medio ventre duæ aliæ, ab excrementi meatu alia ad caudam continua. Hujusmodi pisces in lacubus maximis nascuntur. Vidit Rondeletius in Arvernæ lacu quodam istiusmodi pisces, qui binum cubitorum, pedum totidem latitudinem æquarent. Nostro in foro copiosissimè prostant: minores Scardas, majores propter dorsum insigniter repandum Gobbos quasi gibbosos nuncupant, suntque pedales plerumque bipedales rarissimi. Scribit Gesnerus *vadum* amare argillosum, vel albicanti argillæ simile: ideoque in lacu Tigurino non passim, sed superiore ejus parte capi. Stagnantibus a. aquis præcipue delectantur, illicque muco, luto, herbisque vescuntur. Quare in iis tantem capiuntur fluviis, qui tardius fluunt, turbidaque sunt, & crassiore aqua, qualis est Araris: multi item in Gallia Belgica: nec in his ad eandem unquam magnitudinem accrescunt, ad quam in lacubus & stagnis. Mirum quod narrat idem Gesnerus, nimirum quendam in Polonia per multos horum piscium conjecisse in piscinam quæ mox superveniente hyeme tota congelata esset: cum parendi convivii causa, remoto gelu pisces capere vellet, ne unum quidem invenire potuisse: sequentia, vere rursus omnes apparuisse. Ad hosce latos Cyprinos referri debet piscis hujusmodi è Polonia missus, ubi Kloszez dicitur, totus ex subcæruleo ad violaceum vergens, exceptis pinnis &

Tab.  
XXIX.  
5.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 42.



cauda, quæ albicant. Pinna quæ ab ano est, longior & in exortu latior quam pars est, à pictore puto, expressa est. Habentur à quibusdam in pretio in Arvernia imprimis, ubi in lacu quodam magni & pingues capiuntur. Nonnulli partem in eis mediam expetunt; alii plus molestiæ ob minutissimas spinas inter edendum quam voluptatis afferre arbitrantur.

## CAPUT IX.

De Cyprino lato alio, & Ballero.

Tab.  
XXIX.  
5.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 43.

**G**esnerus ex relatione Kentmani, tria hujusmodi piscis genera in Albi reperiri tradit. *Primi generis* pisces esse parvos, tennes, latos, colore subaureo, cui circa dorsum fuscus admiscetur. Dupla eis ad latitudinem longitudo, caput parvum. Pinna dorsi & cauda fusci coloris sunt: reliquæ verò quinque pinnae, è fusco punicei. *Squamae* ut in Cyprino. Genus hoc Miseni parvum cognominant, *kleinkarass*, vel à colore *Giblichen*. Vivaces sunt admodum. E piscinis & stagnantibus aquis in Albim veniunt. Raro octo digitos longitudine excedunt. Vescuntur gramine & argilla, ut & reliqui hujus generis pisces: quamobrem magis amant piscinas, quam fluentes & lapidas aquas, propter vadum herbosum & argillosum. Itaque rarius in Albi reperiuntur. In piscinis quidam multiplicari eos non patiuntur domini, impediunt enim incrementa & saginationes Cyprinorum, quos à pabulo depellunt. *Alterius verò generis karas*, aliquanto crassiores & longiores sunt. *Squamas* similiter ut prædicti vel ut Cyprini, è gilvo seu flavo nigricantes habent: vocantur autem *Halbkarass*, id est dimidii Carasi, quoniam è Caraso & carpa veluti compositi videntur. Hi quoque ut primi generis Carasi, & piscinis aut stagnantibus aquis Albim ingressi, pariunt in eo & crescunt. Utrisque caro est subflava, & in cibo viscosa, quomodocunque parata. Quo diutius verò in Albi immorantur, eo sapidioris solidiorisque carnis evadunt. *Tertii demum generis Carasi* tenuiores & latiores sunt quam dimidii nunc dicti, similes primis, sed majores & pulchri candoris argentei, habentque pinnas parte supina rubentes: superior vero pinna cum cauda obscurius è fusco punicea est. Hi pisces in Albi nascuntur, non aliunde (ut prædicti) ingrediuntur. *Pariunt* primum Iunio mense, secundò Ianuario, sicut & superiores, quibus temporibus etiam præcipuè capiuntur. Mediocriter augentur, ut sesquibres aliquando aut bilibres capiantur. Assari solent & in pretio habentur. Fœminæ ovis gravidæ, elixæ etiam in aqua ad juris ferè consumptionem, vel copioso butyro ad jus sub finem adjecto, non displicuerint. Est in Frisia orientali piscis, quem *karutz* appellant, Carpa multis par-

tibus minor, tergo magis arcuato & gibbofo. Sexies in anno parere unanimiter affirmant, qui ipsum in vivariis servant.

DE BALLERO ita Aldrovandus: Aristotelis Bellerum inter fluviatiles & lacustres bis meminit. Ballerus, inquit, & Cyprinus & cæteri fere omnes, cum parturiunt, undis se intrudunt. Et alibi: Ballero & Tilloni lumbricus canis exortu innascitur, qui debilitat, cogitque ad summa stagni efferri, quæ æstu intereunt. Hunc Rondeletius eum esse conijcit, qui à Lugdunensibus, & lacuum qui in Allobrogibus sunt, accolis Bordeliere nominatur, quod littora semper sectetur & quærat. *Bordenim* littus significat. Cæterum cur Bellerum faciat, nullum adducit argumentum, nisi quod vita & moribus à Cyprino, quo cum nominatur ab Aristotele, non differat. Vilis est piscis. Strymonis amnis accolæ vulgo *Plestyam* teste Bellonio vocant, in Macedonia ad Pischiacum lacum, ubi plurimus est, modo *Platanus*, modo *Plestyam*, modo *Platogniam*. Hollandi, apud quos cum ob copiam, tum quod per se insipidus sit, vilissimus habetur, *een Bleye*. Bramæ, inquit Rondeletius, tam similis est, ut parum cautis pro Bramis sæpè vendatur, sed ab his magnitudine corporis & squamarum differt & pinnarum & caudæ colore. Est igitur Ballerus capite brevi, ore parvo, sine *dentibus*, sed horum loco ossa habet aspera: sine lingua, sed *palato* carnosio: Pinnas duas habet ad Branchias, duas alias in medio ventre, ab excrementi meatu unicam ad caudam usque in dorso aliam. Posteriores pinnae cum cauda rubro colore perfusæ sunt, ut in Percis fluviatilibus videre est, quæ in dorso est, nigricat. Linea à branchiis ad caudam curva producta est. Branchias quaternas habet, os in medio palato, ex adverso sita sunt ossa duo loco inferiore, altera parte serrata, quibus contrario occurso cum palati osse herbæ atteruntur. Vetriculum parvum habet, intestina pinguedine oblita, hepar ex albo rube-scens, in quo fel viride splenem rubrum. Multis spinis abundat, frequentes *squamas* habet, rotundas & tenues. Tergus ejus nigricat, venter candicat. Oculorum pupillam Bellonius non ut in aliis nigram, sed veluti crystallinam esse asserit, iridem vero albissimam, ac tredecim squamarum ordines utrinque in lateribus habere.

## CAPUT X.

De Tinca.

**T**incam vulgatissimum ubique terrarum piscem, à solo inter veteres Aufonio memoratum, ab aliis quod nullo in pretio fuerit, neglectum, Jovius existimat. Bellonius Aristotelis *φύλαξ*, quem Gaza *Fullonem* vocat Dorionis apud Athenæum *γυζοεις*, id est Fullonem dici, credit: metuo ne perperam.

Non

Tab.  
XXVII.  
7.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5.  
cap. 44.

Bell. de  
Aq. l. 2.

Tab.  
XXIX.  
7.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5.  
cap. 45.



Non tantum n. Tincæ decocto, sed & aliorum glutinosorum piscium, Ichtyocellæ, Anguillæ, &c. maculæ eluuntur. Fullo quoque Aristoreli marinis piscis est, Tincam inter fluviatiles & Lacustres reponimus. *Menam* non esse, quod *Platinæ* placet, vel ob ultimam hanc rationem, quia marinus est, certum est: Quid si verò, inquit Aldrovandus, Romanam vocem esse dicamus, à qua sententia idem Jovius non videtur declinasse. Celebratur enim apud Ciceronem, quidam facetus Orator Placentinus cognomine Tinka, fortassis, inquit, ab hoc pisce cognominatus, quemadmodum Florentiæ Laurentius Medices senior, uti erat perurbanus, cuidem celebris familiæ civi, se domi Tincam ingentem exquisita arte coctam falso jactanti, Tincæ cognomen, quod illi postea fuit æternum, indidit. Quemadmodum Merula ob similitudinem cum Tinka, item Callarias noster, Tinka marina vocari meruerunt, quid vetabit, si Tincam etiam Merulam palustrem dixerimus? Hoc fanè nomine usus est doctissimus Scaliger his verbis: Aufonius sui temporis secutus plebem, usitatis nominibus, pulcherrimum poëma non est veritus inficere potius, quam aut ipse in ambiguo versari, aut jactare Authorem in obscuro: sic Alosam pro Clupea sive Thrissa, Tincam pro Merula fluviatili posuit. Habet quibus cum Cyprino similis est, habet item quibus cum plurimum ab eo discrepat. Corporis enim specie, pinnis earumque situ, & palato carnosio, cum eo convenit: squamis verò non item. Hæ Cyprino majusculæ, Tincæ vero perquam exiguæ tenuesque & muco semper obductæ: adhæc Tinka juxta oculos circum habet rubrum, qui in Cyprino flavescit. Color omnibus haud idem, aliquæ enim subalbidæ sunt; plurimæ ex albo flavescentes, nonnullæ virides, quæ verò in maris degunt paludibus, ut in multis Hollandiæ locis, subnigræ sunt. Aufonius viridem dixit, cum plerumque flavescat potius. *Rostrum* habet breve ac retusum: os fere rotundum, ad ventrem inclinans, planè edentulum, at pro dentibus serrata ossa. Ex utroque oris latere, ubi inferius labrum superiori committitur, appendix pendet, ut in Cyprino, cutacea, rotunda, brevis, mollis, ac lubrica adeò, ut nunquam explicetur, conspicuave fiat, in digitis comprehensa extendatur. *Oculi* sunt magni & aurei. pinnæ binæ sunt ad Branchias, totidem aliæ in ventre, à podice una, in dorso alia brevis sine aculeo. Cauda in latam pinnam definit. Branchias habet quaternas duplices, lapillos in capite Auratæ & reliquorum marinorum more, binos exiguos. Stagnantes potius quam currentes aquas amat, ideoque in stagnis, lacubus ac paludibus quàm in fluminibus frequentior; & inter arundines ulvasque plerumque victitat, omnique anni tempore hisce in locis capitur.

E rivis a. flumina majora quandoque intrat, sed degunt maximè, ubi vadosa sunt, vadumque ipsum limosum. Gregalis est, putrescentis limi sordibus vescitur, carne nequaquam. De *amicitia* ejus cum Lucio supra dictum est, quibus si lubet, adde, quod cum Lucius in ceteros tyrannidem exerceat, à Tinka quasi beneficii memor, prorsus abstinet. Cum occiditur, diu supervivere fertur. *Usum* in cibis quod spectat, insuavem habent carnem, quia impurum & damnatum alimentum: ideo commune est apud Italos mulierculas diverbium. *Nassuno mangia Tenca, che febre non sente*, & Aufonius vulgi solatia dixit. Diebus tamen canicularibus inprimis noxiæ putantur, quanquam Marsicana è Tucinolacu, qui nunc Celanus, quæ labio inferiore trito, quod saxoso ejus loco voluntur, à vulgaribus distinguuntur, laudantur: nec non illæ, quas parvus lacus quarto décimo ab urbe lapide, apud Bacanam sylvam, profert. Hæc teste Jovio, nobilis quidam propinalis lautitiæ studiosissimus, autumnino captas, allio lardoque contritis, additisque odoratis oleribus & multo aromate, in teganis ad vaporem tepidioris furni felicissime percoxit. Laudatur denique Thrasymena Tinka, de qua idem Jovius: Cum in cœna Leonis X. Pontif. discumbentes, pelagios pisces vario judicio certatim atque impensius laudarent, nobilis quidam Florentinus Tincis fortasse solum assuetus, extollatis, inquit, convivæ, ut lubet marinos pisces: ego certè Trasymenam Tincam conditam leucophago, his vestris Triglis, Spigolis & Rhombis prætulero: quo suo infuso dicto lachrymas omnibus præ risu excussit.

Veteres medici (inquit Medicus quidam apud Gesnerum) ad sopiendos capitis & artuum dolores, torpedines admovebant, quarum loco à mediterraneis Tincæ forsan usurpari potuerunt. Sunt qui non febrientium modo æstus Tincis pedibus subditis, seu alligatis vivis temperari, sed idem remedium adversus arquatam etiam morbum proficere putent. Jovius quoque scissas per dorsi longitudinem, pedum & manuum plantis applicatas, ardentis febris ardoribus plurimum adversari, quosdam tradit putare ex secta Judæorum, qui quanquam sordidæ admodum, inquit, & ridentibus aliis talia experirentur, aliquando tamen ipsis æstuantibus exoptata blandimenta feliciter attulisse comperti sunt. Monet vero Rondeletius, ut id opportunè fiat, quod alioqui non modo nihil profuerit, sed contra maximè obfuerit. Frigiditate siquidem intro repellente ac magis constringente augeri incendium. Alii ictericorum jecori aut umbilico vivam imponunt. Icterici aliqui Tincam viventem alligant umbilico, donec immoriatur, postridiè rursus aliam alligant, idque etiam



certo die repetunt. Tinca immortua intus ac foris veluti croco tineta redditur, & plerique hoc remedio restituntur. De felle hoc ex libro Germanico manuscripto habet Gesnerus: Fel de Anguilla, Thymallo, Tinca & porcello lactante, misce ad aurium remedia. Hoc enim infuso, pelliculas rumpes, fluxiones curabis, vermes aurium occides.

## CAPUT XI.

De Lota Gallorum.

Tab.  
XXIX.  
Aldrov.  
de Piscibus  
l. 5.  
cap. 46.

**L**ugdunenses, inquit Rondeletius piscem qui in Arari invenitur, *Lotam* vocant, qui à Gebennensibus *Motella* quasi *Mustella* nominatur. Si quis *Mustellam* lacustrem vel fluviatilem appellaverit, non ineptè mea quidem sententia fecerit, modo non eam accipiat, quæ ex mari fluvios petit, qualis est *Mustella Aufonii*, qui *Mustellæ* nomine *Lampretam* nostram describere videtur. *Lota* Piscis est fluviatilis & lacustris. *Mustellæ* marinæ vulgari, de qua alibi diximus, similis admodum, nisi esset corpore rotundiore & spissiore. Ex maxillæ inferioris extremo pilus unicus veluti ex mento barba propendet, nullus in superiore eminent, ut in marina. (Gesnerus tamen in suis putat etiam supra duos pilos esse, sed in mortuis ferè latere, ut in maxima observavit.) *Pinnis* quatuor natat, duæ sunt ad Branchias sitæ, duæ in ventre, ab ano unicum continuam habet ad caudam, huic æqualem & similem in dorso, quam præcedit alia pinnula. *Cauda* mucroni gladii figura similis est. Parvulis *squamis* corpus tegitur, quod è ruffo fuscum est, & maculis nigris undulatum dispositis conspersum. *Dentes* parvulos & tenues habet. Mucro oblita & lubrica *Lota* est, ut *Anguilla*. *Ventriculum* parvum habet cum multis appendicibus, intestina convoluta; *hepar* albicans, in quo fellis vesica, quæ ex viridi flavescit, splenem rubrum, *vesicam* oblongam aëre plenam, branchias quaternas & duplices. *Nascitur* in lacubus & fluviis leniter fluentibus, ut in Arari. *Hepar* pro corporis ratione magnum est, & delicatum habetur. *Ova* noxia, quemadmodum ova Barbi, quæ ventriculum lædunt & alvum turbant. Caro tota à Lugdunensibus habetur in pretio.

## TITULUS IV.

De Piscibus lacustribus.

## CAPUT I.

De Umbla vulgari, &amp; Rondeletii.

Tab.  
XXX.  
1. 2.

**I**nter Lacustres pisces censentur, *Umbla*, *Trutta*, *Lacustris*, *Carpio*, *Lavarelus Allobrogum*, *Bezola*, *Albula*, *Albus Salviani*, *Farra*, *Pigus*, *Sarachus*, & *Schilus*. *Umbla*,

quasi umbra, quod haud exiguum cum umbra fluviatili similitudinem habeat, dicitur. Rondeletius *Salmonem lacus Lemani*, quod corporis specie, pinnarum numero, situque & partibus internis. *Salmonem* referat, vocat. Helvetii à Colore circa ventrem rubicundo, *Rotele* nomen indidere. Duo ejus esse genera magnitudine maxime differentia in Lucernensi lacu Gesnerus tradit. Majorem circa Bielam Rott, alicubi Roote appellari: à Sabaudis *Toutte*; circa Lemannum vero Umble minorem diminutivo nomine *Rotele* privatim dici. (Est & alius in Suevia & circa Augustam *Rotele* dictus, sed fluviatilis, non lacustris pisces, *Truttis* quoque affinis, Germanis cæteris ferè *Huch nuncupatus*, de quo suo loco diximus) Sabaudia circa Bielam *Ronson* vel *Bondelle*, illo nomine colorem indicari, hoc forte bonitatem. Denique piscem qui in lacu Bavarie Ammersee vocatur, Germanice *im Disling* non alium quam Umblam minorem videri: conferri enim Salmoni parvo; & à dorso usque ad media latera coloris lutei esse dici, adeoque tenerum, ut statim extra aquam expiret, nec in alio ullo ejus regionis lacu inveniri. *Umbla major* corporis forma partibusque omnibus Salmonibus & *Truttis* similis est. Os habet magnum, dentes vero non solum in maxillis, sed etiam sex magnos in lingua. Caput livescit, branchiarum opercula argentei sunt coloris in extremo aurei. Magis albicat quam minor. Nullis suggillatur lituris, unicum esse parvam tergoris pinnam Bellon. scribit: Rondeletius tamen non longe à caudæ exortu aliam sed admodum exiguum depingere videtur, & ipse Bellonius eandem in icone exprimit, & mox puto apophysim carnosam vocat. Idem Bellonius juxta ventrem, pinnam (in impressis codicibus branchia legitur sine sensu) utrinque unam esse ait, sed quam nec ipse, nec Rondeletius quoque pingit: duas sub ventre huic appositas, omnes sine aculeis: postremas piscem in duas æquales partes interfecare, sed partem quæ ad caput est, paulo longiorem esse. *Cutim* adeo glabram esse, ut squamis carere videatur. Tergus præ multo livore opacum apparere: ventrem præ albedine uti argentum micare: apophysim carnosam habere supra caudam, Umbræ, *Truttarum*, &c. more. Quaternis præditam esse *dentium* ordinibus in palato serpentium more, linguam ostendere ad uncis in gyrum dentibus, crenatis, exertis & hamatis senis, vel eo pluribus communitam, præter hoc maxillam etiam inferiorem parvulis aliis exertis & parum falcatas in ambitum vallari, branchias habere utrimque quatuor: latera ejus virgula recta secari utrimque per medium corpus, parum repandum versus ventrem. Tres aut quatuor dodrantes plerumque longa est. In Lucernensi lacu brachii fere lon-

Bellon.  
de Aq.  
lib. 2.



longitudine excrefcere Gefnerus testatur, & Rondeletius duos aliquando cubitos longas à Lemano lacu Lugdunum advehi. *Minor Umbla* (ut idem Gefnerus refert) dodrantalis plerumque aut brevior, pedem raro excedit, aut fi amplius, increfcit. Vidi n. inquit, aliquando palmos quinque longam. Octobri mense in Lacu nostro captam corpore latiusculo, nunquam tamen Umblæ majoris magnitudinem attingit *Ventre* turgidulo aliquando fpectatur, propter *vesicam* nimium inflatam. Est a. vesica ei oblonga, ut Albulis, non diftincta per medium. *Dorsum* totum cum dimidia laterum parte subrofeum: Inferiora latera albicant. *Venter* albiffimus est: caudæ color idem, qui dorfi pinnulam mollem & parvam, ut Truttæ, dorfo extremo gerit. *Maxillis* est dentatis. Spinæ etiam cœdentes in *lingua* habet. Pinna omnes partim subalbent, partim crocei coloris funt. Branchiæ quaternæ. *Lapillos* in cerebro habet. *Mares* ventre, pinnis & cauda magis rubent, fœminæ candicant: eadem capite fuperius & dorfo magis virent. Non tantum in Lemani lacu, fed & in aliis capitur. *Vefcitur* pifciculis, quifquiliis & aliis. Si vel parum *faucietur*, velut moribunda fupernatat. Capta quam primum aquas reliquerit, exfpirare traditur. *Carne* est fuavi, ficca, & cum fenuerit dura, & quæ multorum iudicio Afellis, imò faxatilibus fuccedere queat. Pinguis potiffimum apud Allobroges capitur tantique fit, (inquit Bellonius.) quanti ditiorum burfa æftimare poteft. Commendatur ab Helvetiis Novembri mense, & alias circa initium Decembris: quo tempore Gefnerus ova habere ait bona & folida, tardius vero caro ejus infufa, pinguiufcula & flaccida apparet & ova dilutiora funt. Tempore partus menfis inepta est. Cum elixatur, vino prius fervido injicitur, ne nimis mollis reddatur. Apud Allobroges pafitiis includi Bellonius refert.

Facit Rondeletius alterius mentionem, quam Lemani lacus accolæ *Umble chevaliere* forte ob magnitudinem, præftantiam & robur nominant. Neque verò à fuperiore folum differt, vel fexu, vel ætate, ut ex fequenti descriptione perfpicuum fiet. Est igitur hic pifcis Salmonibus & Truttis, quæ vulgo Salmonatæ dicuntur, fimilis, *roftro* recurvo, quo à fuperiore differt, id n. longius habet & acutius. Maxillæ inferioris extremum incurvum in maxillam fuperiorem, ejus rei gratia excavatum recipitur ut in Salmonibus videre eft. Maxillæ lineis multis diftinctæ funt. *Dorsum* ex cæruleo nigricat. *Venter* aureo colore eft. *Hepar* flavefcit, in eo fel: *splen* nigricat. *Ventriculus* gulæ fubjectus eft, longus, fpiffus, cujus innumerabiles funt appendices, quemadmodum in fuperiore. In infignem magnitudinem excrefcit. Carne eft ficca & dura: in afulas dividitur, que Caryophyllis confixæ in

craticula affantur, & oleo five butyro irrigantur. Paratur etiam hic pifcis Truttæ modo. Caput maxime commendatur, ut Salmonis.

## CAPUT II.

## De Trutta Lacuftri.

**Q**UAM nos Truttam Lacuftram vocamus, eam Galli *Truttam Salmonatam*, Rondeletius *Salmonem lacuftram* vocat, cumque Truttis vulgaribus grandior fit, Salmone minor, *Sarionem* ab Aufonio dici Bellonius & Rondeletius opinantur. An fit *Anchorago* Caffiodori quod Gefnerus opinari videtur, fuperius diximus. Ex Truttorum genere effe. Salmonique fimilem cum ex corporis forma, partiumque externarum & internarum fimilitudine, tum ex nomenclatura Gallica notum eft. *Differt à Salmone* magnitudine & maculis. Minor n. & maculas in lateribus purpureas, multo quam Salmo copiofiores habet Truttæ, itemque in fluviis rapidis & limpidis inveniuntur, non funt adeo maculoſæ, magnitudineque, fucco, carnis colore & fubftantia multo inferiores. Umbla vero nullis ut dictum eft litturis fuggillatur. *Gefnerus hunc pifcem diligenter intuitus, his verbis defcribebat: Squamulis* tegitur minimis, bene dentatus eft, & *lingua* etiam utrimque dentibus munitur. Caput colore nigro, cæruleoque mixto, dorſum partim glauco, partim ſubnigro, partim cæruleo, partim ſubviridi. In lateribus puncta nigra. Pinna in medio dorſo multis nigris maculis variatur, reliquæ alben. Habet & ultimam illam dorſi mollem *pinnulam*, ut reliquæ Truttæ: branchias quaternas. *Appendices* non toto circuitu inteftini, fed ab una tantum parte magnas, oblongas, bipartitas, utrimque circiter 18 habet, & alias ſex ſeparatim ex oppoſito, ventriculū ſeu majus inteftinum verſus. Hæc ille. Ad duum triumve cubitorum *magnitudinem* accreſcit, in Lario lacu ad 50. quinimo, Jovio auctore, ad 100. etiam libras. Initio æſtatis *caro* ejus rubere incipit, duratque is color uſque ad Auguſtum, vel ſaltem ad Divi Jacobi diem, quo tempore partu jam abſoluto, colorem rubicundum ammittit. Gefnerus loco differre invicem iſtiusmodi lacuftræ teſtatur; alias n. in vado ipſius aquæ degere, præſertim argilloſo, hæſque magis pingueſcere, & palato ſapidioreſ effe, alias circa ſummas aquas, ubi muſcas appetunt, minus pingues & vilioris pretii: illas apud ſuos *Gundformen*/ hæſ *Schwabformen* appellari. Duo item genera capi in montanis lacubus quos Artheſis facit, quorum unum ab aureo colore *Goldformen*/ alterum à nigredine *Schwartzformen* appelletur.

*De loco & natura hujus pifcis ita Aldrovandus: Lacuftris pifcis eft, fed qui ex lacubus fluvios quandoque ſubit certo tempore, inſtante nempe partu. E Lemano in Rodanum aſcendere ajunt vere,* inquit Gefnerus, ut &

Tab.  
XXX.  
3.  
Aldrov.  
de Pifci-  
bus l. 5.  
cap. 59.



circa Sedunum capi: at in Tigurino & Acronio lacubus neque eodem tempore migrare putat. Acronii lacus incola *paritura* ad Rheni influentis ostium ascendit, ubi cum pepererit, rursus descendit. Conferri ajunt hunc piscem junipero, nam sicut hæc tertio demum anno fructum perficit, ita etiam ejus foetus ad tertium usque annum crescens, perficitur: *parere* plerumque Julio & Augusto, alias citius tardiusve, prout cælum magis minusve calidum fuerit. Jam vero magnolice sit corpore, suâ tamen naturâ agilis quoque est, aliarum Truttarum more. Tradit Jovius sese audivisse majores istas Truttas lacus ripis lascivo excurso extremos arenæ margines aliquando justis passibus longitudine profuscasse. Laudantur vehementer *in cibis*, *Carnem* habent solidam, rubicundam, & saporis optimi: aliquando tamen præ nimia pinguedine nauseam movent, & mortuæ paucissimis horis, quod pinguis illa teneritudo quam sæpissimè computrescant, gratiam saporis amittunt. Larianæ multo succo corpora replent, & genitalem humorem copiosè suggerunt. Præferuntur, si Jovio credimus, Soranæ aliis, in Acronii lacus parte inferiore captæ, illis quæ in superiore parte capiuntur: item quæ circa fundum pascantur, iis quæ circa summam aquam. Ab Helvetiis Februario commendantur, ab aliis simpliciter æstate, dum pulpæ earum rubent. Spinæ dorfi & Caudæ assæ, vel principum mensis inferuntur.

## CAPUT III.

## De Carpione.

Tab.  
XXIX.  
2. 3.  
Aldrov.  
de Piscibus  
lib. 5.  
cap. 50.

**Q**ui sit apud Veteres Carpio, ignoratur, Moderni quidam in solo Benaco lacu reperiri, & à carpando auro dici ajunt. Alii ablata priori syllabâ, *Pione* vocatum fuisse, ac tandem *Carpione* quod cum quidam piscem edisset, careque supputanti solvisset, carè se *Pione* edissere diceret, perhibent Fracastorius à carpo nauta, à Saturo Benacum trajecturo, quod aurum ipsi extorqui vellet, in carpionem mutato derivat. Lacustri potissimum Truttæ congener statui potest. Nam & corporis figurâ, partium numero & carnis substantiâ ei similis est: punctisque similiter nigris notatur, ac denique pinnulam dorfi posteriorem mollem, ut illa habet. Evidentibus tamen ab eâ interstinguitur notis. Prominentiori enim rostro, majoribus oculis, candidiore & turgidior ventre, ac nigricantiore dorso est: *magnitudo* Truttæ lacustri duorum triumve plerumque cubitorum, cum Carpio pedem excedere nunquam visus sit. *Dentes* habet non in maxillis solum, sed etiam in palato & lingua, *squamis* tegitur tenuibus. Ven-

trem habet candidum atque argenteum, dorsum subnigrum. Qui ab Aldrovando exprimitur, lateribus est fere rubicundis, intensius verò rubet lineâ corpus dividens. Ventre pinnisque candicat, *Tergus* ad cæruleum inclinat. Solius Benati lacus alumnum esse omnes ajunt: negatque Petrus Bembus alibi capi, huncque piscem capere atque cognoscere Friderico Imperatori voluptati fuisse. Atqui Salvianus revera reperiri nascique asserit in parvo & limpido lacu, haud procul ab Alvito Campaniæ oppido ex-oriente, (vulgo illago della posta appellato) ex quo Fibrenus fluvius exoritur: esse tamen Benacinis minores, & vix libram unam implere. Profundiora aquæ *loca* amat. Pisciculis *vestitur* & quibusdam lacus recrementis. Bellonius Phrygani edacem esse tradit. Auro *vesti* paulo ante negavimus. Carne est duriuscula, siccaque, minime glutinosa, rubescente, Truttis & Salmonibus simili. Plus æquo servatos contabescunt & deteriores fieri ajunt, id quod & multis aliis piscibus accedit, maximè iis qui delicatiore & friabili sunt carne quam obrem Benaci accolæ, in sartagine frixum, foliis involutum, aceto in quo aromata prius ebullierint, irrigatum, per proximas urbes circumferre, quem condiendi modum vulgus ab hoc pisce acarpionare, alii amarinare nuncupant. Platina spinam in capite gerere scribit perniciosam, eamque inter edendum cavendam: cujus tamen apud alios nulla mentio est.

## CAPUT IV.

## De Lavareto Allobrogum, &amp; Bezola.

**L**avaretus à munditie & candore, quod nunquam sordidus sit, nomen sortitus est. Bellonius ex Truttarum genere esse ait, Rondeletius, Salmonum, Truttarumque generi adjungendum suaderet, inquit, pinnula illa dorfi posterior adiposa Salmonum & Truttarum generi propria nisi multa alia reclamarent, utoris constitutio Thrissisquam Salmonibus similior. Os sine dentibus, caput compressum, corpus *maculis* carens caro mollis & candida. Quamobrem Lavaretum inter Salmones (Truttasque) & Alosas, ambigere judicat. Bellonius exactissimè delineavit his verbis: Piscis Lugduni satis cognitus. Umbræ similimus, nisi *simus* esset, *dentibusque* omnino careret: *Bisulcam* (Bezola) tamen vulgarem magis refert: sed Lavaretus nunquam pedem excedit, neque crassior est eo quod pollex & index capere possunt. Capite est oblongo, *squamis* tenuibus, albis, atque ut in Trutta parvis exiguum in tergore gerit pinnam, duas ad ventris latera utrimque circa branchias, ac totidem sub ventre ei oppositas, quæ tergoris fastigium occupat: aliam quo-

Tab.  
XXX. 4.  
Aldrov.  
de Piscibus  
lib. 5.  
cap. 51.

Bellon.  
de Aq.  
lib. 2.



quoque parvam in eo interstitio, quod est inter caudam & anum, quæ omnes nigricantes apparent. *Linea* à supercilio subrubra per latera ad caudam protensa insignis est: *cauda* bifurca, pinnisque ad extrema nigris, fimbriatis ac laciniatis. Ventre laxo & prægrandi, ut in Trutta. Hoc item à Cæteris piscibus differt, quod *nare* est recurta, atque (ut in Harengiis ac Logiis) ossiculis quibusdam prominentibus insigni, labiis nullum *dentium* rudimentum ostendentibus, appendice glabra ac carnosâ *caude* insidenti, in Umbræ modum. Neque tamen *dentibus* caret: ossicula enim ad ejus fauces atque oesophagi ingressum utrimque conspiciuntur, senis hinc inde denticulis, ut in Themolo, comminuta. *Branchiæ* illi sunt utrinque quaternæ ac simplicissimæ, quarum extrema, quæ capiti inhæret, reliquis sane minor est, nullis lateribus maculis est insignitus, totumque hujus piscis corpus, dempto tergore argentum est. Verumtamen si ad ejus internas partes advertas, *costas* quinque & triginta utrinque connumerabis, cernesque *cor* illi esse pallidum ac trigonum, pericardio inclusum: *hepar* album, unius tantum lobi, ut in Exocæto & Delphino, in cujus latere dextro fellis vesicula adfuta est. *Lien* à sinistris apophysis & stomacho incumbit. *Intestina* nullas habent revolutiones. Nam gula usque ad ventriculi fundum deducitur, qui per piscis longitudinem delatus, ac sursum quidem reflexus, duodenum parit à dentibus suffultum, in cujus gibbo innumera apophyses spectantur: ex quibus vena oritur, per quam sanguis defertur ad hepar. Apyloso sequitur aliud intestinum, quod nullis anfractibus circumductum, rectâ ad anum tendit. *Vulvam* utrinque bicornem habet, tenuibus *ovis* conspicuam. Cætera in congeneribus piscibus describentur. Lacum Allobrogum, ut Burgetii & Equibelerii proprium Rondeletius facit. Bellonius ex Lemano quoque adferri scribit. Caro ei candida, mollis, suavis, minimè glutinosa, boni succi, mediocriter nutriens. Bellonius in tantis in Gallia delitiis haberi scribit, ut regionem œconomorum chartæ frequenter inscriptum habent.

BEZOLÆ nomen huic pisci latus Lemani accolæ dedere, Bisulam Bellonius dixit. Latine *Cephalum* vel *Mugilem Lacustrem*, vel potius *Leuciscum Albalamve* lacustrem appellare licebit. Bellonius semel tantum hujus piscis meminit, Lavaretum Bisulam magis quam Umbram referre inquiens. Sed Rondeletius exactius, ut Lavaretum, inquit, Lacus Burgetius, & Equibelerius ferunt, ita Lemanus Bezolam vulgo dictam, non admodum dissimilem, nisi quod colore minus est candido ad cæruleum inclinante: rostro acutiore, capite minore, ventre latiore & prominentiore. Nullum piscem re-

perias, cum quo melius comparari possit, quam cum Harengo, quam in marinis depinximus. Carne est molliore quam Lavaretus, & ab eo saporis suavitate & succi bonitate multum superatur, nec in pretio habetur. Proprius est Lemani lacus.

## CAPUT V.

De *Albula parva*, & *minima*  
Gefneri.

ALBULAM parvam non sui generis piscem esse, sed Albulam sive Bezolam cæruleam secundo tertiove suæ ætatis anno ita vocari, quidam opinantur, quibus piscatores nostri, inquit Gefnerus, contradicunt, quod cæruleos observarint, secundo etiam ac tertio anno forma coloreque à genere Albularum (de quibus hic loquimur) differe. Cognatus est hic piscis cæteris lacustribus albis. Nam & species & sapor fere omnium non dissimilis est. Albula magis quam Bezola albicat: cauda tamen & reliquæ pinnæ, præter eas quæ juxta branchias sunt, nigricant in extremitatibus. *Dorso* color glaucus: alicubi tamen purpurei quiddam & cærulei mixtum videtur. Caput ex glauco cæruleum. Inter caput & dorsum color viridis, ceu gemma relucet. Branchiæ ei quaternæ. Hyeme aliquando memini me videre hunc piscem *squamis* per latera exasperatum, eminentibus per singulas squamas veluti tuberculis. Aiebant hoc indicium esse recentium & vivarum. *Capiuntur* Albulæ in summa parte Tigurini lacus, juxta locum quem Buchberg vocant, diebus ferè quatuordecim post diem divi Martini, & ad oppidum Rapperswillam circa ipsum divi Martini diem. A *partu* in lacum nostrum descendunt (sed non tam procul ut cæteræ Albulæ) usque ad Ver: deinde rursus ascendunt tota æstate, usque ad divi Martini diem. Capiuntur etiam in Gryphio agri Tigurini, multo majores quam in nostro, & in Halvillensi Bernensis agri. Augusti & Septembri mensibus præcipue laudantur, quod suaviores eo tempore solidioresque sint. Postea enim pariunt, & mollior earum caro fit, & succus in foetura consumitur.

DE ALBULA MINIMA sic Gefnerus: Albulam minimam hunc piscem voco, inquit idem Gefnerus, quem nostri Hagele vel Haling, quasi Haleculam appellant. Friburgi Helvetiorum (ut audio) *pfarren* / Lucernæ *Nachtfisch* / quod noctu fere irretiatur, ut quidam putant. Sed mihi piscator Lucernensis affirmavit, *Nachtfisch* vocari Albulam cæruleam anno primo, cum circa diem divi Johannis ætate jam ad digiti longitudinem excrevit. Tota specie accedit ad illam quam proxime albulam parvam nominavi, sed plerumque minor est, & in capite minus viridis.

Tab.  
XXX.  
7. 8.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 53.

Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 54.

Tab.  
XXV. 5.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5.  
cap. 52.



viridis. Si piscem erectum inspicias per dorsum aliquid coloris purpurascens in lateribus apparebit. Branchiæ ei quaternæ sunt, pinnulæ albescent. Ore aperto superioris mandibulæ extremitas deorsum tendit. Os habet longiusculum, *dentes* nullos. Julio *coëunt*. Noctu tantum *capiuntur* retibus ad passus quadraginta aut quinquaginta demissis. Cum cœlum serenum est, altius descendunt cum nubilum, ascendunt. Densissimis gregibus præ cæteris Albulis capiuntur, non passim in lacu nostro, sed maxime à pago Vædesuilla, usque ad Insulam & versus alteram ripam à loco Surenbach usque ad arbo-rem longam. Diebus quatuordecim fere à natali Domini capi incipiunt & immixtæ eis Albulæ cæruleæ aliquot, & mox expirant. Cum captæ mox expirent, in recentes habeantur matutino tempore potius ad prandium coëmuntur, & assi in craticula quam calidissimi à gulonibus devorantur, qui eam ob causam non universos, sed paulatim alios assari jubent, ut statim assumtis prioribus, fervidi posteriores mensis afferantur. Embamma additur ex aceto, sapa, pipere, sale & potri aut cepæ foliis concisis. Placet item recens in jure albo frigido, apio copiose insperso, maxime per mensem Decembrem. Sale idem conditus infumatusque comendatur.

## CAPUT VI.

De Albo Salviani &amp; Farra.

Tab.  
XXX.  
9. 10.  
Aldrov.  
de Piscibus  
l. 5.  
c. 55.

**A**lbus Salviani, Capto lacustris Gesneri est. Quamvis Squalo Alburnove appellato pisci persimilis sit, ab eo tamen evidentibus quibusdam notis facile internosci potest. Primum enim etsi uterque latitudinis ratione oblongus appareat, eadem nihilominus utriusque existente latitudine, Albus paulo longior Alburno conspicitur. Deinde rostro acutiore, oculis majoribus ac dorso magis repando Albus est. Nam cum Alburni sensim atque modice, Albi repente ac plurimum à capite extuberat *dorsum*. Pinnarum autam tum in lateribus, tum in dorso ac in imo ventre existentium, situ ac numero ei cum Alburno conveniente, earundem colore ab invicem discrepant: subnigras enim Albus: subrufas verò Alburnus eas habet. Postremò amplioribus *squamis* albus tegitur. Ventreque atque lateribus, æquè atque Alburnus candidus atque argenteus est: capite vero ac dorso magis quam ille subviridis. Magnitudine non differunt. Uti enim Alburnus, sic & Albus pedalis, frequens: bipedalis verò aliquando tantum reperitur. Lacustris piscis est, non tamen in lacubus omnibus aut eorum quam plurimis, ut Tinca, Lucius, Squalus ac Barbus, sed eorum nonnullis solum reperitur. In Trasymeno enim lacu, ubi etiam Albo vulgo vocato, fre-

quens satis in fine veris *capitur*. In fluminibus eum reperiri huc usque non observavimus: estque advertendum, ne quispiam eum in fluminibus etiam reperiri contendens, Squalum pro Albo nobis ostendat, in mari nec nascitur, neque ex lacubus fluminibusve ad id descendit. Duram *carnem* habet Albus, & propterea ægre coquitur. Inspidus adeo est, ut piscium omnium jure vilissimus censeatur. Nec enim ulla condiendi ratione sapidus effici potest. Torrefactus tamen paulò minus ingratus est palato, solumque in aliorum piscium penuriâ eo vesci solemus.

FARRA, Fora & Pala quoque dicitur. Lavaretos vel Thrissas refert, ut scribit Rondeletius, magnitudine cubitali, ore parvo, sine dentibus ut in Thrissis, colore cinereo, corpore depresso & lato, *squamis*, pinnarum situ & numero Lavaretis similis, linea à branchiis ad caudam recta & candida ducta est. Pinnulam dorsii mollem pinguemque habet, caudam latissimam. *Carne* est candida & suavi, quæ Laveretorum Truttarumque carni non cedit.

Æstate & autumno *capitur*, hyeme in altis gurgitibus latet. Sale conditur & servatur in hyemem. Sicille. Cæterum monendus est Lector in Rondeletii codicibus diversum piscem, quem in Lemano Vangeronem vocant, huic capti haud recte per librarium incuriam præfigi.

## CAPUT VII.

De Pigo, &amp; Schilo.

**P**isci, quem descripturi sumus, Verbani Larii que lacus accolæ *Pici*, *Pigi* & *Picui*, quod clavis suis seu aculeis pungat, nomen imposuere. Rondeletius *Cyprianum clavatum*, Albertus *Vergiliadem*, quod Vergiliarum ortu apparent, dixit. Cypriano, describente Rondeletio ita est, similis ut demptis aculeis Cyprianum esse affirmes. Est enim eodem corporis habitu, pinnas totidem eodem in loco sitas, os, oculos, eodem modo carnosum, interna omnia similia habet. Vita item, moribus, sapore, succo Cypriano similis, nisi quod paulo melior est. *Salvianus diligenter sic descripsit*. Pigus piscis est capite rotundo: rostro obtuso, nec admodum extento, ore mediocri & edentulo.

Branchias habet utrinque quaternas, & juxta eas, pinnas binas, utrinque unam: aliasque in imo ventre, caudæ magis quam capiti vicinas. In dorso ferè medio una haud magna, nullis aculeis armata reperitur: Imo ventri propè caudam alia una etiam minor hæret. *Cauda* ipsa in falcatam pinnam desinit. Totius *figura* ni paulo longior esset, ovata censeretur posset. *Squamis* magnis tegitur, ex quarum medio albi & pyramidati *aculei*, in fine veris & ineunte æstate, enascuntur. Quibus cum primis 40. æstivis diebus hor-

reat,

Tab.  
XXV.  
11. 12.  
Aldrov.  
l. c. cap.  
56.

Tab.  
XXX.  
13. 14.  
Aldrov.  
l. c. cap.  
57.



## CAPUT VIII.

## De Saracho.

reat, æstate procedente imminuuntur primum, demumque prorsus delitescunt. Quapropter primis illis æstivis diebus demptis, reliquo anni tempore prædictis pyramidatis aculeis omnino caret: unde cum Plinius scribat: Duo lacus Italiæ in radicibus Alpium Larius & Verbanus appellantur, in quibus pisces omnibus annis vergiliarum ortu existunt squamis conspicui crebris atque præacutis clavorum caligarium effigie, nec ampliusquam circa eum mensem visuntur. Dubio procul Pigum piscem, etsi innominatum eum relinquat, describit, cum is (ut infra monstra bimus) Larii & Verbanilacus alumnus sit, & (uti diximus) in prima æstate (quo quidem tempore vergiliæ exoriuntur) ejus squamæ parte media, clavorum caligarium instar, præacutæ fiant. Habent enim caligares clavi, qui à caligis militaribus, quibus suffigebantur, dicti sunt, pyramidata capita. Ejusmodi a. aculeos, sicuti Majo & Junio tantum mensibus, in dorsoque solum & lateribus; & non in ventre, Pigo enasci asseverant omnes, sic non fœminas, sed mares tantum inhorrescere, testantur nonnulli: Venter ex albo languide rubet: tergus ex cæruleo nigricat. Quod ad interanea attinet, nil habet præcæteris piscibus peculiare atque animadversione dignum. Cum maximè excreverit, quinas aut senas libras non excedit. Solius Larii atque Verbani lacus accola est. Nemo enim in alio lacu flumineve eum reperiri hucusque (quod sciam) animadvertit. Et licet frequentiores in prima æstate, cum clavis illis caligariis insigniti apparent, in iis lacubus capi solent, reliquis etiam omnibus ferè anni temporibus, in eisdem, etsi non æque crebro, capiuntur. Majo Mense circa lacus littora parit. Sapore & succo Cypriano est similis, paulo tamen melior. Salvianus ei sapidissimam, ideoque cum optimis quibuscumque dulcis aquæ piscibus conferri posse & maxime in æstatis principio captum: hoc enim tempore nulli piscium esse secundum, & quovis denique modo conditum, probe semper sapere.

Aldrov. l. c. c. 59. SCHILUM, qui & *Nagemulus*, ita describit Gasserus: *Bagmaul* piscis est in Ambronis lacu Baviaræ, qui raro capitur, quoniam raro altius natando evehitur. Longissimus ulnam æquat. Formâ non dissimilis est Lucio, nisi quod in aqua subviridis, extra aquam verò dilutior apparet: oculis albicantibus, ore retro juxta maxillas minus lato. Squamarum magnitudine, ordine & asperitate Percam refert. Pinnæ dorsî erectæ, aculeis tres fere digitis rigent. Præter dorsî spinam paucas alias & parvas habet. Parit Martio. In cibo quidem optimus est Majo & Junio. Elixatus, assatus & frustatim concisus etiam frigi solet. Pinguis est admodum, & carnem etiam coctus albissimam servat.

Piscem quem Albanenses *Sarachum*, Ichthyopolæ *Sarachinum* vocant. Bellonius *Agonum*, Jovius & Salvianus *Aconem*, Fracastorius & Jovius *Aquonem* vocant, ab officulis sine dubio illis acutis, quæ asperam spinosamque in ejus ventre lineam constituunt, & veluti acus quidam sunt. Rondeletius *Chalcidem*, quem Gaza *Aericam* vocat, dici opinatur, alicubi fortè *Sardanella* dicitur. De ipsorum Generibus ita Bellonius: Tres sunt apud Insubres lacus in quibus piscem vulgari Mediolanensem idiomate, *Agonum* nominatum capiunt, varium quidem eum.

Tab. XX. Aldrov. de Piscibus. l. 5. c. 5.

Bellon. Aquatibus l. 2.

Larius enim lacus, qui hodie Comensis cognominatur, Agonos educat exiguos ac magis populares, Sardis similes, dempto quod ventre sunt latiore: neque alio quam Mediolanum transferuntur, aut saltem raro Mantuam prætergrediuntur. Eos doliis muriâ conditos adservant, quanquam etiam mediocriter sicci sine muriâ comperiantur. Verbanus lacus, quem lacum majorem cognominant, multo majores Agonos quam Larius educat. Indigenæ urbium, quæ ad ejus litus sitæ sunt, Aronan, Palencza, Cornobio, Locaria & Eugudræ vocatos pisciculos magno proventu capiunt, mediâ magnitudine inter Larios & eos ex lacu Lugaræ, quos Indiginæ urbium nominant *Campignon* & *Buiffon*. Benacus autem Lacus magnitudine insignes Agonos profert. Sed nec Urbani aut benaci Agoni muriâ condiri solent, ut minores. Hæc ille; & mox rursus de Saracho. Duo, inquit, tresve lacus sunt in Epiro, in quibus Sarachi capiuntur, quos ubi sale condierint, exiccant, & fumo infecerint, Venetias, Anconam & aliò navigiis transvehunt. Quorum eos maximè in pretio habere solent, quos de la Bojane hujus nominis flumine ac lacu cognominant. Horum verò duo comperiuntur genera, alterum minus, alterum autem Clupeæ ferè magnitudinis. Minores Sarachi quadrante longiores non sunt, majores pedalem implent longitudinem. Ambo eadem linea sub ventre præditi sunt, quâ Clupea insignita est. Cæterum Agoni omnes (inquit idem Bellonius) squamas habent levi contactu decedentes, tenues, latas & transparentes: corpora argenteo colore nitentia, sed parum nigricant in tergo. Desquamati super argentum terfissimum refulgent. Oris rictum habent grandiusculum sine dentibus: pinnam in tergo simplicem, parvam, duas in lateribus sub branchiis, quarum omnium exterius tegumentum spineum in medio crenatum est. Oculos valde grandes proferunt, caudam

Q in



in penicilli modum discissam. Utrique nonnunquam lituris duabus, rotundis, ac nigris, interdum pluribus sigillatur in tergo. *Lineam* sub ventre habent ferratam, ad anum desinentem. quam si digito in adversum confrices, cùltri modo acutam percipias. *Branchias* habent utrinque quatuor, internâ parte veluti fimbriatas, quod etiam Harengis, Celerinis & id genus piscibus accidit. *Cor* ut semen Cicerculæ trigonum inter anteriores pinnae sub branchiis occultatum. *Hepar* subrubrum sinistro stomachi lateri & œsophago incubans, ipsumque pylorum amplectens. *Stomachi* figura in conum turbinata, à cujus superiore parte pylorus exit, ac multis apophysibus cœcis circumdatur. *Lien* dextræ Stomachi parti, inhæret ruber, à pyloro intestinum non reflectitur, sed recta ad anum tendit. Triginta sub ventre *officula* acuta, asperam in hoc pisce lineam constituentia, connumerare potes. Hæc omnia itaque Bellonius, quibus addi potest, Hosce pisces ita pinguescere referente Rondeletio, ut cum in craticula assantur, pinguitudo veluti oleum distillet, adeò ut

ab hac pinguedine, sint qui *Liparim* appellant. *Carnivori* sunt, & pulices aquaticos venantur. De *generatione* prodit Salvianus, Acones fœminas ovis gravidas, maribus semine refertis consequentibus, ad saxosa litora Majo mense adnatare, ibique illas parere sua ova, hos suo semine fœcundare, moxque pusillos inde procreari pisciculos, qui intra paucos dies ad digiti augeantur magnitudinem, tuncque vulgo *Antefitos* vocari. Aqua exempti mox *emoriuntur*. *Gregatim* *vivunt*, & temerè in retia incidunt. Adeo sunt *timidi*, ut vel à tremula umbra terreantur. A Luciis, Cyprinis & Truttis adeo sibi metuunt, ut aliquot aliquando millia, insequentem inimicum longo per lacum tractu pavidi fugiant, jucundo intuitibus spectaculo. Alosis sapore persimilis, vere graciles, autumnis optimos Jovius facit. Salviano Julio, Augusto, Septembri & Octobri mensibus probantur. Crassiusculum tamen succum gignunt, difficulter concoquuntur, & mediocriter nutriunt. Cum faliendi causa exenterantur, *oleum* ex interaneis ad lucernarum usum colligitur.





# HISTORIÆ NATURALIS

## DE

# PISCIBUS.

L I B E R I V.

### De Piscibus Exoticis.

#### T I T U L U S I.

*De Piscibus squamosis.*

#### C A P U T I.

*De Tajaſica, Paru, Pira-Acan-gata, & Acarauna.*



Oterant quidem & isti, quos hoc libro trademus pisces, ad sua genera in præteritis referri: verum cum tardè nimis ipsorum descriptiones & icones in manus nostras pervenerint, coacti sumus eos peculiari libello includere.

*Tajaſica* itaque prout Brasiliensibus vocatur: piscis est octo aut novem digitos longus, corpore obterete & pyramidalis, extenuatur enim versus caudam. *Caput* est illi grossiusculum & compressum: *Oculi* eminentes & nigri, circello aureo: os edentulum. Sex habent pinnas, nimirum sub qualibet branchia unam oblongam, sub his in medio inferius unam breviorē: unam in medio dorso, aliam longiorem versus postremam dorſi partem, & è regione hujus unam in infimo corpore: septima est cauda, oblonga & in exitu rotundata. Tegitur squamulis parvis, coloris hyalini pallidi, maculis variis fuscis vermiculatis variegatus per totum, exceptis pinnis postbranchialibus & infimo ventre quæ ex pallido subflavescent. Cauda est undata fusco. Latet in arena absconditus; ideoque capitur pediquis, eos ponendo super arenam ubi latet.

Coctus atque assatus bene sapit & convenit cum Hollandorum *Post* / est enim carne albiſſima & friabili.

*PARU*, Piscis est latus & subrotundus, verum haud crassus, novem aut decem digitos longus ab ore ad pinnam caudæ quæ duos & semis digitos longa & totidem lata: latitudo piscis septem digitorum. *Pinnas* obtinet sex: duas magnas ac latas duos circiter digitos; unam in dorso, alteram in ventre quæ utrobique ad caudam extenduntur, habetque quævis pinna in fine prominentiam instar funi-

culi, ea videlicet, quæ in dorso quinque digitos, quæ in ventre tres digitos longam. Post branchias in quolibet latere etiam pinna est duos digitos longa, unum lata, & duas in inferiori ventre sub his, duos digitos longas, angustissimas. *Capite* est parvo, ore elato, angusto, minutissimis dentibus albi coloris; oculis conspicuis, flavo circulo circumdatis. Totum corpus vestitur squamis mediocribus, quarum dimidius numerus niger est, dimidius autem flavescit, ita ut lunulas flavas in nigricante corpore gestare videtur. Circa branchias flavedo est, & in initio pinnarum, post aures macula flava in qualibet.

Piscis est edulis.

*PIRA ACANGATA*, id est, piscis duro capite: Percæ mediæ magnitudine, septem aut octo pedes longus, ore haud amplo, oculis nigris, circello nigricante aureo & ruffo colore mixto. *Pinnas* habet sex & septimam pro cauda: duas postbranchiales, duas infimo ventre junctas, unam versus posteriora in ventre, & unam per totius dorſi longitudinē usq; ad caudam extensam & erectam, firmis spinis suffultam quam in vaginam recondere potest. Pinna caudæ furcata. Tegitur squamulis argenteis, aureo & igneo colore transplendente, præsertim in dorso: in ventre in argenteo thalassinus color translucet.

Pinna dorſi argentea transplendens & maculis fuscis insignita: Pinnæ laterales albæ, quæ in ventre cærulescentes. Caudæ quoque pinna in extremitate cærulescit. Est edulis.

*ACARAUNA*, Piscis magnitudine æquat Paru, sed non est ita latus, & squamulas habet nigricantis coloris. Cauda est bifida, pinna tres digitos longa, duos lata. Pene utramque branchiam etiam pinnam habet, inferius in antica parte duas angustas. Per totum dorſum & per ventrem etiam pennam utrobique extensam, acutam, continuam, in postica parte corporis circiter unum digitum latam. Os parvum, angustum, denticulis minutissimis. *Oculi* haud magni. In utroque latere prope caudam acutissimum habet aculeum; quos in latera potest recondere & evaginare & alios pisces lædere: quilibet aculeus ferè digitum longus ossis piscino constans.

Piscis est edulis.

Q<sub>2</sub>

C A.



## CAPUT II.

De *Guaperuæ*, *Piranema*, & *A-carapucu*.

Tab.  
XXXII.  
3.  
Marcg.  
Hist. Bra-  
sil. l. 4.  
c. 2.

**G**UAPERVA Brasiliensibus. Piscis est corpore lato & compresso, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus. Ore parvulo, denticulis minimis. Pinnae habet sex: post quamlibet branchiam unam, parallelogrammi figura: in infimo ventre duas oblongas: in dorso & inferiore ventre extremo longam ac latam, quæ in acumen desinunt, subulæ figura. Cauda quadrata seu potius parallelogramma, unum digitum longa, duas tertias digiti lata. Tegitur squamulis coloris nigri, splendentis instar bombycini, quarum oræ (non omnium sed quarundam) fimbrias flavas habent instar semilunularum. Pinnae sunt nigrae, Circa os linea crassa purpurei est coloris. & illi perpendicularitur altera supposita Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latus & posticas pinnae extenduntur. Caudam etiam talis fecat linea & ejusdem coloris; una pro fimbria ipsi est oculorum pupillâ nigra, circulo aureo.

PRANEMA, Piscis mediocris Capionis seu Percæ magnitudine; novem, decem aut undecim digitos longus; latus ubi maxime, tres digitos aut paulo amplius. Os habet amplum, subrotundum, edentulum quidem, sed acutissimis prominentiis asperum: oculos magnos instar solidi Hollandici, pupilla crystallina, circulo aureo splendente, qui superius ad dimidiam partem coloris est miniati. Branchias habet admodum amplas. Pone has in quolibet latere pinnae digitum quidem longæ sed haud latæ, & subter has in ventre duæ sibi propinquæ duos digitos longæ & sesquidigitum latæ, triangulares, spinis suffultæ. A ventris medietate ad caudæ exortum usque pinna protenditur tres & semis digitum longa, unum lata, itidem spinis intertexta, quam abscondere fere potest in rima ad hoc comparata: per univsum dorsum ab occipitis sine ad exortum caudæ pinna extenditur quinque digitos longa, paulum plus digitum lata, tenui membrana constans, duabus & viginti spinis intertexta, quam erigere atque deprimere & fere abscondere potest in rima. Cauda quæ à corpore protenditur sesquidigitum est longa, unum lata, pinnam habet tres & semis digitos latam, & plus quam sesquidigitum longam. Color totius piscis est argenteus lactatus lacca florentina. Squamulas habet minutulas quasi triangulares: in ventre plus albicat, seu argenteo minus lacca intermixtum cernitur.

Capitur in mari & boni est saporis, edulis. ACARAPUCU, fluviatilis piscis, in sesqui-

pedalem longitudinem excrevit, ubi latissimus quatuor aut quinque digitorum. Os acuminatum circiter duos digitos longum, haud amplum, labia abscondere & contrahere potest, ut solum hiatus appareat, nullos habet dentes. Oculi magni, pupilla nigra splendente, circulo ex albo & fusco mixto. Pinnae habet septem: unam per dorsi longitudinem ad caudam fere extensam, non latam, quam erigere & spinis sustentare, atque recondere potest: post branchiales duas, totidem in infimo ventre, unam post anum: Septimam pro cauda, furcatam quatuor aut quinque digitos longam. Totus splendet squamis argenteis minoribus: in dorso tamen aliquid aurei admixtum: & in quolibet latere sex oblongæ maculae cæruleæ rufescentes, non ita conspicuæ. Pinna dorsi & cauda dilutè cinerei sunt coloris, ut & laterales: duæ in infimo ventre flavescent paulum, ut & ea quæ prope anum. Edulis est.

## CAPUT III.

De *Pudianô Vermelho*, *Pudianô verde*, & *Iuruu-capeba*.

**P**UDIANNÔ *Vermelho* vulgo, sed rectius *Bodianô*: Brasiliensibus *Aipimixira*, & *Tetimixira*, Piscis mediocris Percæ magnitudine. Latitudo corporis ubi maxima, duorum digitorum prope caudam unius aut paulo plus. Corporis fere æqualis latitudo est. Caput parvum, os acutum, superius in anteriori parte tres denticuli acuti, minimi, inferius item, & versus interiora in utraque mandibula alii minimi denticuli. Oculos habet paululum eminentes, pupilla nigra, exteriori albo, hinc flavo circulo. Pinnae habet septem: nimirum duas plus digito longas, haud latas, post branchias in utroque latere unam: sub his duas junctas in ventre: aliam in ventre versus caudam duos digitos longam, secundum longitudinem adnatam: unam item talem in dorso, tres & semis digitos longam: & septimam pro cauda, quæ est quadrata, digitum longa & lata. Tegitur piscis squamis subtilibus, ita arctè complicatis, ut ad tactum glaber esse videatur. Color totius corporis flavus cum aureo mixtus. Summitas autem capitis & totum dorsum ad media utrimque latera, & fere usque ad finem dorsalis pinnae purpurei est coloris egregii cum lacca mixti: extrema ora pinnae majoris in ventre versus caudam etiam purpurascit ut & pinnae flavæ cum aureo colore mixtæ, ut & totum reliquum corpus. Pars ultima pinnae majoris in dorso etiam flava ut & cauda. Piscis est edulis.

*Pudianô Verde* Lusitanis. Piscis oblongus, nimirum decem digitos ab oris extremo ad caudæ

Tab.  
XXXII.  
4. 5. 6.  
Marcgra.  
Hist. Bra-  
sil. l. 4.  
c. 3.



caudæ initium; corpus tres digitos latum, circa caudam autem sesqui. *Os* acuminatum, haud amplum, antè in superiori mandibula habens duos dentes acutos, longos; & seriem denticulorum minimorum: inferius in anteriore parte quatuor, longos, acutos, & seriem minorum candidorum. *Oculos* habet parvos, pupilla nigricante, circello primum aureo, dein exterius albescente. *Pinnas* obtinet septem, nimirum unam per dorsi longitudinem extensam, sex & semis digitos longam, dimidium latam, quam spinis erigere & sustinere potest: post utramque branchiarum unam, duas digitos longam, paulo plus uno latam: sub ventre duas parvas junctas: à medio autem ventre inferiori una tendit pene ad caudæ exortum, quatuor digitos longa, unum fere lata: Septima pinna est cauda, quæ est quadrata aut parallelogrammi figura, sesquidigitum longa, duos lata.

Totus piscis vestitur squamis latis quæ ita compositæ sunt, ut meri cubi sibi apppositi videantur; lutei seu aurei coloris ac per totum ambitum linea seu fimbria elegantissima azuri seu cærulei coloris. *Caput* superius aureum est cum magna macula coloris ex viridi thalassini, circumdata azureo & azureis flavis subviridibus & albicantibus striis variegatum. *Pinnæ* duæ laterales seu postbranchiales & duæ in ventre albicant, in laterali ambitu cærulea lineola præditæ. *Pinnæ* dorsalis aurei est coloris & striis undulatis cæruleis secundum longitudinem notata, quæ in ventre major ex ruffo ad brunum vergit colorem, striis itidem cæruleis secundum longitudinem. *Cauda* rufescit striata thalassino ac cæruleo secundum longitudinem, in extremitate autem paululum virefcit.

Piscis insignis coloris & edulis. Capitur in mari.

*Iuruucupeba*, aut etiam *Itaiara*. Piscis longus septem aut octo digitos, duos aut tres latus, ubi latissimus: *ore* satis parulo, & ex triangulari rotundo, lingua angusta, brevi, denticulis minutissimis: *oculis* rotundis, pupilla crystallina & circulo rubro. Post branchias in utroque latere habet pinnam sesquidigitum longam, quadratam & exterius circinatam: subter has, duas in inferiori ventre junctas; paulo post occipitium incipit pinna anteriori medietate spinis suffulta, posteriori mollis, quæ tendit secundum longitudinem dorsi ad caudam usque, & semper fit latior, prope caudam digitum lata. In inferiore corpore versus caudam etiam pinnam habet haud amplam. *Cauda* constat pinna sesquidigitum longa, plus uno lata & quadrata.

Squamatus piscis, sed squamis ita complicatis ut lævis esse videatur. Piscis universi color egregiè ruber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus; in lateribus autem

constanter maculas habet puniceas, nigras, varias, majores & minores. *Pinnæ* omnes sunt rubræ & nigro maculatæ.

Pinguis est piscis & boni saporis, optimus tamen assatus. Capitur in mari inter scopulos. Parieti recens appensus noctu toto corpore clare lucet.

## CAPUT IV.

*De Iaguaraca, Carauna, Cururuca, & Guatucupa Iuba.*

**I**A GUARACA. Piscis est mediocris Percæ magnitudine, *ore* acuto, edentulus. *Oculos* habet magnos, pupilla crystallina nigra, magna & ampla, circulo coloris argentei, & superius maculam sanguineam habente. *Pinnas* habet in lateribus & infimo ventre similes præcedenti pisci: per dorsum verò secundum longitudinem extenditur pinna digitum lata, usque ad unum digitum ab initio caudæ, constans tenui membranula undecim spinis acutissimis suffulta, quam potest elevare & substernere pro libitu: atque non solum componere, sed & abscondere in rima cui pinna insidet.

Hanc sequitur alia contigua unum digitum lata, pertingens ad caudæ exortum, duos digitos longa, triangularis & superius desinens in acumen. *Cauda* autem pars reliquo corpori subtenfa rotunda est, sesquidigitum longa, continens pinnam furcatam, cujus pars inferior duos digitos longa, superior paulo longior. Ad branchias in utroque latere, in quolibet duos habet aculeos, in quorum medio alii sunt minimi: his branchiis & aculeis ferit & vulnerat: ferit etiam cum spina dorsali & cum iis quæ sunt in infimo ventre, ad quarum singularum latus aculeus est satis longus, & quidem in pinna prope caudam in infimo ventre spina est unum digitum longa.

Totus piscis tectus est squamulis eleganter dispositis; & quælibet squamula in ambitu minutissime est serrata. Color totius corporis est argenteus, in ventre plane albicat. *Caput* superius incarnati est coloris; & hispida testa munitum. *Pinnæ* omnes coloris sunt dilute incarnati: ea autem quæ in dorso spinis suffulta, prope spinas auro est umbrata.

*Caro* pinguis & boni saporis, præsertim si piscis assetur. Capitur in mari inter scopulos.

*Carauna*. Magnitudinem & figuram habet ut *Iuruuca peba*, differt tamen capite & colore corporis. *Pinnas* quoque eodem modo positas habet ut ille. *Os* autem obtinet lunatum; dentesque habet acutissimos, sed minutos: *Branchias* amplas, quæ aculeis in postica parte sunt munitæ. *Oculi* versus summitatem capitis in lateribus positi non longe

Tab.  
XXXII.  
7. 8. 9.  
Marcg.  
Hist. Bra-  
sil. l. 4.  
c. 3.



ab invicem haud magni, pupilla ovali nigra, quam ambit circulus ruber. Squamulis in universum vestitur lunatis, coloris miniati per totum, & ubique punctula nigra, magnitudine seminis papaveris insparia habet, præterquam in ventre.

Capitur in mari inter scopulos: estque edulis, molli admodum carne atque boni saporis.

*Cururuca*, species *Corvinæ*; Piscis fluvialis, sesquipedem longus, corpore oblongo; ore satis amplo, oculis mediocribus, nigris. *Pinnas* habet septem: unam per dorsi longitudinem ad caudam ferè protensam, quæ divisa est & prior pars latior, tres digitos ferme, & totidem longa, triangularis, spinis suffulta, posterior longior, sed exilior. Cauda fere quadrata. Squamas habet mediocris magnitudinis argenteas cum auro & subfusco pauco mixtas, præsertim in dorso & lateribus. *Pinnæ* in dorso & lateribus ac cauda, cinereæ, in medio ventre flavescent, & fufescent. Edulis est.

Idem. l.

4. cap. 4.

*Guatacuba Iuba*, in duorum pedum longitudinem excrescit, dorso paulum incurvato. *Os* habet triangulare, acuminatum, dentes parvos acutissimos. *Oculos* magnitudine stufferi Hollandici, pupilla magna, nigra, splendente circulo rubro. *Pinnas* habet molles sine spinis in lateribus, nimirum unam in quolibet latere, post branchias, angustam, duos & semis digitos longam: duas tales junctas & ventre subter illas unica spina munitas: & unam prope anum digitum longam ac latam, unica quoque spina armatam. Ante medium dorsum versus occiput, incipit pinna desinens ad caudæ initium, quinque digitos longa, unum fere lata; quæ duabus & viginti spinis erigitur: cauda duos pene digitos longa, unum lata, pinnam habet plus uno digito longam & quatuor latam paululumque exterius versus interiora arcuatam. Vestitur squamis paulo majoribus, coloris argentei & striis flavis & ex argenteo rufescentibus secundum longitudinem extensis à capite ad caudam usque. In utroque latere etiam à capite ad caudam eminens linea tendit. *Caput* ex argenteo, rufo, flavo mixtum. *Pinnæ* albæ sive argenteæ, caudæ pinna rufa: venter albus.

Capitur in mari inter scopulos. Boni est saporis, & lingua & caro circa mandibulas longè optimi ut in Carpione.

## CAPUT V.

*De Pira lurumenbeca, Tamoata, Acara, & Pira Pixanga.*

Tab. XXXII.

II. 12.

Idem lib.

4. c. 4.

**P**IRA JURUMENBECA vulgo *Bocamol-le*, quia molliore & aquis extractis statim moritur: vivit in mari in cœno: oblongus piscis haud latus: novem aut decem interdum pedes longus, duos & semis latus, ubi latif-

simus. *Os* habet elevatum; quod ampliare & rotundare potest: oculos magnos, pupilla crystallina, circulo ex argenteo & brunno mixto. *Septem* habet pinnas, duas angustas postbranchiales, duos digitos longas: duas in infimo ventre junctas, duos fere digitos longas, unum latas: unam post anum firma spina suffultam: sextam per dorsum extensam & bisectam; anterior ejus pars sesquidigito longa, unum lata, triangularis, quam erigere & in rimam recondere potest, mollis & translucens, altera pars usque ad caudam fere porrecta, tres digitos longa, semidigitum lata, itidem mollis. Septima est cauda, duos fere digitos longa, sesquidigitum lata. figura pentagoni cujus basis inserta in corpus.

*Squamas* habet toto corpore argenteas, splendentes, mediocris magnitudinis: in dorso viridis & aureus color transplendet. *Pinnæ* argenteæ & in medietate exteriori aureæ. In quolibet latere tinea tendit paulum elata, etiam argentei coloris ut reliquum corpus.

Edulis est & boni saporis.

**TAMOATA.** Lusitanis soldido (quia armatus) piscis fluvialis seu aquæ dulcis, edulis. Longitudo corporis ab occipitio ad initium caudæ trium & semis digitorum; longitudo capitis unius digiti; latitudo paulo major. Crassities corporis; ubi maxima, nimirum post occipitium, trium, circa caudam duorum. *Caput* latum ranæ ferme modo; *Os* haud amplum; ad cujus quodlibet latus filum habet unum digitum longum instar barbæ, os edentulum. *Oculi* minimi crystallini, magnitudine seminis papaveris, circello aurato cincti. *Pinnas* obtinet octo; ad quamlibet branchiam unam, digitum longam, firmam instar cornu in uno latere, directe à latere protensam: duas in infimo ventre, non ita firmas at ejusdem magnitudinis: unam in medio dorso, alteram in eodem dorso prope caudam, minimam: unam parvam in infimo ventre prope caudam & octavam pro cauda, digitum longam & latam. Totum caput superius tegitur testa dura instar clypei: & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis squamosis corporibus composita: suntque hæc corpora per ambitum minutissime serrata & quadruplici ordine tota lorica disposita: id est, coeunt partes seu squamæ lorice in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre. Color totius piscis obscure ferreus, præsertim in capite. Carne bona est.

Piscis hicaqua carens in fluvio ubi est, tempore sicco, per terram abit ut aquam quærat.

*Acara Pinima.* Piscis est latus, dorso incurvato, sex aut septem digilos longus, quatuor latus, ubi latissimus, parvi Carpionis figura aut verius Percæ misnicæ. *Os* habet haud amplum, denticulos minutissimos: oculos satis

Idem lib. 4. c. 5.

Idem lib. 4. c. 6.



fatis magnos pupilla nigricante transplendente, circulo rubro fusco, & albo: *Pinnas* septem; unam per totum dorsum extensam & continuam versus anteriora minus uno digito latam, versus posteriora latiore: huius pinnæ medietas anterior spinis suffulta est & illam in rimam potest recondere: post branchias in utroque latere unam duos digitos longam, haud latam, in medio ventre duas junctas semidigitum ferme longas firma spina sustentatas: inter anum & caudam inferius itidem unam firma spina munitam: Septima pro cauda est furcata, plusquam sesqui digitum longa, totidem lata.

Totus vestitur squamulis argenteis ex auro splendentibus: in quolibet latere septem magnas habet strias secundum longitudinem ad caudam usque extensas, coloris fusci splendentis (in quibusdam aurei seu lutei) à summo item capite per utrumque oculum ad extremitates oris, in quolibet latere capitatis lata stria nigra descendit, ad cuius oram aliquid cærulei admixtum est. Ultra harum striarum exortum in dorso, nimirum ubi pinna dorsi initium sumit, itidem per quodlibet latus descendit nigra stria usque ad exortum pinnæ lateris seu oram branchiarum Omnes pinnæ & cauda coloris sunt lutei seu aurei splendentis. Capitur in mari inter scopulos: & est edulis atque boni saporis.

*Pira Pixanga*, Belgis *Gatvisch* / quia in initio antri inter scopulos degit in mari Longus est novem digitos, ab initio oris ad exortum caudæ. *Cauda* duos digitos longa. *Os* sesquidigitum amplum, minutis sed acutissimis denticulis præditum. *Caput* haud magnum: oculi magni, prominentes, pupilla coloris instar Turcoidis optimi, circulo nigro, cum aëreo & sanguineo mixto. Branchiæ in triangularem figuram desinunt, ampla & acuta spinula præditæ. *Pinnas* habet septem: unam per totius dorsi longitudinem extensam, unum ferme digitum latam, & in posticâ parte latiore, cuius prior medietas undecim firmis spinis sustinetur; posterior est mollis.

Post branchias in utroque latere unam, duos digitos longam & totidem latam, subrotundam & carnosam: duas junctas in medio pene infimo ventre, unica spina singulas firmatas: unam mediocrem post anum spina munitam. Septima est pro cauda, duos fere digitos longa & totidem lata, non secta sed extremo ambitu subrotunda. Tegitur squamulis parvulis per totum corpus, ad tactum glaber nisi à cauda versus caput digitis fricetur. Totum corpus, caput, pinnæ, cauda ex albo flavescent: & per totum variegantur maculis sanguinei coloris diluti; rotundis, magnitudine seminis canabis: quædam etiam in ventre majores. Pinnæ eodem modo maculatæ in ambitu suo obscurius rufescent.

Figuram ferè Auratæ habet. Edulis est ac boni saporis.

Captus per trihorium extra aquam potest vivere: bihorium postquam mortuus esset, aperiebam illum & cor adhuc movebatur exemptum: cor situm erat statim post fauces, & aspera arteria in id inferebatur, eratque digitum remotum à reliquis visceribus per mediastinum; minimum utique & vix granum tritici æquans etiam quando spiritu inflatur.

## CAPUT VI.

*De Vubarana, Capeuna, & Acarapitamba.*

**V**UBARANA. Piscis figura corporis Truttæ nostrati similis, ubique ferme æqualis crassitie, paulum tamen in dorso exaltatus, versus caudam autem angustior. Corpore oblongo, quadrante cylindræo: pedalis longitudinis, semipedem crassus. *Caput* acuminatum seu coactum, haud magnum: oculi stufæri magnitudine, pupilla nigra, circulo primum aëreo, exterius argenteo: *Os* edentulum & lapis illi pro lingua. In medio dorso unicam habet pinnam duos pene digitos longam, unum anterius latam, trapezii figura, non tamen duris spinis firmatam. Post branchias in quolibet latere versus inferiora parvam pinnam oblongam & angustam obtinet & duas tales laterales ad infimum ventrem è regione dorsalis: prope anum unam parvam. *Cauda* constat pinna furcata instar harengi plus duobus digitis longâ. Squamulas habet ordine lineari secundum longitudinem corporis positas, ita affabre ut ad tactum quaqua versus glaber videatur. Supernè si aspiciatur olivacei est coloris; at eminus aut lateraliter si intuearis plane argenteus ac splendens videtur, & dorsum cærulescit ex argenteo: venter plane albus: branchiæ ita glabræ sunt ut laminæ argenteæ videantur.

Assatus boni est saporis, nec opus est desquamare: coctus non ita commodus ob multitudinem spinarum per carnem dispersarum.

**C**APUENA. Piscis corpore oblongo non lato qui in septem digitorum longitudinem excrescit. *Os* illi obtusè acuminatum; habetque in superiore atque inferiore mandibula unam seriem minimorum denticulorum: tota cavitas oris cum lingua sanguinei coloris insignis: *Oculi* illi parvi, stufæri magnitudine, crystallini, circulo partim argenteo colore variegato. *Pinnas* obtinet septem; in quolibet latere post branchiam unam oblongam, tenuem quasi triangularem: duas triangulares in infimo ventre; unam post anum firma spina munitam: unam per dorsi longitudinem excurrentem, cuius anterior

Tab.  
XXXij.  
I. 2. 3.  
Idem  
H. B.  
l. 4. c. 7.



rior medietas spinis munita, quem recon-  
dere potest, posterior mollis & sine spinis:  
cauda bicornis, molli pinna. Tegitur squa-  
mulis parvis argenteis, in quibus aliquid au-  
rei transplendet. In quolibet latere habet  
duas lineas crassas aurei coloris, unam à sum-  
mitate oris per oculos & medium latusten-  
dentem ad caudam, alteram magis superius  
per dorsi latum pergentem. In summitate  
capitis livescit. Pinnæ omnes sunt cineræ:  
*Venter* albus ut & ejus pinnæ.

Coctus boni est saporis. Capitur in mari  
inter scopulos.

Idem l.  
4. c. 8.

**A C A R A P I T A M B A.** Piscis oblongo  
corpore ut mullus seu barbus, in duorum  
pedum aut etiam majorem longitudinem  
excrevit: *Os* habet minutum & dentes: *Ocu-  
los* amplos, pupilla crySTALLINA, circulo mi-  
niato: *Pinnas* septem; unam à summitate  
dorsi tendentem ad exortum caudæ fere,  
spinis suffultam, digitum latam aut paulo  
amplius: postquamlibet branchias unam te-  
nuem & longam, subtus in ventre duas jun-  
ctas, & prope anum unum: *cauda* constat  
pinna quinque digitos longa, quæ in duo ob-  
liqua cornua definit. *Squamis* totus vesti-  
tur modo Carpionis, eleganter ex purpureo  
cæruleis. In utroque latere in medio ab ocu-  
lis ad caudam tendit linea sesquidigitum la-  
ta: aurei coloris, per totum autem dorsum &  
latera usque ad hanc lineam puncta aurea  
majuscula habet: sub linea in lateribus sub-  
tiles lineas aureas seu flavas, secundum lon-  
gitudinem. Venter albicat. Pinnæ laterales  
& ventris ex albo flavescunt. Dorsalis pinna  
& tota cauda aurei sunt coloris.

Optimè sapit affatus, & melius quam co-  
ctus. Pinnæ ejus lucent noctu. Capitur in  
mari.

Hic piscis à crustaceo quodam animalcu-  
lo vexatur, sesquidigitum longo, digitum  
crasso, figuræ oblongæ, ut cauda Gamma-  
ri & eodem modo formato & crustato: con-  
stat autem septem juncturis, & habet qua-  
tuordecim brevia crura, unguiculis acutis  
prædita, in quolibet latera septem: antè  
corpusculum paululum ampliatur. *Corpus*  
molle est sub crusta instar cochleæ lenta cute  
obductum: nec oculi nec os apparent. Hoc  
animalculum ori piscis se ingerit & unguicu-  
lis suis arte faucibus inhæret, nec unquam  
piscis se ab illo liberare potest. Postero die  
adhuc vivebat capto pisce & pridie mortuo,  
in totum albi est coloris.

## CAPUT VIII.

*De Iaguacaguare, Curimata, Ta-  
reira, d'Alto, & Tarei-  
ra de Rio.*

Tab.  
xxxiiij. 4.  
5. 6. 7.  
Idem l.  
4. c. 8.

**I A G U A C A G U A R E,** Lusitanis *Iaqueta*,  
Id est, interula, à colore, quia nigritæ ejus-

dem coloris amiciuntur. Piscis instar Percæ  
nostræ latus & obrotundus, ad summum oc-  
cto digitos, quinque aut sex latus. *Os* habet  
parvum, cum minutulis dentibus ordine di-  
gestis: *Oculos* mediocres crySTALLINOS, circulo  
fusco: *Pinnas* porro septem, unam à medio  
dorso ad exortum caudæ protensam, spinis  
suffultam, anteriore quidem parte semidi-  
gitum latam, posteriori latiore & trianguli  
figuram desinentem. Duas postbranchiales,  
duas in inferiori ventre; unam post anum la-  
tiusculam: caudam denique duos digitos lon-  
gam, parallelogrammi figura, quæ in duo  
cornua definit. Squamis vestitur, instar per-  
cæ, majusculis; quæ è cinereo cærulescunt.  
A dorso autem per latera latæ lineæ descen-  
dunt ad ventrem nigræ, in quolibet latere  
quinque. Superius caput quoque nigrescit;  
venter verò albescit atque erubescit. Pinnæ  
omnes è cinereo cærulescunt & quodammo-  
do nigricant versus extremitates. Tota de-  
nique cauda nigra est. Edulis est piscis.

Haud malè convenit cum Mormyro Ge-  
fneri, nisi quod Icon in eo differat, quod in  
Mormyro Gefneri plures lineæ nigræ vel  
pullæ à dorso ad ventrem per latera descen-  
dant.

**C U R I M A T A.** Piscis Carpioni, figura,  
colore, carne valde similis: sesquipedem  
longus, quatuor & semis digitos latus: *ca-  
pite* Carpionis; *ore* rotundo & edentulo: *cor-  
pore* oblongiori, & squamis majusculis. *Pin-  
nas* habet septem præter caudam; nimirum  
duas postbranchiales, duas in medio ventre  
inferiori, unam post anum, & unam plane  
parvulam parallelogrammam huic opposi-  
tam in dorso; unam denique in medio dorso,  
magis longam quam latam. Totus piscis co-  
loris est argentei ut Carpio, & ejusdem sa-  
poris. Non capitur nisi in dulcibus aquis.

**T A R E I R A D A L T O,** id est marinus,  
piscis tereti corpore, decem digitos longus  
(reperiuntur & majores) quinque crassus,  
ubi crassissimus, nam versus posteriora sen-  
sum minuitur. *Caput* habet colubrinum, su-  
pra oculos in duo tubera elatum: oculos pu-  
pilla nigra, circulo flavescente; os acumi-  
natum satis amplum, interius flavum denticu-  
lis acutissimis munitum, quales & lingua ha-  
bet. *Pinnas* obtinet octo, nimirum in quolibet  
latere post branchias unam, uno plus digito  
longam, trientem latam, directè à latere pro-  
tensam: post has interstitio pene sesquidi-  
giti in infimo ventre duas junctas figura tra-  
pezii, duos digitos longas & totidem fere  
latas in extremitate: versus caudam in infi-  
mo ventre unam duos digitos longam in cor-  
pore extensam, sed plane angustam, supra  
hanc in dorso parvula est instar cuspidis cul-  
telli: in medio dorso una pene quadrata,  
duos digitos lata, plus uno longa: Octava  
est caudæ vix sesquidigitum longa & furca-  
ta. *Pinnæ* a. instar foliorum papaveris sunt  
tenues



tenues & mollib. spinis sustentantur. *Squamulis* vestitur peltatis, ita affabrè compositis ut ad tactum glaber videatur. Venter totus albicat: latera & dorsum secundum longitudinem lineas habent alternatim flavas & virides. *Ora* squamularum circumcirca brunnae sunt, & videntur quasi rhombi ordine positi essent brunnis lineis circumscripti, & ac si per unum ordinem tenderet linea, flava, per latera viridis. Pinna in dorso secundum longitudinem strias habet brunnas reliquæ flavas. *Cauda* itidem striata brunno. Caput superius maximam partem brunnum. Piscis assandus, nam coctus non ita bonus est. Sapore autem multo antecellit Tareira do Rio, qui multas habet spinas.

TAREIRA do Rio, id est fluviatilis, oblongo corpore, dorso recto, ventre paululum protuberante: inferior illius mandibula longior superiori: dentes habet acutissimos & inter eos duos longiores in medio inferioris mandibulae & quatuor tales in superiore: mordet vehementer: *Oculi* satis magni, prominuli, pulchri, pupilla atra, cætera nigri. *Caput* Lucii capiti parum simile. Longus est piscis quindecim aut sedecim digitos. *Pinnas* habet sex: nimirum duas oblongas post quamlibet branchiam unam, duas junctas oblongas in infimo ventre, unam post anum parallelogrammi figura; unam in medio dorso magnam, rectam, parallelogrammam, plus tribus digitis longam, duobus latam. *Cauda* parallelogramma pinna constat, duos & semis digitis longa, sesquidigitum lata, in extremitate circinata. Totus tegitur squamis satis magnis, fuscis in dorso & lateribus; verum in lateribus fuscum argenteo est variegatum, ut ita per fuscum argenteum videatur. *Caput* tegitur dura testa fusca. Venter totus albicat. *Pinnæ* omnes fuscae, sed nigro undulatae transversum ut Nisi cauda: itidem & cauda. Capitur in fluviis. Edulis est, sed multas habet spinas.

## CAPUT VIII.

De Paratiapia, Ceixupira, & Piquitinga.

PIRATIPIA piscis est oblongo corpore & satis crasso, interdum tantam magnitudinem acquirit ut quinquaginta libras æquet: *Oris* pars inferior longior superiori. *Denticulos* habet acutos, inordinate positos & tota oris cavitas cum lingua est rubra. *Oculi* prominentes, pupilla crystallina ovali & circulo rubro. Ante utrumque oculum habet foramen. *Branchiae* desinunt in triangularem figuram, & sunt amplæ. A summitate dorsi ad caudam usque extenditur pinna, quæ ad medietatem anteriorem spinis surrigitur, reliqua medietas est mollis. In inferiori corpore prope anum etiam pinnam mol-

lem habet ob rotundam: in quolibet latere post branchias unam, & duas in infimo ventre junctas, oblongas. *Cauda* fere quadrata est, at in extremitate paulo latior quam in exortu. *Squamis* vestitur parvis. *Dorsum* & infimus venter cinnabarii sunt coloris, latera ex gryseo fufcescunt.

In totum præterea est maculatus, & in dorso quidem maculas habet majores nummo misnico, ex gryseo fuscas, in lateribus vero & infimo ventre minores ejusdem coloris. *Pinnæ* omnes cinnabarii coloris, in extremis oris lineam albißimam habentes, adque eam fimbriam latam nigerrimam. Postbranchiales pinnæ totaliter cinnabariæ sunt sine fimbria nigra aut alba. Dorsalis pinnæ medietas anterior tota rubra, reliqua fimbriata albo & nigro ut reliquæ. Optimi saporis carnem habet si coquatur.

CEIXUPIRA, acquirit interdum longitudinem novem ac decem pedum, atque crassitiem corporis humani corpore oblongo & capite atque figura corporis. Tuberoni haud absimilis. Quem describo tantum duos pedes erat longus cum semisse. Erat illi *caput* compressum & latum, septem digitos longum & fere quinque latum: *Os* haud in amplum pro mole corporis, parabolicæ figuræ, edentulum, prominentis tamen acutissimis confertim repletum: lingua lata: *oculi* albi haud magni, paulò majores duplo stufero Hollandico, pupilla crystallina. *Branchias* habet satis amplas: *Pinnas* septem, nimirum post quamlibet branchiam unam, directè à latere protensam triangularem, semipedem longam: duos & semis digitos latam, ubi latissima. Interstitio ferè sex & semis digitorum ab occipite in medio dorso incipit pinna quatuordecim digitos longa, in initio triangularis, & quatuor digitos alta, hinc sensim minuitur & ad caudam ferè pertingit, ibique triangulo desinit. Huic opposita est ejusdem figuræ una in infimo ventre, undecim digitos longa, desinens cum superiore, sed non cum illa incipiens. Infra duas postbranchiales in infimo ventre duas habet junctas, quamlibet tres & semis digitos longam & sesquidigitum latam. Septima pinna est cauda, incipiens duorum digitorum interstitio à fine dorsalis & ventris, bicornis, superius cornu fere octo digitos longum, inferius paulò brevius, nimirum septem digitorum. *Pinnæ* omnes antè spinas habent, sed molles. In interstitio inter occiput & dorsalem pinnam, octo ossæos triangulares aculeos prominentes obtinet, quos recondere in carne & erigere potest, ac pro armis usurpare. Ante quemlibet oculum, intervallo unius digiti foraminulum habet duplex. *Caput* ossæum & glabrum. Totum corpus exiguis squamulis vestitur, ita ut totus piscis glaber videatur. Colore totus est niger, excepto tamen ventre, qui albißimus instar cretæ, in lateribus



(inter album & nigrum) paululum canescit nigredo, cætera, ut dictum, nigerrima. *Pinnæ* omnes nigrae, exceptis duobus infra post branchiales in infimo ventre quæ albæ sunt, oris nigricantibus. In utroque latere piscis linea quædam profundior reliquis squamulis tendit ad caudam usque ejusdem cum corpore coloris.

Piscis gravis ac pinguis est, ac pro optimo habetur inter omnes in Brasilia, præsertim quando adhuc mediocris est magnitudinis. Capitur in Mari.

*PIQUITINGA* est duos, aut paulò plus digitos longus, figuræ pene ut *Parabucu* à quo non multum differt ut dicam. *Os* habet parvulum, sed quod ample aperire & rotundare potest: *Oculos* satis magnos, nigros, circulo argenteo: branchias amplas: pinnas sex & septimam pro cauda: nimirum duas postbranchiales, triangulares, inferius positas: duas junctas in medio infimo ventre: unam triangularem in medio dorso, unam post anum: cauda constat pinna furcata. Color capitis argenteus splendens superius olivaceo imbutus. Tegitur squamulis albis, in dorso tamen olivaceus color translucet. *Pinnæ* omnes albæ. Differt à *Piabucu*, quod ille paulò major evadat, & lineæ illius lata non splendeat, cum reliquum corpus splendeat, quod in hoc contrario se habet. *Piabucu* etiam pinnam habet in dorso prope caudam, qua hic caret. Cæterum caro similis, edulis.

## CAPUT IX.

*De Camuri, Guaracapema & Miivipera.*

Tab.  
xxxij.  
Idem l.  
4. c. 10.  
& 11.

**C**AMURI Lusitanis *Robalo*, piscis est duos pedes longus. Lupo nostro figura corporis similis atque etiam ore, crassus plus uno pede, ubi crassissimus: *caput* sesquipedem pene longum: *os* semilunare, in medio paulum acuminatum, sex digitos longum, sed quod magis dilatare atque rotundare potest, ita ut circumferentia ejus fiat tredecim digitorum: *oculos* habet dupli stufferi magnitudine, pupilla crystallina, circulo aureo: *Pinnas* octo; nimirum duas in dorso, priorem tres digitos longam & paulo plus latam, firmis spinis sustentatam, quam in rimam recondere potest: alteram huic magnitudine parem, sed spinis destitutam, nec habentem quo condatur: duas postbranchiales, paulo plus tribus digitis longas, duas in infimo ventre quatuor digitos longas, duos & semis latas, unam talem post anum; octavam pro cauda, quæ est furcata, quinque digitos longa, sex lata. *Squamæ* habet ut *Carpio*, coloris argentei, splendentes, in dorso autem & lateribus aureis admiscetur. Venter plane albicat: *Pinnæ* sunt aurei coloris, quibus aliquid fusci admixtum est, in quolibet latere superius à fine branchiarum usque ad

medium exortus caudæ, ductam habet lineam crassam, nigram.

**GUARACAPEMA** mas est Doradæ. Piscis compresso corpore & latus, licet non ita crassus. *Caput* desinit in figuram quadratam, estque in fronte ita in aciem eductum, ut facilius fluctus maris natando secare posset. In sex aut septem pedum longitudinem excrescit: latitudo sive altitudo, ubi maxima, nimirum versus anteriora & pone caput, sesquipedalis. *Os* habet haud ita amplum, pro magnitudine corporis, mandibulas compressissimas, denticulos acutos. Paulo supra os & quidem versus ejus interiora oculi positi inferiori loco, ne nimirum in aquis imperiose ageret, qui alius linceus. *Oculi* autem sunt magni, rotundi, pupilla crystallina, cæterum argentei coloris. Branchias habet amplas: *Pinnas* septem, nimirum unam insignem à summitate capitis per totum dorsum extensam usque ad caudæ exortum, latam in medio septem aut octo digitos, quæ sensim minuitur, constans membrana ad tactum coriacea, & spinis mollibus interius sustentata: hanc natans in æquore erectam tenet. A medietate infimi ventris ad caudæ initium itidem pinna producit, sed vix unum digitum lata, in exitu triangulata: post utramque branchiam pinnam habet oblongam octo vel novem digitos: sub his in infimo ventre duas propinquas paulo longiores. *Cauda* circiter sesquipedem longa in duo cornua ampla distenditur. Squamulis minimis vestitur totus, quæque ad tactum vix sentiuntur; ita ut glaber videatur. Color in capite, dorso, lateribus ex viridi & argenteo mixtus, uti & in pinnis, in ventre vero albicat. Per totum autem corpus (nimirum latera, dorsum, caput) maculis variegatus cæruleis, variæ magnitudinis, milii, grani hordeacei, ervi. Carnem habet siccam, boni saporis.

Velocitate natandi superat porcos marinos, & eodem modo saliendo progreditur. Vescitur pisce longo vulgo *Petumbo* appellato.

**MIIVIPIRA & PIRABEBE** Brasiliensibus, *Peixe volador* Lusitanis. Piscis est volans, vel hirundo piscis: variæ est magnitudinis: major erat *Halece*, quem hic describo, & formæ rarioris. Figuram corporis habet (instar *Xandat Pomeranorum*) terebrem & posteriora versus acutiorem. Totius longitudo ab ore ad finem caudæ tredecim digitorum; crassities, ubi maxima, nimirum circa exortum alarum, septem fere digitorum, ad exortum a. caudæ duorum. *Caput* crassum habet, superius compressum & latum, nimirum superius fere duos digitos & quasi in tubera supra oculos elatum, os non ita magnum, edentulum, ac ossa ejus paulum ferrata instar limæ. *Oculi* magni, rotundi, stuffero Hollandico æquales, pupilla nigra, circulo flavo, & exterius altero fusco. *Pinnas* ha-



habet sex cum cauda; duas in dorso, unam parvulam in medio, paulum tamen versus anteriora, alteram post hanc duos digitos longam, sesquidigitum latam, tenuem, at octo spinis suffultam; duas robustas in infimo ventre, subter illa, duos & semis digitos longas, firma spina constantes sed angustas, & unam parvam in inferiore corpore ex opposito majoris in dorso; septima est cauda, duos digitos longa, toridemque lata & furcata. Præterea habet duas alas magnas, in quolibet latere unam, habentes exortum suum sesquidigitum fere post oculos, post branchias paulum; estque alarum longitudo septem digitorum, latitudo in exortu plus uno, in extremitate sex digitorum: constant alæ tenui membrana instar chartæ puræ (*Postpapier*) ex albo seu cinereo subfusci coloris: habent aliquot plicas & sustentantur spinis tenuibus per longitudinem extensis. Ad utramque alam in initio ejusdem parva quasi ala exit, duos & semis digitos longa, sed planè angusta & sua spina munita. Totum caput cum initio dorso (ab ore nimirum ad quinque digitos numerando) vestitur testa ossea, dura, quæ versus suum finem dupliciter divisa in duos aculeos desinit quasi spinas. *Branchia* a. ad duos digitos extenduntur in aculeos usque subalis. Totum autem corpus vestitur squamulis elegantibus, ordine dispositis, quæ in ventre triangulares, in lateribus & dorso verius ellipticæ figuræ. In ventre a. ita dispositæ sunt ut piscis ad tactum glaber videatur: at in lateribus & dorso quælibet in sui medio habet tuberculum, ita ut ordine naturæ dispositæ in recta linea, repræsentent lineas rectas, elatas, tuberculatas. In toto ventre albicat, in lateribus & dorso subfuscus, & splendens ut *Harengus*. Spinæ quæ alas sustinent, & per eas extenduntur etiam albicant. Alæ ipsæ ex cinereo fuscescentis sunt coloris, maculis nigricantibus variegatæ. Volat hic piscis super aquas instar *Hirundinis* per spatium quantum sclopeto pertingi potest: nimirum usque dum ficescant alæ, tunc n. iterum aquæ se immitit alas hamectandi gratia & denuo volat. Natura a. huic pisci alas dedit, ut se salvare posset, dum hostis ejus *Dorada* magna catterva ipsum persequitur. Sæpiissime mille eorum simul volantes vidi in Oceano Tropici interjecto: interdum etiam volando incidunt in naves, ut nobis etiam factum memini. Caro boni est saporis cocta. Actum & de *Hirundinibus* superius, sed quia hujus Icon ab illis diversa, addere & hanc placuit.

## CAPUT X.

*De Guaibi Coara, Guaperua  
& Pyraya.*

**G**UAIBI COARA Brasiliensibus, *Bura-*  
*co de Velha* Lusitanis; Piscis est corpore

latiusculo; dorso elevato & à capite arcuato duodecim aut quatuordecim digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus. *Caput* & *os* acuminatum, satis amplum, habens in utraque maxilla seriem minimorum denticulorum; linguam conspicuam; quæ una cum cavitate inferiori oris, sanguinei est coloris: *Oculos* stufieri magnitudine crystallinos, circulo coloris ex aureo & fusco mixti. *Pinnas* obtinet septem, nimirum post branchias in quolibet latere unam, quasi triangularem, mollem: in infimo ventre duas junctas: unam post anum duplici spina munitam: per dorsum a. una extenditur, cujus medietatem anteriorem undecim spinæ erigunt, quam recondere potest in cute, posterior medietas mollis & sine spinis. *Cauda* constat pinna bicorni, & parallelogrammi figura à corpore extenditur. *Squamas* habet mediocres, instar *Percæ*, argenteas, quæ per oras sunt melini coloris, & aspectu referunt meros cubos: in occipitio & dorso summo squamæ ex argenteo cærulescunt, & per oras itidem sunt melini coloris. Totum a. caput superius & ad latera est aurei coloris, striis cæruleis secundum longitudinem variegatum. *Pinnæ* omnes melini sunt coloris, exceptis duabus in infimo ventre, quæ magis albescunt: per latus a. utrumque versus dorsum secundum longitudinem tendit linea melini coloris ad caudam usque. Piscis boni saporis coctus: capit in mari inter scopulos.

**G**UAPERUA Brasiliensibus, *Peixe Porco* Lusitanis, Græcis *νιπρῶς*. Ab ore ad initium caudæ quindecim digitos longus, in medio ubi latissimus, octo latus: corpore paulum compresso ac lato: dorso arcuato, ventre adhuc magis curvo: capite porcino: dentibus caninis, albis, longis; octo in quolibet mandibula, duo medii tam inferius quam superius longiores sunt reliquis: dentes inferioris mandibulæ aliis quasi brevioribus sustentantur. *Os* subrotundum, angustum: quatuor fere digitorum interstitio ab ore superius sunt oculi, sesquidigitum à se invicem distantes, majores grosso misnico (& ante eos quasi vestigium foraminis) pupilla crystallina, circulo aureo maculato ceruleo. Branchiarum loco rimam habet duos digitos longam, plus uno latam. In dorso tres penè digitos post oculos, duo habet cornua, unum pennam olorinam crassum, tres digitos longum, quod versus posteriora paulum inclinatur, alterum parvum per membranam alteri adnexum, utrumque in rimam recondere potest demissum. Trium & semis digitorum intervallo post hæc pinna est, in initio fermè triangularis, hinc magis magisque angustatur ad caudam fere, quinque digitos longa, initio paulo plus duobus lata: & è regione in infimo ventre talem, initio duos & semis digitos latam, magis magisque arctatam versus caudam.



*Cauda* quadrata figura à corpore extenditur, & *pinna* habet quatuor digitos latam, duos longam, quæ in duo cornua dilatatur, ut totius longitudo sit quatuor digitorum. In medio inferioris corporis parvam habet *pinna* & ante eam cornu sesquidigitum longum. *Pinnæ* omnes sustentantur spinis & sunt cærulei coloris; venter albicat. Squamis vestitur elegantibus, in superficie sua punctulis thalassinis cum cæruleo indico umbratis, in dorso magis cæruleis. Ab oris summitate in utrumque latus ad *pinnas* postbranchiales, semilunari figura, duæ lineæ crassæ cæuleæ, unius digiti intervallo, ducuntur. Comeditur assatus, coctus non valet.

Dedimus hujus & in superioribus descriptionem, sed quæ cum isto non convenit.

*PIRAYA* & *PIRANHA* Brasiliensibus: Piscis pedalis longitudinis, lato corpore circiter sex digitos, ubi latissimus: dorso incurvato, capite obtuso ut *Dorada*. *Oris* hiatus parabolicus, quod exactè claudere potest, habet labia parva quibus dentes tegit; obtinet enim tam superius quam inferius ordinem dentium triangulorum, alborum, acutissimorum, quatuordecim in qualibet mandibula (minores habent duodecim) quibus uno morfu partem carnis ex quacunque parte hominis potest abripere quasi novacula esset abscissa. Si quis ingrediatur aquam vel saltem immittat pedem vel manum, statim ab illo lædi potest, ita sitiens est sanguinis & cupiens carnis humanæ, quare caute ab illo cavendum. *Oculos* habet rotundos, parvos, crystallinos, pupilla nigra, & inter illos duo foraminula seu spiracula: branchias amplas, exterius duras & osseas: sex *pinnas* & septimam pro cauda; duas nimirum postbranchiales paulum elatas à ventre infimo, duos digitos longas, unum latas: in medio infimo ventre duas junctas parvulas, vix unum digitum longas & angustas: è regione harum in medio dorso incipit *pinna*, & ad duorum & semis digitorum longitudinem extenditur versus posteria, paulo plus uno digito lata: duorum autem digitorum interslitio à parvulis in infimo ventre incipit *pinna* firma, spina antè munita, cætera mollis & maximam partem squamulis tecta, & paulo plus duobus & semis digitis longa, extenditurque ad exortum caudæ, unum digitum lata: exortus caudæ sesquidigitum longus, ipsa bicornis, & quodlibet cornu in exitu arcuatur. *Squamulis* tegitur: tota summitas capitis dorsum & latera usque eo si linea ducatur à postbranchiali *pinna* ad medium *pinnae* squamosæ, coloris est cinerei diluti cum paucis cæruleo mixti, ac squamula quælibet fimbriam habet ignei & cærulei coloris transplendentis, reliquum laterum seu inferior pars & venter coloris sunt flavi obscuri, ut & capitis inferior pars, ac *pinnae*

postbranchiales & omnes infimi ventris.

*Pinna* dorsalis & cauda coloris est è cinereo cærulescentis.

Edulis est, & carnem habet albissimam, paululum siccam & boni saporis. Sæpissimè comedi. Hæc species maximè gaudet cænooso fluvii fundo.

*Pyræ* alia specus hic reperitur magnitudine & figura plane similis priori, excepto quod parvulam adhuc *pinna* habeat squamatam inter dorsalem & caudam, & quod colore differat: nimirum summitas capitis, totum dorsum & laterum superior pars eo usque si linea ducatur à *pinna* postbranchiali ad medium *pinnae* squamosæ, coloris sunt aurei cum cinereo mixti, & cæruleo transplendente.

Capitis inferior pars, reliquum laterum & infimus venter insigni colore croceo fulgent, qui aureus persplendet. Ejusdem coloris croceo aurei sunt *pinnae* postbranchiales & infimi ventris. Dorsales duæ & cauda cinerei diluti cum paucis cæruleo mixti, ut & dorsum.

Hæc species magis gaudet arenoso fluvii fundo. Edulis est ut prior.

Reperitur & alia *Pyræ* species alba, figuræ ut antecedentes, solum caput non ita obtusum, sed os paulum prominet figura conica: color ventris & laterum argenteus: dorsum & caput argentei coloris cum paucis cæruleo transplendente: *pinnae* omnes argentei coloris cum gryseo mixti.

Dentes habet parvulos triangulares ordine dispositos, nec ita mordet ut cæteri. Paulò minor quoque est reliquis speciebus, cæterum non minus edulis, quam illæ.

## CAPUT XI.

De *Amore Guacu* & *Guacari*.

**A**MORE GUACU Brasiliensibus; in semipedis longitudinem excrevit; corpore oblongo, capite crassiusculo, branchiis amplis, minutissimis in ore denticulis: *Oculi* illi parvi nigri circello aureo. *Pinnas* habet septem: nimirum duas postbranchiales oblongas, quasi triangularis; duas sub his junctas; duas in dorso, anteriorem minorem posteriore; & è regione posterioris unam in infimo ventre. *Cauda* oblongiuscula, parallelogramma, in extremitate circinata. Tegitur squamis pro sua magnitudine majusculis. Piscis in totum ferrei coloris, in ventre tamen paululum è ferreo albicat. Est edulis.

*GUACARI*, piscis subrotundo seu pyramidalis corpore, pedalis vel paulo majoris longitudinis; octo digitorum crassities, ubi maxima est. *Caput* inferius planum, lateribus ellipsin describit, superius subrotundum.

Tab. xxxiv.  
4. 5.  
Idem l. 4.  
c. 13.



*Os* parvum rotundum habet subter in plano capitis: loco dentium in utroque latere processus habet quasi setis equinis factos: inferius labium explicatum, lunatum, membrana constans, quæ in lateribus oris in suis extremitatibus in cirrhum definit, triennem digiti longum, qui chirri pro barba serviunt. *Oculi* parvi, rotundi, nummi misnici magnitudine, cinerei fusco maculati, superne positi & inter quemlibet foramen, distans dimidium digitum ab oculo versus interiora. *Branchiæ* angustæ inferius versus & antequamlibet proxime corpusculum parallelogrammum, semi ferme digiti longum, quod extendere & recondere potest, ita ut reconditum vix videatur. Continet illud corpusculum in extremitate denticulos acutos setaneos, quibus alios pisces pungit. Et post branchias in quolibet latere inferius ad planum, triangularem quasi pinnam, quatuor digitos longam pene, plus uno latam, oblongam, spina ossea in extremitate laterali sustentatam & aliis minoribus secundum longitudinem discurrentibus: spatio autem sesquidigiti versus posteriora directè post has jam descriptas, iterum duas inferius pinnas habet quadratas, in quolibet latere unam, duos & semis digitos longas, duos latas, eodem modo spinis hispidis osseis sustentatas. Post anum in infimo ventre angusta est pinna, parallelogramma, duos digitos longa. In medio dorso pinna est, quatuor digitos longa, duos longa, spinis hispidis ordine dispositis sustentata, ac antè spinam duram crassiore suffulta, post hanc prope ortum caudæ superius parva quædam est pinna, membranosa, quæ antè corniculata spinam fulcitur. *Cauda* constat pinna tres digitos longa inferius, duos superius, bicornis, spinis firmis suffulto. Totum caput testa vestitur dura ad tactum hispida: totum corpus squamis triangularibus, versus anteriora majoribus, ordine positis.

Sunt autem squamæ omnes ad tactum asperæ, quasi exsculptæ, quælibet in sui medio extuberantiam habens: scilicet totum corpus loricatum est, & quælibet pars lorice habet quatuor angulos, & in quolibet existit tuberculum, ita ut in quolibet latere sit quadruplex ordo tuberculorum. *Color* totius piscis croceus dilutus, in ventre saturatior; ac per totum maculatur maculis rotundis, magnitudine seminis sinapi, fuscis. Maculæ hæc in lateribus & pinnis paulo sunt majores, in capite minores, ac in summitate capitis maculæ ruunt quasi rivuli. Posterior medietas ventris nullas habet maculas. *Pinnæ* omnes ut corpus coloratæ & maculatæ, excepta pinnula prope caudam, quæ constat membranula nigra, corniculata autem illius spina crocea est & maculata ut reliquæ.

Diu vivit extra aquam, ad quinque horas. Editur defracta lorica, sed paucam habet

carnem: intestina longissima, æqualis omnia crassitie, instar crassioris fili quo vela consunt. Habebat unus piscis quindecim digitos longus, intestina viginti octo pedes longa, quæ dimensus sum.

Reperitur & hic *Guacari*, magnitudine & figura plane similis priori, qui in flumine S. Francisci capitur, solo colore differens & bonitate carnis: est enim totus umbræ coloris obscuri, & per totum maculis adpersus ob rotundis, nigris, seminis sinapi magnitudine. Caro hujus boni est saporis.

## CAPUT XII.

De *Piraumbus*, *Acaraja* &

*Acara*.

**P**IRAUMBU Brasiliensibus; *Chayque varona* Lusitan. Piscis Carpionis magnitudine & figura, decem digitos longus ab ore ad initium caudæ, paulo plus quatuor digitos latus, ubi latissimus: versus caudam angustior & æqualis latitudinis, duorum nimirum digitorum. *Os* habet instar Carpionis, oculos magnos prominentes, pupilla crystallina; circulo aureo cum albo mixto. *Pinnas* obtinet octo, nimirum unam in medio dorso, paulo plus tribus digitis longam & unam latam, quam in rimam recondere potest, & erectum novem firmis spinis sustentare: huic contigua est alia tres fere digitos longa, minus uno lata nullis innixa spinis: post utramque branchiam unam habet tres digitos longam, unam latam in exortu: in infimo ventre duas junctas, duos digitos longas, vix unum latas, firma spina munitas; post anum unam, digitum latam, dimidium longam, itidem firma spina sustentatam: octava est pro cauda, tres digitos longa, totidem lata & furcata. Squamas habet majores, instar Carpionis, argentei splendentis coloris, pauxilo aureo mixti: quælibet autem squama mediam partem usque ab insertionem suam coloris est *feuliemort*: sub capite & ventris priore parte magis argenteus est: Omnes pinnæ dilutè cinerei sunt coloris. In ore superius & inferius lapidem habet, denticulis minimis præditum, vix sensibilibus.

Edulis est ac boni saporis.

*ACARAIA* vulgo corrupte *Garanhã*: Piscis qui trium pedum longitudinem adipiscitur, figura Carpionis. *Dentes* in inferiori mandibula habet acutos, instar acicularum: in superiori duos longos paulo crassiores, quibus interjacent minutissimi vix sensibiles. *Oculi* ipsi magni sunt, pupilla crystallina, circulo sanguineo primum, hinc argenteo. *Pinnam* longam habet per dorso longitudinem expansam, cujus mediam partem versus anteriora spinis surrigere, & in rimam recondere potest: reliquas quinque pinnas communes habet cum aliis piscibus: septi-

Tab.  
xxxiv.  
6 7. 8.  
Marcgr.  
Hist. Bra-  
sil. lib. 4.  
c. 14.



mam pro cauda, quæ lata & penè bicornis est. *Squamis* vestitur argenteis, mediocris magnitudinis, quæ sanguineo colore umbratæ sunt, ita ut maximam partem sanguineus videatur, argenteo colore transplendente; in ventre totus est albus, ut & sub faucibus. *Pinnæ* omnes sanguinei coloris, exceptis iis quæ sunt in infimo ventre, quæ albæ sunt, in extremitatibus tamen sanguinæ.

Edulis est piscis. Sale etiam conditur & fervatur.

**A C A R A** piscis palmum longus, dorso curvo, & alto corpore ut *Perca*. *Os* habet angustum, & dentium loco limam. *Oculos* habet magnos, nigros, circulo aureo. *Pinnas* obtinet sex, nimirum sub qualibet branchia unam longam, triangulum acutum referentem: à summitate autem dorsi pinna extenditur, firmis spinis sustentata & in triangulum acutum prope caudæ exortum desinens. *Cauda* oblonga est, parallelogramma, in extremitate recta. Vestitur squamis satis magnis, argentei coloris, sed in capite, dorso & lateribus ita umbra mixtis, ut fuscus videatur. Venter albicat. *Pinnæ* omnes & cauda fusci sunt coloris ex umbra. In medio quolibet latere magnam habet maculam nigram, ut & prope exortum caudæ.

Edulis est piscis, & capitur in dulcibus aquis.

### C A P U T XIII.

*De Guarú-Guarú, Cucupú-Guacú, & Maturaque.*

Tab.  
xxxiv. 9.  
10. 11.  
Idem 1. 4.  
c. 14.

**G U A R U - G U A R U** pisciculus est minutus, nunquam major sesquidigito, exili corpore, oblongo, instar minimi *Eleotris*. *Capitulum* habet compressum: ocellos nigerimos, circulo aureo: pinnulas quinque, nimirum duas postbranchiales, & duas subtus ferè in infimo ventre, & unam in posteriore medietate dorsi. *Cauda* constat pinna parallelogramma, in extremitate circinata. Vestitur squamulis, & totum caput superius, & dorsi anterior medietas sunt fusci coloris, posterior & latera aurei, squamulis umbratis umbra: caput inferius & venter albi splendentis ut mater perlarum, pinnulæ flavæ. Prope caudam utrimque maculam habet nigram.

Edulis est & capitur in lacubus & stagnis.

**CUCUPU-GUACU** Brasiliensibus, Lusitanis *Meros*, Belgis *Jacob Everssen*: ingens sit piscis: habui, inquit Marcgravius, quorum corpus cum capite quinque pedes erat longum & cum cauda sex. Corporis ambitus quatuor pedum, octo digitorum, altitudo unius & semis. *Caput* & *Os* magnum habet, quod apertum in rotundum dilatat, e-

dentulum: oculos mediocres, pupilla crystallina nigricante, circulo flavo: *Branchias* in ambitu rotundas, medio autem in triangulum desinentes: *Pinnas* quinque; nimirum unam à summitate dorsi incipientem & non ita longe à cauda desinentem, ad anteriorem partem seu medietatem plane angustam & acutis spinis munitam, posterior autem medietas lata est, & semilunata in ambitu, spinisque haud firmis erigitur: prope anum unam ejusdem figuræ, cum medietate posteriore dorsalis, sed dimidio minorem: Post branchias prope infimum ventrem duas longas & latas, tenuioribus spinis intertextas. *Cauda* magnam pinnam habet quadratam, in extremitate latiore, quam in exortu. *Squamæ* habet parvas. Totum caput, dorsum ac latera cinerei sunt coloris cum umbra mixti, & versus dorsum paulo saturatioris. *Venter* albicat. *Pinnæ* omnes cum cauda dilutè brunnæ. Per totum caput, dorsum, latera & pinnas postbranchiales maculæ parvæ nigrae, seu puncta frequentissima dispersa. Venter verò & reliquæ pinnæ cum cauda his punctis carent. Bonam habet carnem. Capitur in mari.

**M A T U R A Q U E** piscis est corpore oblongo, & fermè parallelogrammo, figura scilicet *Tamoate*. Quinque aut sex digitos longus, sesquidigitum latus ubi latissimus. *Caput* habet latiusculum, dura testa tectum. *Oris* pars inferior paulò longior superiori: & in inferiori sex denticulos acutissimos habet, in superiori aliquot minimos: *Branchias* satis amplas: oculos rotundos, nigros, circello aureolo, exterius fusco: *Pinnas* sex, nimirum duas postbranchiales oblongas, haud latas: duas tales in medio infimi ventris, & unam post anum trapezii figura, & similem in medio dorso. *Cauda* constat pinna quadrata, unum ferè digitum longa, in extremitate circinata. Tegitur magnis squamis ordine positis. Totum caput superius, dorsum & latera nigra sunt, venter ex albo obscurè canescit. *Pinnæ* omnes nigrae.

Capitur solum in lacubus & paludibus, non in fluviis. Boni saporis est.

### C A P U T XIV.

*De Carapo, Piaba, Piabucu, & Nhaquunda.*

**C A R A P O** prima species, corpore oblongo figura cultri, dorsum nimirum crassum & obtusum, venter acutus ut culter: posterius autem corpus desinit in acumen: unum pedem circiter longus, duos digitos latus, ubi latissimus. *Caput* acuminatum, sed compressum, inferius labium paulo longius superiori, os angustum, inferius ordinem denticulorum minutorum, superius nullos habet.

Tab.  
xxxiv.  
12. 13.  
Marcg. l.  
4. c. 15.



habet. *Oculi* minimi, nigri, vix grani papaveris magnitudine. *Branchiæ* angustæ, & post quamlibet parvula pinna oblonga. Unius ferè digiti intervallo à capite in infimo corpore incipit pinna tenuis, angusta, & per totum ventrem æqualiter porrigitur ad finem corporis: nam caudam nullam habet, nec ullam aliam pinnam in toto corpore. Squamas habet mediocres. Totus piscis est coloris ex fusco & paucorubro mixti, ac in dorso & capite magis nigrescit. A branchiis in quolibet latere linea tendit ad finem corporis usque, quasi cultri acie tracta, & sub hac linea maculæ nigræ per corpus dispersæ, feminis sinapi magnitudine.

Capitur in lacubus, & est edulis.

In flumine S. Francisci capiuntur Carapo huic priori speciei similes, excepto quod longiores sint, & in extremitate acuminati instar subulæ, ad trium digitorum longitudinem, squamulas parvas habent.

CARAPO secunda species, priori figura, colore & lineis lateralibus similis, excepto quod dimidiæ tantum sit latitudinis, nec ullas maculas habeat. Capitur in lacubus. Caro spinosa, sed boni saporis.

PIABA magnitudine *Phoxini*. pisciculus duos aut tres digitos longus (interdum quatuor aut quinque quando maximus) ocellos habet nigros, circello aureo. Squamulis vestitur. In medio dorso pinnula erecta triangularis: post quamlibet branchiam unam habet oblongam, duas in medio infimo ventre & post has unam, quæ ad caudæ exortum protenditur: cauda est furcata. *Caput* ad latera auro & argento splendet: totum dorsum argenteo viridi & multo Indico: medium laterum secundum longitudinem argenteo & Indico mixtum: *Venter* aureo & argenteo & paucorubro. Post quamlibet branchiam maculam habet rotundam, satis magnam Indici coloris, & statim post hanc ejusdem coloris maculam lunæ corniculatæ figura, ejusdem coloris oblongam in quolibet latere ad caudæ exortum. *Pinnæ* omnes & cauda aurei coloris, quæ in infimo ventre rubræ. Capitur in omnibus fluviis currentibus Brasiliæ, ac summa vi contra aquæ cursum nititur.

Brasiliiani involvunt foliis arborum, & cineribus condunt, desuper ignem imponentes; sic præparatos comedunt: Saporis sunt haud contemnendi.

PIABUCU pisciculus sex digitos longus, sesquidigitum latus, ubi latissimus; ventre paululum extuberante, oculis elegantibus, pupilla crystallina, circulo argenteo, cui superius parum rubri admixtum. *Septem* habet pinna, octavam pro cauda furcatam: nimirum post branchiales duas in infimo ventre, unam in medio dorso, circa anum unam longam extensam versus caudam; & è regione hujus in dorso parvulam. Tegitur squamulis argenteis splendentibus. Per me-

dium laterum secundum longitudinem tendit linea alba lata, non splendens. Dorsum autem ad hanc lineam olivacei est coloris, cui viridis hyacinthinus persplendet. *Pinnæ* albæ.

Capiuntur facillimè aciculis, vel corbe, aut olla immissa in aquam, cui parum farinæ de mandioca, aut mica panis intrita. Cocti comeduntur & frixi. Si quis vel leviter vulnerato uno aut altero membro, vel ulcusculum tenens aquam ingrediatur, statim hic piscis vulnus petit mordendo, ita sitiens est sanguinis humani.

NHAQUUNDA: Mas & foemina reperitur. Mas corpore est oblongo, ferè ubique æquali, septem, octo, aut decem digitos longus, duos altus, ubi altissimus: *Caput* & os ferè *Lucii* habet, superius labium extendere, & oris hiatum rotundare potest: Dentium loco habet limas, linguam tenuem, branchias amplas, oculos conspicuos, pupilla nigra, circulo fusco: septem pinna, post quamlibet branchiam unam, duos ferè digitos longam: sub his in infimo ventre duas junctas, & post anum unam penè quadratam. Ab initio ferè dorso una propenditur penè ad caudæ exortum, tres digitos longa, unum ferme lata, æqualis, mollibus spinis suffulta, quæ in fine paulo latior, & in triangulum desinit. *Cauda* testa dura regitur nigra. Totum corpus squamis mediocris magnitudinis vestitur, ac totum dorsum & latera obscuri grysei sunt coloris cum argenteo transplendente. Venter albus. In utroque latere unum ordinem habet macularum, rotundarum, nigrarum, pisi magnitudine, & inter has dispersa punctula multa cærulea. *Pinnæ* omnes aureæ, ut & cauda: & pinna dorso insuper variegatur per totum punctulis cæruleis. In utroque latere per ordinem macularum nigra tendit linea, incipiens à fine superiore branchiarum, & ad regionem finis pinnæ dorsalis desinens, & semidigiti ferè interstitio sub hujus fine, alia linea incipit, ac in medio exortus caudæ desinit. *Lineæ* hæc elatæ sunt ac aureæ.

Capitur in fluviis, ac boni est saporis.

Foemina mari per omnia similis, excepto quod punctulis cæruleis in lateribus & pinna dorsali destituatur, & quod venter circa anum rubescit. Comeditur ut mas.

## CAPUT XV.

De Amore Pixuma, Amore Tinga,  
Guara Tereba, Piracoa-  
ba & Corocoro.

AMORE PIXUMA Brasiliensibus, vulgo corrupte *Amorca* piscis magnitudine *Tamoate*, capite lato, ore amplo, & edentulo, corpore oblongo, ita ut fere *Tamoatam* referat. Coloris est obscure ferrei, in ventre, qui

Tab.  
XXXV.  
2. 4. 5. 6.  
Mareg.  
Hist. Bra-  
sil. l. 4.  
c. 17.



qui extuberat, albi. Tegitur cute molli: pinnas habet septem & octavam pro cauda in ambitu circinatas. Carne est sicca & bona, ut *Tamoata*.

*AMORE TINGA* Brasiliensibus, piscis est ejusdem plane figuræ cum *Amors Guacu*, sed tantum minor: habetque squamas in totum albicantis, seu pallidi coloris, & in totum maculatur maculis fuscis, ut *Tajafica*. Cauda tamen illius est fusco undata. Edulis est ut præcedentes.

*Guara Tebera*. Piscis magnitudine septem aut octo digitorum: capite obtuso, oculis crystallinis, circulo aureo: os denticulos habet minimos: Branchias amplas: dorsum incurvatum, unde & *Corcovado* minor potest appellari. *Pinna*s obtinet septem: post quamlibet branchiam, unam longam: sub his duas junctas in infimo ventre: in medio autem ventre duas spinulas acutas, quæ membranula conjunguntur, & post has triangularem, quæ deinceps angustata ad exortum caudæ extenditur: in summitate dorsi triangularem mediocrem, & post illam aliam similem majorem, quæ angustata ad exordium caudæ porrigitur. *Cauda* in duo cornua extenditur. A branchiis linea tendit ad medium piscis, quæ dein obliquè deorsum vergit, & directè usque ad caudam porrigitur: hæc posterior lineæ medietas hamulis posterioribus verlis armatur, & utroque latere triangularibus vestitur squamulis, quæ minimæ sunt, ut ad tactum glaber videatur. Coloris est in dorso & lateribus usque ad medietatem longitudinis ex hyalino cærulescentis: reliquum laterum & venter albicat, sed aureus color transsplendet. *Pinna* ventris albæ, reliquæ cum cauda aurei sunt coloris.

Edulis est piscis.

*Piracoaba* piscis pedalem longitudinem adipiscitur, corpore oblongo, ut *Zandat Pommeranorum*. Os habet acuminatum, amplum, edentulum; mandibulam superiorem longiorem inferiore, & superior pars oris prominet in rotundum conum è cartilagine constantem: *Oculi* illi satis ampli, pupilla crystallina, circulo aureo. *Pinna*s habet octo: nimirum duas in dorso triangulares erectas, interstitio sesquidigiti: post quamlibet branchiam unam longam, angustam; duas his breviores in infimo ventre junctas, & prope anum unam triangulatam; octava est cauda furcata. Sub qualibet pinna postbranchiali barbam habet sex pilis crassiusculis constantem, tres digitos ferè longis, estque ejus exortus propè exortum pinnarum, vergens retrorsum. Totus vestitur squamis mediocris magnitudinis argentei coloris, & in dorso ac summitate capitis paulum canescit. *Pinna* quoque omnes cani, seu cinerei sunt coloris: postbranchiales tamen nigredine dilutæ sunt. Barba alba. Capitur arenosis locis in mari. Boni est saporis.

*COROCORO* piscis dorso incurvato, capite & ore obtuso: pedalis longitudinis. Denticulos habet parvos, haud acutos: branchias satis amplas, quarum anterior pars in spinam definit acutam: sex pinnae: nimirum in quolibet latere post branchias unam tres digitos longam, subtus in infimo corpore duas triangulares ferè, sed in extremitate circinatas & antè firmam & acutam spinam suffultas, post anum una crassa, dura & acuta spina nixam, cui parvula spina antistat. A summitate dorsi pinna incipit, quæ arcuatim ad medium dorsum tendit, firmis ac acutis spinis sustentata, hinc definit & contigua illi est mollis, quæ & arcuata fere est, & penè ad exortum caudæ protenditur. *Cauda* duos digitos longa, quatuor lata. *Squamis* majusculis vestitur totus argentei coloris, sed in toto dorso, & ejus summitate diluta umbra mixtis & per latera transversim (non tamen ad ventrem usque) in quolibet octo striæ, digitum latum crassæ, ex diluta umbra descendunt: venter totus albus, ut & illius pinnae. Pinna dorsalis, post branchiales & cauda ex argenteo & diluta umbra mixtæ. Pinnam autem anteriorem dorsalem in rimam potest recondere. Capitur in mari, & est edulis.

## CAPUT XVI.

*De Guatucufa, Uribaco & Guarerva.*

*GUATUCUFA* Brasiliensibus, *Balabolla* Congensibus, *Corvina* Lusitanis. Piscis corpore oblongo, dorso paulum, ventre minimum curvo: longitudinem duorum pedum non raro adipiscitur. Os habet acuminatum, cujus inferior pars paulo longior superiore, quodque ample potest diducere; dentes minimos, linguam conspicuam, branchias amplas; oculos stufieri magnitudine, pupilla nigra, circulo argenteo. *Pinna*s obtinet septem; post quamlibet branchiam unam oblongam; duas sub his in infimo ventre paululum versus posticam partem, unam post anum triangularem, unam triangularem ac latam in summitate dorsi, duriusculis spinis suffultam, & huic fere contiguam alteram in posteriore parte dorsi oblongam, quæ æqualis fere latitudinis, atque ad exortum penè caudæ protenditur. *Cauda* constat pinna fere quadrata & lata. Parvulis rotundis squamis totus vestitur, coloris per totum argentei splendentis, cui tamen in dorso aureus transsplendet, & ad tactum videtur lævis. *Pinna* & *Cauda*, ut & venter albicant. A summitate autem branchiarum per medium latus ad caudæ exortum tendit linea argentei coloris. Capitur in mari, ac optimi est saporis.

*URIBACO* piscis dorso incurvato, ventre protuberante, quindecim aut sedecim digitos

Tab.  
XXXV.  
7. 8. 9.  
Idem  
ibid.



gitos longus, quinque, aut sex altus, ubi altissimus. *Caput & os* obtusum, conum referens triangularem: dentes parvuli, acuti, lingua lata: branchiæ ampliæ in triangulum definientes: Oculi dupli stufieri magnitudine: pupilla crySTALLINA, circulo argenteo, cui aliquid cinnabarii mixtum est. *Pinnas* habet sex, nimirum post quamlibet branchiam, unam longam triangulum acutum referentem, sed exterius paulum circinatam: sub his in infimo ventre duas triangulares, antè firmam spinam munitas: post anum unam oblongam, in exteriori ambitu circinatam, molliusculis spinis per medium suffultam, antè autem dura & acuta spina: à summitate autem dorsi ad exortum fere caudæ pinna latiuscula, latitudinis fere ubique æqualis, & acutis spinis sustentata. *Cauda* itidem lata in duo veluti cornua distenditur. *Vestitur* squamis magnis, in totum argentei coloris, sed cui parum cinnabarii translucet. *Pinnæ* laterales, & infimi ventris albæ seu argenteæ, dorsalis & cauda plus cinnabarii, quam argentei habent. A summitate denique branchiarum ad caudam usque (paulum arcuatim) tendit linea rubra, & supra eam in posteriore parte corporis, in utroque latere, maculam habet nigram. magnitudine grossi mifnici. *Capitur* in mari. *Edulem* habet carnem & bonam.

*Guarerva*, piscis corpore lato, compressoque quatuor digitos longo, tres lato, ubi altissimus, ore patulo, denticulis minutis. *Pinnas* habet sex, nimirum postbranchiales duas, parallelogrammi figura; duas oblongas & latas in superiori dorso, & infimo ventre posteriori, quæ in acumen definunt, figura subule. *Cauda* quadrata, seu potius parallelogramma, unum digitum longa, & duas tertias partes digiti lata. Squamulis tegitur nigri coloris splendentis instar bombycini, quarum oræ (quarundam tantum, non omnium) fimbrias habent flavas instar semilunularum. *Pinnæ* omnes nigræ. Circa os linea crassa est ferrei coloris, & alia illi perpendiculariter superposita. Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latas & posticas pinnas extenduntur; (caudam etiam talis linea secatur, & ejusdem coloris) una pro fimbria ipsi est. *Oculorum* pupilla nigra, circulus aureus.

## CAPUT XVII.

*De Camaripuguacu, Piratia pua, Curema, Parati, & Aramaca.*

Tab. xxxv. 10. Marçg. Hist. Brasil. 1. 4. c. 18. **C**amaripuguacu piscis dorso recto, ventre paululum extuberante; pinguis ad tactum & revera. *Caput* habet antè acuminatum, *os* amplum, edentulum, quod in rotundum diducere potest, nimirum supe-

riore mandibula, inferiori immota permanente, ita ut duos pugnos humanos juxta se, vel etiam humanum caput possit admittere. *Linguam* habet conicam, crassam, superior autem mandibula brevior est inferiori, ita ut clausum os superius habeat: *Oculos* latiores Imperiali, rotundos, crySTALLINOS, & argenteos, branchias amplissimas. Longitudinem adipiscitur undecim aut duodecim pedum, crassitiem viri. *Pinnas* obtinet septem; duas haud procul distitas à branchiis, in lateribus proximè ventrem anteriorem, longas, triangulares; culibet autem harum parvula subest, quæ tamen natando vix videri potest: in medio inferiore ventre itidem duas conjunctas, triangulares, latiores prioribus, sed breviores: has versus posticam partem corporis inferioris sequitur alia solitaria pinna, triangularis, lata, squamata, quæ appendice continua, angusta, protenditur ad caudæ ferè exortum: in dorsi altera medietate versus posteriora, pinna est elata triangularis, lata, quæ appendicem habet versus posticam partem vergentem, elevatam, triplo longiorem, instar funis crassioris. Septima pinna est pro cauda, quæ secta est, & in amplam extenditur furcam. Squamis vestitur magnis, obrotundis seu peltatis, majoribus Imperiali, in dorso tamen minoribus materia squamarum alba, pellucida instar matris perlarum; sunt autem arctè sibi impositæ squamæ, ita ut quadruplices aut quintuplices jaceant, ac de qualibet ante aliam prominet pars figura lunæ bisectæ, quæ argenteo obducta est (revera repræsentat argentum) & rivulos hinc inde discurrentes monstrat argenteos in argenteo campo; ita totus piscis argento obductus videtur, præterquam in dorso ubi cæruleus est, argento tamen translucente. *Pinnæ* omnes argenteæ, præter dorsalem, quæ eundem colorum habet cum dorso. Carnem habet lentam, quæ diu coqui debet, multæ in carne spinæ, sed satis crassæ, ut facillè inter edendum extrahi possint. Magis aspectu quam esu piscis delector.

Comedi sæpius ejus carnem, sed lenta est, & tantum famelico conveniens. Os superius ossa habet duritiæ æqualia ossibus alicujus animalis.

*Piratia Pua* ingentem adipiscitur magnitudinem, ut *Capu ripima*. Inferior mandibula paulo longior superiori: dentes acuti in tota mandibula inferiori, in superiori solum in medio, qui longiores, quemadmodum & medium in inferiori: *Os* ampliare amplissimè potest in rotundum foramen. *Oculos* obtinet non ita longos pro corporis mole, pupilla crySTALLINA. Branchias amplas, duras seu armatas. Corpore a. est oblongo, dorso paulum incurvato versus caput, & ventre mediocriter amplo. *Pinnas* habet septem: Unam à summitate dorsi (incipientem versus

S capitis



capitis ferè exortum) ad caudæ usque initium protensam, quoad medietatem anteriorem spinis suffultam, quoad posteriorem mollem sine spinis, in medio a. sui angustior, antèrius latior, postèrius adhuc magis latam & quasi circumatam in extremitate. In quolibet latere post branchias, unam latam, & in extremitate circumatam, cætera quasi quadratam: sub his in infimo ventre duæ propinquæ sunt oblongæ, haud latæ, firmis spinis nixæ: prope anum unam habet satis amplam, itidem circumata fimbria postèrius, uti ea quæ in dorso. Corpus postèrius quadratè extenditur, & continet septimam pinnam pro cauda, quæ ampla est, & figuræ penè quadratæ. Squamulis vestitur parvulis, ita ut ad tactum glaber videatur, etiam si antrosum mulceatur. Coloris est per totum corpus ex obscuro aureo epatici, qui tamen obscurior in dorso & summo capite huic a. coloris lituræ obtenduntur. Pinnæ omnes ejusdem cum corpore coloris, laterales a. præterea fimbrias habent aureas: reliquæ epaticas. Carne satis probata est, si junior sit, nimirum sex, septem aut octo pondo, & assatus magis quam coctus, nam pinguis est: adultior verò ducentorum aut plurium pondo carnem habet pro bajulis; nec delicatior carne *Camarupim asu*, nimirum lentam, tenacem, ac difficilis coctionis. Capitur in mari.

*Curema* species *Tainha* grandis & crassa. Piscis marinus, in duorum pedum longitudinem excrecens, corpore oblongo, ferè cylindræo, more *Trutæ* fluviatilis, crasso & præpingui. *Caput* in conum obtusum definit, superius compressum & latum, durum, squamis duris tectum. *Os* pro mole corporis parvum, parabolicum, labio superiori conspicuo, mobili. inferius a. os triangulare, obtusum discumbit, & paulo brevius est superiori, edentulum. *Oculi* magni, rotundi, antèrius positi, nigri, circulo argenteo. Duo narium foramina supra os. Branchiæ semilunares, haud amplæ. Pinnas habet septem (octavam pro cauda, quæ in duo cornua definit) nimirum duas postbranchiales, triangulatas duas, magis versus postèriora in infimo ventre, junctas: in summo dorso parvam, tribus suffultam duriusculis spinis: post anum unam bicornem, & illi oppositum in dorso ejusdem fere magnitudinis. Tegitur squamis magnis clypeatis, planis: color totius piscis in summitate capitis, dorso & medietate laterum obscurè cinereus, cui hyalius transplendet: reliquum laterum, venter & caput inferius argentei splendentis coloris, uti & pinnæ ventris, reliquæ pinnæ cum cauda ejusdem cum dorso coloris. Præpinguis est & coctus vel assatus sine oleo vel butyro comedi potest. Salitus & in sole siccatus asservatur magna copia. Salitus quoque & in muria servatur. Optima illius pars venter.

*Parati Lusitanis Tainha*, piscis est in longitudinem pedis excrecens, figura corporis ut *Curema*, cui per omnia similis est excepta magnitudine, & quod circulum aureum habeat circa oculos. Carne est sicciori, & quæ inter coquendum pinguedinem flavam de se fundit. Magna copia saliti in sole exsiccantur & reconduntur. Capiuntur retibus, ut & *Curema*, transiliunt a. retia eleganti spectaculo, quando illud trahitur: quando malacia est magno numero ex aquis exsiliunt.

*Aramaca Lusitanis Lingoada* & vulgo *Cu-bricuncha*, soleæ est species compresso corpore, & figuram habens soleæ quam Belgæ vocant *Conge*. *Os* denticulis acutis proditum: caret lingua: *Oculos* habet duos in uno latere (ubi lapidei est coloris) in altero nullum. *Pis* magnitudine, unum prope latus postèrius oris, alterum superius & magis versus postèriora vergentem, pupilla lunata, crystallina, hyalino colore transplendente. Branchiæ satis ample, in quolibet a. latere post branchias est pinna una, duos digitos longa, angusta, superius in pilum tenuem desinens; ad branchiarum finem in infimo corpore sunt duæ parvæ pinnæ junctæ. Per totum a. corpus tam superius, quam inferius secundum longitudinem habet pinnam usque ad caudam extensam, tenuem, vix semidigitum latam, cauda ferè quadrata constat pinna tenui Vestitur squamulis parvulis, & in toto sinistro latere, ubi oculos habet, lapidei est coloris, in latere dextro albi, vivit in mari inter arenas. Edulis est & boni saporis.

## TITULUS II.

*De Piscibus Exoticis Lævibus.*

### CAPUT I.

*De Piscibus in totum lævibus.*

### ARTICULUS I.

*De Guamajacu, Ape & Petimbuaba.*

**P**Isces Exotici læves sunt in duplici differentia: Vel enim sunt in totum læves, vel cum aliqua lævitate spinosi. Ex istis sunt quos hic describemus.

*GUAMAJACU APE* Piscis triangularis; duplex est, unus cornutus, alter sine cornibus. Cornutus ab ore ad initium caudæ septem digitos est longus, (interdum & longior) à ventre ad dorfi summitatem tres digitos latus seu altus: venter vix duos digitos latitudine complet: cauda unum digitum lata, desinens in pinnam duos digitos longam & totidem latam. *Os* ipsi parvulum, & *pis* tantum capax: habens in superiori mandibula duodecim denticulos angustos, acutos, in inferiori quinque. *Caput* ab ore ad cornua usque in gibbum

Tab.  
xxxvj. 1.  
2.

Tab.  
xxxvj.  
3. 4.  
Marcgr.  
1. 4. c. 1.



gibbum assurgit, convexitate sesquidigiti; dorsum autem ad eundem modum in gibbum arcuatur: & unicam tantum habet pinnam in postica parte versus caudam, & quidem exilem. *Oculos* habet satis amplos, diametro trientis, supernè in capite in fronte positos prope cornua, ab ore circiter sesquidigiti intervallo: & ante singulos oculos foraminulum unum. *Pinnas* in universum obtinet quinque unam in extremo dorso, ut jam dixi, & in quolibet latere unam, longè infra oculos versus posticam corporis partem paulum vergentes, unum digitum longas: & prope utramque rimam, unam plus semidigito longam, branchiarum loco unam denique pinnam inferius in ventris extremitate prope exortum caudæ, unum pene digitum longam, dimidium latam: quinta facit caudam. *Cornua* duo directè ante se protensa in fronte gerit prope oculos: magnitudine calcarii galli gallinacei, duo itidem æqualis magnitudinis in infimo ventre versus quartam pinnam. caret squamis, sed tegitur densa cute, in ventre quidem alba, reliquo a. corpore fusca, atque in ventre & lateribus usque ad altitudinem oculorum figuris trigonis, tetragonis, pentagonis, sexagonisque mirè distincta & notata. Ubique a. (excepto infimo ventre) eadem cutis variis maculis nigricantibus est insignita. De altera specie superius egimus.

*Petimbubaba* piscis tres aut quatuor pedes longus: corpore instar Anguillæ. *Os* edentulum acuminatum, superiori mandibula breviori quam sit inferior: estque longitudo oris sesquidigiti, amplitudo, ubi maxima, vix unius. *Caput* novem digitos longum est ab oculis ad oris extremum, crassities ejus post oculos quinque digitorum, hinc paulatim minuitur, ita ut prope os sit trium tantum digitorum. In summa a. longitudo capitis à fine branchiarum ad oris extremum est unius pedis & unius digiti. *Oculos* habet satis magnos, magnitudine nucis avellanæ & pene figura, pupilla splendida cærulescente, quam tunica ambit argentea, in parte anteriori & posteriori macula miniata notata. Post branchias in utroque latere, pinna directè protenditur à latere sesquidigitum lata & longa rufescentis coloris: hinc sex & semis digitorum intervallo versus posticam corporis partem, duæ pinnæ parvæ rufescunt in quolibet latere una, sed magis versus ventrem.

Post has pedis intervallo sequitur pinna rufescens duos digitos longa, sesquidigitum lata: sub hac autem ejusdem magnitudinis & coloris una in infimo ventre: demum à fine harum intervallo ferè quinque digitorum, sunt adhuc duæ pinnæ rufescentes paulo minores superioribus, una sursum, altera deorsum elata, & inter has ortum sumit cauda instar murenæ tenuis, teres, sex digitos longa. Corporis a. longitudo à fine branchia-

rum ad caudæ initum est duorum pedum & trium digitorum. Cute est instar Anguillæ glabra, coloris in toto corpore & lateribus ab ore ad caudam, hepatici, in dorso triplici, in lateribus unica serie macularum cærulearum magnitudine nummi Missinici ferè: hæc maculæ à medio corporis in lateribus ad caudam usque in lineas coeunt: inter omnes a. maculas cæruleas ordine intercedunt maculæ virescentes. In inferiori corpore tam sub capite quam ventre albescit, & videtur aliqua rubedo inspersa. Corpus a. universum non exactè teres est, sed compressum & latiusculum, ventris non latitudo prope secundum par pinnarum, ubi latissimus, duorum digitorum, crassities ibidem totius corporis sex digitorum. Hinc paulatim attenuatur, donec prope exortum caudæ sit sesquidigitum paulo plus aut minus crassum. Edulis est piscis. Potest *Acus* piscis vocari. Iconum quas supra dedimus, nulla cum hac convenit, nisi fortè *Acus* minor Bellonii.

## ARTICULUS II.

De *Nhambdia* & *Guaperua*.

**N**HAMBIDIA Brasiliensibus, *Bagre do Rio Lusitanis*, piscis corpore oblongo, obeso, ventre molli, versus posteriora angustiori. *Capite* compresso, & ore parabolice figuræ, & denticulis minimis prædito. Est autem corpus duodecim aut quatuordecim digitos longum, duos & semis altum, ubi altissimum. *Oculi* parvuli, paululum protuberantes, rotundi, pupilla nigra, circulo ex auro & umbra mixto. Branchiæ satis, amplæ, & barba sex filis constans, duobus supra & quatuor infra os: Eorum quæ supra os versus latus stant quodlibet crassitiem habet filii, quo literæ obliquantur, quinque digitos longum, & post cujusque exortum fovea est oblonga, in quam barbæ initium incumbit, vertendo illam posticam parte, ut semper facit: quatuor inferiorum quodlibet exterius duos & semis digitos longum, interior sesquidigitum, suntque inferiora fila barbæ non ita crassæ ut superiora. *Pinnas* habet septem, & octava est pro cauda: nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam, firmissima & acuta spina munitam (quemadmodum & in exortu ipsius post branchiam os durum est, triangulare) ad medietatem corporis ante anum duas junctas oblongas, in extremitate circinatas: versus caudam in inferiore ventre unam ferè quadratam & in extremitate circinatum: in summitate dorsi magnam quadratam multis spinis suffultam & post illam unam longam angustam; cute carnosa constantem; qua & corpus est tectum. *Cauda* bisecta est, & quælibet pars in exitu circinata. *Cute* tegitur non squamis.

*Caput* dura testatectum, osque superius to-

Tab.  
xxxvj.  
5. 6.  
Marcg.  
l. 4. c. 5.



tum umbræ coloris: dorsum & latera cinerei cum pauxillo cæruleo mixti: Venter albus: pinna dorsalis prior prope exortum ejusdem coloris, cætera in totum nigri, spinis cinereis: posterior ejusdem coloris cum dorso & lateribus: pinnæ postbranchiales totæ nigrae: barba nigra, uti & pinnæ ventris & cauda, licet in exortu paululum ruffæ. A summitate branchiarum per quodlibet latus tendit in medio linea rubra usque ad caudæ initium. Capitur in fluviis, & est optimi saporis, vulgoque comeditur.

*Guaperua* piscis cujus longitudo ab initio oris ad exortum caudæ paulo plus duorum digitorum (reperiuntur tamen & duplo majores) corporis medii crassities, ubi maxima, trium: laterum quodlibet unum digitum altum. Caret omnino branchiis: *Os* habet satis amplum & elatum, projectum instar canis, minutissimis denticulis; loco linguæ lapidem habet instar Carpionis: ocellos vix grani milii magnitudine, colore egregii tûrcoidis. Inter ocellos in medio superioris labii, seu in fronte cornuculum gerit sursum erectum, & paulum retrorsum versum, & ante illud corniculum etiam filum tenue, & dimidium ferme digitum longum versus anteriora directè propensum paululum tamen elevatum, cui appendiculum adhæret ut in Liliis: filum hoc retrò recondere potest: nam post corniculum fovea est invertice, hinc parva eminentia & iterum vallis, tunc ad unius digiti longitudinem pinna in dorso porrigitur quadrantem lata. *Cauda* pinulam habet plus semidigitum longam: à cauda interstitio aliquo versus anteriora circa ani regionem iterum pinnula est semidigitum longa & duæ parvulae in inferiori corpore sub pectore. In medio a. ferè corpore, magis tamen versus anteriora, in quolibet latere brachium obtinet, desinens in pinnam duas trientes digiti longam, & penè ita latam, pinna a. branchiorum octo constat spinis, quæ per pinnæ longitudinem disparguntur, & antèrius prominent instar octo unguiculorum acutorum. Brachium quodlibet unica constat junctura ac versus anteriora deflectit, ut ita naturæ piscis commodius serviat. Caret in totum squamis, sed tegitur cute in ventre molli, reliquo corpore ad tactum aspera & scabra, ut in Tiburonibus. *Color* cutis est obscurè rubricans, cui fuscus admixtus, & per totum corpus maculas habet nigras, figura undarum. Pinnæ & brachia etiam ejusdem sunt coloris cum fusco mixti. Sed pinna in dorso in quolibet latere quatuor habet maculas nigras majores: cauda verò & omnes pinnæ minores eleganter variegatæ sunt. Ventriculum habet duos digitos longum, cum orificio tres digitos longo, & duos circiter amplo, quod in ipsas fauces inseritur: Unde ventriculum inflare instar utriculi potest. Caro ejus non comeditur. Ad orbium

classẽm pertinet. Vescitur squillis: natans egregie explicat pinnas & inflat se, ut instar orbis, seu pilei appareat rotundus. Habui alium totum colore differentem, duos & semis digitos longum qui totus erat coracini coloris splendentis, & se inflabat. *Cutis* horum piscium facillè detrahi potest, & tomento impleta servari.

### ARTICULUS III.

*De Curvata Pinima, Puraque & Pisce innominato.*

**C**URVATA PINIMA, *Lusitani Bointo.* Piscis est *Cordcovadi* magnitudine, vel etiam major, corpore oblongo, satis tamen lato & crasso, amplis branchiis, oculis grandibus argenteis. Caret *squamis*, & tegitur solummodo cute præterquam in medio laterum: nam cujuslibet lateris medium à branchiis usque ad caudam permeat lata linea aurei coloris; hinc à branchiis incipiens alia parallelus superius ducitur ad duas partes totius longitudinis; hinc hæc parallela secatur oblique auream, & pergit parallelus usque ad caudam: linea hæc parallela aureæ antèrius, & usque dum auream secatur, duplici squamularum serie minimarum insignitur, & tota est glabra, postica parte, ubi secatur auream, & infra itidem duplici serie squamarum notata, sed majorum, & linea ipsa non est glabra, ut antèrius, sed aculeata quasi denticulus piscium. Color piscis in dorso & lateribus subvirescens, in ventre albus & splendens. *Pinnas* habet septem, nimirum postquamlibet branchiam unam oblongam: duas sub his versus posteriora junctas in infimo corpore: unam in medio ventre, & huic oppositam unam in summo dorso, & adhuc in dorso unam magis versus anteriora. Ab ultima dorsali & ventris pinnâ continua, haud lata, acuta utrobique abit ad exordium caudæ: quæ furcata est. Capitur frequentius in mari, & boni est saporis.

**PURAQUE**, *Lusitanis Piexeviola*, ob figuram quam cum Cithara communem habent qua ludunt Lusitani. Piscis est latus, non crassus, cartilagineus. Longitudo ejus ab initio capitis ad finem caudæ unius pedis, & novem digitorum. Ab initio seu acumine capitis ad octo digitorum intervallum versus posteriora, cordis lati figuram habet, uti pingi solet, latitudo ejus, ubi maxima septem digitorum, excurritque ibi in latere in pinnas instar Raijæ, estque pene transparens cum luci obvertitur. Caret branchiis. *Caput* in conii figuram desinit. Ab acumine capitis tres digitos & semis retrò numerando, occurrunt oculi unum digitum ab invicem distantes, rotundi, prominentes, mediocris avellanæ magnitudine, pupilla nigra, circulo aureo. Ad utrumque oculum versus posteriora habet fistulam, minimi digiti

Tab.  
xxxvj. 7.  
8. 9.  
Marcgr.  
H. Bras.  
l. 4. c. 5.  
& 6.



giti apicem capientem, per quam aquam evomere potest. Sub oculis, in inferiori tamen corporis parte, os habet, distans tantum ab initio capitis quantum oculi, sesquidigitum amplum, edentulum, & duo spiracula sesquidigitum post os versus posteriora: In quolibet latere quinque incisuras habet, ut Raije & Tiburones.

Post anteriorem illam cordiformem corporis partem reliquum corpus teres, aliquantulum tamen compressum, & ibi latum tres digitos, & in quolibet latere habet pinnam mollem, tres digitos longam, & sesquidigitum latam: hinc angustius fit corpus usque ad caudæ pinnam, ubi digitum est crassum. *Caudæ* pinna fermè duos digitos longa, paulo plus uno lata, superius longior, quem inferius, ut in Tiburonibus. Inter duas a. illas pinnas secundas laterales versus caudam in dorso, distantia duorum digitorum ab invicem adhuc duas pinnas erectas habet, ad tactum instar membranæ crassioris, triangulares, duos digitos longas, sesquidigitum latas. Tegitur cute molli, nullis squamis, ac in toto inferiori corpore in medietate anteriori est albus, in posteriori incarnati coloris cum albo mixti. In dorso, aut superiori corpore glutinis est colore, fuscis maculis variegato, insperfaque egregia varietate puncta ex albo cærulescentia. Pinnæ quoque glutinis habent colorem, ac in lateribus aliquid rufescentis mixtum. Acumen capitis cartilaginis colorem obtinet, qua etiam constat. Per totius dorso longitudinem ad tactum spina dorso, quasi tuberculis minimis eminet. *Caput* illius recens lucet noctu. Caro ejus non comeditur. Sed si comedatur, asserunt piscatores, per tres horas semifatuos reddi homines, dein sponte ad se redire. Unius attractus, crepitum articulorum manus & brachii causat, qui tamen statim desinit: & si in medio tangatur, artuum tremorem efficit.

Capitur mensibus pluviosis, quando tempestuosum est in Bibribi fluvio, longè exterâ adveniens, cum Rajis & Pastinacis.

PISCIS INNOMINATUS in septem digitorum longitudinem excrescit; figura similis illi, quem vulgo *Harder* appellamus; pinnis tamen aliter firmatis: duæ enim quæ in infimo ventre anteriore sub branchiis sunt, magnæ & latæ, duæ post branchias in lateribus parvæ, in dorso duæ mediocres, & in inferiori ventre posteriori parvæ. *Cauda* constat pinna furcata. *Os* parvum, oculi magni. *Cutem* habet glabram, sine squamis: in dorso nigricantem, ac in utroque latere quatuor nigricantes maculæ magnæ à dorso protenduntur, in ambitu suo violacei coloris: Inter maculas autem versus dorsum prominet thalassinus color: reliquum corpus argenteum. *Pinnæ* nigricantes cum violaceo mixtæ, & duæ illæ magnæ sub ventre quinque argenteis maculis singulæ insignitæ. Insignis colo-

ris piscis, quando natans videtur. Viçtitat venenis illis Bæsaenen.

## ARTICULUS IV.

De *Mucu*, *Abacatuaja*, & *Acaramucu*.

**M**UCU Brasiliensibus, piscis tereti corpore, ut *Enneoptalmus*, vulgo *Lampræta*, Germanis *Neunauge* / nec crassiori: circiter duos pedes fit longus, magis aut minus: Capitulum habet acuminatum, conicum; ocellos parvos nigros: os item parvulum: guttur inflare aliquo modo potest. Caret pinnis: per latera lineas obliquas nigras habet, angulos obliquos per medium laterum invicem facientes.

Edulis est & capitur in lacubus & paludibus. Iconem ejus Nobilissimus de Laët in Americæ descriptione, sub nomine *Ubirre* dedit, verum descriptio *Mucu* cum iconem non satis convenit, ideo non est mirum, quod diversum à *Mucu* esse sentiat.

*Abacatuaja*, Lusitanis *Peixegallo*. Faber & Gallus marinus. Passeris magnitudinem habet, altus & latus instar illius, subrotundus; neque illo crassior: *Os* illi est haud amplum, edentulum; *Oculi* nigri, circulo argenteo. *Pinnas* habet quinque, unam in dorso, unam in ventre, utramque descendentem, & continuam ad caudam usque: itidem post branchias utrimque unam: *Cauda* constat pinna furcata. Præterea habet duo quasi fila in longum extensa ab inferiore corpore, & unicum tale in dorso ante pinnam dorsalem. Caret squamis, sed tegitur cute levissima, splendente, coloris argentei, totusque est illius coloris, exceptis filis illis, quæ nigra sunt. Carnem habet boni saporis. In descriptione Americæ sub nomine *Awah kattoe*, sive *lawke* datur. Icon superius data, non in totum convenit, ideo repetimus.

*Acaramucu* Piscis corpore est compresso, nec crasso, verum oblongo, decem enim digitos longus est, quatuor latus, ubi latissimus. *Os* illi parvulum; angustum, rotundum, apicem minimi digiti admittens, ut piscis triangularis. Superius & inferius in anteriori parte oris utrimque dentes triangulati acuti. *Oculi* stufæri magnitudine, crystallini, pupilla nigra. Distant oculi ab ore, duos digitos & semis, plane in alto positi, tres quartas partes digiti à dorso sub utroque oculo, in quolibet latere, branchiarum loco fissuram habet oblique factam, unum digitum longam, trapezii figura. In dorso summitate directè supra oculos, instar fili majoris, seu crassioris cordæ violæ, corniculum habet oblique erectum versus posteriora, quatuor digitos longum & teres. In postica corporis parte inferius & superius utrimque pinnam habet tenuem, tres digitos & semis longam, tres quadrantes digiti latam, quæ desinunt

Tab.  
xxxvij.  
1. 2. 3.  
Marcgr.  
H. Braß.  
l. 4. c. 11.

Idem  
Hist. l. 4.  
c. 12.



circa caudam, quæ parallelogrammi figura exoritur à corpore, habetque pinnam sesquidigitum longam, paulo plus duobus latam. Caret squamis, sed tegitur cute glabra, parum tantum hispida, ut Xiphiæ, coloris albicantis, cui gryseus est admixtus, & in dorso paulum fuscus; pinnæ quoque grysei coloris. Non est edulis: in ventriculo algæ seu musci marini multum inveniēbam. Parieti appensus noctu clarissimè lucebat in tenebris.

## ARTICULUS V.

De *Punaru*, *Timucu*, &  
*Guebucu*.

Tab.  
xxxvij.  
4. 5. &c.  
Marcg.  
H. Brasi.  
l. 4. c. 13.

**P**UNARU pisciculus est quatuor digitos longus, corpore oblongo, capite crassiusculo, & antè obtuso. Os habet parvum, in maxilla inferiore duos solummodo denticulos, longos, acutos instar acicularum: oculos superius & in fronte positos, pupilla nigra, circello aureo: & supra hos duo rubra fila brevissima, prominula; branchias amplas: utpote quæ una ei est è duabus conflata. Pinnas postbranchiales duas oblongas, & sub his duas plane angustas. Paulo post occiput incipit pinna, quæ ad caudam usque producit, spinulis prominulis suffulta. In medio infimo ventre incipit similis, ferè ad caudam usque pertingens. *Cauda* a. longiuscula, & parallelogramma. Tegitur cute fusca, & pinnæ sunt ejusdem coloris.

Reperitur hic & alia *PUNARU* species, figura corporis priori similis, sed mandibulas habens rostratas, quasi è minimis denticulis compositas. A summitate capitis pinna latiuscula extenditur usque ad exortum caudæ, quæ mollioribus textitur spinis non prominulis. Postbranchiales habet ferè ut prior, ut & in ventre & cauda. Color ut prioris, sed variegatus est in lateribus lineis curvis obscure purpureis. Utraque species inter scopulos vivit, & intrat etiam testaceorum domicilia.

**TIMUCU** Lusitanis *Peixe agulha*, Piscis duos est pedes longus, corpore tereti instar Anguillæ. *Rostrum* habet osseum, tres vel quatuor digitos longum, acuminatum, utrobique dentibus minimis refertum: inferior rostri pars paulò longior superiori, & id quod prominet molle, non osseum; caret lingua. *Oculos* habet rotundos, crystallinos, circulo argenteo: sex pinnas, nimirum duas oblongas postbranchiales, duas junctas in infimo ventre ante anum parvas, post anum unam, quæ ferè ad exortum caudæ porrigitur, & similem huic oppositam in dorso. *Cauda* pinna quasi bisecta constat. Caret squamis, sed tegitur cute. Summitas capitis & rostri ac dorsum cum medietate laterum olivacei est coloris: inferior medietas cum ventre argentei. Per utrumque autem latus se-

cundum longitudinem linea tendit virens, distinguens olivaceum ab argenteo. Pinnarum color respondet parti cui appositæ sunt.

Edulis est. Capitur in mari, & fluviis salis Boni est saporis, præsertim frixus butyro: Caro ejus non est spinosa.

**GUEBUCU** Lusitanis *Bicuda*, piscis rostratus; oblongo & ferè tereti est corpore, ut *Dorada*: capite porcino; rostrato, cauda in duo cornua diducta ut *Albacara*, *rostrum* acutum, osseum, durum: partis superioris longitudo sedecim digitorum, inferioris decem. Crassities totius prope insertionem septem digitorum: utramque autem rostri partem movere potest. Branchias habet amplas: os interius orbicularis figuræ, in medio sui hyperpolico foramine: lingua oblonga, alba, dentibus omnino caret. Oculos habet solidi magnitudine, pupilla crystallina, circulo argenteo. A rostri insertionem caput in altum assurgit, ut in *Dorada* mare: Est autem caput ab oculis ad occiput longum septem digitos, novem altum. Corporis longitudo ab occiput ad caudæ exortum quatuor pedum, & altitudo lateris post occiput unius pedis; in medio autem corporis decem digitorum, & prope caudam duorum. *Cauda* in duo cornua extenditur & ampliatur, quodlibet octodecim digitos longum, ad cuius exortum in quolibet latere duæ auriculæ membranaceæ. *Pinnas* habet sex: proxime postquamlibet branchiam unam, directè à latere protensam, dura membrana constantem in *Tiberone*, figura trianguli acuti, undecim digitos longam, & in exortu, ubi latissima, duos tantum latam: è regione harum in infimo ventre duo bacilli formia corpora juncta habet, ex osse nigro constantia, dura, plane ut os *Sepie*, quodlibet novendecim digitos longum, utrumque junctum, in rima longa, profunda recondere potest, quæ à natura secundum longitudinem ventris facta est ad caudam usque. Interstitio duorum pedum à fine hujus fissuræ seu ano, in infimo corpore pinnam habet triangularem sex digitos longam, latere anteriori firma spina munitam; etiam hanc in rimam quandam recondere & rursus surrigere potest: Octo digitorum interstitio ab hac pinna, parvam habet versus caudam, in acutum triangulum versus posticam partem desinentem, & è regione hujus similem & æqualem in superiore corpore, has duorum digitorum intervallo sequitur cauda, quam supra descripsi. Maxima a. omnium est pinna dorsalis, incipiens à summitate occipitis, quæ prætenditur per dorsum in trium pedum longitudinem, constans membrana pergameni æmula, costis intertexta, hanc quoque totam demittere potest ac in profunda rima condere: lata est sesquipedem, ubi latissima, & versus posteriora paulum angustatur.

Cute

Idem  
H. B.  
l. 1. c. 14.



*Cute* crassa, sub aspera vestitur, tota subfusca: spinulis oblongis, trientem digitis longis, ut ita solida sit & aspera, cum squamis careat. Venter & caput inferius albicant, latera cinerei & argentei coloris: dorsum ex cinereo argenteo obscurè fuscum, ut & caput superius & rostrum; reliquum rostrum cinerescit flavo. *Pinnæ* omnes cum cauda ex cinereo argenteo fuscescunt, ut & dorsalis, quæ præterea maculis orbicularibus, nummi mifnici magnitudine est variegata, illa post anum paulum undulata maculis fuscis: Carnem copiosam habet, non spinosam, pinguem, non glutinosam, ideo ad comedendum aptiorem, quam caro Marforum. In ventriculo interiore multos integros pisces pedales inveniebat author.

## ARTICULUS VI.

*De Bagre aliquot Speciebus.*

Tab.  
xxxviii.  
1. 2. 3. 4.  
5.  
Marcgr.  
H. Bras.  
1. 4. c. 16.

**B**AGRE piscis sex ponit author Species. *Prima* est oblongo corpore, initio dorsi paulum elevato, capite acuminato seu conico, quod dura testa est tectum ad initium elevationis dorsi, pedalis longitudinis: Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum quatuor inferiores sesquidigitum longi, duo superiores longitudinem totius piscis æquant. *Pinnas* obtinet septem, octavam pro cauda: nimirum duas postbranchiales loco inferiori positas, & ante quamlibet fortem aculeum, dentatum osseum, unam in summitate dorsi elevatam, & ante illam item aculeum fortem, æqualis cum pinna longitudinis: duas junctas in medio ferè infimi ventris, magis tamen versus posteriora, unam membranaceam sine spinis versus caudam, & huic oppositam mediocrem mollibus spinis suffultam. *Cauda* constat pinna furcata, caret squamis, sed tegitur cute per totum argentei coloris splendentis. *Pinnæ* omnes argentei sunt coloris, ut & barba & caput. Per medium utriusque lateris tendit linea argentea ad caudam usque constituta ex 77. protuberantiis. *Oculi* nigri satis ampli; os parvulum, edentulum, labiis elavatis. Piscis est edulis, si quis ab eo læsus fuerit, difficulter sanatur, & magnos patitur dolores.

*Secunda* corpore oblongo, capite compresso & plano, ore inferius parabolicæ figuræ, obtusio, edentulo. *Caput* octo digitos longum, testa dura punctulata tectum. *Oculi* parvi, rotundi, crystallini, quatuor ferè digitos ab invicem distantes. Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum exteriores longiores, quatuor digitorum, reliqui breviores: septem illi pinnæ, octava pro cauda: una nimirum in summitate dorsi, firma spina antè munita, erecta, tres digitos longa, totidem lata: duæ postbranchiales, itidem firma spina munitæ, quatuor digitos

longæ, duos latæ, interstitio sex & semis digitorum post branchiales in infimo ventre (qui paulum extuberat) duæ junctæ, tres digitos longæ, duos latæ, in ambitu circinatæ: septem digitorum intervallo à dorsali, alia in extremo dorso, carnosæ, sesquidigitum longa, unum lata, in extremitate mollibus spinis munita, & sub hac in infimo ventre alia paulo major cauda sequitur trium digitorum intervallo, in duo cornua diducta, crassa seu molli membrana constans duos & semis digitos longa, in quolibet cornu duos lata. Totum caput superius, & ad latera, dorsum totum & latera ad protuberantiâ ventris usque, candidum diluto flavo & aureo mixti est coloris, in testa capitis etiam aliquid viridis transplendet: *Pinnæ* omnes & cauda gryseæ sunt: Venter & laterum inferior pars & caput inferius (quod planum est) albi coloris. Caret squamis, sed vestitur cute Bona satis est carne, melior quam Camarupi, cujus magnitudinem ferè æquat.

*Tertia* figura & magnitudine ut præcedens, sed barbam habet quatuor tantum cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos, & latiusculis instar ligulæ, duobus brevibus: ad pinnam dorsalem similis ligula novem digitos longa, & post branchiales pinnas eodem modo: cætera similis præcedenti.

*Quarta* Belgis vulgo *Cliphagre* decem digitorum longitudinem habet; corpore oblongo: Capite lato & compresso: ore parabolico, edentulo. Barba constat sex cirrhis, quorum quatuor inferiores unum digitum, superiores duos longi. Oculos habet parvulos, cærulescentes, quatuor digitorum interstitio ab ore in summitate dorsi tegitur testa dura ossea, & post branchias in quolibet latere pyramidalis testa angusta tegit latera. *Pinnas* habet septem, & octavam pro cauda: nimirum unam in summitate dorsi, elevatam, mollem, sesquidigitum altam, plus uno latam, antè spina ossea crassa dupliciter ferrata, duos & semis digitos lata sustentatam. In medio ventre infimo duas parvas: in fine penè dorsi, carnosam, parvulam, angustam, & è regione hujus inferius aliam parvulis spinis suffultam; cauda diffusa in duo cornua sesquidigitum longa. Tegitur cute: ac in capite, initio dorsi & lateribus, ubi testaceus est, umbræ est coloris, per reliquum totum dorsum & latera umbræ dilutioris, & fuscis maculis mediocris magnitudinis variegatur: in ventre albicat. A testæ latiore fine ad caudam usque in quolibet latere, per lineam tectam tendit ordo denticulorum acutorum, posterius versorum, qui clypeo duro ferrato in medio insunt, nam anguli obtusi figura positi sunt usque ad caudam hoc modo 7.

Edulis est, sed paucâ carne, quæ non magni fit.

*Quin-*



*Quinta* præcedenti similis, & maculis nummi mīnisci magnitudine variegatus: Verum caret denticulis illis in lateribus: lineam solummodo habet: & duos cirrhos, & sex longiores quam alter. Hæc species habet carnem bonam & pinguisimam.

*Sexta* magnitudine & figura similis illi, quem secundo loco descripsimus: sed barbam habet tantum quatuor cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos & latiusculis instar ligulæ, duobus admodum brevibus. Ad pinnam dorsalem similis ligula est novem digitos longa; & ad postbranchiales eodem modo; cætera per omnia similis illi, quem diximus; nam & ventrem ita protuberantem habet.

## ARTICULUS VII.

*De Ajereba, jabebirete, Niqui, & Guatacupu.*

Tab.  
xxxviii.  
6. 7.  
Marcg.  
H. Bras.  
l. 4. c. 16.

**A**IEREBA Brasiliensibus *Rajæ* species, piscis planus, circinatus, unum pedem & novem digitos longus, & totidem latus (reperiuntur & duplo majores.) Quatuor digitorum interstitio ab anteriori circumferentia in superiori superficie duo foramina habet satis ampla, tres digitos ab invicem distantia, prope caudæ exortum orbicularis incisura est in quolibet latere: *cauda* teres, quatuor pedes longa, & circiter in medio sui, duas osseas spinas crassas retro dentatas habet, quibus pungit, quando ad spiracula apprehenditur, caudam incurvatam supra corpus levando. *Os* inferius habet, haud amplum, edentulum, incisuræ quasi parabolicæ. *Cute* tegitur in superiori corpore ferrei coloris, & in medio dorso insignitur tuberculis nigris, parvis: inferius corpus totum album. Caro nihili æstimatur in cibis.

*Jabebirete* *Rajæ* species, ejusdem magnitudinis cum *Ajereba*, figura autem obtusi vomeris ad latera extuberantis: sectiones prope caudam ut in illa, & præterea duo corpora cylindracea digiti crassitie protuberantia. *Cauda* longa. Color piscis superius è cinereo fuscus, inferius albus, carne probata est & bona.

Reperitur hic & alia *Rajæ* species præcedenti similis; excepto quod processibus illis cylindraceis prope caudam destituitur. Color totius corporis superius umbræ punctulatus per totum maxulis nigris, seminis sinapi magnitudine: *Cauda* aculeis caret. Carnem habet bonam.

Reperiuntur hic & *Rajæ*, quarum caudæ tres & semis pedes longæ, crassæ in initio tres digitos, & in fine plane acuminatæ, plenæ tuberculis nigricantis in totum coloris, flexiles ut scutica.

**N I Q U I** Belgis Pieterman: Piscis est ca-

pite crasso, ore ranæ amplo, edentulo, crassa lingua, inferiore mandibula paulo longiori quam superior. Anterior corporis medietas est paulo latior, posterior angusta & teres: estque ut plurimum sex aut septem digitos longus, latus antè quidem sesquidigitum aut paulo latior: Ocelli ipsi parvi quidem, sed exserti, cylindracei more cancrorum terrestrium, pupilla nigra, circulo è cinereo fusco. Branchias habet amplas, & post quamlibet pinnam unam, digitum longam & latam, in ambitu circinatam: in ventre sub his paulo inferius duas junctas: à medio dorso pinna ad caudam pene continuatur, semidigitum lata, at in fine paulo angustior, cui respondet similis in infimo ventre: *Cauda* plus digitum longa, minus lata, parallelogrammi figura, in extremitate circinata. Ante exortum pinnæ dorsalis duos habet aculeos fortes, & supra postbranchialem utramque unum acutum. Tegitur cute, cujus color ex nigro & umbra, gryseoque mixtus, nimirum in toto dorso, capite & lateribus, pinnisque omnibus; Venter albicat, & in lateribus etiam plus albi, quam nigri aut grysei est. Per totum dorsum, caput & latera, puncta nigra, magnitudine seminis papaveris, dispersa.

In arena absconditus jacet prope littus Maris, ac incedentes vulnerat.

Edulis est, si jecur & fel bene separetur, aliàs lethalis.

*Guarapuca* Lusitanis *Cavala*, Belgis *Ro-ningfisch* / est corpore oblongo, fere æqualis ubique crassitie, excepto versus posteriora, ubi magis magisque attenuatur. Ut plurimum in septem pedum longitudinem excrefcit, & crassitiem corporis humani. *Caput* & *os* habet acuminatum, dentes acutos, rotundos, ordine positos, oculos magnos crystallinos, circulo argenteo: *Pinnas* octo, videlicet post quamlibet branchiam unam triangularem, directè à latere protensam: unam tenuem angustam ferè in initio dorfi, post hanc unam in eodem dorso triangularem erectam; sub hac in infimo ventre triangularem; duas mediocres triangulares in infimo ventre subter postbranchiales. *Cauda* constat magna pinna in duo cornua amplè extensa. A pinnis autem triangularibus, tam in dorso, quam in infimo ventre, parvulæ ordine pinnulæ oblongæ sunt dispositæ usque ad caudam. Vestitur cute argentei coloris, cui in ventre paulum carulei, in dorso multum miscetur, ut color resplendeat. In quolibet latere linea subtilissimis squamulis contorta describitur ad caudam usque. Boni est saporis. Est quidem *Scomber*, sed quia Icon quàm supra dedimus, non convenit, ideo & hanc adjicere placuit.



## CAPUT II.

*De Piscibus non omnino le-  
vibus.*

## ARTICULUS UNICUS.

*De Guacucuja, Guamajacu guara, &  
Guamajacu Attinga.*

**G**UACUCUJA, *Monoceros* piscis: *Vespertilio* Aquaticus posset appellari. Corporis figura anterie est instar vomeris: Corpus octo digitos longum, quinque latum in medio, ubi latissimum: medietas autem corporis posterior rotunda est, & versus caudæ pinnam fastigiatur in conum: medietas autem anterior vomeris seu lati cordis figuram obtinet. Piscis autem non crassus, sed latus; caput vix prominet seorsim à corpore, estque illi inter oculos supra os cornu impositum, durum, duos pene digitos longum, conicum. Oculos habet nummi misnici magnitudine, pupilla crystallina lenticulari, reliqua pars variegata maculis, & lineis flavis albisque. Oris hiatus castaneum potest capere, ipsum edentulum est. Supra os carnea prominentia est instar tonsillæ humanæ ferè. In utroque latere in medio piscis, brachium eminet, quatuor digitos longum, una junctura constans, inferior medietas brachii duos digitos longa est, unum lata in infimo ventre inter brachia duas habet pinnas sesquidigitum longas, quæ quasi pedes sunt. Cauda constat pinna duos digitos longa, sesquidigitum lata, ac fere quadrata. In inferiore corpore, sesquidigiti interstitio à cauda etiam pinnulam habet parvam, & talem etiam in dorso, trium digitorum intervallo à cauda. Cute tegitur, non squamis, quæ superius fusca est, multis tuberculis duris, per dorsum insignita versus anticam partem, & utrumque latus. In utroque autem latere undecim nigras habet maculas lentis magnitudine & figura, binas ac binas juxta se positas. Prope insertionem utriusque brachii etiam multas ejusmodi maculas nigras habet, & ibidem in quolibet latere foramen parvum in corpus.

In summa, in lateribus, circa oculos, in extremis branchiis, mirè variegatur punctulis albis, nigris, lineisque itidem albis & nigris, ut vix exprimi possit à pictore. In toto autem inferiori corpori egregii miniati est coloris, atque ibi cutis æqualis, verum ad tactum paulum hispida.

*Guamajacu Guara*, Lusitanis *Pexe Porco* & *Diabe*: Orbis est species. Longitudo ejus ab initio oris ad pinnæ exortum in cauda quatuordecim digitorum: pinnæ caudæ longitudo plus duorum digitorum: Rotundo est corpore, & crassities ejus duorum & vi-

ginti digitorum. Caret squamis, tegitur cute, per totum corpus ex fusco ochræ coloris pallidi, in ventre albi. Totum corpus aculeis munitum est, qui in lateribus longiores, in reliquis partibus breviores (longiores autem sunt duorum digitorum) teretes, in extremitate valdè acuti, & singuli tribus insertiōnibus, quasi triquetris cuti infixi. Inter aculeos cutis ubique maculis nigris scatet, excepto ventre. Oculos habet magnos eminentes: Os parvum obrotundum, edentulum: pinnas tantum quatuor, duas in lateribus duos & semis digitos longas: unam in dorso versus caudam ejusdem magnitudinis, & minorem sub ano.

Potest orbis muricatus Gesneri dici.

Habui inquit author, alium minorem vivum Mense Febr. anni 1639. item alios duos mense Septembri vivos. Cutis eorum erat è fusco virescens, in ventre nigricans: aculei ut prioris, & planè similis figura corporis: prope quamlibet pinnam, maculam habebant nigram, ut & utrimque ad latera prope os. Pinnarum color erat flavus: oculorum pupilla nigricans, circulo luteo. Supra utrumque oculorum cornu exile, satis longum, molle, cutacea substantia constans, quod præ se fert natans, quando autem extra aquam est, flavescit. Inflare se potest & iterum confidere. Sonum edit *Ulch / Ulch*. Si velis ut se inflet, trahe pinnam quæ in dorso est.

*Guamajacu Attinga* Brasiliensibus, Marcgravio *Orbis muricatus* Ranæ rictu, septem digitorum longitudinem habebat, & corpus oblongum: os Ranæ simile, & loco dentium tam superius, quam inferius, os durum; oculos magnos, rotundos, protuberantes, pupilla crystallina circulo flavo: Branchiarum loco foramen in utroque latere digitum admittens, & pone hoc pinnam trapezii figura, unum digitum longam, duos latam: In extremitate dorsi versus caudam etiam pinnam oblongam, haud amplam, & è regione hujus similem in infimi ventris extremitate. Cauda constat pinna sesquidigitum longa, unum lata. Totum corpus tegitur cute spinosa, quæ in capite in duram testam abit. Spinæ illæ constant duris ossibus & acutis: in infimo tamen ventre caret spinis, sed mollis est instar Ranæ. Totum corpus & caput superius ex gryseo & fusco est maculatum: magis tamen rufescit, inferius totum ex albo flavescit, ut & spinæ totius corporis, Pinnæ omnes flavescunt. Post utramque pinnam postbranchialem maculam habet nigerimam stuferi magnitudinē, & supra hanc utrobique, paulum tamen magis versus anteriora aliam minorem nigerrimam. Ad utrumque latus exortus pinnæ dorsalis etiam similem habet, parvulas item sub oculis & ore. Utris modo se inflare potest. Edulis est, & capitur in fluviis dulcibus.

Idem l.  
d. c. 14.



## CAPUT III.

De Narinari, Tiburone, &  
Iperuquiba.

Tab.  
xxxix.

**N**ARINARI. Sunt aliquot illius species, hæc quam hic describimus, appellatur *Narinari pinima*: Lusitanis *Raja*, Belgis *Pulsteert* vel *Deicle*. Pastinaca marina. Corpus habet magnum, latum, fermè triangulare: constans ad utraque latera latissima pinna triangulari, carnosa: & prope caudam habet duas pinnas, palmi magnitudine, subrotundas æqualis longitudinis: caput magnitudinem habet mediocris porci, crassum, compressum, in medio quasi fossam habens. Os triangulo subrotundum, compressum paulò & in promuscidem desinens: nam oris hiatus quinque distat digitos ab extremitate promuscidis versus ventrem: amplitudo oris duorum & semis digitorum: edentulum, sed loco dentium os habet linguæ figura inferius in ore, quatuor digitos longum, sesquidigitum latum, ad fauces usque pertingens, & simile os superius, transversim positum, duos digitos longum & totidem latum. Inferius os constat è septendecim ossibus, albis, duris literæ U figuram habentibus, quæ arctè per membranas conjunguntur, hisce alia septendecim subjacent, singula singulis, spongiosa ad aspectum, nec ita dura, superius os constat quatuordecim ossibus literæ J figura, quæ eodem modo per membranas sibi invicem agglutinantur, iisque etiam alia quatuordecim ossa superjacent: duo autem illa ossa per membranas annectuntur aliis ossibus capitis. *Cranij* cavitas sex circiter digitos longa est, vix duos lata, in qua cerebrum latet. Promuscis tantum constat cartilagine. *Oculos* habet parvos, nummi misnici magnitudine: post oculos in quodlibet latere spiraculum amplum, pomi vulgaris capax; intra hæc branchiarum folia recondita jacent: ad latera inferius à fine capitis in quolibet quinque oblongas incissuras. *Color* totius superius ferreus, maculis albis per totum inspersis, magnitudine nummi misnici, inferius totum album. *Cutis* tota glabra lævisque. *Corporis* longitudo ab occipite ad exortum caudæ sesquipedalis, latitudo inter extremitates pinnarum triangularium, trium pedum, & decem digitorum.

Pinnarum prope caudam longitudo septem digitorum, latitudo quatuor. *Capitis* longitudo decem, latitudo septem digitorum, crassities sesquipedis. *Caudæ* longitudo quatuor pedum & trium digitorum: crassities sesquipedis. *Caudæ* longitudo quatuor pedum & trium digitorum: crassities in exortu quinque digitorum, quæ sensim gracilefcit. Paulo post exortum caudæ superius

parvam pinnam curtam habet, paulo plus digito longam, & mox post eam duos hamulos sibi invicem super erectos, piscatoriis hamulis similes & incurvatos, longitudine trium digitorum. Caro boni est saporis, sufficiens quadraginta hominibus saturandis.

*Tiburonis* species minor. Belgiseen Crupshape, à figura. Convenit eum majore, excepto capite, quod triangulare habet seu prout cor vulgo pingitur. *Oculi* parvi ad latera ipsius capitis. *Os* parvum, triangulare longe infra positum, triplici ordine dentium minorum, unde ita nocere non potest, os quippe habens angustum. Caro melius sapit, quàm majoris.

*Iperuquiba*, & *Piraquiba*. Lusitanis *Piexe pogador* & *Peixe piolho*, nostratibus *Dupger*, quia Tiburoni adhæret fugens. Octodecim digitos longus, ferè teres, quatuor digitos crassius, ubi crassissimus, in postica parte attenuatur. *Os* habet triangulare, cujus pars superior brevior inferiori, etiam linguam. *Caput* superius ad dorsum usque duos digitos longum, circiter planum & figuratum, ut palatum alicujus piscis striis transversis, hac parte Tiburoni firmiter adhæret in ventre, & capto illo simul capitur. *Oculi* parvi, flavi, pupilla nigra, semicirculo flavo. *Dentes* nulli, sed eorum loco multæ minutissimæ prominentiæ. Post branchias utrobique pinnam obtinet triangulatam, duos & semis digitos longam, subter in ventre duas junctas: à medietate corporis tam superius, quam inferius, etiam pinna extenditur angusta usque ad caudam, quæ pinna constat sesquidigitum longa. *Cute* tegitur per totum corpus cinerei coloris.

Tab.  
xxxix.

Tab.  
xxxix.

## TITULUS III.

De aliquot aliis, & inter hos monstrosis  
piscibus.

## CAPUT. I.

De pisce ἀνθρωπομόρφῳ & Remoranti.

**P**ISCem ἀνθρωπομόρφον, ita describit Kircherus: Capitur certis anni temporibus in mari Orientali Indiæ ad insulas Visajjas, quas insulas Pictorum vocant, sub Hispanorum dominio, piscis quidam ἀνθρωπομόρφος, id est, humana prorsus figura, quam ideò Peche muger vocant, ab indigenis Duyon. Caput habet rotundum, nulla colli intercapedine trunco compactum. Extremæ aurium fibræ, quæ & auriculæ nominantur, ex cartilaginea carne eleganter vestita, quarum interior pars amplissimis formata anfractibus, veram hominis refert aurem; Oculos

Tab. xl. r.  
Kircher.  
Artis  
Mognet.  
l. 3. par.  
l. 6. p.  
675.

suis



fuis ornatos palpebris, situque & colore non piscis sed hominis judicares; naso non nihil aberrat: malam inter utramque non usquequaque eminet, sed levi tramite bipartitur; sub eo verò labra magnitudine specieque nostris simillima. Dentium non quales in sunt piscium generi ferratiliū, sed plenorum & candidissimorum continua series. Pectus alba cute contextum, hinc atque hinc paulò latius quàm pro corpore in mammas extuberans; neque eas ut foeminis pendiculas, sed qualis virginibus globosas, plenas lactis candidissimi. Brachia non longa sed lata ad nandum apta, nullis tamen ipsa Cubitis, ulnis, manibus, articulisve distincta. In administris soboli propagandæ membris, in utroque sexu nulla ab humanis distinctio: posthæc in piscem cauda desinit. Hactenus ingeniosissimus Kircherus. Ossâ hujus piscis insignem vim sanguinem sistendi & attrahendi habent: visa, ita sanguinem currentem stringere, quasi venaligaretur. Efficaciora tamen foeminarum, & ex his quæ maculis ad nigrorem accedentibus distinguuntur. Alius quidam dicit, carnem carni hominis applicatam, ita omnes spiritus ad se attrahere, ut hominem veluti stupidum reddat. De *Remoranti pisce* apud Hugonem Linschotanum habemus. Historia talis est: Navis quædam Lusitanica per Morambiquem in Indiam decurrebat. Vento hæc adeò secundo & optato utebatur, ut vela omnia plenissima navem proferre felicissimè viderentur. Diebus ergo quatuordecim integris cursum versus Lineam æquinoctialem nautæ tenentes, & quotidie altitudinem matientes, tandem observarunt, gradus ad metam propositam, non minui aut pauciores fieri, verum quotidie multiplicari, seque ab æquinoctiali Linea quam longissime dispelli & arceri. Quæ res non saltem præter omnes naturæ causas esse videbatur, ad admirationem universorum, verum etiam qui in navibus erant, certis se præstigiis & incantamentis agitari, liquidissimè rebantur, cum scirent, illius loci mare hujus apulsus neutiquam causam esse, & vela secundis ventis interim nihilominus ex voto turgida procedere. Sese ergo anxie invicem contuentes, partim terrore, partim anxia vi & admiratione diu exercebantur; dum tandem, nescio quo casu, nautarum quidam, attentis & sollicitis in undam oculis despectans, latam & ingentem quandam caudam proræ intortam innexamque contuitus est, qua piscis quidam navem firmiter prehenderat, reliquumque corpus per navis longitudinem exporrexerat, adeò ut caput ipsius post puppim prominere. Hoc ille situ navis omnem molem ita violentè torquebat, ut illam contra violentissimum quoque reflantis venti impetum vi & robore suo immensè retroageret, se cumque tot diebus

rapide proferret. Jam itaque hoc pacto causa repulsus præcognita, adactis sudibus furcisque & organis, conferentibus cæteris, ad arcendum eum tamdiu studiosissimè laboratum est, donec tandem, cauda plicatili avulsa, navem ille destitueret, cum jam diebus quatuordecim integris illi agglutinatus adhæsisset, & violento renisu eandem, omni impetu ventoque contrario spreto, nando secum abripuisset. In æternum itaque memoriæ signum historiam hanc Pro-Rex in atrio suo depingi accuravit: quam effigiem his meis oculis persæpe egomet cum magna admiratione usurpavi, & circumstantiis supradictis subnotatis diligentissimè perlegi.

## CAPUT II.

De Pisce Goensi.

**I**dem Hugo narrat, ex flumine quodam Guæ, cujus ostium hyberno tempore pro loci more obstructum erat, piscatores quosdam monstruosum piscem extraxisse, cujus similem nec in India nec in aliis locis uspiam videre contingit: qui ob novitatem Archiepiscopo, ejus jussu à pictore ad vivum exprimebatur cujus Icon seu effigies Regi Hispaniarum postmodum transmissa est. Animal illud mediocris magnitudinis erat, canem domesticum vulgarem altitudine haud excedens, cujus rostrum porcino simile protuberabat. Oculi ei parvi erant; nullæ aures, quarum loco duo saltem foramina hiabant. Pedes elephantinis (respectivè tamen) per omnia similes erant. Cauda ad dorsi fines lata, sensim in acumen desinebat. Per atrii pavimentum cursitans, suum porcorumve grunniebat ritu. A capite ad caudam universum corpus squamis, pollicis articulum prioris æquantibus, constitutum erat tam solidis ac firmis, ut nec ferrum, nec æs plus resisterent. Grandibus & frequentibus, non secus ac incus quædam à nobis plagis contusus, nihil aliud quam convolvebatur, & echini more caput caudamque intro condebatur, ut globi exquisitam rotunditatem præstaret: nemine interim juncturarum proportionem satis observante. Conglobatus, nulla, vel vi, vel machina develli aut expediri poterat; relictus tamen, sponte se iterum pandebat aut explicabat, & qua via patebat errabat.

Nieremb. H. N. l. II. c. 5.

## CAPUT III.

De Pisce ludicro, Pusta, &amp; Michipillin.

**I**lluvies menstrua, & ludicrus gestus, unde nomen meruit, commendant

Nieremb. H. N. l. II. c. 13.



*tolt*, h. est, lufum aquarum. Genus quoddam est piscium lacustrium molli cute inteectum, ac lacertarum more quadrupes, dodrantis longitudine pollicemque crassum, etsi interdum cubitum excedat. Vulvam habet muliebri simillimam, ac venter ejus maculis fuscis distinguitur, corpore medio ad caudam usque, nempe prolixam & quæ juxta finem tenuissima sit, paulatim ac sensim gracilescit. Pro lingua est cartilago brevis ac lata. Quaternis natat pedibus, in totidem digitos, persimiles ranarum, fissis. Caput depressum est, & reliqui corporis proportionem magnum. Hiscens rictus, aterque color. Huic menstrua singulis quibusque mensibus fluere observatum sæpe sæpius est, haud aliter au mulieribus; tum venerem abunde excitare, haud secus ac scinci facere solent, quos terrestres crocodilos quidam vocant, ad quorum genus fortasse pertinet. Salubre ac gratum præbent alimentum, nec dissimile anguillarum carni. Multis modis parari solent, frixi nempe, assi, elixique. Verum ab Hispanis magna ex parte ex aceto mulso, addito pipere, caryophyllis, atque siliquaastro Indico: à Mexicanis vero siliquaastro solo, seu intacto, seu integro, familiarissimo illis ac prægrato condimento.

Nie-  
remb.  
H. N. l.  
II. C. 14.

Nie-  
remb. H.  
N. l. II.  
c. 41.

*Pusta* capiuntur in fluminibus Panucinorum, minimi digiti vix æquantes longitudinem atque crassitudinem, sed ventre ranuncolorum instar paulo protuberantiore, quibus simul eum miltomame permixtis & admotis, subvenitur passis erisypelata, brevitate & facilitate mirabili. *Michipillin* seu ova piscium, dicitur genus quoddam lacustre, album, quod ex omni piscium in lacu degentium Mexicano conflatur multitudine, unde factum est illi nomen. Statis anni temporibus eadem capitur palude, haud aliter quam thynni, trichiæ, scombri, similesque pisces, alii gregatim vagantes in Oceano. Agmen pisciculorum esse creditur, haud lendibus majorum. Medio id procedit alveo, in neutrum littus inclinans, tam numerosum à multitudine, ut quinque cubitorum intervallum aut amplius occupet. Non prætermittunt occasionem piscatores, sed diligenti observatione & cura vagantes pisciculos captant excipiuntve retibus, atque ita non mediocris solet sæpenumero fieri captura. Coquuntur iidem alienis fictilibusve vasis, ferculisque ubi opus est, adiiciunt, addito siliquaastro chillive: quo apparatu neque modico neque ingrato cibo constant, sed quo non modo Indi, verum advenæ quoque Hispani sæpenumero vesci gaudeant.

## CAPUT IV.

De *Ambiza* & pisce *mulari*.

**A** Dnectam quod Philippus Pigafeta scribit de quodam pisce Zairi, qui membra duo habet manus humanas referentia, & caudam clypei & forma & magnitudine. Vocatur hic ab incolis *Ambize angulo*, id est, *porcus aquatilis*, propter pinguedinem qua porcum refert. Caro, quæ ab incolis fumo induratur, & ad lautitias reservatur, & gustu & odore est grato. Aquam dulcem non relinquit. Pabulum ejus est gramen, & omnis generis herbæ in littore enatæ. Ore bovem refert. Tantæ interdum & magnitudinis, ut quingentas libras pondere elevet. Capitur à piscatoribus non ut piscis, sed fere ut bos. Observato enim loco diligenter, ubi pasci solet, scaphis suis expectant, & advenientem contis aut remis occidunt: occisum ad aulam regiam deferunt; aliter enim capitali proposita pœna (ut & alios pisces, qui hinc Regii dicuntur, nempe trutas, & cacongo piscem singularem, salmonem figura referentem, sed colore diversum, caro enim ea est alba; & tam pinguem, ut prunis superimpositus eas extinguat) vendi non potest. Unde diligenter ne impunitas audaciores reddat, observantur piscatores ab Aulicis, & deprehensi absque ulla remissione plectuntur. De *pisce mulari* sic scribit Nierembergius.

Nie-  
remb. H.  
N. l. II.  
c. 55.

Sub Philippo II. visa in Oceano bellua duabus velificans alis, navis specie. Fregit unam bombardæ ictus. Irrupit per fretum Herculeum bellua furens, & horribilibus frendens mugitibus atque illapsa per mediterraneas Hispaniæ oras, Valentiam appulit, ubi demum exanimata, centum & quinquaginta dodrantes prolixa, molis circuitus centum, vacuitas cerebri septem homines capiebat.

Nie-  
remb. H.  
N. l. II.  
c. 62.

Eques in os consistere posset. Maxillæ servantur in Escuriali usque ad decem & septes pedes porrectæ, viginti armatæ dentibus duorum dodrantum, minimi unius. Genitalia immodica. Appellatum idcirco monstrum piscis mularis. Aliqui eruditi lamiam fuisse putarunt ob fauces & ingluviem. Duo cadavera in stomacho reperta. Creditum quoque aliquibus hujus generis belluam devorasse Ionam Prophetam. Quis certo sciet?

## CAPUT V.

De *Pisce tauriformi* & *A-milotl*.

**P**iscis tauriformis est Francisco Herman-do pisculus vix duos palmos longus, sed pin-

Nie-  
remb. H.  
N. l. II.  
c. 24.



pinna munitus caudæ instar, sed pæne prolixa digitos: corio intectus duro, fusco, sed circa ventrem candenti, & ubique pentagonis sex angulisve distinctos figuris. Os est minimum, sed longiusculis munitum dentibus: Oculi magni, pinnae circa aures binæ satis parvæ, quemadmodum & aliæ duæ, quarum altera circa extrema ventris est, altera verò juxta postremum dorsum; mirum est, in hoc pisciculo duas prominere juxta frontem spinas acuminatas, infractæ duritiei, instar corniculorum, ac totidem alias eadem magnitudine & forma circa ventris postrema. Vide an ad Boopa vel Acanthiam referri possit. *Amilotl* vero est piscis teres, lacustris, squamosus; candescens, maculis aspersus pullis, sesquidodrantem longitudine, & pollicem crassitudine excedit. Binas pinnas habet in dorso, totidem in ventre, utrimque unam, ac infra ven-

trem alteram. Caput est oblongum, rostrum acuminatum: sed inferna maxilla prominentior. Oculi sunt nigri, iris aurea. Aureum caput, venter luteus, adeoque reliquum pæne corpus. Victum ejus sic commendat Franciscus Hermendus. Optimum & concoctu facile præbet alimentum; nam & ovis capitur magna ex parte onustus, adeoque gratum, ut cum gravem quamdam evasissem ægritudinem, mihi que nutrimenta omnia, à sanis hominibus & sagacioris palati vehementer expetita, sorderent displicerentque vehementius, hoc uno cibi genere suavissime usus sim, & advires instaurandas non mediocriter adjutus. Sed magnitudo ipsa adeo gratiam commendat, ut quo in majorem amplitudinem adoleverit, eo majori habeatur in precio, expetatur avidius, rarius inveniatur venalis, inventusque ematur carius.





# HISTORIÆ NATURALIS

## DE

# PISCIBUS.

LIBER V.

## De Cetis.

## CAPUT I.

## De Cetis in genere.

Galen. 3.  
de Alim.  
facult. c.  
21. & 37.



Æl. H.  
A. l. 17.  
cap. 6.  
Plin. H.  
N. l. 9. c.  
7.

Arist. H.  
A. l. 9. c.  
2. & 4. de  
partib.  
c. 13.

Etorum nomine sepe tam apud Græcos quam Latinos ingentis molis pisces intelliguntur; hic pro illis duntaxat sumimus, qui pulmones, arteriam, collum & alia membra cum terrenis quadrupedibus communia habent, quibus omne propriè dictorum piscium genus destituitur. Specialius aliquando, seu pro Pistrice, seu pro Balæna sumi, apud Ciceronis Aratum, & Oppianum videbis. Integuntur corio, qui Macedonibus, dum è Mesambria Tocam navigarent, visus, corio squammoso, tam crasso ut cubitum æquaret, ostreisque patellis, & algis oppletus, pro monstroso habendus est. Lora ex eo fiunt, quibus maxima pondera per cochleas sublevantur, simili duritie & nervose esse, & chordas ex iis ad bellica instrumenta confici, prodidit Ælianus. *Pulmones* habent, quod plus caloris, quia ingentis molis animalia, ut possint moveri, requirunt. Branchiis idè carent, sed *fistulas* (ora vocat Plinius, nares Ovidius, Cardanus oscula) acceperunt. Ductus hæc ab ima palati ad extimam parte duplex, septo distinctus, & nostrarum narium foraminibus ad palatum deductis, proportionem quodammodo respondens. Unicum in extima parte literæ C. figura foramen apparet, quod carne pingui, tanquam operculo, tegitur. Respirationis gratia datas, vel exinde colligas, quod obturatis, citius moriantur, quod in Delphino Rondeletius observavit. *Os* ipsos subter habere, Aristoteles & Plinius reliquere, ut dum resupinantur, pisces quos captant, evadendi tempus habeant, in promptu habere, observavit Rondeletius. Resupinatos tamen cibum capere, tum ob dictam causam, tum propter longam & multum infra descendentem oris scissuram. Carent quidam *Dentibus*, instructi quidam, ferratis, planis, exertis, aliquando hominis similibus. Eboris instar can-

didus, ad opera firmos, anteriores latos, ne hæreret cibus, posteriores acutos, ut promptius divideretur, apud Cardanum legimus. *Mammæ* foeminae habent; detractos aliquando ex una in Aquitanico littore duo lactis cados, Rondeletius prodidit. Audire certum, & nulla manifesti instrumenti vestigia, ut putat Aristoteles, Rondeletius tamen in Delphini cranio, meatum qui ad cerebrum usque excurrit invenit. Vehementer *pinguescunt*, quod piscium carne alantur, & moveantur tardissimè, quod tardo motu digeri posset, densitate corii præpeditur. *Internas partes* verbis Rondeletii describam. Sub peritoneo, inquit, partes quæ ad nutritionem & generationem conformatae sunt, ad quadrupedum terrestrium magis quam ad piscium partes accedunt. Nam *Epiploon* habent, sed minus pingue, quo ventriculus & intestina incalescunt, & foveantur. *Ventriculum*, magnum, cum ad justam magnitudinem accreverint: in recens natis exiguum est, & geminus videtur. Ejus fundo *pancreas* hæret, desinit in *intestina*, quæ in multos gyros convolvuntur, eadem ferè ubique crassitudine, præterquam in extremis, quæ mediis paulò sunt latiora. *Mesenterium*, vertebris annectitur, glandulas nigras, venas, arteriasque intertextas habens. *Renes* venæ magnæ trunco, arteriæque magnæ per emulgentes annectuntur, sunt inter epar & testes siti. *Urina* per *ureteras* in vesicam percolatur: quæ terrestrium animalium vesicis similis, sita est inferiore ventris parte. In iis qui uterò adhuc gestantur, in urachum desinit, per quem urinam deponit in allantoidem tunicam ad diem usque partus. Editi in lucem, per pudendum urinam veluti terrestria emittunt, & per musculum sphincterem retinent. *Vracho* arteriæ umbilicales adhærent, arteriæ magnæ inferioribus ramis insertæ. Utrunque sunt *testes* oblongi, quibus præparantia vasa præposita sunt, infiniti scilicet venarum arteriarumque è magna vena ortarum ramuli, qui post varios & multiplices anfractus, in epidymum inferuntur. Cum enim magna sanguinis copia, multo semini generando necessaria sit, quæ longo vasorum ductu, ob spatii brevitate transmutari & elaborari non potest, solerter

Cardan.  
variet.  
cap. 37.

Aristot.  
H. A.  
l. 4. c. 8.



folerter admodum natura gyros illos vasorum constituit, ut illis, id quod longitudini deest, pensaretur, & quibus singuli meatus capreoli intorti dependent, & glandulosa corpora radici pudendi adnata desinunt; ex quibus meatu urinario, nervo cavo *genitale* constat humano simile, cujus extremum foris propendet, in glandem tenuem linguis avium similem desinens, quæ præputio non omnino integitur: intus replicatum latet, ad veneris usum exoritur. Venas suas, nervos, arterias, idem pudendum habet. Ossi innitur, quod ossi pubis proportionem respondet. *Thorax* costis veris ac mendosis, sterno, vertebra, musculis constat: cujus capacitatem *pulmones* magni complent, densiore substantia quam in terrestribus: crassitudine & colore hepar quadrupedum referunt, tum, ne aqua in rariorem substantiam penetrans, ejici non posset; tum ne in magnis expirationibus, quibus in aquis ferè semper coguntur, tenuior substantia ferè disrumperetur. At in duas partes divulsi sunt, parte inferiore adeò gracilescent, ut membranam esse affirmes. Undique *Cor* complectuntur pericardio conclusum, in medio thorace locatum, nulla in re porcorum cordi absimile: duos sinus, totidem auriculas, denique omnia similia habet. Adhæc, asperam arteriam, Oesophagum, musculos & quæcunque in terrestribus corporibus sunt, clavícula exempta, reperire est. *Caput*, cum vertebra articulatur. *Cerebri* dispositio diversa. Nam in anterius & posterius divisum est, non in dextrum & sinistrum, ut in homine. *Nervorum* conjugationes ex eo nascuntur, plexus *χρυσίδης*, in eo rete mirabile, meninges duæ pro integumento. *Vulva* in foeminis cervicem palmum unum longam habet: ea deinde in ramos duos distribuitur, veluti in quadrupedibus terrenis videre est, testes ad uteri cornua positi, pudendum inter umbilicum & podicem. De *Magnitudine* in singulis speciebus dicetur. *Locum* si spectes, in solo nec tamen omni mari (Pontus Euxinus nullos habet) reperiuntur. Semperque ferè in alto versantur. Circa solstitia maximè visuntur, quod tunc illic ruant turbines, tunc imbres, tunc delectæ montium jugis procellæ ab imo vertant maria, pulsataque ex profundo, belluas cum fluctibus volvant. Aliàs in fundo maris ferè degunt, molis suæ pondere. *Cibus* ipsis pisces, harengi imprimis, quos quandoque tam avidè persequuntur, ut in littora vadosa impingant. *Generant* intra se, & catulos enituntur. Hi teneri sequuntur matrem, quod à nautis visum. *Motu*, ob corporis molem, & ventris ingluviem tardo feruntur. *Visus* & *ruditus* ipsis hebetior. Hinc curiosæ omnium naturæ beneficio, pisciculus, si credere fas est, tanquam duce utuntur. Odore piscis adeò delectantur, ut sese navi affricent. Strepitu

terreri Arrianus in rebus Alexandri M. prodidit. *Usus* in cibis, apud Ichthyophagos, prodente antiquitate invenere. Præparationem vide apud Aldrovandum.

## CAPUT II.

De Cetis in specie.

## ARTICULUS I.

De Balena.

**E**Thæc de Cetis in genere sufficiant, in specie jam de iisdem agentur. Numerantur autem inter eos, *Balena*, *Balena vulgi*, *Physeter*, *Pristis*, *Orca*, *Delphinus*, *Phocæna*, *Scolopendra*, *vitulus marinus*, & *Manati Indorum*. Tab. xli,  
Tab. xlii,

**BALÆNA**, Græcis *φαλαίνα*, vel *παρά το βάλλον*, id est emittere, quod maris aquas per fistulas emittat, vel a *φάλον* quo vocabulo Græci meatum in galeis militaribus, cui plumas inferebant, indigitant, vel à Chaldao *ܠܒܐ* quod & devorare dicitur. Ingentis est magnitudo. Visa in Indico mari, quaternum jugerum, seu nongentorum sexaginta pedum longitudine. Centum & quinquaginta cubitos, obtinebat, quem Nearchus ejectum vidit. *Describitur* à Bellonio, Rondeletio, & Aldrovando. De *suo* scribit Bellonius, adipem ejus velut oleum non condescere: pinnas habere utrinque unam & tertiam in dorso, quæ totum corpus dirigit. Caudam lunatam, Corium nigrum, cui pinguedo pedis altitudine subsit, lardum quadragesimale appellant. Lingua eidem aliquot librar. pondo. Ante oculos prætenturæ, seu tenues quædam assulæ, quatuor ulnas longæ, ac sesquipedem latæ, longissimis villis præditæ, quibus iter prætentat. Ossa tam magna, ut postes ex iis fieri soleant. *Rondeletius* suæ parvam linguam, & quæ quatuor duntaxat vel quinque vasa salsamentaria adscribit. Alibi, penem se unius vidisse, qui à procero homine humeris deportatus terram contingeret, scribit. In ejus, quam *Gesnerus* describit, ventriculo tria dolia crudorum pisciculorum, inter quos salmo unius ulnæ longitudine, inventa sunt. Pelle nigro undique tegebatur, nisi quod maculæ duæ candidæ, utrinque supra medium oculi inciperent, & retro tenderent. Tota maxilla inferior erat candida, & pars quædam sub ventre. Plura apud Gesnerum vide. *Aldrovandi* prior colore erat subcæruleo, tota maculis nigricantibus conspersa, ventre candido. Altera, quam Bufalinam vocat tota nigricabat. Capta erat An. M. D. LXXVII. in Scaldi decem ab Antwerpia milliariibus monstrosa, quam Pareus descripsit. Longitudo ejus erat pedum octo & quinquaginta, altitudo sexdecim. Cauda quatuordecim pedes lata, ab oculo ad extremum rostrum intervallum sexdecim pedum, Vossius  
de Idol.  
l. 4. c. 32.  
Plin. H.  
N. 1. 9.  
c. 3.



Schonfeld. in Ichtyol.

Ælian. H. A. l. 16. c. 18.

Plin. H. N. l. 9. cap. 6. Schonfeld. in Ichtyol.

Maxilla inferior senum in singulis lateribus pedum erat, viginti quinque dentibus armata, qui totidem foraminibus in superiore dentibus omninò carente excavatis, recondi poterant. Tot dentium longissimus sex pollices non excedebat. *Locus* ipse procul à terra ubicunque degit. Plurimas autem circa Islandiam, Gronlandiam, & vicina Septentrioni loca, à Biscainis, Anglis, Hollandis, circa æstivum inprimis solstitium, quo tempore sinus recessusque maris pacatiores quærunt, capiuntur. In Taprobanae mari Thunnis insidiari, apud Ælianum legimus: in Gaditano Oceano non ante brumam conspici: statis temporibus in quodam sinu placido & capaci, mirè gaudentes ibi parere, condi, Plinius prodidit. *Victus* ipsis pisces, visus qui quadraginta asellos devoraverat, eosque adhuc recentes, quos oculatus testis dissectos & sale conditos ad solem siccavit. Sunt qui comedere masticando negent: pisces deglutire integros, eosque minutos, quod interna gutturis membrana nil magnū ingredi sinat, dicunt. Quidam carne vesci negant, quod in captæ visceribus præter mucum & spumam nihil reperitur. Pisciculum Lodel venatoribus dictum, si copiose voravit inobviatur quasi, & in furorem acta, nec hominibus nec æqualibus suis parcit. De *Coitu partuque* (verba sunt Schonfeldii) venatores referunt, Balænas contracta societate & consuetudine in amorem mutuum, quum conjunctione, saltatione, aliisque affectuum conjugalium significationibus inter se testantur coire; hinc unà natæ semper, amicitiamque captam conservare, donec accensa ad libidinem foemina, erecto ad perpendiculum & in caudam corpore, marem eodem posito obvium, pinnis suis, tanquam brachiis duobus, amplectatur, mutuoque complexu per horæ dimidiam, vel integram utræque hæreant: Inde conjugium & conversationem ad mortem usque colere. Fæmellæ fætum autumnō inter Octobrem & Januarium pariunt, unicum, tauro non minorum, imò majorem pro matris quantitate, qui sub maternas pinnarum præfidiis & tutela tutas, non deserit parentes, nisi ablactatus. Philostratus faucibus ab eis filios abscondi, si quando majorem belluam fugere contigerit, prodidit, quod & apud obscurum de natura rerum authorem invenies. Terræ defectu aquæ affinis, aquâ ore recepta & ejaculata succurrere, fide ejusdem dicitur. *Dormire* edita per summa fistula, Aristoteles author est: stertentes audiri, Plinius: in siccum exire ut à Solis radiis caleant, Oppianus & Ælianus. *Inimicitiam*, cum Delphino, Thunnis & Orca gerit. A gladio pisce ut supra diximus vehementer timetur. Ziglerus castoreo aqua diluto & in mare effuso adeò terreri, ut totus grex dissipetur prodidit. De *vena-*

*tione & captura* vide Schonfeldium. *Usus* adipis in lucernis, ad inungenda coria, curruum rotas, & alia. Cardanus viscera quia pingua, & sapore & violæ quasi odore commendari scribit. Galenus eis mucosum saporem tribuit. Viginti balænarum genera apud Hartenium inveniuntur, ex quibus *Primum* quot Ninting vocatur hominem fugit, & comestibile est. *Decimum*, quod Fiscraake, haleces versus terram fugat. *Undecimum*, quod triginta ulnarum, ultra septuaginta dentes habet, & eos tam magnos, ut inde tabulæ ac manubria cultellorum fiant. *Duodecimum*, non habet pinnas in dorso. *Decimum quintum*, quod Rodkemling vocatur, subvertit naves, & X L. est ulnarum. *Decimum sextum*, quod Nahwal, antè in superiore mandibula, dentem longitudinis septem ulnarum, adeò exactè tortum in circuitu, ut humano ingenio melius fieri non posset, habet. *Decimum septimum*, quod Skeling, octuaginta ulnarum, diversos superciliorum supra oculos habet ordines. *Decimum octavum*, quod Nordhwal, nonaginta ulnarum, vivit nisi de pluvia & rore cœlesti, quod Haffnegruffæ, magis insula esse videtur quàm piscis. Fides sit penes authorem.

Galen. l. 3. Alim. Schonfeld. in Ichtyol.

## ARTICULUS II.

*De Balena vulgi, & Physetere.*

**B**ellua hæc ut plurimum triginta sex cubitos longa est, octo alta, ut Rondeletius describit. *Oris* scissura ad duodeviginti pedes porrigitur. *Dentes* in eo nulli, sed horum loco in utraque maxilla, corneæ sunt laminæ nigræ, sensim in pilos suillis similes desinentes, quæ in anteriore & posteriore sive interiore oris parte breviores sunt, in media longiores. Ab interioribus *Lingua* intus continetur & coercetur: inde abducta vel abscissa ita diffunduntur, ut in eundem locum iterum recipi non possit. *Oculi*, quatuor ulnarum spacio à se distant, foris parvi apparent, intus capitis humani magnitudinem superat. *Pinnas* duas maximas in lateribus habet, quibus natat, & catulos in metu occultat, in dorso nullam habet. *Cauda*, situ caudis Delphinatorum similis est, figura non multum absimilis, quam cum movet, ita mare agit, ut naviculas submergat. *Rostro* est brevi. *Fistula* caret. *Corio*, duro, nigro, integitur, sine pilis, cui lepades, & ostrea hærentia aliquando reperiuntur. *Internas partes*, veluti in Delphino. In ventriculo mucus, spuma, aqua, alga foetida, ambra inveniuntur, ut exinde Carnivoram non esse colligas. Vitulos vivos parit. Carnis nullus in *Cibis* usus, sola lingua commendatur, sale condita. Viginti tria

Aldrov. de Cetis cap. 7.

Philostrat. l. 2. de vita Apollonii.

Arist. H. A. l. 4. c. 10. Oppian. Halieut. l. 1. v. 404. Ælian. H. A. l. 9. c. 50.

sape



Aristot. H. A. l. 3. c. 12. Plin. H. N. l. 11. c. 37. *sæpe vasa ea implentur* *Μοσχίον* Aristotelis esse, vel exinde colligitur, quod pro dentibus setas, quibus intus os hirsutum est, habeat. Plinius musculum manuum benè dixit, sed pro duæ Balænae malè posuit.

PHYSETER, qui & Physalus, *παφῶ* id est à flando dicitur, quod copiosorem aquarium eluviem præ cæteris efflare scribatur. Gesnerus eundem vel saltem affinem cum Pusti, qui *πύστις*, *πύστις* & *πύστις*, dicitur, facit, quem vide. Diversum esse à Physalo maris rubri, ex descriptione videre est. Magnitudine hic adulti Gobionis, sine ore, cum branchias tamen habeat, perniciem ei qui gustaverit creat. Intumescit enim, tandemque ventris profluvio vita finitur. De *Descriptione* inter authores non convenit. Plinius ingentisque columnæ modo se attollere scribit. Solinus super antennæ navium velis quondam diluvium eructare addit, quod Strabo commune cetis in mari extero circa Turdetaniam facit. Turnerus portentosæ magnitudinis cetum facit, & singulos se eorum tantum aquæ è fistulis, quas in capitibus habent ejaculantes vidisse, ut singuli singulas naves aquarum copiâ in profundum submergerent, adjicit. Bellonius hoc solo à Balænis differre, quod nullas prætenturas habeat, neque tam vastâ corporis mole, figuraque sit magistereti. Rondeletio est ore maximo, dentibus acutis, ferratis, linguâ carnosâ & magnâ, fistula longè quam reliquis crassiore, pinguedine multa.

## ARTICULUS III.

## De Puste &amp; Orca.

Tabula XLIII. Aldrov. de Cetis c. 5. Bellon. de Aquatilib. l. 1. Aloysius l. 6. Navigat. Clusius Exot. l. 6. c. 19. **P**USTES à secando, quod perniciosissimè nâtet, dictus est. Perperam à Bellonio capite vasto, rotundo, & cacabi figuram exprimente describitur, quo modo namque aquam velociter secaret? Rondeletio est rostro, valdè longo, osseo, utrinque aculeato. Aculei validi sunt, & Delphinorum dentibus similes. Aloysius Cadamustus feram aquaticam vocat, eaque in assamenta secari ligna scribit. Clusius ipsius formæ ratione inter Galeos seu caniculas reponi debere affirmat: eumque ita ex pictura describit. Erat hic piscis, inquit, corporis formâ & colore Galeorum generibus, aut Caniculæ Aristotelis valdè similis: nullis tamen maculis ut illa, conspersam cutim habens, perinde tamen rudem, & instar Zyganæ cutis asperam, fusci in dorso coloris, in ventre candicantis, & sex pinnas habet, in lateribus, medio videlicet pænè corpore binas, &c. Caput in longum & angustum, planum & firmum rostrum porrigebatur, utrinque cum iis dentibus, sive osseis firmisque & rectis spinis, ex adverso sitis serræ instar munitum, viginti vel etiam pluribus, &c. Binos oculos in prona capitis parte habebat,

binas nares in supina, & infra illa oris scissuram, ut Zyganæ fere transversam. Reperitur plerumque in Oceano occiduo.

ORCA Latinis à vasis olearii aut vinarii similitudine dicitur. Quodnam apud Græcos habeat nomen, vix compertum, nisi vocabulo Orygis apud Strabonem, quem in mari extero circa Turdetaniam ponit, veniat. Bellonius ocrynum Oppiani esse credit, sed perperam. Thunni enim hic genus maximum. Delphino est corpore toto vigesies crassior, potissimum circa ventrem: Toto tergore atra, ventre ex albo roseo, ad latera ferè cærulea. *Rostrum* habet finum, sursum repandum; cuius labri inferioris tanta est crassitudo, ut à superiore sejungatur dum piscis pronus est, quâdraginta triculenti in eo dentes, quorum anteriores obtusi & graciles, posteriores acuti & crassi sunt. *Oculi* eidem sunt parvi, pinnae pro corporis magnitudine pusillæ. *Cutis* glabra & politissima. *Cauda* lunata, & ulnam distenta excedens. *Pudendum* mari in medio ventre abstrusum, duor. pedum longitudinem excedens; in foemina ano vicinum est, ad quod utrinque duorum digitorum intervallo, quædam foramina visuntur, in quibus mammæ papillæ delitescunt. Sæpe octingentas, aliquando & mille libras excedunt. *Lienem* unico orbiculari globo in placentæ formam effectum habet. Plurimum aquæ per fistulas ejaculari, Plinius author est. *Orca*, inquit, in *portu Ostiensi* visa est oppugnata à *Claudio Principe*. *Venerat tunc ex ædificante eo portum, invitata naufragis* tergorum è *Gallia advektorum*, satiansque se per complures dies, *alveum in vado sultaverat*, *accumulata fluctibus in tantum*, ut *tiretimagi* nullo modo posset, & dum *saginem persequitur*, in *littus fluctibus propulsa*, *emittente dorso*, *multam super aquas, carinæ vite inversa*. *Præterea* iussit *Cæsar* *plagas multiplices inter ora portus*, *profectusque ipse cum prætorianis cohortibus*; *populo Romano spectaculum præbuit*, *lanceas congerente milite*, è *navigeis assultantibus quorum unum mergi vidimus restatu belluæ oppositum nuda*. De earum & Balæna pugna ita quoque Plinius: Balænae & in nostra maria penetrant. In Gaditano Oceano non ante brumam eas conspici tradunt. Condi autem æstatis temporibus in quodam sinu placido & capaci mirè gaudentes ibi parere. Hoc scire orcas, infestam his belluam, & cuius imago nulla representatione exprimi possit alia, quam carnis immensæ dentibus truculentæ. Irrumpunt ergo in secreta, & vitulos earum & foetas vel etiamnum gravidas lancinant morsu, incussæque ceu Liburnicarum rostris fodiunt. Illæ ad flexum immobiles ad repugnandum inertes, & pondere suo oneratæ, tunc quidem & utero graves, pariendive pænis invalidæ, solum auxilium novere in altum profugere, seseque oponere, & cautium



tium angustis trucidare, in vada urgere, saxis allidere. Spectantur illa prælia ceu mari ipso sibi irato, nullis in sinu ventis, fluctibus verò ad anhelitus ictusque, quantos nulli turbines volunt.

Hucusque Plinius.

#### ARTICULUS IV.

De Delphino.

Tabula  
XLIV.  
Aldrov.  
de Cetis  
c. 7.

**P**iscis quem Latini Delphinum vocant, is Græcis *δελφίς* & *δελφίν* & si minutus *δελφινίσκος*, plærisque Europæ nationibus, Porcus marinus dicitur. Ex Cetis esse, quod branchiis careat, pulmonemque & arteriam habeat, Aristoteles reliquit. Repando dorso incurvum esse plærisque proditum, unde incurvè cervicum pecus Pacuvius vocavit, seu quod talis oculis nostris, dum ab undis exiliens in mare præceps fertur, propter celeritatem motus appareat, seu quod, quia branchiis destituitur, revera corpus, cum se vibrat, incurvet, ut promptior in gurgitem pronus feratur.

Plinius  
H. N. l.

Aristot.

*Rostrum* ei est finum, unde Simonis nomine gaudere Plinius scribit. *Linguam* mobilem, brevem, latam, carnosam, exertam in ambitu ferratam, suillæ non absimilem. *Dentes* parvos, acutos, pectinatim coeuntes. *Oculos* magnos, sed cute adeo tectos, ut pupilla solum appareat, non longe ab oris scissura, quin in eadem propemodum linea sitos. De *Fistula* situ non convenit inter authores. In dorso esse scribunt Aristoteles & Plinius, ante cerebrum Rondeletius, cujus verior sententia, inter oculos Bellonius. In dorso esse creditum veteribus, quod magis ad posteriorem partem quam in balæna spectet. *Pinnis* duabus validis natat, quæ veluti hominis brachia cum omoplati articulis junguntur. Earum musculi quatuor robusti dorsi pectorique annectuntur. Hæ in ventre sunt, ita sitæ, ut non solum natatum, sed & motum, quo sursum se effert respirandi causa, adinvenit. In dorso quæ est, aculeatam Plinius, & Pausanias faciunt, propter duritiem sine dubio. Nam rigidam satis esse Rondeletius testatur, duæ quæ in cauda, ex ejusdem lateribus, altera dextram, altera sinistram partem versus, ita ut cauda, quæ lunata, aquam latitudine sua verberet. *Sextum* si attendas, pudendi in *femina* orificium, ano vicinum est ad terrestria animalia accedens, binas eadem, si Plinium sequimur, in ima alvo papillas tantum gerunt, nec evidentes, & paulò in obliquum porrectas. Aristoteles mammas propè genitale continere ait, papillas quadrupedum more conspicuas habere negat, sed velut alveolos quosdam humoris duos esse scribit, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore catulorum parentem sectantium excipitur. *Vulva* cervicem pal-

lum unum longam habet, quæ deinde in ramos duos veluti in quadrupedibus terrenis videre est, distribuitur. Testes ad uteri cornua, pudendum inter umbilicum & podicem gerit. *Mari* foramen quoddam in medio ventre apparet, è quo pudendum quadrupedibus simile exit, quod in congressu erigitur, & extra eminens profertur. Ideò fortè Aristoteles genitale foris esse dixit, testes intus, qui secundum Plinium prolongi, ad alvum necti. *Felle* omninò caret. *Locum* si spectes, nullum ferè sine Delphinis mare; adeo ut & in Ponto, quem nulla piscibus inimica belluâ ingreditur, repriantur, & in Adriatico quamvis raro capiantur, sed & aquas dulces subit, & Nilum ipsum, ibique piscibus aliquandiu pascitur. Illos tamen non esse, quos Solinus serratas cristas habere. Crocodicolos studii ad natandum elicere, demersosque astu fraudulento tenera ventrium subternantes secare & interimere, scribit, facile mihi persuaderi patior, quod Marcellinus non Delphinos, sed Delphinis similes vocat. Accipit à Græcis qui circa Propontidem salitant Bellonius, eosdem instar aliorum piscium migrare, è mari mediterraneo videlicet Septentrionem versus, Hellespontum & Propontidem emetiri, Euxinum ingressos certo tempore immorari, tum denuo loca prius relicta repetere. *Cibus* Delphino pisces, in quos crudeliter grassatur, habetque Cephus aves comites, quæ ab eo accisorum sanguine pascuntur, ut Oppianus scribit. *Vita* longa, ad tricenos sæpe annos producit, fortè quod felle careat. *Coitus* humano similis, illeque paulò quam piscium qui attritu ventrium coeunt, diuturnior. Aristoteles tamen cæteror. more congregi scribit. Gestat utero decem mensibus, & singulos uno partu, interdum & binos edit. Parere æstate, nec ullo alio in vulgatis Plinii codicibus legimus. Rondeletius foetum verè aliquando extraxit, alteram foeminam Octobri dissecuit, inque ejus utero tum demum formari coeptum foetum invenit. Chorion amnio & allantoido tunicis, is in utero involvitur, sanguine pervenas umbilicales nutritur, spiritum per easdem arterias recipit. Proles celeriter adolescit, quippe annis decem ad summam magnitudinem perveniat, ut tradit Aristoteles. Pro voce ipsis gemitus est humano similis, ut Plinius prodidit. Rondeletius stridore medere scripsit, vocisque nonnihil. *Visum* habent acutissimum, ita ut piscem etiam sub lapide vel in caverna aliqua latitantem videant. Omnium tum terrestrium tum aquaticorum velocissimos Aristoteles dixit, ocyores volucre, ocyores telo. Nam cum fame concitati fugientem in vada ima piscem, diutius spacium continuere, ut arcu emissi ad respirandum, emicant, tantaque vi exiliunt,

Plinius  
H. N.

Solinus  
Polyhist.

Aristot.  
l. 5. c. 5.  
Aristot.  
H. A.  
l. 6. c. 13.

Aristot.  
H. A.  
l. 9. c. 48.  
Plinius  
H. N. l.

Ælian.  
H. A. lib.  
12. c. 12.



exiliunt, ut plærumque vela navium transvolent saltu. Pernicieisæpe causa ista velocitas. Nam aliquando, dum Mugiles persequuntur, nec incitatum cursum inhibere possunt, terræ impacti, præda fiunt; quod & tum fit, cum vel asylo infestantur, ut Rondeletius observavit, vel nimio piscatorum strepitu gravantur. Plinius tellure tactas mori ait, repugnante experientia. Nam & Aristoteles extra aquam mutientem & anhelantem cæterorū spirantium more reliquit, & Gesnerus Arimini captum tres dies in terra vixisse scripsit, & Rondeletius vivos à Mospeliensibus Lugdunum usque deportari affirmat. Gregatim ex ætatum ratione dispositi natant. Parvuli præcedunt, adultiores sequuntur. Hoc singulari in prolem amore fit, quo etiam motus tenellos in fauces recipere, ut Solinus dicit, vel saltem eos in faucibus aliquando gestare, quod Oppiano & Gesnero visum, solet. De ipsorum somno ita Plutarchus: *Delphinus dormiens de summo per altum demittitur, tantisper dum in vadum impingat, solumque sentiat: Hic excusso somno ronchoque edito ad summum rursus meat, rursusque demittitur, ac pronus fertur, imo quodam mirabiliter composito quietem captans. Ingenium singulare resipit, quod parentes senio confectos alant, sui que corporis nisu natatum tanto amore prosequantur, ut sæpe aliquem ex se captum ad portum usque comitentur, mortuum verò quasi ad sepeliendum efferant; quod Hesiodi à latronibus interfecti in mare projectum cadaver, ad Rhium & Molycriam deportasse legantur, quod navibus in qua aliquis ex delphinicidis, coorta tempestate, quasi in ultionem perniciem struant, quod à Græcis, Italis, Venetis in primis nautis creditur, quod Serapidem & Dyonisium, jussu Ptolomæi Soteris revertentibus, & supra Maleam abreptis, ducem se ad stationem præbuerint; quod Simonis nomine miro modo gaudeat, ut post Plinius, Gillius cum ad Antipolin provinciæ Narbonensis urbem navigaret expertus scribit, quod captus miserationem gemitu moveat, ut auritus testis Gillius prodidit, quod denique cantu & Musicâ, unde illa de Arione in mare injecto & à Delphino liberato, seu fabula, seu Historia, oblectetur. Tempestates lasciviendo prælagire nautæ, Bellonio refragante affirmant, & à nobis cum ex Anglia Scotiam aliquando peteremus observatum est; seu quod aëris mutationibus non aliter ac ægri afficiantur; seu quod procellâ exsurgente, consurgentes ab imo maris exhalationes, calorem in Delphinis excirent, quem ut temporent, crebrius erumpunt. Piscatoribus Luboicis in piscatione subsidio esse, authoribus proditum est: Verum rectissimè Bellonius, non suo ingenio sed fortuitò id facere, observavit. Si enim in Celerinorum aut Sardiniarum gre-*

ges inciderint, capitibus absumptis, truncos capientibus relinquunt. Pisces verò irruentis Delphini impetu consternati, postquam in aërem exiliissent, tam denso interdum in mare agmine relabuntur, ut pluviam repræsentent. Quæ de Delphinor. in pueros amoribus dicuntur, apud Gellium & Ælianum invenies. *Inimicitias* cum Balæna, ut apud Philen legimus, Pompilo, & Amiis gerit. Ex pisciculis, Pediculum parasitum habet, de quo ita Aristoteles: Maris quod à Cyrena in Ægyptum panditur, piscis Pediculus nomine circa Delphinum est, qui omnium pinguiissimus fit pabuli copiâ, quæ Delphini operâ suppeditatur. *Ufus* ejus quibusdam gentibus in *Cibis*, & quidem tantus, ut in mensas Principium veniat. Maximè tamen hepar & lingua commendantur. Illud tenerum, sed mali succi. Hæc, tenerior pinguior & hepatis præferenda. Cardanus viscera non solum sapore sed & odore quasi violæ commendari scribit. De *Ufu in Medicina* pauca occurrunt. Kiranides ventrem siccum & tritum spleniticis prodesse, *jecur* assum & in cibo sumptum, tertianam & quartanam integre sanare scribit. Plinius febrium circuitus tolli ait, si ante accessiones degustatum fuerit. Dentium cum melle Cinis infantium gingivis dentitionibusque confert. Alligatus, pavores repentinos tollit.

## ARTICULUS V.

De Phocæna &amp; Scolopendra Cetacea.

**P**hocæna Delphini species est. Rondeletius quidem diversum à Tursione facit; sed Gaza, motus sine dubio Plinii verbis, qui Tursiones Delphinorum similitudinem habere scripsit, Phocænam Tursionem vertit, & pro iisdem, Scaliger, Bellonius, Gesnerus, Jovius & alii agnoscunt. Differt tamen & ab eo qui Athenæo *ὑπόδον* dicitur, & à *Platanista*, quem Plinius in Gange Indiæ rostro & cauda Delphini, magnitudine verò quinque cubitorum, facit. *Descriptionem* si attendas, ita de iis Plinius: *Delphinorum similitudinem habent, qui vocantur Tursiones. Distant & tristitiâ quidem aspectus: abest enim illa lascivia; maxime tamen rostris. Canicularum maleficientia assimilati.* Nobis ex Bellonio & Cardano, ista placet. Phocæna Delphini est magnitudine, brevior tamen crassiorque corpore. Captus aliquando in Neustria, qui mille libras pendebat, adeò pinguis ut teres videretur. *Caput* habet obtusum, *Rostrum* tam firmum ut cum capite ferè rotunderetur; *Meatus auditorios* admodum obscuros si reperire volueris, ab oculi majore cantho, sex digitor. intervallo caudam versus accuratè disquirere, illucque grandem culmum inferere oportebit. *Pinna* eidem solidæ ac nigræ.

Gell.  
Noct.  
Atticar.  
l. 7. c. 8.  
Ælian.  
H. A. l.  
6. c. 15.  
l. 8. c. 13.  
& l. 2. c.  
6.  
Arist. H.  
A. l. 5. c.  
31.

Plin. H.  
N. l. 32.  
c. 10.

Tab.  
XLI.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 6.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 3.

Cardan.  
in variis.

Plin. H.  
N. l. 9.  
c. 8.

Plutarch.  
l. utra animalia.

Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 47.

Plutarch.  
in Sympos.

Plutarch.  
l. utra animalia.

Plin. H.  
N. l. 8. c.  
35.



Tergoris color ex cæruleo in obscurum livens. *Cauda* lunata. Cardanus eum qui Diepæ in Neustria captus erat, *fistulam* in medio per quam aquam effunderet, digiti magnitudine habuisse scribit. *dentes* quoque obru-  
 fos, & hominis molaribus similes. Minxisse, ore aperto respirasse & suspirasse; *Lachry-  
 matum* fuisse, profluentibus ex oculis gut-  
 tulis; diuque supervixisse, quamvis sanguis è  
 vulnere, non secus ac vinum è siphunculo  
 flueret, addit. Nullius non maris est incola.  
 Bellonius sæpius in Oceano Gallico quam  
 Delphinos capi scribit. Rondeletius etiam  
 in Ponto vivere, & in loco illo, Aristotelis,  
 Arist. H. A. l. 8. ἔστι γὰρ φαλκίνας ἐν δελφίνῳ ἔστιν ἐν τῷ Πόντῳ, &c. φα-  
 λκίνας pro φαλκίνας ex eodem Aristotele, qui  
 antea Phocænam in Ponto nasci scripserat,  
 legendum esse putat. Hoc alii de vitulis ma-  
 rinis accipiunt. *Parit* magna ex parte binos  
 vel singulos ut Aristoteles prodidit. Bello-  
 nius in forum Parisiis, diebus Veneris in pri-  
 mis adferri reliquit. Delphino tamen est de-  
 terior, quia pinguior.

Ælian. H. A. l. 13. c. 13. S COLOPENDRÆ CETACEÆ, Ælia-  
 nus solus meminit. Exerunt aliquando to-  
 tum è mari caput. Narium pilos magna ex-  
 cellitate apparere, caudam perinde atque  
 locustæ latam conspici, reliquum corpus a-  
 liquando in superficie æquoris spectari, &  
 cum triremi justæ magnitudinis conferri pos-  
 se: Per multis pedibus, utrinque ordine sitis;  
 tanquam ex scalmis appensis natare. Ad-  
 dunt inquit harum rerum periti ac fide di-  
 gni, ipsos etiam fluctus ea natante leviter  
 subsonare. Pro hac Cetacea Scolopendra,  
 hanc quam exprimi curavimus Aldrovandus  
 exhibet. Tota ad colorem cæruleum verge-  
 bat; ad latera tamen & in ventre nonnihil  
 rufescebat.

## ARTICULUS VI.

De Phoca, seu Vitulo marino.

Tab.  
XLI.

ET si Phoca animal sit amphibium, quia  
 tamen humore potissimum victitat, nec  
 diu extra aquas vivere potest, inter aquati-  
 lia referre placuit. Græci φαλκίνας dicunt, seu  
 ex βάλκη boatu quem edit, unde Servius a-  
 pud Virgilium, Phocas, *marinos boves* in-  
 terpretatus est, seu aliunde ducto vocabulo.  
 Plinius & Gaza vitulos marinos; ille, quan-  
 doque Vitulos simpliciter dixit. Festo Bo-  
 cas, ut Gesnerus conjicit, vocatur. Varinus  
 ἀνάκλυς κῆτος, Oppianus δῆρα εἰνέλειον dixit. Dif-  
 fert *Corporis figura* ab omnibus tum pisci-  
 bus, tum Cetis, adeò ut quadrupedum vo-  
 caverit Aristotel. Habet quippe, ut ocula-  
 tus testis Rondel. scribit, veluti *brachia* sine  
 cubito, sine ulna, brevissima: Quod sequi-  
 tur, Carpo nostro respondens, ex multis  
 ossibus constat: Metacarpium verò, ex  
 quinque ossibus quæ pelle tantum tegun-  
 tur: inde tanquam manus indivisa, præ-

terquam in extremo, in quo quatuor linca-  
 rum distinctiones, tantum spectantur; un-  
 guës autem quinque distincti. Quia pinna-  
 rum vicem agunt, ideò Homerus φαλκίνας  
 cognominavit. *Corio* tegitur duro, so-  
 lido, pilis nigricantibus & cinereis, quæ-  
 dam maculas parvas albicantes in ventre ha-  
 bent. Plinius *Cartilagine*s non ossa habere  
 scribit, sed Aristoteles carne abundare mol-  
 lemque esse, & cartilaginibus ossibus con-  
 stare, author est. *Caput* est breve, & pro  
 corporis magnitudine parvum. *Collum* lon-  
 gius, quod pro arbitrio extendit & con-  
 trahit. Inferior *maxilla* Lupinæ similis est,  
 superior quam in lupo latior, hacque & na-  
 ribus vitulis terrestribus affinis est. Oris  
 scissura mediocris. *Superciliorum* locum &  
 superius labrum pili duri alias nigri, aliàs  
 albi tegunt. *Dentes* sunt ferrati & lupino-  
 rum similes. *Oculi* splendent & subinde in  
 mille colores ut hyænæ transeunt. *Lingua*  
 est scissa, id est bisulca. Plinius duplicem  
 facit, Rondeletius latam esse addit. *Auri-  
 bus* caret, quod vitam in humore traducat,  
 partes verò aurium meatibus additæ, ut mo-  
 tus aëris à longè delatus servaretur: sed lo-  
 co eorum meatus angustissimos & exiguos  
 habet, qui in viventibus sunt evidentes, in  
 mortuis difficillimè inveniuntur. Lato est  
*pectore*. Omoplatas enim habet quaternis  
 musculis connexas, superiore vel posteriore  
 in parte quam canes terrestriaque alia ani-  
 mantia, quæ in lateribus eas habent. *Fel* in  
 hepate habere negat Aristoteles, omninò  
 habere, Bellonius. *Plinius* tribuit, sed par-  
 tem non exprimit. *Renes* ei sunt firmissimi  
 & solidissimi, cum reliquor. omnium mag-  
 is minusve cavi. *Genitale*, maribus oblon-  
 gum, fœminis ad terrestria accedens. Aristot.

*Vescuntur* piscium carnibus, & in vivaria  
 immissi, furibundi in eos sæviunt; apud  
 Troglodytas extra sinum Arabicum piscium  
 capturæ non minus ac homines intenti. In  
 retia delapsi, dilacerant eadem, & piscibus  
 una captis effugiendi ansam præbent. Lepo-  
 rum & aliorum retro mingentium ritu  
*mingunt* & *coeunt*, nempe averſi, inque me-  
 dio coitu cohærent. *Pariunt* in terra pecu-  
 dum more, nunquam geminis plures, scri-  
 bit Plinius. Secundinas emittere scripsit  
 Aristoteles. Prolem circa duodecimum à  
 partu diem in mare deducunt, quod Cal-  
 purnius inter impossibilia recensuit. Ma-  
 xima ex parte per littora vagantur, & vi-  
 cinos agros, vineta & pomaria deperdunt.  
 Si quando colliculum ascenderint, indeque  
 secedere coguntur, pedibus ac capite in ven-  
 trem contractis, ac toto corpore in globum  
 contracto, maximo impetu in mare devol-  
 vuntur.



Plin. Iu-  
venal. Sa-  
tyr. 3.

vuntur. Non procul tamen à littore recedunt, quod ipsis difficilis pedum in terra usus sit. Difficiliter *interficiuntur*, nisi capite eliso, quòd corpus totum carnosum sit. Extra aquam ad solem in arena littoris vel super saxa, *dormiunt*, ut liberius respirent. Nullum animal graviore somno premi auctor est Plinius. Non aliquoties, cum Andream poli in Scotia studiis operam daremus, tam prope ad stertentes accessimus, ut lapidibus infestari potuerint. Postquam se in aquas coniecissent, elato ex undis capite nos intuebantur. Inter dormiendum tam altè stertunt, ut mugitum edere videantur, quod Aristoteles quoque & Plinius meminere. In causa pituitosus humor, qui in aspera arteria, inspirando & expirando exagitur. Sed & in aquis fortè dormiunt. Nam & ranæ, quarum more sub aquis diu urinantur, longissimo anni tempore, sub aqua latere possunt, ne quicquam de *pulmone* dicam, qui exiguus, spumofus, nec sanguineus. *Ingenium* si spectes. Sæpissimè mitescit, & naturam ferinam deponit, & quod mireris, accipit disciplinam, voceque pariter & visu populum in spectaculis exhibitus salutat, & incondito fremitu, nomine vocata, respondet, sed & in hominem amore fertur, hac in parte nihil à Delphini natura abhorrens. Visus aliquando vitulus marinus, qui ad principis Christiani nomen gaudio perfundi videbatur, obmutescere ad Turcæ. Is etiam cujus Rondeletius iconem dedit, in Lerini insulæ Cœnobio, nullo metu cum hominibus per multos dies versabatur, adeò ut & gradus ascenderet. Damnis apud Philostratum, Phocam à piscatoribus captum, filium quem in cavea pepererat, ita deplorare mortuum vidit, ut per triduum à cibis abstineret. Tzetzes verò testatur, cum suis catulis mori, istos cum suis matribus, parentesque senio confectos, in natando juvare. Summa ipsis cum mari *Sympathia*. Pili enim excoriati si mare turbatum in fluctus surrexit, similiter eriguntur; si desedit, in planum sternuntur. Quod cum non crederetur, factò in Indico mari circa Hispaniolam insulam periculo, non amplius fabulosum haberi Cardanus asserit. Plinius sensum æquorum retinere, semperque æstu maris recedente inhorrescere scripsit: Rondeletius verò mutationis aëris significare, austrinis ventis surrigi, bore alibus ita desiderare, ut nullos planè affirmes, sæpius observavit. Fulmina & grandines corium prohibere Plutarcho & palladio proditum. Ideò & summas velorum partes eo obtegi, & Augustum Cæsarem pellem vituli marini perpetuo circumferre consuevisse, & Severum Imperatorem eadem tectum voluisse legitur. Grandini verò obviare Palladius credit, si per possessionis terminos circumferatur, & in villæ aut cortis ingressu suspendatur,

Philostr.  
l. 2. de  
vita A-  
pollonii.

Plutarch.  
Sueton.  
in Augu-  
sto.

Pallad.  
R. R.

cum malum videris imminere. Urso me- tuere Oppiano debemus, congressos aliquando cum iisdem in spectaculis. Lycostæ rustico apud Calphurnium; fugere & arietes marinos, & forti anhelitu è cavernis extrahi, Æliano. Negligitur etiam ab infima plebe in *Cibis*. Caro enim ipsius mollis est, spongiosa, & pinguis, adeò ut liquetur si diutius manibus contrectetur. In *Medicina*, dextra pinna capiti subdita somnum adfert, quòd nullum animal graviore somno prematur. *Pellis* à podagra præservat, si ex ea calceos gestaveris. Adeps in muliebribus morbis vehementer ab Hippocrate laudatur. *Coagulum* quod evomere dicunt, ne in hominum manus incidat, cum panace, vel succo punici, Comitiales morbos sanat. Celius Aurelianus tamèn id reprehendit.

Ælian.

Plin.

Plin.  
Theop.  
H. l. 9 c.  
12.

## ARTICULUS VII.

## De Manati Indorum.

**H**UJUS piscis nemo veterum meminit, nisi fortè Bos sit Aristotelis, quem in Historiis inter Cetacea reponit. Belgæ vaccam marinam vocant. Nec in congruè iste dicitur, cum quod capite terrestrem bovem referat; tum quòd ejusdem more herbis in terra pascatur. Utri est similis, ideò fœdissimus aspectu. *Caput* habet bovis instar, *Oculos* exiguos, *Pedes* circa caput binos, crassos tanquam alas brachiorum loco, quibus natat. *Aurium* loco duo foramina exigua quibus audit. *Lapides* seu ossa in cerebro bina parvæ pilæ palmariæ magnitudine, orbicularia. Circa *caudam* strictior est & quasi præcinctus, quæ etiam ab inde ad extremum tota conspicitur nervosa. Fœminæ duo sunt ubera in pectore, quibus catulos lactat. *Corium*, quo integitur est simile ustulati porci corio, digitum densum, cineraceo colore, rarisque pilis præditum. Adeò magnus est, ut jugo boum opus sit ad unum vehendum. Nonnunquam quatuordecim aut quindecim pedum longitudinem superat, octo verò palmarum crassitudinem. Circa insulam Hispaniolam in mari capitur. Subit tamen & flumina, & secundum ripas eorum herbas depascitur. *Mansuescit* aliquando. Aluit quendam per viginti sex annos in lacu Guaynabo Caramatexi Regulus, tam mansuetum, licet jam grandem, ut nomine Matonis in-clamatus, è lacu egrederetur, & ad ædes cibi sumendi gratia perreptaret, iterumque in lacum remearet, pueris atque viris, quorum cantu delectari videbatur comitantibus. Idem denos simul pueros tergo exceptos ex una lacus parte oppositam transvehbat. Cum quidam ex Hispanis hastam in eum vibrasset, etsi non læsus, nunquam tamen imposter. emergere voluit, si viros vaste indutos, & barbatos conspexisset. Intumesciente fluvio Hayboaico, & in lacum illum se effundente, in mare regressus est. *Usus* & in *Cibis* & in *Medicina* præstat. Caro enim ejus resiccata, Anglicæ bubulæ similis est, & diutissimè incorrupta manet; cocta Thynni carne est præstantior. Cauda in partes concisa, & soli per quinque dies exposita, tandem in patella cocta, multa pinguedo elicitur, quæ, quia rancorem non contrahit, ad ova in sartagine frigendo adhibetur. *Ossa* in capite colicæ passioni & doloribus nephriticis valde adversantur, si primò adusta, contrita & per cribrum transmissa, in vino drachmæ unius vel alterius pondere, assumpta fuerint. Ex Corio cingula etiam & calceorum soleæ fiunt.


Tab.  
XLIII.  
Arist. H.  
A. l. 6.  
c. 11.  
Lopez.  
Hist. Ge-  
ner. c. 13.  
Clus.  
Exot. l. 6.  
c. 19.



## ADDITAMENTUM

D E

## CANE ARISTOTELIS

Nie-  
remb. H.  
N. l. II.  
c. 20.

**P**ISCIS qui hodie Tubero dicitur, Canis Carcharias esse vulgò creditur. At quia ille quem Franciscus Hernandus describit, exactè descriptioni, quam attulimus, non respondet; ideò placet & hanc apponere. Cetaceus inquit piscis est, ex genere oblongorum, Oceani incola, quindecim interdum dodrantes longus, vorassimus, cursu volens, nec omnino stupidus, & bina humana corpora sæpe numero crassus; ore quòd rostro unciarum decem intervallo subjacet, lunato, vallatoque supernè trino dentium præacutorum, ac sese mutuo ferræ modò subintrantium, ac quaterno infernè binum dodrantum rictu, & brachiis utrimque quinis: rostro ranæ obrotundo, pinnis singulis utrimque juxta branchias, totidem juxta pudenda, juxta caudam unicâ alterâ omnium maxima imminente dorso statim à branchiis, alteraque juxta caudam modicâ, à contrario alterius parvæ, sed in oppositam partem vergente caudâ magnâ, crassâ, falcataque, & superna parte triplo aut quadruplo longiore atque latiore, & juxta exortum quibusdam parvis cavitatibus insigni: oculis modicis longo inter sese distantibus intervallo: pupillâ magnâ, & sublutea iride, corio verò ceterorum cartilagineorum, cum sese tendit, nullis ictibus penetrabili: dorso ac lateribus cæruleis exsaturatis, ac ventre candenti. Mirum est, bina pendere mari, ossæ pudenda, cava alba, dodrantem longa, & ternis singula, glandis loco, longiusculis noxia acuminibus, quibus novaculæ modo faciliè quidvis obvium abscindit. Maleficum animal est, atrox, ac hominum devorator, adeò vivax, ut in perquam tenues etiam divisum apalectos, affixumque veru, ac vitam adhuc videatur mordicus retinere. Medio cre præstat, & quale alii congeneris pisces, dum parvum est alimentum, sed provectius, durum, ingratum, insalubre, & fluxum alvi ciens. Unicum est illi intestinum, satis amplum; unde tam improba contigit voracitas. Cor parvum subalbidum, laxum, & usque adeò vivax, ut educit, & in varias partes sectum, diutius conspiciatur moveri, ventriculisque distinctum. Stomachus vastus est, hepar candens, in duas partium tænias, quatuor dodrantes longas, ac decem uncias latas. Splen vero jecinoris longitudine, sed duas tantum uncias longus.

Nie-  
remb. H.  
N. l. II.  
c. 19.

Caterum solent circa tuberones pisciculi quidam natare *Romeri* dicti, de quibus ita

Hernandus: Piscis est spinosus, Oceani Septemtrionalis alumnus, dodrantem plus minus longus, tres uncias crassus, corio tectus molli & pæneteres. Lunatâ constat caudâ, & rostro resimo atque compresso, oculis magnis, si magnitudini corporis comparentur, pupillâ nigrâ ac luteâ iride. Senis natat pinnis, quarum altera medio pænè dorso in caudam usque procedit, sensim sese attenuans, & à quibusdam præacutis spinulis sumens exordium: altera à pudendo pænè ipso in caudam ferè descendit, utrimque à brachiis singulæ, binæque paulo ante initium ventris.

Color universi ex albo in cæruleum tendit, quamquam dorsum caputque cyaneo exsaturato videantur nitere, universumque corpus senis pavonini coloris transversè in discurrentibus orbibus ambiatur. Extrema corporis caudam contingentis quadrata sunt, & quaternis veluti dorsis distincta quarum bina quæ in latera excurrunt, desinunt in acumen. Caudæ initium pavonino exsaturato splendore. Micant mediæ utrimque partes, dilutiores sunt sequentes exsaturatæ, ac demum postremæ candentes.

*De Glauco Æliani.*

**A**D Glaucum Æliani videtur referri debere, & hic quem Clusius exenteratum & resiccatum ita describit: Erat, inquit, corpore longo, trium ferè pedum longitudinem explete coloris (resiccatum enim & exenteratum dumtaxat conspiciebam) ex cineraceo fusci, in quo tamen quidam candor, præsertim in tergore, adhuc eluceret: vivum enim & recenter captum argentei pænè coloris ambitus pedis, hoc est, duodecim unciarum longitudinem æquabat.

Nie-  
remb. H.  
N. l. II.  
c. 21.

Cartilagineus vero erat, & lævi cute præditus; rostro lato, sed in obtusum deinde acumen desinente. Oculi magni erant, è quorum infima parte enata erat membrana, quæ sursum sese attollens, velut nubes caliginem illis offunderet.

Oris rictus non valde latus, in supina capitis parte maxillas in obtusum angulum desinentes habebat, ferè ut simiæ: quaternis autem dentibus os præditum erat, binis in superiore maxilla, totidem in inferiore: iisque firmis, quorum singuli quibusdam fulcis erant distincti, ut pluribus dentibus armatum os esse videretur. Corpus à cervice sensim gracilescebat: spina sive aculeo in eâ parte, quâ dorsum cervici connectebatur, sito, eoque sex uncias longo, infimâ parte lato & cavo supernâ autem valdè acuto. Pinna surrecta innitebatur quatuor pænè uncias longa. Binas dumtaxat in lateribus branchias valdè aper-



apertas observabam, utrumque videlicet unam, cum aliorum galeorum genera denas habeant, in singulis lateribus quinas.

Has sequebantur duæ pinnae ad natandum idoneæ, longiores quam in ullo galeorum genere conspexerim, novem videlicet unciarum longitudinem æquantes. Binas alas habebat ex utraque podicis parte, quatuor uncias longas, illasque bifidas, hominumne industria sic fissas, an à natura nihil pronunciare possum.

Alia deinde pinna in dorso paullò infra eam, quæ ad aculeum erat, exoriebatur, ad extremam ferè caudam usque inæqualiter porrecta, hoc est, ad eam usque caudæ partem, quæ tenuissima, & septem uncias longa, muris caudam quodammodò æmulabatur. Podici, qui in supina parte, ut in reliquis piscibus, situs, vicina apparebant bina foramina, in quem usum, ignoro.

Capitis porro cutis siccitate adeò erat contracta, ut nulla circa oculos: nulla ante eos, foramina observare potuerim.

*De Pisce Gibbo.*

**H**Uic similis est *Acacana*, qui est dodrantalis piscis, insignis prolixitate inferioris labri, & eminentiâ gibbâ, quæ à capitis exordio usque ad os, quod per exiguum est, arcuato descendit flexu.

Dorsum lateraque cyanea sunt, venter ac laterum pars alba, ac præter duas pinnas quæ circa branchias sunt utrimque, unicam angustam & longam, & aliam parvam, duæ aliæ visuntur breves, altera à medio ventre, altera vero à dorso in caudam usque procedens.

Squamosus non est, & tamen bono constat alimento. Mare illum ad me misit Australe; etsi quidam referant, in Septentrionali quoque reperiri.

*De Ostracione Gesneri.*

**O**STRACIONI affinis est *Catan* qui piscis est quindecim pedes, cum in perfectam magnitudinem adolevit longus, cortice rectus durissimò, laminis rhomboidis figuræ, paucisque contexto, testaceæ panè duritiei, nitidis, ac circa alia elatis, qui vicem lorice præstare posset. Rostrum est prælongum & acutum, ferrati dentes, & quaternò ordine dispositi, ac pinnae crassissimæ binæ juxta branchias, ac juxta caudam unica. Vivit in lacubus aut magnis fluminibus provinciae Panucensis. Salubri constat nutrimento: sed cum parandus est, hic piscis, spoliatur corio. Vivit ex aliorum piscium canumve raptu, homines quoque interdum aggreditur.

Editur vero assus, non coctus aut elixus.

A D L I B R U M V.

*De Phoca.*

**P**HOCARUM generis est Wallrus seu Mors, animal amphibium, quod Vorstius apud

Deleatium ita describit: Belluam hanc marinam vidi, magnitudine vituli, aut canis Britannici majoris. Phocæ non dissimilem: capite rotundo, oculis bovillis, naribus depressis ac patulis, quos modo contrahebat, modo diducebat, aurium loco utrimque foramina; rictu oris rotundo nec ita vasto, superiore parte aut labro mystaca gestabat setis cartilagineis, crassis ac rigidis constantem. Inferior maxilla trigona erat, lingua crassa brevisque, atque os interius dentibus planis utrimque munitum, pedibus anterioribus posterioribusque latis, atque extrema corporis parte Phocam nostratam planè referebat.

Pedes anteriores antrorsum, posteriores retrorsum spectabant cum ingrederetur.

Digiti quinque membrana intersepiente distincti, eaque crassa. Posterioribus Digitis ungues impositi, non prioribus caudâ planè carebat. Postica parte repebat magis quam incedebat.

Cute crassa, coreacea, pilisque brevibus ac tenuibus obsita vestiebatur, colore cinereo. Grunnitum apri instar edebat, seu crocitetabatur voce gravi & valida. Repebat per aream extra aquam, quotidie per semihoram aut amplius dolio aqua pleno immittebant, ut se ibi oblectaret. Catulus erat, ut ferebant qui attulerant ex nova Zembla, decem hebdomadarum, dentes seu cornua exerta, ut adultiores, nondum habens, tubercula tamen in superiori labro præcipiebantur, unde brevi proditura facile apparebat. Ferum & validum animal calebat ad tactum, valideque per nares spirabat.

Pulmentarium ex avena, miliove comedeat lentè & suctu magis quam deglutendo, herumque gestantem cibum ac offerentem magno nisi ac grunnitu accedebat, sequebaturque, nidore ejus allectus. Lardum ejus gustantibus haud insuave visum est.

Conspiciebantur ibidem duo majorum capita, dentibus duobus exertis Elephantorum instar, longis ac crassis & albicantibus munita, qui deorsum versus pectus spectabant. Eorum coria cccc. aut Io. pondopendisse ferebant Angli qui attulerant.

Hiscè dentibus rupes ascendere seque sustinere ajebant. Et prodeunt in continentem seu terram ut somnum ibi capiant gregatim.

Pabulum ajebant illis esse folia oblonga ac magna, herbæ cujusdam è fundo maris nascentis. Nec piscibus vivere, aut carnivorum esse. Vidi ibidem penem ejusdem animalis osseum, rotundum, cubitum & amplius longum, crassum, ponderosum ac solidum, in fine prope glandem longe crassiore ac rotundiorem. Hujus pulvere ad calculum pellendum Moscovitæ utuntur.



## Appendix Nova

D E

UNICORNU  
MARINO.

Nicolaus  
Tulpius  
observ.  
Medic.  
cap. lviii.



Quantumvis acriter disceptetur, utrum etiamnum alicubi extet unicornem illud animal, cui Sacrae Literae, praeter indomitam ferociam, pretiosum attribuunt cornu; extra tamen omnem controversiam aleam est, pleraque omnia quae a magnatibus asservantur cornua, adeo non esse ferarum aliqujus terrestres, quin potius prodire ex bellua marina, cujus cornu passim reperire est, cum in mari Boreali, tum etiam in Islandia, Gronlandia, aliarumque vicinarum insularum littoribus; sive sejugatum, a corpore, sive cranii particulis etiam nunc insidens. cujusmodi certe cornua nobis oblata fuere quam plurima, vel ex direptis Principum Germaniae gazis, vel a nautis ceu opima maris spolia Amstelredamum delata.

Inter quae unum ceteris longe praestabat, colore, ac forma oculis gratum, capitique tam accurate adhuc infixum: ut, ad rei memoriam, id ari lubens incidissem, nisi haud diu post, oblatum fuisset integrum monstrum, a chirurgo marino depictum, cujus caput cum unicornu ipsi inhaerente, coram conspeximus. cujus speciem propterea malui spectatorum oculis repraesentare, sed ea fide, qua illam in tabella delineavit, Chirurgus, id temporis, navi huic a Medicinis.

Erat autem hic piscis, (cujus cadaver anno cIdo cXlviii. iv. nonas Iunias, inventum fuit in Mari aquilonari, prope Insulam Majam) admodum obesus, longus pedes duo de viginti, latus duodecim, capite cyprino, sive carpioni simili. Os latitabat infra cornu, quod protuberabat ex ossibus maxillae superioribus, inter se dehiscens, ibidem propemodum loci, ubi Pristis dentatam emittit ferram. non quidem exacte in maxillae medio, sed loco aliquatenus dextrorsum vergente. licet laevorsum in neutro, quod conspexi, cranio ullum alterius cornu occurrerit vestigium. Corium autem erat fuscum, & sub illo plurimum lardi, e quo copiosum quidem igne mercatores elicuere, oleum, attamen praeter odoris foeditate parum ipsis lucrosus. Spina dorsi ut ex validis constabat vertebrae, sic desinebat in caudam bifidam, adhaerente utrique lateri pinnam satis validam. Cornu vero erat rectum, durum, ac album, striisque profundis, a latiore basi, usque ad acutum mucronem, tam aequabiliter ornatum: ut jurasses te videre nitidum, ac niveum ebur, exquisitissima arte expolitum. Longitudinis erat novem pedum, septem cum dimidio extra cranium protuberantibus, sesquipede vero eidem etiamnum insidente, cujus exemptae superficies etiam reliquo corpore fuit asperior, minusque splendicans.

Sed quid dicam de Cajo Plinio l. xi. cap. xxxviii. asserente, vera cornua solis quadrupedibus dari? at non vidisti forte Plini vel summam hujus unicornu elegantiam, nitoremque, vel solidos illos Rosmari,

sive elephantis Marini, (quem nostrates walruffer vocant) dentes; qui ut pretio non cedunt elephantinis, sic neque marinum hoc cornu, ullis terrestrium animalium cornibus, quibus etiam virtute nequaquam inferius est. sive in expellendis variolis ac morbillis, sive in domandis febribus malignis. Quae alexipharmaca vis, cum pulcherrima ipsius venustate, conjuncta permovit forte Reges, ac Principes cornu hoc care emere, neque minoris aestimare, quam gemmas, ac lapides pretiosos quorum admirabile atque excelens artificium adeo non hominibus quin etiam ipsi Deo dignum videtur qui ametur, atque in honore habeatur.

At negat Casparus Bartholinus Vir limati iudicii Arctoo huic unicornu inesse vim singularem adversus venena, quam tamen nos non semel in ipso evidenter animadvertimus. sed imposuit forte viro incluto, quod in canibus fecit periculum, sive per arsenicum, sive Mercurium sublimatum, quibus duobus potissimum in ejusmodi tentamentis utimur. quae sicca, atque adurentia venena ut maxime temperat lene aliquod oleum, sic adeo non refranat nedum coercet, quin potius exasperat siccus non modo hujus unicornu, verum etiam quorumcunque cornuum pulvis.

Sed dicat quis? anne igitur nigrum veri monocerotis cornu, a Plinio, Aeliano, Solino, aliisque prioris aetatis, memoriae proditum, venenis tam expressis adversatur, uti constans fama est, ac passim in ore omni populo? vis me veritati litare? nullus est praeis auctoritate sua id adstruit, nedum cuiquam illius aevi, ejus unquam in mentem venit. quin potius quicquid illius alexipharmacae virtutis est, id passim acceptum ferunt, non tam monocerotis cornu, (de cujus virtute altum ipsis silentium) quam asini sylvestris. cujus encomium perperam intellectum, procul dubio ansam dedit spisso illi errori, in quem quidam adeo non delapsi, verum plane immersi nescio quam gloriose praedicarunt antiquorum hoc cornu seu praesentissimum ad venena remedium. in quo futili commento equidem profecto non possum ulterius connivere, sed disputet mundo tamdiu verba data. in remedio, a nostri seculi hominibus, cogitatione potius, quam usu, aut eventis deprehensio. uti videre est apud Hieronymum Mercurialem, Ambrosium Pareum aliosque artis nostrae Coryphaeos.

Quo veriloquio antequam tamen orationi huic finem imposuerim, operae fuerit aequa animorum balance explorare impetum illum, quo Olaus Magnus lib. xxi. cap. x. affirmat ferox, ac fidens hoc monstrum, in Boreali mari efferri in naves obvias. quo illas cornu suo, (quod tamen male in fronte collocat) perfodat. quam eandem vim etiam Xiphiae pisci, sive Gladio Plinii, legimus attributam. ab Ovidio, Oppiano, Paulo Iovio, aut nautis nostratibus, a quibus fragmenta cornuum inventa fuere in navium carinis, rubente undique mari a profuso belluarum sanguine. unde illud Poetae:

Ac durus Xiphias, ictu non mitior ensis.

— à remige laesi

Cum sint perforesi sua membra tricuspede telo

Sapè repellentes, hostem mucrone carinam

Irati penetrant.


Cujus Xiphiae speciem memini me vidisse captum, ad quatuor millia passuum ab insula Texalia, circa initium belli intestini Britannici, quasi praesagium illius καταστροφής, quae Regem, cum regno pessundedit universo. exprimente hujus piscis ense, ad amussim, illam gladii speciem quam nostrates ceu pedorm, indignant.



*Ajellus*



*Callarias Ajellus minor*




*Ajellus alter sive Merluctus*




*Musfela*




*Tinca marina*




*Hippurus*



*Harengus*




*Liparis*




*Aper*




*Scolopax*



*Glancus*



*Monoceros*












*Asellus*




*Asellus minor*



*Asellus mollis*




*Asellus alius*




*Reuersus Indicus Anguilli*


*formis*




*Molva*




*Rutilus*




*Coruulus*



*Salpa*



*Coruulus*










*Reversus*

*Indicus squamosus*



*Thunnus*



*Pelamys Cærulea*




*Cocynus*



*Pompiros*




*Amia*

































*Tania*

*Tania altera*



*Tania Bellonij*




*Tania falcata Imperati*



*Canis Carcharias*

*Canis Carchariae species alia*




*Canis Carcharias alius*


















*Catulus major* 1




*Catulus* 2

*Canicula Aristot*



*Canis*

*Marinus* 3



*Canicula* 4

*Galeus canis*




*Mustelus Spinax*

5



*Mustelus*

*Larus* 6



*Galeus*

7



*Galeus Asterias seu stellatus*

8



9

*Galeus Stellaris*

*Galeus Glancus Venetanus Gesn*










*Mola*

2



*Mola Peregrina*

1



4

*Torpedo maculosa*



3

*Torpedo*



6

*Torpedo*



5

*Torpedo*




8

*Aquila*



*Pastinaca*



9

*Aquila species alia*









*Raia*



*Raia*



*Gesneri*



*Raia Oculata  
alia*



*Raia  
Oculata  
et leuis*

*Raia leuis*



*Spiegel Roche*



*Raia Aferia  
Apera*

*Raia asperima*



*Raia Oxyrhin-  
chos minor*




*Raia Oxyrhynch-  
chos. major*









*Aldrouandi.*








*Monstruosi Piscis Volantis*




icon

*Raia exsecata, et concinnata ad formam Draconis Volantis.*




*Ova Raiarum*



*Raia Lævis*



*Raia Olaj.*



*Oxyrinchus*

*minor. alius*



*Rana piscatrix minor.*



*Squatina*









*Piscis*

*Gibbosus*




*Lumpus Anglorum*

1




*Scarus omas*

3



*Scarus Varius*

4




*Turdus*

6



*Turdus*

5



*Turdus*

8



*Turdus*

7




*Turdus*

9




*Turdus*

10




*Turdus*

11



*Paus*

12



*Attagenus Lepras*

13



*Attagenus alius*

14










*Merula*




*Marzapanus*




*Fuca Phycis*



*Iulis*




*Perca*



*Marina*


*Perca Marina*




*Perca Marina*




*Perca*




*Perca*




*Hiatula*



*Canadella*



*Hepatus leber*



*Hepatus*




*Melanderinus*



*Melanurus*











*Cinædus Alphestes*



*Alphestes Cinædus*



*Cinædus alius*



*Coracinus*




*Coracinus minor*




*Coracinus niger*



*Adonis Exocætus Bellony alaudis adnumerandus*




*Ammocætus . Exocætus  
Ammodites*




*Umbra*




*Glaucus*




*Acus*



*Gobius maior Gefn.  
Paganellus*



*Acus . alia Species*




*Gobius minor*




*Acus minor*



*Acus . maior*



*Acus alia*











*Anthias Rond.*  
*Afellis conformis.*

2




*Anthias Rondeleti*

1



*Anthias prior.*

3



*Anthias prior.*

5




4



*Anthias secundus.*

*Anthias quartus*

6



*Anthias Congener*












7



















*Sphyræna siue Suda*




*Alanda non cristata*




*Piscis gutturosus*



*Mullus unerbis*




*Hirundo Plinii*




*Erythrinus*



*Acanuan*



*Orphus*




*Synodus*


*Dentex*




*Synagris*



*Sparus*



*Scorpius minor Scorpæna*











*Aurata*



*Alia aurata Species*




*Iulia Salu*




*Doncella*


*Mormyrus*



*Cantharus*



*Salpa*



*Scorpius Major*



*Scorpius*


*Minor*



*Blennius*



*Stromaieus*




*Fratola*



*Aphua Cobites*

*Cepola*

*Blennius Bellon*



*Aphya Phalarica*



*Apua marina*



*Harengus*


*Minor*




*Hiphetus*



*Engrasicholus*



*Atherina*



*Apua Vera*










*Sarda*

1



*Sarda Flandrica major*

2



*Sarda Flandrica minor*

3



*Sarda marina*

4



*Smaris Acer*

5



6

*Smaris alia*



*Smaris*


7

*Peregrina*



*Boops*

8



*Boops peregrina*

9




*Solea Pecten salu*

10



*Solea Oculata*

11



*Solea Lingulata*

12




*Citharus*

14



*Rhomboides*

16




*Citharus flauus*

15



*Solea alia*

13













Sanditz Anglorum.

Draco marinus maior




Draco minor.  
Araneus Rondel.



Araneus minor.

Dracunculus ara:  
nei Species




Araneus



Vronosopus




Dracunculus.




Tranchurus. Scombri Species



Scomber.



Scomber




Iacertus peregrinus uel Rubei maris.



Scombrus alius.



Saurus






*[Faint, illegible handwriting covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]*



*Milvus alius.*



*Corax seu Corinus*




*Milvus*




*Milvus alatus.*




*Milvus*



*Boops*




*Passer alias.*



*Passer*



*Rombus*




*Passer.*




*Rombus alius.*



*Rhombus Lævis uetus.*



*Rombus aculeatus.*










*Salmo*

1



*Salmo alius*

2




4

*Mugil .*

*Lupus . .*



3



*Mugilis*

5

*Species alia*



*Capito Anadromus*

6



*Caper Caperis*

7



*Acipenser*

*Zeelandicus*


11



*Acipenser Sturio*

1


8



*Acipenser seu Sturio*

9

2




*Acipenser seu*

10

*Sturio*

3










*Galens Rhodius*




*Cataphractus Gabler*




*Eperlanus*



*Lyræ*



*Lampreta seu  
Lampetra*



*Lampreta alia*




*Anguilla*




*Anguilla alia*




*Orbis eckhinatus*



*Orbis Species*




*Species alia Orbis*




*Orbis Stellatus*

*Orbis Annumerandus*




*Orbis Annumerandus Piscis*



*Orbis Britannicus*











*Huso seu Antacæus stellaris*




*Alius Huso.*





*Antacæus*

*Rond.*





*Ostracion prior Aldron*

*Orbis Scutatus Rondel*



*Holostæon Bell. Ostracion Nilj*

*Ostracion Americæ*









*Trutta Rot*

2

*Trutta Varia*

1





3

*Thymallus*

5

*Umbra*



*Thymallus*



4

*Barba*

6

*Capita*


7



*Capito fluvii atilis*

8

*rapax*



*Orfus*

*Rutilus*


9

*Leuciscus*

10


*Leuciscus*

11



*Leuciscus*

12



*Coruus Niloticus*

14

*Oxyrinchus Sphyræna*

13




*Nasus*

15

*Gobio fluminalis*

16



*Gobio*

17



*Pisciculus*

20

*Cobitos*





*Cobitus Barbatx*

22

*Bartgrundel*

*Asper Danubianus*

19



*Cobitos*

*aculeatus*

23

*Gobitus*

21











1 Pecten




Araneus minor



Alofa



Alofa seu Clupea




Phoxinus Squamosus Maior




Blicca Ballerus



Phoxinus Sqam. minor




Glanis




Barbota




Cyprinus monstrosus



Cyprinus



Cyprinus Alius









*Phoxing Læuis*

3




*Phoxinus*

2



*Phoxinus*

1



*Atrillius . Padi*

4



*Antacæus Stellatus*

5



*Mustela*

6



*Mustela fluviatilis*


8



*Mustela foßilis*

*Mustela . alia*

9




*Lambreta*

10




*Lambreta*

11



*Perca .*

*mayor dicta*




*Salmerinus*



*Perca*



*Schrollus*




*Pungitius*







*Epelanus*













ad tab. 22.










2 *Umbla min.*




*Umbla major*




*Trutta Lacustris, Trutta Salmonata.*



*Lavaretus Albula*




*Albula Lacustris*



*Albula Cærulea*

*Lacustris*



*Alb. minima.*




*Carpio Benaci.*

13



*Albula Parva.*




*Alburnus Albus Sabiani.*



*Schillus.*

15




*Clavatus cyprinus*




*S. Qualus*

10




*Farra. Alius. generis.*

12




*Farra albula lacustris species*


11



*Chalcis altera Rondelety*



*Agonus*











*Porcus Supinus Saluiani*



*Gobius Bottatrix*




*Alburnus Salu*



*Mesora uel Blennius Salu*




*Thymus Salu*




*Cyprinus Salu*



*Salar Varius*




*Obis*




*Rubellius Salu*



*Barbus Salu*



*Salmo Salu*











Parn 2


1 Taiasica



3 Guaperua




4 Pudiano Vermelli




5 Pudiano Viridis




6 Turuuapcha itaiara




7 Guatoupa iuba




8 Iaguaraca



9 Tamoata




10 Carauua



11 Acara Pinima



12 Ticapixanga

















Guabi Coara.

1




Piraia et Piranha.

3




Guaperua.

2



Amore Guacu.

4



Guacari.

5



Piraumbu.

6




Acaracia.

7



Acara.

8




Guaruguaru.

9




Cuguru. Guapu.

10



Maturaque.

11




Piaba.

13



Carapo.


12



















*Piratia Pua.*




*Aramaca.*




*Guamaiaacu apu.*




*Petimbubaba.*




*Nhamdia.*



*Guaperua.*




*Curuata Pimma.*



*Pirague.*



*Piscis innominatus.*



*Mugil*








*Abacatuia.*

2




*Mucu.*

1




*Acaramucu.*

3



*Punaru.*

4




*Punaru.*

5




*Timucu.*

6



*Gubucu.*

7



*Niquy*


8































*Anchra pomorphos*




*Pirametara*

*Pracama Brasil*

*Petim Buaba*





*Sallema sen Salema*




*Camari Puguacu*

*Leo Marinus* 8



*Frater*

*Augo*




*Galerita*

10




*Sijnagris*

11







Small fish



Small fish



Small fish




Small fish






*Balæna*




*Balæna*



*Balæna*

*Monstrosa*



*Balæna*



*Phocæna*










*Balæna magna 60. perticas longa. 41. alta.*











Utilis Piscis ferram ad instar  
Piscis habens



Delphinus prior



Delphinus Alter




Antiq

Metal




Delphinus

Femina



Antiq  
Metal

Delphinus alius











Caput Delphini



Gladius Piscis Xiphiæ




Scolopendra Cetacea



Vitulus



Phoca sine



Vitulus marin.

Bos Marinus



Bos Marinus

Vetus

Bos Marinus Luuencus










*Cete Admirabilis forma.*



*Galci genus.*



*Orbis spinosa.*




*Histrix piscis.*




*Orbis Rana rictu.*



*Piscis triangularis.*



*Scarus Cretens.*



*Orbis oblongus*


*testudinis Capite.*



*Sargus Aldrou.*











*Albula nobilis.*




*Albula.*




*Asellus Virescens.*



*Asellus Varius.*




*Cataphractus.*




*Iania Cornuta.*



*Idem supinus.*



*Mustola marina Vampara.*









*Aculeatus marinus Major*

Tab. XLVII



1

*Lupus Marinus*


*Schonfeldij*



2

*Lycostonius*

*Balticus*




3

*Scorpius Marinus*



4

*Midom Supimis*




5

*Spirinchus*



6

*Siluri vera affigios*




7



1812

1812







*Caput piscis cornuti.*



A



B

A



A









THEATRI UNIVERSALIS  
ANIMALIUM  
PARS SECUNDA.

S I V E

*HISTORIÆ NATURALIS*

D E

A V I B U S

L I B R I V I.

Cum Enumeratione Morborum, quibus Medicamina ex his Animalibus  
petuntur, ac Notitia Animalium, ex quibus vicissim Remedia præstan-  
tissima possunt capi,

C U R A

HENRICI RUYSCH,

*M. D. Amstelædamensis.*



AMSTELÆDAMI,

Prostat apud R. & G. WETSTENIOS,

---

Anno MDCC. XVIII.



THEATRI UNIVERSALIS

AMICUM

AD AMICUM

1773

WAVOZELZ WAKWALZ

1773

AVIVU

1773

Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis. Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis.


Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis. Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis.

Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis.

1773

AMICUM

Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis.



AMICUM


Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis. Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis.

Amicus, si tu amicum habes, amicum habebis.




ENUMERATIO MORBORUM,

Quibus petuntur Remedia ex AVIBUS.

	Asceffus	Pag. 7. b.	Fluxus alvi	45. b.	Podagra	35. b. 38. b. 61. b. 101. b.
	Albugines	33. a.	Genituram augmentia	42. a.	Purulentiae remedium	42. a.
	Alopecia	66. b.	Hectica febris	53. a.	Renum affectus	41. b.
	Alvum infantibus		Jecinoris dolores	7. b.	Sanguinem sistentia	93. b. 95. b.
	solventia,	93. b.	Illæo resistens	53. a.	Scabies	30. a.
Angina		33. b.	Iliaca passio	46. a.	Scirrhus	35. b.
Angina occulta		53. a.	Impetigines	38. b. 43. a.	Secundinae	96. b.
Anus		79. a.	Lateris dolores	85. b.	Somnum impedientia	35. b.
Asthma	30. a.	53. a.	Lentigines	74. b.		35
Articulorum dolor	14. a.	27. a.	Lumborum dolores	62. a.	Stomachus	53. a. 66. b.
Articulorum vitia		66. b.	Leuce	6. a.	Strumæ	7. b. 62. a.
Arthritidem præservantia		101. b.	Lues Venerea	45. b.	Suffocatio matricis	40. b. 42. b. 46. a.
Calculus	6. a.	692. a. 66. b.	Mammæ puerperio vexatæ	43. a.	Suffusiones oculorum	3. b. 33. a.
Caligines		33. a. 84. a.	Melancholica	53. a. 74. b. 121. b.	Temulentia medentia	33. b.
Capilli	43. a.	81. b. 84. a.	Mentem restituentia	119. b.	Tempora	85. b.
Capitis dolor	7. b.	24. b. 84. a.	Menstrua alba	59. b.	Tonillarum dolores	79. a.
Cervicis dolor		62. a.	Morbus Gallicus	119. b.	Trichiasus	35. b.
Chronici morbi		24. b.		bis 121. b.	Tussis puerorum	24. b.
Clavi pedum		53. a.	Morsus Venenati	95. b.	Tympanites	64. a. 66. b.
Colica	6. a.	53. a. 64. a. 95. b.	Nephriticorum remedia	42. a.	Varices	6. a.
Comitialis morbus	7. b.	46. a. 101. b.	Nubeculae	3. b.	Venena digerentia	95. b.
Concoctio	6. a.	7. b. 36. b. 92. a.	Oculi	61. b.	Venerem augmentia	48. b.
Condylomata		7. b.	Oculus læsus ictu	84. a. 93. b.	Venerem incitantia	14. a. 66. b.
Corporis dolores sedantia		119. b.	Oculorum hebetudo	27. a.	Ventriculi dolores	15. b.
Coxendicis dolores		62. a.	rubor	ibid & 38. b.	Vermes expellentia	85. b.
Dentium dolor		66. b. 79. a.	dolor	ibid	Vesica	93. b.
Dysenteria	64. a.	74. b.	Oculorum vitia.	48. b.	Vigiliam præstantia	90. a.
Dysuria		61. b.	Oculorum vulnera	64. a.	Virgam erigentia	66. b.
Elephantiacus morbus	45. b.	64. a.	Paralysis	61. b.	Virium restauratio	59. b.
Epilepsia	14. a.	24. b. 38. b. 42. a.	Parrotidas sanantia	33. b.	Virus	46. a. 79. a. 90. a.
		61. b. 66. b. 84. a. 124. b.	Partus	65. a.	Vomitum educantia	53. a.
Epileptici infantes		93. a.	Parturientes adjuvans	7. b.	Vulnera	121. b.
Facies		92. a.	Pestilentia	64. a.	Ulae dolores	79. a. 121. b.
Faciem purgantia		66. b.	Pestiferi morbi	61. b.		
Febris		53. a.	Pilos denigrantia	24. b.		
Febris Quartana	84. a.	96. b.	Pituitas	64. a.		
Fistula		59. b.	Pleuritidem sedantia	38. b. 95. b.		
Fœtus		62. a.	Pfilothra	33. b.		

NOTITIA AVIUM,

Ex quibus Remedia Præstantissima capiuntur.

	Nas	95. b.	Gallus Galinaceus	53. a.	Passer	66. b.
	Anser domesticus	93. a.	Haliætus	3. b.	Perdix	45. b.
	Attagen	42. a.	Hirundo	84. a.	Phasianus	40. b.
			Larus	93. a.	Pica	27. a.
Aura	121. b.		Luscinia	90. a.	Picus martius	79. a.
Bubo	30. a.		Mergus	96. b.	Struthocamelus	36. b.
Capo	59. b.		Merops	81. b.	Tominejum	124. b.
Ciconia	101. b.		Merula	74. b.	Turtur	65. a.
Columba	61. b.		Milvus	14. a.	Tutupa	119. b.
Cornix	25. b.		Noctua	33. b.	Vespertilio	35. b.
Corvus	24. b.		Offifraga	6. a.	Vultur	7. b.
Coturnix	48.	48. b.	Otis seu Tarda	43. a.	Ulula	30. a.
Cuculus		15. a.	Palumbes	64. a.		33. a.
Cygnus		92. a.	Pavo	38. b.	Upupa	85. b.
Gallina corylorum		42. a.				



# I N D E X.


## I N

### HISTORIAM NATURALEM

## D E

# A V I B U S,

*Juxta seriem Alphabeti concinnatus, in quo numerus prior  
Historiae paginam, posterior tabulam designat.*

	P.	T.		P.	T.
 Cachoatli	127.	183.	Domesticus	92.	84
Acacaloti	127.		Magellanicus	126.	56
Acanthis	68.	43	Sylvestris	93.	48
Accipiter in genere	18.	7	Anthus	88.	45
Asterias	10.	8	Apos	84.	
Fringillarius	10.	8	Aquila in genere	1.	
Palumbarius	10.	8	in specie	3.	
Sacer Ægyptius Bellonio	12.	9	Aquila alba seu Cygnæa	6.	
Accipiter major		11	anataria seu Morphnos	4.	2
minor		11	anopæa	6.	
Achalalactli	128.		Chrysaëtos	3.	1
Acitli seu aquatilis lepus	158.		Bellonii		5
Acolchis Indiarum	157.		Gesneri		1
Acolin	127.		Haliætus	3.	2
Acototloquichiti	127.		Heteropos Gesneri	6.	5
Æsalonus accipitris species	10.	10	Melanoctus seu Valeria	3.	3
Æfalo falconum species		13	Alius	3.	3
Ajaja	139.		Morphnos Bellonii	4.	4
Ajuru species	140.		Morphno congener	4.	5
Alauda	69.	38	Percnopteros	4.	4
criftata	70.	38	alius		4
criftata senex		38	alius peregrinus	153.	5
non criftata	70.	33	Pygargus	4.	2
maxima seu Calandra		38	alius	4.	3
pratorum	71.	38	Aracari	148.	
Alaudæ congener	71.	38	Araracanga	141.	59
Albulus aquaticus		47	Ardea	102.	50
Alcedo vocalis	107.	52	minor		50
Alchata seu Filacotona	64.	32	Cinerea major	103.	50
Aluco	32.	19	minor	103.	50
Amalozque	128.		alia seu congener	103.	50
Ampelides	191.		alba	103.	51
Ampelides Aldrovandi seu Garrulus			Egretta Gallorum	103.	
Bohemicus Gesneri	28.		Garletta Italarum	104.	
Anas	95.	158. 49	Garzetta bianca dicta	104.	
campestris Bellonii	43.		Squajotta Italarum	104.	51
Carina	99.	49	congener	104.	
Domestica	96.	49	Nigra		15
Indica	96.	49	Ardea asteria seu stellaris major	104.	51
Lybica	96.	49	altera minor		51
Anas fera seu sylvestris	96.	146. 49	Congener	105.	
Bofcas major	97.	49	Criftata	105.	
Caudacuta	98.		Ardeola	143.	61
Circia	97.		Arquata	108.	51
Fistularis	98.		Aglus	82.	42
Fufca major	97.	49	Afio		18
Glacius	97.	49	Afio seu Otus	31.	18
Herle	98.	49	Afio seu Scops	32.	18
Muscaria	97.	49	Attagen	41.	26
Nigra	98.	49	Atricapilla	90.	45
Penelope	98.	49	alia		45
Platyrinchos major	97.	49	Atinguacu Camacu	147.	60
Platyrinchos minor		49	Aves diurnæ	1.	
Puffinus	98.		nocturnæ	29.	
Querquedula	96.	49	Aves exoticæ Aquaticæ	126.	150.
criftata	97.		Terrestres	117.	
La Tardone	98.	49	Aves Farrenses	229.	
Anas marina		49	Aves Carnivoræ canoræ	68.	
Anas fera		49	Aves terrestres carnivoræ	1.	53
Anas fera	146.	49	Avis cucullata aquatica	160.	
Andira Aca	144.		longa	122.	
Anhima	147.	61	montana	122.	
Anbinga	148.	60	Indica	113.	
Ani	132.		Diomedica	91.	46
Anser Bassanus	94.	47	Paradisia seu Manucodiata	117.	55
			Pugnax		



I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
Pugnax	105.	52	cinerea	25.	17
Scythica <del>Mitternachtlicher</del> Adler	6.	5	cœrulea	25.	17
Stellata seu Stella Sternvogel	43.	26	Corvus	23.	16
Avium natura in genere	4.		Aquaticus	95.	47
Avosetta seu Spinzago d'acqua	90.	48	Sylvaticus	95.	47
Avosettæ species		54	Cotta Anglorum	98.	
Aura	121.		Coturnix	47. 157.	27. 28
Aurivittes carduelis species	68.	43	Cozquauxtli	121.	
Ayayam	150.		Crex	108.	
			Cuculus	14.	10
B.			alter	14.	10
B Arge Gallorum	106.		Cuntur	124.	
Boarina	87.	44	Curicaca	130.	57
Bernicla	94.		Curucui	144.	60
Boudree Bellonii	12.	7. 11	Cygnus	90.	48
Branta seu Bernicla	94.	48	cuculatus Nieremb.	122.	56
Brenthus	90.		Cynchramus	49.	
Bubo	29.	18			
Bubo <del>Berg</del> hun	29.	18	D.		
Bubo <del>Pach</del> teule	29.	18	D A aje	118.	
Bubo <del>Hautz</del> dictus		18	Diabolus marinus Parisiensium	98.	
Buteones	11.	7. 11	Diomedea avis	91.	46
C.			E.		
C Abure	145.		E Mbriza		35
Calcamas	150.		alba	68.	35
Calidris Bellonii chevalier, rubra	108.		pratensis mas	68.	35
nigra	109.		foemina	68.	35
Canarias <del>Zucker</del> vogel/ <del>Canari</del> vogel		36	Embriza pratensis <del>Wissen</del> meritz		36
Cannevarola	88.	45	Emeu Clusii	119.	56
Capricerca	94.	48	Nieremb.		56
Caprimulgus	34.	20	Erythra gallinula aquaticæ species		35
alias		20	melana Indica		35
Capella <del>Hip</del> witz		27			
Capo	59.	30	F.		
Caracara	144.	61	F Alcinellus seu Falcata	105.	51
Caracura	150.		alia species		51
Carduelis <del>Distel</del> finch	68.	36. 37	Falco	16.	12. 13
ciliis albis		36	Albus	18.	12
mas		36	Alius		12
Cariama	138.	59	Arborarius seu Dendrofalco		
Caripira	150.		<del>Baum</del> falch	19.	10
Catarrhacta	94.	47	Cyanopus	19.	
Caryocatactes <del>Russ</del> bicker		27. 40	Gentilis	18.	
Cenotzqui	123.		Gibbosus	18.	
Ceoan	123.		Italicus	19.	
Cephus	94.	47	Lanarius Gallorum	18.	
Cercio	113.	53	Falco lapidarius	19.	
Certhia	80.	42	Montanus	17.	13
Charadrios	113.	26. 53	Oenentanus		12
Chalandra	70.	33. 38	Passagir		12
Chicuatli	123.		Peregrinus	16.	13
Chloris <del>Gruen</del> finch	71.	36. 37	Rubeus	19.	12
congener seu chloris Indica	71.		Sacer	16.	
Chloropos Gallinula aquatica	109.	111. 31	Tenetanus	18.	
Ciconia	99.	50	Ficedula		33
nigra		50	Ficedula, Canabia		33
Cinclus	112.	53	Flamenco avis Hispanis dicta	130.	
alias		53	Fringilla <del>Finch</del>	69.	33. 36
Cinclus Gallinago minima Bellonii		53	montana	69.	36
Cinnamomus	152.		sublutea	70.	36
Circus	10.		Fulica <del>Wasser</del> hun		31
Citrinella <del>Citren</del> se	71.	36. 38	Fulica seu Mergus niger	98.	
Cocoi ardeæ species	143.	61			
Coccytraustes	76.	37	G.		
Indica	77.	37	G Algulus		27
Columba domestica	62.	32	G Gallina	53.	29
varii coloris		32	Africana	131.	57
Cypria		32	Gallinula Aquatica	109.	31
alia		32	Gallina Corylorum <del>Wasser</del> hun	42.	25
Indica		32	Gallinula Erythropus aquatica	110.	
Hirsutis pedibus major		32	Gallinula Hypoleueos aquatica	109.	31
Livia	64.	32	Gallina Indica cum ovo ejus	58.	24. 30
Columba	59.	32	Lanigera		30
Sylvestris	63.	146. 32	Gallinula Ochra aquatica	110.	31
Columbus	62.	32	Gallina Patavina	57.	29
Collurio	12.	43	Gallina Persica	57.	30
Colymbus major	89.	48	Pumilio seu Nana <del>Wasser</del> hun	57.	29
major Bellonii	89.	48	Quinca	58.	30
maximus	90.		Gallinula Rhodopos aquatica	110.	31
minor	89.	48	Gallina Turcica	57.	30
Coracia	26.	16	Gallinarum ova	53.	
Cornix	24.	16			
frugivora	25.	17			



	I	N	D	E	X.	P.	T.
Gallinago minor scelopax <del>Bar</del> schneppff	110.		31	Jacamacaii		136.	58
sylvestris aquatica	160.			Jacamaciri		138.	57
Gallinula chloropus vide chloropos gallinula.				Jacana		130.	57
Serica <del>Samethunlein</del>	110.	23.	31	Jacarini		143.	
terrestris	111.		31	Jacapu		131.	
Gallo-Pavomas	39.		24	Jacupema		136.	58
Gallus gallinaceus	59.		29	Jacurutu		136.	58
Cornutus	57.		29	Jaguacati guacu		133.	57
Indicus	58.	29.	33	Jaja U qui tototl		119.	
Indicus mirabilis			30	Jambu		131.	
Monstrosus candatus			21	Japacani		144.	
Palustris	58.		30	Ibi jau, Noitibo		133.	57
Patavinus	57.		29	Ibi jau magnitudine noctuæ		133.	58
Peregrinus Clusii	122.		56	Ibis		101.	50
Perficus	57.		30	Jochaulcuachili		126.	
Scoticus sylvestris	57.		30	Ipecati Apoa		148.	60
Turcicus	57.		30	Ipecu		142.	59
Gambetta Aldrovandi Italorum	109.			Isipida <del>Epfz</del> bogel		107.	31
Garagay	121.			Itzquautli		153.	
Garrulus Bohemicus Gefneri, vide	28.			Juncus Bellonii		112.	53
Ampelis Aldrovandi	53.			Jupujuba		131.	
Generatio pullorum	12.		7	Iynx seu Torquilla		80.	42
Goyranifcu Boudree Bellonii	26.		16	Congener		81.	42
Graculus					L.		
Graculus palmipes seu Corvus Aqua-							
ticus minor	95.		47	L Agopus		46.	28
Granivoræ aves	37.			altera species			28
Grigallus major	41.			Lanarius prior		12.	9
Grus balearica mas	116.		54	alter		13.	9
foemina			54	Lanius albus		13.	9
crispa			54	Cinereus		13.	9
Japponensis	116.		54	minor			10
Vulgaris	114.		54	alius			11
Gryphus	151.		62	Lanius collurio			11
Guacuguacu	139. (58.		56	Milvus			11
Guara	139. 151.			Larus		92.	
Guarauna	139.			albus		93.	46
Guainumbi variæ species	134.		58	cinereus		93.	46
Guira Acangatara	147.		60	Fidipes		94.	46
Guira coereba	144.			major			46
Guira guacuberaba	144.			minor Sterna		94.	46
Guira guainumbi	132.		57	niger		94.	46
Guiranheemgatu	142.			piscator		93.	46
Guiranejoa	142.		61	Ligurinus Gazæ		68.	36
Guiraperea	144.			alius			36. 37
Guirapunga utraque	137.		59	Limosa Venetorum		106.	
Guira Querea	138.		59	Linaria		69.	36. 37
Guiraranheengata	143.		59	marina Aldrovandi		69.	38
Guira tangeima	131.		57	rubra		69.	36. 38
Guira teonteon	151.			Lomsbay		129.	
Guiratinga	143. 150.			Loyia		29.	
Guirarica	143.			Luscinia		88.	45
Guit Guit	118.			Lusciniola		88.	45
Gulo <del>Sees</del> luder	89.			Lutea mas		71.	38
Guranhæ-engera	125.			foemina		71.	38
H. <del>Hæ</del> matopus Bellonii	106.				M.		
Hæmantopus mas	106.		52	M Acuacagua		146.	
foemina			52	Macucagua		125.	
Halcyon	107.		52	Maguari		139.	
Harpa	13.			Maia		118.	
Harpys	151.		62	Manucodiata Aldrovandi prima		117.	137. 53
Heatototl	128.			secunda		118.	55
Helorius Creçi	106.			longa		118.	55
Herle Bellonii	89.			Mareca		146.	
Heuhqueçholtototl	157.			alia species		146.	
Himantopus	108.			Matuitui		136. 148.	58. 60
Hirundo	83. 160.		42	Meerganser Gefneri		89.	47
Apos	84.		42	Mergus		95. 159.	
Agrestis	84.		42	Arcticus Clusii		159.	56
exotica aquatica	106.		46	Bellonii			47. 48
marina			42	Albus		97.	
riparia	84.			Cirrhatu		97.	47
Hoactli	128.			Glacialis		97.	
Hoactzin	119.			Longirostratus		96.	47
Horion	106.			Niger		97.	
Hortulanus mas	49.		28	Raucedulus		96.	
foemina	49.		28	Rhenanus		96.	47
Congener	49.		28	Ruber		96.	
Hortulanus <del>Brach</del> Amsel/ <del>Cro</del> stel			37	Merops <del>Sees</del> chwalb			27
Hypolais seu Curruca	90.		45	Merops <del>Imben</del> scrafz		81.	42
Hypotriorchis	12.			Congener			42
I.				Merula		73.	39. 40
J Abiru	137.		59	mas		73.	39
Jabiru guacu	137.		59				foemina
Jacacintli	128.						



I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
foemina	73.	39	Passer stultus Bononiensium	67.	126
alba & nigra	73.	39	Torquatus	67.	
bicolor	75.	39	Passer Troglodytes Bellonii	82.	42
brasilica	75.	40	Armeniacus	82.	42
Indica Apos	76.		Passer in juglandibus degens	67.	
aquatica <del>Wasser</del> Amsel		53	Passeris species seu congener	67.	34
montana	75.		Passeres fabri	158.	
rosea mas	75.	40	Passerculus Brachyurus nostras	67.	34
Merula saxatilis <del>Stein</del> Amsel	75.	39	Passerculus Troglodytes <del>Zaun</del> schlupfferle		42
torquata mas	75.	39	Pavo	37.	22
foemina	75.	39	foemina	37.	22
Merulae congener duplex	76.	39	albus	39.	23
Merulus passer, solitarius	74.	39	sine cauda Chinenfis		21
Milvus	13.	11	Japonensis mas	39.	23
Mituporanga	133.	57	foemina	39.	23
Mitu mutu	133.	58	Pauxi	123.	
Monedula	26.		Pelecanus sive Patea <del>Toffel</del> ganz	91.	46. 62
aliud genus	26.		Perdix	44.	27
Montifringilla	69.	33. 36	alba seu Lagopus	46.	28
Congener		38	altera		28
Morfex	89.		Cinerea	46.	28
<del>Mot</del> <del>szkoto</del>		27	Damascena	46.	28
Motacilla		43	Græca Bellonii	46.	27
Mas	86.	44	Ruffa	46.	28
alba	86.	44	Phalacrocorax	95.	47
flava	86.	44	Phalaris	90.	
Muscipeta	87.	45	Phasianus	40.	24
Mutu	125.		alius		24
			Phoenicurus	88.	45
			altera species		45
			Phoenicopteros	101.	50
			Phoenix	152.	62
			Plytivoræ aves	37.	
			Pica	26.	157. 17
			brasilica	28.	56
			alia		56
			caudata s. varia	27.	17
			caudata Indica mas	27.	17
			foemina		17
			caudata alia <del>Elster</del> Amsel		27
			Garrulus Argentoratenfis	27.	17
			Glandaria <del>Heger</del>		17. 43
			species alia		17. 43
			marina	27.	17
			Perfica	28.	
			Pica Cureba	139.	
			Picicicli	123.	
			Picui pinima	139.	
			Picus Cinereus	80.	41. 43
			Chlorio-Indicus	80.	41
			luteus cyanopus	79.	41
			Martius	78.	
			Maximus niger	78.	41
			Major <del>bundter</del> Specht	79.	41
			murarius	79.	41
			Nidum suspendens	80.	41
			Varius minor	79.	41
			alius		41
			Viridis <del>grun</del> Specht	79.	41
			major		41
			Pitanguo Guacu	147.	60
			Pluvialis	113.	
			cinerea	114.	53
			flavescens	113.	
			major Aldrovandi	114.	53
			Polyglotta	123.	
			Porphyrio	106.	52
			Prunella		36
			Pfittacus	20. 153.	140. 14
			Pfittacus albus cristallus	21.	15
			Cinereus	23.	15
			Erythrocyanus	22.	
			Erythroleucus	23.	
			Erythrochlorus cristatus	23.	
			macrourus	23.	
			Erythrocyanus Gefneri	23.	
			Erythroxantus Gefn.	23.	
			Leucocephalos	22.	15
			Major	21.	14
			Minor	22.	14
			Maximus	21.	15
			Maximus alter	21.	15
			Poikilorchinus	22.	14
			Torquatus macrourus	23.	
			Viridis	22.	14
			Viridis melanorinchos	22.	15
					Pugna-



	I	N	D	E	X.	
	P.		T.		P.	T.
Pugnaces	105.		52	Tentzontototl	119.	
Pullus gallinaceus monstrosus	148.		60	Tijeguacu	144.	
Pyrrhocorax	26.		16	Tijeguacu Paroara	146.	60
Pyrrhula	87.			Tijepiranga	131.	57
				Tinnunculus mas	11.	8
				fœmina	11.	8
				Canchris <del>Manentw</del> aher		10
<b>Q.</b>				Tlacoquauthli	153.	
Uachiltone	127.			Tlauquechul	126.	
Quarotoni	157.			Tominejo Nieremb.	124.	56
Quahzonecolim	157.			Torquilla	80.	
Quereiva	125.			Totanus	108.	52
Querquedula	96.			Totoquestal	122.	
Quetzaltototl	121.			Triorches seu buteo		11
Quirapanga	125.			Tritonus	119.	
Quiratinga	150.			Trochilus	81.	90. 48
				Trynga	111.	53
				alia	111.	53
<b>R.</b>				Tucana	125.	56
Allus	98.			Tucan		
Regulus	81.	42		Tuidara	139.	
non cristatus	82.			Tuputa	119.	
Rex avium paradisearum	137.	55		Turdus	71.	158. 37
Rhinoceros	28.			viscivorus	73.	39
Rousserolle	107.			Turdus leucocephalos	73.	39
Rubecula	87.	43. 45		Illas		73
Rubetra	87.	45		Simpliciter dictus	73.	39
Rubicilla seu pyrrhula	87.	43. 45		Trichas	73.	
Ruticilla seu phœnicurus	87.	43. 45		Turtur	64.	32. 33
Rusticula <del>Schneppf</del>		53		Indicus	64.	32
minor		27		Tzinitzian	122.	
fulvatica	110.	31				
<b>S.</b>				<b>V.</b>		
Acer Ægyptius vide Accipiter				Anellus seu capella <del>Apuitz</del>	113.	53
Sayacu	132.	57		Verspertilio	34.	20
Scheladrachus	89.			lectans	35.	20
Scolopax five Galligano	110.	32		pullus		20
Scops	31.	18		Vinago	64.	
Seleucides aves	151.			Ulula <del>Del/ Duhu/ Cule</del>	32.	18. 19
Semenda avis	152.			Ulula <del>Archæule</del>		19
Serinus <del>Girnitz</del>	71.	36		alia		19
Sirenes	151.			Upupa	85.	27. 42
Skua Hojeri	129.	56		Uria	90.	
Soco	136.	58		Urogallus major	40.	25
Spinus seu Ligurinus, acanthis <del>Zessel</del>	68.	36		minor	41.	25
Spipola	87.	44		alius	41.	25
alba	87.	44		Urubitinga	146.	
Starda seu Tarda	42.	26		Urubu	142.	61
Stoparola	87.	44		Urutaurana	139.	59
alia	87.	44		Vulpanser	93. 94.	
Strix	34.	19		Vulturum differentiæ	7.	6
Struthocamelus	35.	153. 21		Vultur alpinus vel aureus	7.	6
Sturnus <del>Staer</del>	76.	157. 40		Boëticus	7.	6
albo capite		40		aquaticus	130.	
Cinereus		40		Cinereus	7.	6
pullus		40		Leporarius	7.	6
vulgaris	76.	40				
Stymphalides aves	151.					
Subbuteo	12.	9				
<b>T.</b>				<b>X.</b>		
Alchicuatli	153.			Lepapantototl	128.	
Tamatia	142.	59		Xochitenacatl	126. 119.	156. 56
alia	143.	59		altera	119.	56
Tangara	125. 146.	60. 61		Xochitototl	121.	
Tapera	139.			Xomotl	127.	
Tacoletl	153.					
Tarda	42.					
Teitei	144.			<b>Y.</b>		
Tempatlahoac	159.			Andeu	153.	
				Yutu	158.	



# I N D E X

*Quibus paginis Tabula arum sint subjungende.*

Tabula		pag: 2.		Pag: 61.
I.			XXXII.	
II.	}	4.	XXXIII.	64.
III.	}		XXXIV.	66.
IV.	}	5.	XXXV.	
V.	}		XXXVI.	68.
VI.		7.	XXXVII.	
VII.		10.	XXXVIII.	69.
VIII.		11.	XXXIX.	
IX.	}		XL.	72.
X.	}	13.	XLI.	74.
XI.	}		XLII.	79.
XII.	}		XLIII.	82.
XIII.	}	17.	XLIV.	86.
XIV.	}		XLV.	88.
XV.	}	22.	XLVI.	93.
XVI.			XLVII.	94.
XVII.		23.	XLVIII.	91.
XVIII.	}	25.	XLIX.	95.
XIX.	}	31.	L.	100.
XX.		34.	LI.	104.
XXI.		35.	LII.	105.
XXII.	}		LIII.	
XXIII.	}	37.	LIV.	114.
XXIV.			LV.	118.
XXV.		39.	LVI.	121.
XXVI.	}	40.	LVII.	131.
XXVII.	}	42.	LVIII.	133.
XXVIII.		46.	LIX.	138.
XXIX.	}		LX.	146.
XXX.	}	57.	LXI.	147.
XXXI.	}		LXII.	151.

# I N D E X



# P R Æ F A T I O


## I N

### HISTORIAM NATURALEM

#### D E

# A V I B U S:

In qua de Operis ratione, & de Avium natura in genere, agitur.



Quaticos greges, æ-reus Avium seu volucrum grex insequitur, Benevole Lector. Inditum iis id nomen, non tam quod pervia discurrant, iisdemq; delectentur, ut Isidoro & Perotto placet: vel ab adventu, quod inde venient, unde quis non suspicetur, ut Festo: quàm vel à volando, quod Ebreis *קָנָה* dicitur, ut Martinius in Lexico deducit, vel ab *ἀφην*, audiendo, quod Scaligero patri visum. Græcis, *ὄρνιθες* ab *ὄρνις* & *πτερόν*, *ὄρνις*, *πτερόν*, &c. vocantur. Collum omnes & dorsum & eas quæ terram spectant, quæque pectoris vicem gerunt, partes, cum cæteris animantibus communes habent: peculiare præ cæteris, *alas*, *pennas*, quibus caulis plumas & *rostrum*, quod in senecta durefcit. Neque *labia* ipsis sunt, neque *dentes*, neque *manus* pedesve anteriores, neque *auricula*, neque *nares*, sed meatus horum sensuum, ad odoratum in rostro; ad audiendum in capite. *Oculos* similiter atque aliæ animantes, duos sine palpebris habent. Connivent inferiore gena graviores: nictant ab angulo obeunte membrana omnes. Aristoteles, *σκαρδυνόσσοι ἐν τῷ καρτῷ δέματι ἐπίπνυσι*, dixit. *Femur* simile coxæ, longum, ad medium usque subeuntem atque affixum ventrem: quod cum avulsum est, *coxam* putes: At ipsa coxa, quæ inter hoc & tibiam est, alia quædam pars esse videatur. Maxima uncungibus, & *Pectus*, aliis robustius. Pro cauda clunibus est, iis quibus aut crura longa, aut pedes continuata planicie dati, brevis, longus aliis. Alas in priora curvant. Omnium animalium *bipedes* sunt ut homo: quamvis retrorsum curvant crura, quadrupedum modo, uncos habentium longi, & quæ ad aquas versantur. Carent tamen iis Cyseli, & quoddam Manucodiatorum genus. Omnes sunt *πολυδάκτυλοι*, sed & omnes quodammodo *πολυδάκτυλοι*. Plurimis namque digitis discreti sunt: & *τὰ πλεονά τετραδάκτυλα* quidem, & articulos tamen atque distinctos habent digitos. Plinius eos alias habere dixit, palmipedes esse alias, alias inter utrumque divisus digitis, adjecta latitudine. Quæ volatu sublimes feruntur, omnibus quaterni digiti, tres in anteriore parte, unus ponè pro calcaneo plurimis. Paucæ binas ante,

totidem post habent. Quibusdam etiam calcaria sunt, Uncungues autem & calcarigeræ, nullæ. Plinius, ni fallor, radios dixit. Illæ sunt volucres; hæ humiles. Data nonnullis & surrectis pennis crista. Soli gallo peculiaris, quæ nec caro est, nec à natura carnis aliena. Interiora si attendamus, *Lingula* sortitæ omnes sunt, sed diversam: aliæ longam, latam aliæ, quæ præter cætera animalia, literas sono exprimunt: aliæ ante ex cornu acutissimo, retro ex carne compositam, ut in historia occurret. *Lingula* quæ gurgulioni imposita est, nulli: apertione & contractione ita meatum temperant, ut prohibeant, ne quid gravioris in pulmonem demittatur. *Viscera* & inter se & ab aliis animalibus differunt. Præjacet in quibusdam ventriculo ingluvies, seu cavum amplumque corium, in quod receptus cibis per initia coquitur; à gula angustius, dein laxius, & rursus, quo ad ventriculum demittitur, arctius. *Ventriculus* plurimis carnosus & compactus: pelle interiore robusta, etiam cum à cornoso ablata est. *Ingluvie* destituta, gulam capaceam latam, aut totam qua ventriculo jungitur obtinere, ut monedulæ, corvi, coturnices: quæ tali carent, longam habent, & liquidius præ cæteris excernunt, ut Porphyrio. Complurimis *intestinum* tenue, & si explicetur simplex. *Appendices* explicatæ sunt, sed paucæ, neque superne ut piscibus, sed in ima parte ad intestini extrema. *Fel* non eodem loco habent, quædam enim *πρὸς τῇ δουρίᾳ*; quædam *πρὸς τοῖς ἐπείροις*, ut columba, hirundo, &c. *Testiculos* *πρὸς τῇ δουρίᾳ*. Antequam coëant, quibusdam sunt parvi, quibusdam obscuri & *ἀδύτοι*; tempore coitus majores fiunt. *Genitura* alba est. Vesica carent, quod larga humoris copia ad pennarum ortum & incrementum requiretur, ut Aphrodisæo visum Pennigeri hujus exercitus *locus* sunt Aër, aqua, terra. Illum fulcant, unde Aves cœli dicuntur; in hac gradiuntur; in ista quædam natant. Sunt tamen quæ in quibusdam locis non inveniuntur, de quibus ita Plinius: *Hæc quoque mira naturæ differentia: alia aliis locis negat, tanquam genera frugum fruticumve, sic & animalium non nasci translatitium; in vecta emori, mirum. Quid est illud unius generis saluti adversum, quæve ista naturæ invidia? aut qui terrarum dicati avibus termini? Rhodus aquilam non habet: Transpadana Italia juxta Alpes Larium lacum*

Scaliger in Hist. anim. l. 1. p. 48 Arist. H. A. l. 2. cap. 15. edit. Scaligeri.

Arist. H. A. l. 3. cap. 11.

Arist. l. c. Plin. H. N. l. 11. c. 45 & Plin. H. N. l. 8. cap. 39.

Plin. H. N. l. 11. c. 47.

Arist. H. A. l. 2. p. 213. edit. Scal.

Albert M. de Animal. 2. tr. 1. cap. 6. Arist. H. A. l. 2. c. 22. edit. Scaliger.

Arist. H. A. l. 2. cap. 16. Arist. H. A. l. 3. c. 1. Arist. H. A. l. 6. cap. 9. Arist. H. A. l. 6. cap. 2. Aphrodis. Probl. p. 1. q. 108.

Plin. H. N. l. 10. c. 29.



cum appellat, amaranthum arbutum, agro, ad quem Ciconiae non permeant: sicuti nec octavum circa lapidem ab eo, immensa alioqui finitimo Insubrium tractu examina graculorum monedularumve.

Picus Martius in agro Tarentino negatur esse, &c.

Arist. H. Sed nec eadem semper omnibus regio. Faciunt enim *μεταβολαί* quaedam, ut in gruibus, Ciconiis & aliis dicemus. Unde Plinius. *Temporum magna differentia avibus. Perennes, ut columbae, semestres ut hirundines: trimestres ut turdi & turtures, & quae cum faetum eduxere abeunt, ut galgali, upupa, Scilicet. Migrant quaedam, alio non procul à locis in quibus morabantur secedunt, & seipsas abdundunt, & quidem nullo discrimine, tam*

Arist. H. *ισθμιαί* quam *γαμψύχοι*. *Viclitant carnibus, insectis, herbis, granis, & seminibus, piscibus & ranis. Sola Emmo prunas etiam devorat, ut in ejus descriptione dicetur, Bibunt suctu ex his quibus colla longa, intermittentes, & capite resupinato velut infundentes sibi: Porphyrio solus morsu. Non bibunt* *γαμψύχοι* *quod Herodotus, ut Aristoteles scribit, ignoravit. De Generatione notandum, duobus modis fieri coitum; foemina humi confidente ut in gallinis: aut stante, ut in gruribus. Quedam omni tempore coeunt, ut gallinae, & pariunt, praeterquam duobus mensibus hyemis brumalibus: plerumque tamen vere & ineunte aestate: quo tempore etiam pleraeque pariunt, & quidem semel. Oscimes praeter exceptas, inquit Plinius, non temere faetus faciunt ante solstitium vernum, aut post autumnale: ante solstitium autem dubios, post solstitium vitales. Ova ferunt omnes, vespertilionem excepto, qui animal. Infecunda sunt quae ad uncas habent ungues. Tribuit hoc avium generi natura, ut fecundiores essent fugaces earum quam fortes. Ovorum alia sunt candida, ut columbis & perdicibus: alia pallida, ut aquaticis: alia punctis distincta, ut meleagridi: alia rubricoloris, at Phasianis.*

Plin. H. Intus omne bicolor. Exeunt rotundissima sui parte dum pariuntur, molli putamine, sed protinus durescente, quibuscunque emergunt portionibus. Tempus à coitu, partus excubationis, & numerus variant, ut apud Plinium videre est. Aliquando foemina tantum incubat, aliquando mas. In columbarum genere, interdum mas, noctu foemina: inter palumbes post meridiem in matutinum foemina, caetero mas. A coitu inhorrescunt & se excutunt, saepe etiam aliqua festuca lustrant: quod & edito ovo faciunt. Sunt etiam quaedam his bella amicitiaeque, unde & affectus. Dissident olores & aquilae: corvus & chlorio, noctu invicem ova exquirentes. Simili modo corvus & milvus, illo praeripiente huic cibos. Rursus cum terrestribus, mustela & cornix: Aegithus avis minima cum asimo, &c. De Motu ita egregie Plinius. Omnibus animalibus re-

Plin. H. *Intus omne bicolor. Exeunt rotundissima sui parte dum pariuntur, molli putamine, sed protinus durescente, quibuscunque emergunt portionibus. Tempus à coitu, partus excubationis, & numerus variant, ut apud Plinium videre est. Aliquando foemina tantum incubat, aliquando mas. In columbarum genere, interdum mas, noctu foemina: inter palumbes post meridiem in matutinum foemina, caetero mas. A coitu inhorrescunt & se excutunt, saepe etiam aliqua festuca lustrant: quod & edito ovo faciunt. Sunt etiam quaedam his bella amicitiaeque, unde & affectus. Dissident olores & aquilae: corvus & chlorio, noctu invicem ova exquirentes. Simili modo corvus & milvus, illo praeripiente huic cibos. Rursus cum terrestribus, mustela & cornix: Aegithus avis minima cum asimo, &c. De Motu ita egregie Plinius. Omnibus animalibus re-*

Plin. H. *Intus omne bicolor. Exeunt rotundissima sui parte dum pariuntur, molli putamine, sed protinus durescente, quibuscunque emergunt portionibus. Tempus à coitu, partus excubationis, & numerus variant, ut apud Plinium videre est. Aliquando foemina tantum incubat, aliquando mas. In columbarum genere, interdum mas, noctu foemina: inter palumbes post meridiem in matutinum foemina, caetero mas. A coitu inhorrescunt & se excutunt, saepe etiam aliqua festuca lustrant: quod & edito ovo faciunt. Sunt etiam quaedam his bella amicitiaeque, unde & affectus. Dissident olores & aquilae: corvus & chlorio, noctu invicem ova exquirentes. Simili modo corvus & milvus, illo praeripiente huic cibos. Rursus cum terrestribus, mustela & cornix: Aegithus avis minima cum asimo, &c. De Motu ita egregie Plinius. Omnibus animalibus re-*

liquis certus & uniusmodi & in suo cuique genere incessus est: aves solae variomotu feruntur, & in terra & in aëre. Ambulant aliquae, ut cornices: saliant aliquae, ut passeress, merulae: currunt, ut percides rusticulae: ante se pedes jaciunt, ut ciconiae, grues: expandunt alas pendentisque raro intervallo quatiunt (*ut milvi*) aliae crebrius sed & primas duntaxat pennas: aliae & tota latera pandunt: (*ut corvi*) quaedam majore ex parte compressis volant (*ut pici*) percussoque semel aliquae & gemino ictu aëre feruntur: (*cardueles*) vel ut inclusum cum prementes ejaculantur, sese in sublime, in rectum in pronum. (*hirundines*) Impingi putes aliquas, (*perdices*) aut rursus ab alto cadere has, (*alaude*) illas salire, (*coturnices*) Anates solae, quaeque sunt ejusdem generis in sublime protinus se tollunt, atque è vestigio coelum petunt, ut hoc etiam ex aqua. Itaque in foveas, quibus feras venamur, delapsae solae evadunt. Vultur & fere graviores, nisi ex procursu, aut altiore cumulo immissae non evolant, cauda reguntur. Aliae circumspiciunt, aliae flectunt colla. Sine voce non volant multae: aut è contrario semper in volatu silent. Subrectae, pronae, obliquae, in latera, in ora, quaedam & resupinae feruntur: ut si pariter cernuntur plura genera, non in eadem natura instare videantur. De cetero, dorrectis ad caudem cruribus volant, quibus longi pedes: quibus breves, contractis ad medium. Uncos ungues habentes altivolae fere sunt, exceptis nocturnis. De voce hoc dicere sufficiat, loquaciores quae minores, & circa coitus maxime. Aliis in pugna vocem, ut coturnicibus, aliis ante pugnam, ut perdicibus: aliis cum vicere, ut gallinaceis. Iisdem sua maribus: aliis eadem, ut foeminis, ut lusciniarum generi. Quedam toto anno canunt, quaedam certis temporibus. Palumbibus omnibus similis & idem trino conficitur versu, praeterquam in clausula gemitu. Est quae boum mugitus imitetur, in Arelatensi agro *taurus* appellata, alioquin parva. Est quae equorum quoque hinnitus *anthus* nomine, herbae pabulo adventu eorum pulsa imitatur, ad hunc modum se ulciscens. Varium & vitae inter eas spacium. Mares passeress negantur anno diutius vivere. Columbae & turtures octenis durant. Cornicibus & cervis, nescio quot tribuuntur lustra. Morbis infestari nullum dubium, & habentur apud authores remedia. Conferunt illis *σι ἀνχμὶ*, incommodant *τὰ ὑπόμυρτα ἵτη*. Invaletudinis indicium in pennis. *παρά τισιν γὰρ ἐστὶ τὴν αὐτὴν ἵχτιον καὶ αἰσάναι*. Quae de Natura, ingenio, circumtione, docilitate, & affectibus occurrunt, abunde in Historia explicabuntur. Divinationis iisdem aliquid inesse, compertum est. Grues ex mari in mediterraneo volantes, si silent, serenitatem pollicentur, si clamant, atro-

Plin. H. N. l. 11. c. 47.

Plin. H. N. l. 11. c. 51.

Plin. H. N. l. 10. c. 35.

Plin. H. N. l. 10. c. 42.

Plin. H. N. l. 10. c. 35.

Arist. H. A. l. 5. c. 13.

Ael. H. A. l. 7. c. 7.



atrocem turbinem. Idem sonans in crepusculo matutino Ardea, prænunciant; quæ & pluviâ si ad mare recte tendet, prædicat. Sereno canens noctua; volubili sono crocitantans corvus, crepusculo vocales cornix & graculus; monedulæ modo sursum, modo deorsum versus volantes, &c. tempestatem innuunt, &c. *Usum* homini præbent, in cibo, Medicina, venatione, re vestiaria & plumaria, oblectatione & aliis. Caro earum levior & sanior, purgatissimaque in suo genere est, & Albertus dixit. *Differentiæ* Avium sunt infinitæ, ex multisque fontibus petuntur. *Partes* si respicias, aliæ habent *rostrum* rectum, aliæ, superius, inferius, aut utrinque incurvum, *Pedes*, quædam longos, breves quædam. Aliæ sunt digitatæ, aliæ palmipedes, aliæ inter utrumque divisas digitis, nonnulæ apodes: *Caput* aliis cristatum, sine crista aliis, sunt & cornuæ, ut apud Ælium videre est. *Collum*, tliæ longum, ut grues; aliæ breves obtinere. De *Lingua* superius attigimus. *Ala*, plerisque proportionem: sola Dodo tam exiguas habet, ut se à terra tollere non possit. Omnes plumis vestiuntur, recens natus si excipias, & Dodonem, quæ lana quasi tegitur. *Cauda* quoque sunt fere omnes Cacato insulæ Mauritiæ avis cauda caret, &c. *Ratione Magnitudinis*, sunt, parvæ, mediocres, magnæ, apum quantitate, & bovis majores, ut Ælii fabulatur. *Ratione Locis*, sunt terrestres, marinæ, lacustres, palustres, domesticæ & villaticæ, sylvestres, campestræ. Aliæ arboribus insident, vel illis se affigunt, aliæ cavernis delectantur. Quantum ad *Qualitates*, sunt albæ, nigræ, versicolores, & quidem tales pleræque. Mutant quædam colorem, vocemque tempore anni ac repente fiunt aliæ, ut oscines & grues: non matunt aliæ. *Ratione Cibi* sunt carnivoræ, ut rapaces, insectivoræ, granivoræ, &c. Deglutiunt & lapillos & ferrum quædam. *Ratione Generationis* omnes fere, ut dictum, ovum ponunt, sola vespertilio animal. Infecundæ sunt unguines: fecundiores aliæ. Columbæ decies anno pariunt: hirundines, turtures, merulæ bis. Nihil de congressu, partu, incubatione, exclusione, differentiis dicam. *Motus* diversitatem superius jam attigimus. Sed & de *vocis* varietate actum. Philomela modulatur: Aquila clangit: Accipiter pipat: corvus crocitat, crocit; corniculat. Perdix cacabat: Anser, gratitat, glacitat: Cygnus drensat. Turtur & Columba gemunt: Palumbes plausitat: Ciconia glotérat. Gallus cucurrit: Gallina gracillat, glocit: glocitat. Pavo pupillat: Grus gruit. Vultur pulpat. Græculus frigulat: Milvius lipit, lugit. Anas tetrinit: hirundo trinsat. Passer pipit: Sturnus pisitat. Turdus trutilat: Acredula mittat. Coturnix grylissat: Gal-

Arist. H.  
A. l. 1. c. 2  
Edit. Scalig.

Æl. H.  
H. l. 17.  
c. 10.

Herbert.  
i. Itine-  
rar. p.  
347.

Æl. H. A.  
l. 17. c. 14

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 53.

gulus glocitat. Merula stridet vel modulatur: Upupa popissat. Meleagris caccissat: Vespertilio stridet. Pica picatur: Cuculus cuculat. Bubo bubulat: Noctua cucubat. Ulula ululat: Buteo bubit. Regulus zinzilutat, Parustinninat. Reliqua, ne nimis prolixus sim, non attingo. Ego eas in hoc Opere, in *Terrestres & aquaticas distinxi*. Illas iterum in *Carnivoras*, sub quibus sunt Aquilæ, vultures, Acipitres, Falcones, Plittaci, Corvi, Cornices, Noctuæ, Vespertilio, &c. *Insectivoras* non canoras & canoras: *Granivoras*, sub quibus pulveratrices, sylvestres & domesticæ, pulveratricesque & lotrices simul, &c. & *Baccivoras*. *Aquaticas* in *Palmipedes & Fissipedes* quæ etiam sua sortiuntur genera, dispescuntur, prout in syllabo librorum & Capitum præfixo apparet. Et tantum de Avium natura in genere præmittere placuit. Quod reliquum est, scire te *Benevole Lector* velim, exhiberi hic Tibi quasi in tabella, quicquid de Avibus veteres & recentiores habent. Addidi enim omnia illa quæ à Gesnero & Aldrovando omissa sunt. Ideo & totum quintum librum Marcgravii de Avibus Brasiliensibus Appendicis loco adjeci, paucis quibusdam omissis, quæ alibi abunde explicata sunt. De Ufu si quæ desiderabuntur, in Additamentis, Deo bene volente, prostabunt, in quibus una quæque Exoticarum suæ Classi restituetur. Quapropter, si aliqua nunc bis occurrerit, veniam dabis. Similes aliquando appareant species, quæ tamen vel icone, vel quibusdam in descriptione positis differunt. Quia vero duplici Aristotelis Historiæ Animalium editione usus sum, vulgari nempe & Scaligeranana; ideo illam absque addito, hanc cum nomine Commentatoris citare soleo. Iudicem tibi dabo, postquam totum de Animalibus opus paratum fuerit, illumque totius operis ad species, partes, & affectiones reducti, prout Plinius Historiæ suæ libro undecimo, capite trigesimo septimo & aliis pluribus in locis fecit, Compendium, sed Alephabetico ordine dispositum: si tituli marginales omissi sunt, ne mirere. Primus hic in hac Historia labor, & jam fere per triennium apud Typographum delituit: nec tum mihi istos addere animus, prout & in historia de Piscibus vidisti. Fruere interim, *Benevole lector* his, cum Deo; & auctori juventutis literariæ studiosissimo, prosperam valetudinem & ad plures curas vitam apprecare, ut Tuo bono, opus Historiæ Naturalis, de Homine inprimis, quod parat, aliaque huc spectantia, feliciter absolvere possit. Vale. Lsenæ ex Musæo. 10. Febr. A C M. DC. L.



## HISTORIÆ NATURALIS

D E

## A V I B U S

LIBER PRIMUS.


## De Avibus Terreſtribus Carnivoris.

## TITULUS I.

De Aquilis.

## CAPUT I.

De Aquila in genere.



**QUILLA** Græcis seu *παρὰ τὸ αἶσσαν*. concitius feror, seu *παρὰ τὸ αἰετῆος εἶναι*, quod semper augurium ejus veridicum esse soleat, *αἰετὸς* Cypriorum dialecto *αἰγος* & *ἰβειος*. Macedonum *παρὰ τὸς*, *Αἰβειος*, *Αἰβειος*, *Pergeorum* *Αἰβειος* vocatur.

Totam avis *molem* si spectes. *Corpus* ipsi densum, figura erecta. *Ossa* solida & nihil ferè medullæ habentia. *Magnitudo* determinari non potest. Viginti cubitales in Ptolomæi pompa delati fuere. Inter Misenam & Dresdam tres in nido, pulli, totidem patulas quercus ingenti spacio complexo, inventi; quorum maximis alæ per transversum extensæ septem ulnas, ungues viri grandis digitos æquabant, crura leoninis majora erant. *Partes*, si in rationem veniant, anterior *Capitis* pars paulatim arctatur & in *rostrum* definit; quod durum, aduncum, ad senectutem crescit, sed tractu temporis fit inutile. *Oculi* sunt, parvi, charopi, concavi, profundi, nec nimium oblongi, nec exactè rotundi. *Dentes* nulli. *Cerebrum* adeò calidum, ut in pulverem redactum, maniam, exhibitum, inducat. *Alæ* rectæ & extensæ; in summitate recurvæ, nervosæ, paucæque carnis, magnitudinis tantæ ut eas Homerus, januis thalami compararit. *Pennæ* in iis sunt duræ & aliarum, Anserum inprimis & Columbarum permixtæ pennis easdem absumunt. Dum pulli excluduntur, inediâ albescunt. *Pes* dexter sinistro major, colore uterque difformis. *Ungues* adunci & recurvi, quos in incessu, intrò semper vertit; nisi solem aut prædam intueatur, perpetuò inspicit, & hebetatos, rostro, aut ad Lapides atterendo,

acuit, quique cum pullos nutriunt, invertuntur. *Alvus* propter cibi humiditatem mollior. *Fel* ærugineum, impensè acré & mordax. *Sanguis* crassus & fibrosus. *Stercus* tantæ acrimoniæ, ut nulli in Medicina usui esse possit.

Quantum ad *sedes* & *loca*, nec in insulis, parvis inprimis, (cum Rhodi in culmine domus Tiberii confedisset, portentii loco fuit) nec in locis propè *Maotidem* paludem, nec in extrema Scythia, & Sarmatia, ob aëris fortè inclementiam reperiuntur. In Caucaſo, Tauro, regno Peruano, Germania, Polonia, Britannia, Dania, &c. in quibus prædæ copia, eas invenias; & quidem locis *ἀπὸ τῶν* præsertim *ἐν πύλαις ἀποκρίμας*, *ἐν τῇ θέρμῳ* (de Pygargo & Morphno id sumendum non est) seu *πρὸς ἀσφάλειαν τῶν μὴ ἐνεδρεύοντων*, id est ut tutiores ab insidiis sint; seu *διὰ τὸ βραδείᾳ ἀφ᾽ οὐραίας τῆς γῆς*, quia difficulter à terra attolluntur.

*Nutritum* ipsis Carnes sunt, Columbarum, Anserum, Cygnorum, Gallinarum, Ovium, Cervorum, hinnulorum; ob sui à morbo tutelam, leporum, testudinum terrestrium, piscium, etiam & cancrorum: serpentum inprimis, seu propter odium, seu propter eam quam ex humido & frigido cibo capiunt, voluptatem. Sed nec à sui generis avibus iratæ & famelicæ abstinere. Cadavera tamen non tangunt, *Pernopte*rum si excipias. A meridie venari quædam incipiunt, ab orto sole quædam. In prædam conspectam, & injuriæ patentem (lepus in planis, testuno post coitum supina invaditur) velocissimè & tormenti instar (hinc *ἐξουβείας*) se demittunt, posteriore pedis digito feriunt, & occisam in nidos deferunt. Falluntur tamen interdum, quod in Falcone Scalig. Exerc. 237. Scaliger observavit: sed & à Polypo apicante in profundum detractas, *Ælianus* annotavit. *Potus* iisdem nullus, fortè quòd ad cum sanguis animalium sufficiat. *Visæ* ta-

Galen de Compos. Medic. f. l. lib. 4. Galen. l. 10. de simplic. facult. *Locus* Sueton in Tiberio. Strabon. Geogr. l. 7.

Arist. H. A. l. 9. c. 32.

Nutri-  
mentum.

Ælian. H. A. l. 7. c. 11.



men aquam bibisse, medicinæ gratia; & ultimo in senio, rostro præ siccitate incurvato, vitam aliquandiu bibendo sustinere coguntur.

Sexus.

Generatio.

De *sexu* Aquilarum dubitari non debet. Datur genus, quod propter tres testiculos, *Triorchis* appellatur. *Coëunt* vero frequenter; & foemina ter decies in die compressa, si mas revocet, denuò accurrit. Unde Ægyptiis & Venus dicitur, & soli dicatur. Commiscentur aliquando cum accipitre, sed ovis incubare non dignantur: sed & marem cum lupa aliquando coire, scriptores Africani referunt. Ovis majoribus XXX. minoribus XX. diebus incubant, & ad exclusionis promotionem lapidem ætitem; qui æstum ovorum ab incubatione contractum, utpote frigidissimus, temperat; & peculiari qua pollet vi partum accelerat, in nido deponunt. Duos plerumque *excludunt* pullos, quandoque tres. Exclusos solem adversos intueri cogunt, & invitos eidem obvertunt. Si fortè oculos vi splendoris inflexerint, aut nictatione obnubant, tanquam adulterinos abdicant; si immotis eum aspexerint, genuinos agnoscunt. Volatum affectantes, in altum sublato, dimittunt, sibi relictos, aut fortè dilapsos fuscipiunt, grandiusculos; logissimè tanquam rapinæ æmulos, à nido fugant, & ἐν τῇ τόπῃ τῇ περὶ αὐτῆς πᾶντὸς ἀπὸ λάρυγγος.

Sinesius in Dio-  
ne.Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 32.  
Volatus.

Quantum ad *volatum*, à meridie ad vesperam moventur; manè, quiescunt, donec hominum conventu fora impleantur. Tam sublimes rectâ viâ feruntur, & deorsum tanta mole corporis labuntur, velificatas alas modico caudæ gubernaculo advertentes, ut cæteras omnes aves superent, & vel ideò à Poëtis Altrivolantes ὑπερπτερά dicantur Tempore incubatus, & nutritionis pernecitas illa imminuitur, sed motustonicus perpetuo peculiaris manet.

Homerus  
Iliade o.  
Oppian.  
Cyneg.  
l. 1.  
Lucret.  
l. 9.  
Vox.  
Homerus  
Iliade μ.

*Vocem* ipsis clangere seu χλάζειν quidam, ut Homerus, & Author Philomelæ, tribuunt, qui reboatus quidam est propter strepitum gravem, avicularum motum obtundens: nonnulli penè mutas aut vix vocales, quod de tertio genere Aristoteles affirmat, tradunt. Pullos mutos esse constat, quod illis lingua humore quopiam tenellis impeditur. Sed de hoc inferius dicitur.

Sensus ex-  
terni.  
Plutar. de  
Homer.  
Aug. l. 2.  
de morib.  
Manich.

De *sensibus externis* non est quòd multa dicam, tam exacti est visus, ut sola contra rotantis jubaris lucem immotam teneat aciem; sola sublime ita volans, ut à nobis tanta luce difficile cernatur, latentem sub frutice lepusculum, sub fluctibus nantempisciculum, videre comperta sit.

Ingenium.

*Animam* ipsi olere certissimum est, propter quam contacta ab ea corpora facillimè putrescunt. De *ingenio* ac docilitate pauca

occurrunt. Callitrichum herbam in nidum suum contra noxia animalia ingerere affirmant. Subvenisse Aristomeni in Ceadam demisso; gratiam virgini Sestensi, & puero pro educatione, rustico pro lato contra serpentem auxilio, retulisse; infantem recens natum ab exitio servasse, apud Authores invenies. Inde pullos educatos ad leporum, vulpium venatum, descripto ab Aeliano modo, instituebant. Tales & Cublai Tartarorum Imperator habuit. Sed & Pythagoras aquilam ita mansuefecisse, ut certis vocibus sisteret & devocaret, Superodantem, dicitur.

*Inimicitias* gerunt cum Cygnis, (pugna apud statium descriptionem vide) Trochilo, Gruibus quæ ideo montum Taurum transmissuræ, lapillis vocem cohibent, & noctu transvolant. Ardeolis, Ciconia, Hierofalcone, vulturibus; Dracone & Serpentibus.

*Vita* quamvis falaci diuturna est. In senectute visus hebetudine, & rostri aduncitate tentatur; cum vero se illa gravari sentit in sublime fertur, inde, oculorum caligne solis calore dispersa, fervida, in aquas frigidissimas se dat præcipitem, quibus tertio immersa, nidum petit, & inter pullos capturæ aptos quasi febre correpta, cum sudore quodam plumas exuit. Oppetit ergò mortem non tam senio vel ægritudine, quàm fame, in tantum superiore accrescente rostro, ut aduncitas aperiri non queat.

Pausan. l.  
4. V. G.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 5.  
Ælian. H.  
A. l. 17.  
c. 37.  
Ælian.  
H. A. l.  
12. 21.  
Ælian.  
H. A. l.  
4. c. 26.  
Plut. in  
Numa.Antipat-  
bia.  
Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 1.  
Stat.  
Thebaid.  
l. 3.

Vita.

Rhodig.  
Antiq. l.  
7. c. 41.

## CAPUT II.

De Aquila in Specie.

## ARTICULUS I.

De Chrysaëto.

**C**Hrysaëtos Aquilæ genus à fulvo Colore ita dictum est. Aristoteles χυσαέτον, Albertus Herodium, Ælianus Aquilam stellarem, Pindarus Jovis alitem, Hesiodus Ægioped, &c. vocat.

Nomen.

Ælian.  
H. A. l.  
2. c. 39.  
Pindarus  
Lythio.  
Ode 4.

De *externa* ejus *constitutione* veteres hoc duntaxat, produnt, quòd maxima sit omnium inter cæteras aquilas eademque ruffa seu vulva aut subrutila (qui color interdum cum ætate mutatur) & oculis Charopos. Quæ Aldrovando à Ferdinando Medicæo missa erat, pendebat libras duodecim, coloris, in minutioribus totius corporis *plumis*, ex fusco castanei albis sparsim intercurrentibus maculis, paucis dorso, pluribus ventre, radicibus albis, in alis & cauda fusci, eò magis quòd majores pennæ, in cruribus ad pedes usque furruginei: *Longitudo* ei ab extremo rostro ad ultimam caudam, quinque dodrantum, à rostro ad extremos ungues, quatuor Spithamarum, & ultra.



## A R T I C U L U S II.

De *Haliæto* & *Melanæto*.

ultra. *Latitudo* expansis alis *Spithamarum* octo. *Rostro* quod palmam superabat aduncitas infra inferiorem mandibulam ad pollicem unum propendebat, *latitudo* plusquam duorum digitorum, *medii præsertim*, erat. *Color*, in acie nigrior, alibi. *Corneus* ad cæruleum dilutum tendens, fusco maculatus. *Oculos* habebat *Charopos*, quos palpebræ in uno quoque bine, *superne*, & *inferne* integebant, inter nictandum tunica quadam crassa, ab infra sursum exportecta, musculo conspicuo, cujus initium haud præcul ab eruptione nervi optici à cerebro erat, quamque palpebræ superioris loco à naturâ datam, & ad angulum internum inprimis collocatam, quod cutis capitis ob duritiem inpalpebras abire, nequeat, creditur instructa; ab angulo majori ad minorem, obducebantur. *Humor aqueus* in iis copiosus, *CrySTALLINUS*, *Sessilis*, utroque latere compressus, & solidus. *Lingua* erat humanæ similis, lata, extremoteres, versus radicem duobus utrinque ceu hamatis utrique appendicibus corneis armata. *Sinistri pedis posticus unguis* sex digitos in circumferentia longus erat, *dextri* quatuor, singulos digitos, quatuor semicirculares tabellæ, extremos propè ungues, integebant; maximo interiori excepto, quem tres duntaxat vestiebant. De *ingluvie*, *Oesophago*, *ventriculo*, consulat

Aldrov.  
Ornithol.  
.2. c. 2.

*Aldrovandum* qui volet. *Musculos* collum moventes anticos & posticos habebat duodecim, seu sex paria, laterales tres. In thoracis utroque latere tres; *Abdominis* quatuor paria; *Alas* moventes decem, *Scapulae* quatuor; *Ulnam* moventes, sex; eam partem qui carpo in homine respondet totidem, *crura* quinque, *Tibiam* octo; *Tibiam* & digitos, plurimos.

Nutri-  
mentum.

*Cibus* ipsi carnes leporum, gruum, *Anserum*, *Hinnulorum*, *Cervorum*, quos ex declivi præcipites agit; & *Taurorum*, quos magno & ausu & astu aggreditur: aliquando fame premente fructus, & fruges, ut hac in parte deceptus videatur *Aristoteles*, qui fruges etiam si in os ingeras respuere asferit, comedit.

Arist. H.  
A. l. 8. c. 8.

Genera-  
tio.

*Ova* ad summum tria ponit, si juvenis est & vegeta, ut plurimum duo, quorum alterum sapissime putre deprehendi testimonio acupum, per octennium nidum explorantium, *Albertus* affirmat, quæ de ovorum vel ab alterius generis *Aquila Crysaëto*, vel à *Chrysaëto* alteri *Aquilæ* suppositione scribuntur, dubia nimis sunt. Si duo excludit, alterum pullorum ejicit, seu nutritus difficultate, seu quia minus generosus apparet. Prædam nisi fame coacta sola minimè absumit. Impertitur avibus regiâ magnificentia portio, quæ ea sepe sectantur, adulatorum aulicorum ingenia exprimentes.

**H** Aliætos, Haliætos Phavorino, *Aquila marina* Latinis, *Nifus*, sed non recentiorum, *Ovidio* dicitur, *German.* Meer Adler.

Nomen & descriptio.  
Ovid. l. 8. Metamorphos.

Qui à *Bellonio* exhibetur, *magnitudine* est *Milvi*. *Caro* ei cinerea ad nigrum vergens, fibrosa. *Alarum* ad pedes duos Romanos, & digitos undecim extenditur longitudo. *Caput* album & fuscis lineis distinctum, *rostrum* aquilinum, *Oculi* in medio nigri, in ambitu aurei. *Lingua* ferè humana, appendice ad radicem utrinque instructa. *Colore* per summa *Asturis*, per ima albo, *Guttur* maculis ruffis notatum. *Pectus* purè candidum. *Venter* gutturi colore respondens. *Crura* crassa & squamosa. *Cauda* ad commoditatem volatus lata, *Pedes* fissi, hamati, cærulei. *Digit*i quatuor per superna ad dimidiam longitudinem squamosi, ad reliquam incisi, per inferna asperi & aculeati, tam validi, ut flexos vix ulla vi distendas.

Bellonius de Avib. l. 2. c. 8.

*Species Aquilarum* marinarum plures esse videntur, ex quibus, tum illa est *Bellonii* quam testas in cruribus & ungues omnino rotundos habere scribit: tum illa *Alberti M.* & *Anglorum*, quæ pede est uno anserino & natante, altero fisso & prædæ dicto; adipem in cauda gerit, quo guttatim in aqua dimisso, pisces attoniti, prædæ fiunt opportuni.

Differen-  
tia.

*Habitat* circa mare, littora & oras.

Locus.  
Arist. H. A. l. 9. c. 32.  
Nutrimentum.  
Ælian. H. A. l. 3. c. 45.  
Oppian. l. 2. Ixent.  
Aldr.

*Cibus* ei interdum columbæ, interdum aves marinæ; quas universas nunquam invadit, singulas cum emergentes observavit aggreditur, & immensas vel strangulat in humore, vel per summa corripit, sed piscibus præcipuè victitat, quos in sublimi inprimis natantes, in altum mare se præcipitans aquis pectore discussis rapit, & interdum pondere victa demergitur. Quod de adipe superius dictum, quia & testimonio fide dignorum nititur, & pari, in ardea pede in aquam demisso, pisces alliciente, exemplo comprobatur, fidem videtur mereri; & viribus narcoticis, quales, seu in torpedine, seu in opio, seu in spiritu vini sentimus, adscribendum est. Vixit quidam & quidem quietus ad septimum sine cibo. De ipsius *Ortu* mira *Plinius*, quæ quia mendo non carent, diligentius expendi debent.

*Fel* ipsius ad oculorum suffusiones & nubeculas cum melle mixtum prodesse scribit *Plinius*.

Ufus.  
Plin. H. N. l. 29. c. 6.

*MELANÆTOS*, *Aquila Valeria* *Hermolao*, *ἡλίουφάνης* *Aristoteli*, *ἡλίουφάνης* *Hesychio* & *Phavorino*, aliis *Hyperionis* avis dicitur.

Nomen.



Descri-  
ptio.

Minor est reliquis nigra, *rostro* adunco extremitate nigro cæteris corneo subcæruleo. Initium ejus supra narium foramina, membrana quædam transversim obvestit. *Vertex* ac *cervix* obscuro ferrugineo tinguntur; *Oculi* pupilla est nigra, iris charopa, & ex luteo rufescens. *Dorsum* ternis exiguis notulis albicantibus aspergitur. *Alæ* ad ultimam ferè caudam exporriguntur. *Crura* tota propemodum plumis operiuntur; quod nudatum est, id luteum, vix ad digiti unius spacium ad pedes patet.

Locus.  
Cibis.  
Arist. H.  
A. l. 9. c.  
32.  
Pugna.

*Degit* in sylvis & montibus. *Victitat* leporibus quos, sensim in terram delapsa, in plana digressos opprimit. Pugnatur tamen & cum cervis animose. Multum pulverem volatu collectum, insidens cornibus excutit in oculos, pennis ora verberans, donec præcipitet in rupem; sed & cum Dracone, Ova hic confectatur Aquilæ aviditate malefica: at illa ob hoc rapit, ubicunque visum. Ille multiplici nexu alas ligat, ita se implicans, ut simul decendant. Sola Aquilarum foetus suos alit, est liberalis, sola sine clangore & murmuratione.

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 3.

### ARTICULUS III.

De Pygargo & Morphno.

Nomen.

**P**ygargus, Gazæ Albicilla; Hinnularia aliis Melanæto & Morphno major est, at minor Percnoptero.

Descri-  
ptio.

Qui ab Aldrovando exhibetur, majusculi Gali erat magnitudine, *vertice* ac collo dilutè castaneo ex cinero. *Oculi*, pupilla nigerrima, iride lutea, *Rostrum* adunco, & paulo quam cæteris Aquilis, proportionem habita, longiore. *Dorsum* alarumque pars superior, ferrugineis obscurè plumulis ac subnigris integuntur, uti venter ac femora. *Cauda* ab Uropygio ad finem usque tota albicat: duæ tamen pennæ minores, majorebus incumbentes extremo nigræ sunt. *Tibia* totæ fere nudæ, impen- seluteæ, tabellis super intectæ. *Ungues* acerrimi.

Locus.

*Colit* oppida & campos, plana & lucos; sylvas & montes nonnunquam. Romæ rarò visam ex Symmachi epistotelis colligitur. Adoritur nervos, ut Melanætos, cum hinnulis; à dextro latere insilit, in oculos involat, & tamdiu alis percutit, donec præcipientes agat. Aëtitem in nidum infert, à quo & is nomen obtinuit. Sed in alendo foetu reliquis est difficilior.

Differen-  
tia.

Duplex illius *genus* Bellonius recenset. *Unum*, corpore colore inter album & cinereum ambiguo, extremis *alarum* nigris, supina parte tota candicans, quod Ardeam volatu refert; *caput* versus terram deprimet & perdicibus cuniculis, gallinaeis, & aliis minutis volucris, victitat, & ut plurimum Oriente & Occiden-

te sole conspicitur. *Alterum* Milvo regali adeo simile, ut nisi hic & minor esset, & ventre intensius albescente, (pennas circa Uropygium cum superioribus candidissimas obtinet) unus ab altero non dignosceretur. *Ungues* habet atros, crassos, & in fornicem curvatos. Insectatur alaudas per campos, & cum subbuteone de præda tam acriter certat, ut uterque alis & pedibus confertis in terram delapsus, sæpissime aucupibus in prædam cedat.

MORPHNOS, *πλάγγος*, *κλάγγος*, *Νεϊλοφόνος*, Nomen. & *πρεπνός* Græcis; Nævia, clanga, Planga aut Plancus, Anataria seu Avicida Latinis, dicitur.

Plin. H.  
N. l. 10.

Veteres eam magnitudine Melanætum superare, & nigro ac sub obscuro colore, qui tamen nævis quibusdam interstinguitur esse scribunt. Homerus alas ejus tantum patere, quantum valvæ ostii cujusdam viri divitis, cecinit. Ex te centioribus Aldrovandus nullam se vidisse cui omnia veterum competerent, fatetur. Turnerus apud Gesnerum, nomen hoc Balbusarde Anglorum, qui est Buteone major, nævo in capite albo colore fusco proximo; quique ad ripas degit, in terra inter arundineta super aquas nidificat, volatu non admodum valet, pisces & cuniculos dilaniat, adscribit. Bellonius avem falconem secuplo majorem, pedibus cæruleis digitis oblongis, Unguibus patulis, Gallis Gerfault dictam, & terrestri venatui adhibitam, pro Morphno, sed dubius, obtrudit. Saltus convalles & lacus *incolit*. Aquaticis avibus ut fulicis & anatis plerumque, sæpe & piscibus *victitat*. Spectanda dimicatio est, inquit Plinius, ave ad perfugia littorum tendente, maxime si condensata harundo sit: Aquila inde ictu abigente alæ, & cum appetit, in lacus cadente, umbræ suam nanti sub aqua, à littore ostendente; rursus ave in diversa, & ubi minime se credat expectari, è mergente. *Nascitur* ex Ossifragis si Aristoteli credimus.

C. 3.  
Descri-  
ptio.  
Arist. H.  
A. l. 9. c.  
32.

Locus.

Pugna.

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 3.

Morphno CONGENER Aldrovandus appellat aquilam sibi missam, cujus magnitudo galli gallinacei erat. Color totius ferrugineus, rostrum deorsum recta propemodum tendens, membranula lutea capiti conjunctum. Extremæ alæ versus ventrem maculis ovalibus insignitæ, remiges extremo apice albicantes. Crura hirsuta, & albis notis è bætico aspersa digiti superne squammis, inferne tabellis seu annulis intectæ.

Genera-  
tio.

### ARTICULUS IV.

De Percnoptero, & Ossifraga.

**P**ercnopteros, qui & Cypætos, vel Hypætos, Ægyptias, & Oripelargus dicitur.

Nomen.

Bre-



Discri-  
ptio.

Breviter à veteribus, diversim à Neotericeis describitur. Aristoteli est capite albicante, corpore, quam cæteræ dictæ majore, sed brevioribus allis, longiore cauda, vulturis referens. Aldrovandus binos ejusdem icones exhibet. Prior Chrysaëto non multo minor, habet *Corpus* coloris castanei ad nigrum vergentis, *rostrum* mediotenus rectum, extremo in uncum insignem curvatum, principio juxta frontem album, cætera nigrum. *Caput* subalbidum ad fuscum vergens. *Oculos* iride subalbida, pupilla nigra. *Collum* dimidia fere parte eaque superiore propemodum calvum, & paucissimis iisque exilibus plumulis consitum, candicans, ad cujus finem, medio prope collo instar pilorum quorundam hirsutorum ac crispiorum, plumulæ veluti setæ oblongæ supra cæteras, plumas extabant. In tergo veluti cucullus quidam, ad medium usque protensus in acutum finem, velut triangulum quandam definebat. Alter ignavus, colore pennarum totius fere corporis erat fusco ad castaneum obscurum vergente, quem in ultimo collo nonnihil albicantium ordo continuus, angulum acutum in dorsum exeuntem constituens qui veluti cuculli humeris inducti basis erat, distinguebat. *Capite* ad occiput usque; calvo, ita ut pennæ post verbum surrectæ, cuculli speciem exhiberet. Bellonius avem Gallis busard dictam, buteone majorem, coloris nigri, alis brevibus ignavam Cypaëtum vult esse. Gesnerus aliam ciconiæ forma & coloribus similem. Frigoris impatientem, corporis intense calidi, carnivoram, sed pisces respicientem, quæ quatuor horas uno loco sedebat, & solem aliquando splendentem intuebatur, si non Gypaëtum, ex altero saltem parente natum, credit.

Locus.

*Incolit* lucos & plana, ut plurimum, montes, quandoque, in Syria & Ægypto maxime invenitur.

Nutri-  
mentum.Arist. H.  
A. l. 9. c.  
32.

*Cibus* foli inter aquilas, cadavera. Gravis enim, & ad rapinam iners, à corvo cæterisque id genus altibus verberatus, fugatur, capitur. Muribus quoque circa Gazaram Ægypti urbem victitat. Pullos statim parere, Ælianus auditione se repecisse scribit. Avicenna fel ejus destillatum cum oleo violaceo ad aurium dolorem & tinnitum; simum ad abortum commendat.

Nomen.

OSSIFRAGA & Ossifragus, Græcis *φύνη* Aristoteli *φύνη*. Harpa quoque, Sanqualia, & Immussulus dicitur.

Descri-  
ptio.Arist. H.  
A. l. 8. c.  
3.

Aristoteles de ea. Ossifragæ magnitudo major est quam Aquilæ (Chrysaëto nempe excepto) Color ex cinere albicans. Parum oculis valet. Nubecula enim eos habet oblæfos. Quæ ab Aldrovando exhibetur, quatuor dodrantes & medium erat longa, novem, alis. extensis Spitha-

mas, lata, libras undecim pendens. *Plumæ* totius corporis, sub-albo, fusco, & ferrugineo colore variabant. Cutem proximè vestientes, molliculæ & candidissimæ erant, remiges ex toto ad castaneum tendebant. *Caput* & *collum* angustis & oblongis pennis rigeat. *Rostrum* ei duos digitos latum, palmarum longum, subnigrum, è Corneo fuscum, ab initio membrana quadam ultranavium foramina protensa, marginibus suis literams. exprimente tectum, ita aduncum; ut uncus solus pollicem latum adæquaret. *Lingua* humanæ simillima, lato apice, hamatis utrinque duris & corneis appendicibus, membranula tenui ad inferiorem mandibulam connexa. *Mandibula* inferior canalis instar excavata; palatum medio rimam quandam exhibebat per quam pituita à capite destillabat. De mento plumulæ tenues villorum instar, ad barbæ speciem quod ossifragæ Plinius tribuit propendent. *Crura* fuscis plumulis aliquantulum fulvescentibus fere tota obtegebantur. *Ungues* nigerrimi, præatorre splendebant, & semicirculum ad amussim repræsentabant. Substantia ipsorum intus alba & ossea, foris fusco cortice intacta erat. Duodecim *caudæ* pennæ albo & nigro maculabantur, intus albæ, extus fuscæ. Et hæc *externarum* partium ratio est. *Internæ* si attendantur, Uvea, quæ homini in pupilla perforatur, tenuissimam quandam membranulam pupillæ prætensam habebat unde, ut Philosophus notavit, minus visu pollet. Pars, quæ iridis ambitu clauditur, ne prorsus visio præpediretur, subtilissima, *ἄχρο*, & pellucida erat, *Abdomen* pinguedine copiosa redundabat. *Lien* illi rotundæ figuræ, *ventriculi* corpus membranofum, fundo superiori orificio latius, ingluvie carens, quod de sua ossifraga Plinius, cujus vicem Oesophagus, simul atque jugulum transiit, paulatim ad ventriculum usque dilatatus, gerere videbatur. *Vesica* fellis nullum cum epate consortium hoc sub ventriculo multo immersum erat adipi. *Uterus* crasso corpore, pyri forma, semine plenus. *Uropygium* medii pugni crassitudine, & adiposum conspiciebatur &c. Ad hujus genus Bellonii illa, quæ corpulentia colore & specie milvi est, duabus maculis nigris ad alarum latera notata, capite accipitris stellaris, cruribus & pedibus vulturinis, &c. non pertinet: sed illa quæ in comitatu Tyrolensi, colore accipitrum in dorso, in ventre albicante; orgyæ, distentis alis latitudine, rupicapras ex alto ad montes præcipitat, frustra ossium etiam majuscula deglutit; referri huc potest: ut & illa, quam Gesnerus, plumis albis, capite undo & flavo, Saxi injecta ossa confringentem, amici verbias describit.

*Cibus* ipsi Rupicapræ, Hinnuli, canes



Nutri-  
mentum.

Venatici, Anguillæ, cujus frustra in dissecto ventriculo inventa, tam acuti foetoris erant, ut spectatores in animi ferè deliquium conjicerentur.

Generatio.

Probè *fætificat*, ut pullos suos & Aquilæ, quos ista nido volandi facultatem adeptos, & edaciusculos, ejicit, nutrit, & abreptos *αγέει* deflet. Vultures minores ex iis progenerari, & ex iis magnos qui omninò non generent, scribit Plinius.

Arist. H.  
A. 1. 9. c.  
34.

Plin. H.

N. 1. 10.

c. 3.

Antipa-  
thia.

Lucret. 1.

5.

Vox.

Ufus.

Plin. H.

N. 1. 30.

c. 7.

*Pugnat* cum vipera, & fauciata, herba soncho simili, sibi medetur.

*Voces* alias alio in tempore jacit.

*Usum* si spectes, fel ejus cum melle potum leucen curat: stercus aridum tritum concoctionem promovet. Venter potus calculos pellit. Intestini extremum ad alligatum, colicam sistit. Os ad coxam suspensum, varices sanat.

## ARTICULUS V.

*De Anopæa, Aquila alba, Aquila heteropode & Scythica Ave.*

**A**NOPÆÆ fit in Homero Odyss. 1. mentio, quæ quibusdam est *ἀφανής* invisibilis, seu *ἀνοφερής* id est sursum evecta Alii *πανόπαια* scribunt, & hirundinem intelligunt.

AQUILA ALBA seu Cygnea, magnitudine est Chrysaëti, candoris nivei, in rupibus circa Rhenum invenitur. Leporum, cuniculorum, procellorum & piscium venatu vivit, & volatu tarda est.

HETEROPOS Gesneri, sinistrum crus cæruleum, dextrum fuscum albicans habet, de cætereo, pectus, collum, & venter fusca sunt, punctis nigricantibus maculosa. *Capitis* & cervicis pennæ rigent. *Oculi* subrubent, dorsi initium circa alarum summitates in gibbum attollitur.

Arist. H.  
A. 1. 9. c.  
33.

DE SCYTHICA ave ita Aristoteles. In Scythia genus avium Otides. Hæc duos pullos parit. Ovis non incubat, sed in pelle leporis aut vulpis impositos pullos relinquit. Observat in summa arbore an adsit qui pullos surripiat. Quod si quis ascendat, pugnat & verberatalis, ut Aquilæ. Olaus M. oculatus testis, utriusque historiam confirmat, quam Albert. M. falsi simulat.

NB. *Ad Aquilas pertinent Itzquantitli & Tla-coquantili Indorum, vide infra Mantissam. N. 1.*

## TITULUS II.

*De Vulturibus.*

## CAPUT I.

*De Vulturibus in genere.*

Nomen.

**V**ULTURIS nomine intelligitur, quæ Græcis *γύψ*, *γύπας*, *Οἰάρος*, *Αἰγυπτιός*; Lati-

nis etiam Vulturius, à tardo forsan volatu, & per periphrasin, Avis Titii, torva, avida, magna, Palatina, caucasea, dicitur. Lycophron eas olores rapaces, Hermogenes *τάφος ἐμψύχους*, seu sepulchra animata vocat.

Lycophron in,  
Cassandra.  
Descriptio.

Toto corpore Aquilam ferè imitatur, illamque, sesquialtera proportionem, si Bellonio credendum, excedit; nec tamen, quod in rapacium genere solemne, matrem foemina magnitudine superat. *Rostrum* ipsi obuncum, oculi truculenti; quatuor, apud Philen, narium spiracula, unde *τετραπύον*, quod fabulosum est. *Collum* implume, seu potius capitis plumæ ita breves, sicut Aquiles conferantur, ut implumes videantur. *Guttur* longitudine & capacitate, quod propendens ante ventrem ingluvies ostendit, igne, sub quo spaciū palmilatitude, non tam plumis quam pilis, ruffis, vitulinis simillimis, instar lenissimi cujusdam velleris, omni scapo calami destitutis, vestitur. *Alarum* incumbens corpori pars, leni tota vellere, quod soli inter rapaces peculiare integitur. *Crura* tota ad pedes plumosa, contra gelu & frigus munimentum. *Ungues* adunci.

*Sedes* in altissimorum montium jugis, poni, Aristoteles, Plinius, & Homerus sunt authores. Poëtæ Caucasas vocant. A recentioribus in Creta, Zazyntho, Apennino, monte Galliæ Aureo, visi sunt. Æstate in aprica, frigoris vitandi crusâ demigrant, & in Arabiæ desertis & Ægypti inter Cairum & mare rubrum planis, numerosos Bellonius vidit, quod iter illud Camelorum cadaveribus plenum, pastum ipsis suppeditet. Agricola in sylvis degere asserit. Juvenali nidulantur etiam in arboribus. In Creta & alibi in præcipitiis, montium mari imminetibus. Propterea Herodotus Brissonis Rhetoris pater ait, esse vultures in terra altera nobis ignota, eo argumento, tum quòd nemo vulturis nidum conspexerit; tum quòd magno numero repente apparent sequentes exercitus.

Locus.  
Arist. H.  
A. 1. 6. c.  
5.  
Plin. H.  
N. 1. 10.  
c. 7.  
Homerus  
Iliade 2.Agricola  
de sub-  
terraneis.  
Juvenal.  
Satyr. 14.Arist. H.  
A. 1. 6. c.  
5.Nutri-  
mentum.

*Vititant* morticinis & quidem solis, illi, qui cum Aquilis, Ossifragis, & Accipitribus nullam cognationem habent, sui generis volucres mortuas, si Herodoto Pontico credimus, ne attingentes quidem. Vivis etiam tum volucris (ruunt enim in anseres) tum quadrupedibus, illi, qui Spurii sunt. In Creta & Helvetia agnos, hædos, lepores, cervorum hinnulos; In Chile Americæ provincia pecudes, infestant.

Bellon. 1.  
de Avibus c. 23.  
Monard.  
l. de Aromat.

*Datur quoddam genus quod Torgos & Hæmatorrhophum dicitur.*

*Venantur* à meridie usque ad noctem, ab ortu solis ad illud tempus quiescunt.

De eorum *Sexu*, *Coitu*, *Partu*, & *Intubatu* Generatio non conveniunt Authores. Foeminas duntaxat



**Ælian.** taxat inter eos reperiri, **Ælianus**, **Orus**,  
**H.A. l. 2.** **Philes**, **Tzetzes** & alii authores sunt, vel si  
**c. 46. L.** **Auster** non spiret, ad **Eurum** ventum oris  
**r. Hie-** hiatu se pandunt. Spiritus ventī influens,  
**rogl.** intra quinque dies, quibus nec cibum nec  
**Phil. de** potum capiunt, ipsos implet. Tertio à con-  
**propriet.** ceptu anno, non ova sed pullos parere,  
**Animal.** **Geoponicorum** scriptor, **Philes**, & **Simo-**  
**Tzetzes** cattus produnt, intra centum & viginti  
**Chil. 12.** dies ova deponere, **Orus** & **Tzetzes**. **Ari-**  
**c. 439.** stoteles & **Plinius** nidificare scribunt. **Ni-**  
**Arist. H.** phus nidum in Italia vidit. Ille bina com-  
**A. l. 6. c.** plurimum ova ponere reliquit: hic ex  
**Plin. H.** **Umbricio Aruspice** tria. De tempore par-  
**N. l. 10.** tus nihil determinant, hoc interim à **Divo**  
**c. 6.** **Hieronymo** proditur, vulturem cum cœ-  
perit ova edere, quippiam ex **Indico** tractu  
adferre, nucis instar, intus habens, quod  
moveatur, sonumque subinde reddat. His  
veritas subscribere videtur; attamen cum  
**Aquilæ**, **ossifragæ** & **vultures**, ut ex **Aristo-**  
**tele**, & **Plinio** palam est, promiscuo coitu  
inter se utantur: faciliè ex diversarum spe-  
cierum avibus, tertia sterilis, ut ex equa &  
**Afinio Mula**, generari potest, quæ ob simi-  
litudinem cum vulturibus, quam **Aquilis**  
majorem, inter illos potius collocetur. *Edu-*  
*cationem*, si videas, apud **Orum** centum &  
viginti diebus pullis nutriendis infumit,  
alimento deficiente femoribus suis rostro  
vellicatis sanguinem ciet, ipsisque fugen-  
dum præbet. Apud **Albertum** verò un-  
guibus eos vulnerat, & de superfluo sibi  
cibo pascit.

**Ætas.** Extendit *ætatem* ad centesimum annum  
**Ambros.** Quantum ad *facultates & actiones animales*,  
**l. 1. He-** Oriente sole in occasum, occidente in or-  
**xaemer.** tum prospicit, ut apud **Orum** extat. non  
**l. 5. c. 20.** ultra maria tantum, sed per quingenta  
**Indor.** etiam millia passuum cadavera odoratur:  
**Orum. l. 2** seu quod instrumenti sit exquisiti & sicci;  
**c. 7.** seu quod copiosa ab integris quandoque  
**Ufus.** exercitibus exhalatio sit, seu quod eadem  
**Thom.** conglobata, ventis eodem deferatur.  
**Aquin. de**  
**Animal.**

**l. 2.** *Moventur* tardè propte corporis molem,  
**Com-** & volant turmatim.  
**ment. 97.**  
**Volatus.**

**Ingenium.** *Ingenium* exinde colligas, quod **Regio-**  
**Nicander** nes frigus evitaturi mutant. **Ægypto** non  
**in The-** minus, quàm **Ciconiæ** advenæ, quod ad  
**riac.** idem cadaver, à quo satiati, sæpius recesser-  
**Antipa-** runt, identidem redeant, expeditos ad bel-  
**thia.** lum exercitus præsentione quadam conse-  
**Aristot.** quantur: ac ut aliqui addunt, biduò tri-  
**in Mira-** duove, imò septenis diebus antè ea loca  
**bil.** circumvolent, in quibus cadavera futu-  
**Plin. H.** ra sunt, quod domi cadavera à veneno-  
**N. l. 12.** so serpente percussa fugiant, & hepatis  
**c. 53.** morbo laborantes magnarum avium jeci-  
**Ælian.** nora vorent. Suaveolentia adeò averfan-  
**H. A. l.** tur, ut ne armenta quidem mortua, un-  
**6. c. 46.** guento adorato illita, attingant; imò un-  
**Plin. H.** guentorum odore perimantur; perit &  
**N. l. 20.** mali **Punici** grano vultur: sed femine **Si-**  
**c. 5.**

ne **Siferis** **Cretici** vehementer oblectatur.

Inter ejus *morbos* sunt, Hepatis obstru-  
ctio, & pediculi, insectum venenosum, pe-  
diculo par, vel ei qui in inguine nascitur,  
persimile.

*Usum in medicina* partes ejus, magnum  
obtinent. Medicamentum ex integro ab  
**Aëtio** paratur, ad abscessus, condylomata,  
strumas. Cerebrum capiti vel naribus cum  
oleo cedrino illitum, dolorem ejusdem  
sedat. Cor pulli adalligatum adversum  
comitalem morbum prædicatur. **Serenus**  
jecur ad jecoris dolores commendat. **Fel.**  
**Opthalmicis** benè ex **Sammonico** admif-  
cetur. **Penna** pedibus subjecta parturien-  
tes adjuvat; sed nisi tempestivè auferatur  
in uteri procidentiam conjicit. Si dentes  
ea scalpentur, acidum anhelitum reddit.  
**Nidore** pennarum, si utantur, serpentes  
fugantur. **Pellis** ventriculo apposita con-  
coctionem egregiè juvat. **Nervi** ex cruri-  
bus & summis pedibus collecti, & ad talos  
ægri alligati, podagram curant. **Externa**  
si attendas, ex ossibus vulturis tibiae **Scy-**  
**thæ** **Anthropophagi**, **Malenchleni**, **Ari-**  
**maspi** conficiebant. E cruribus candela-  
bra quidam, quod ipsa, innatâ vi venenum  
explorare & attrahere crederent.

*Morbi.*

*Ufus.*

*Æt. l.*

*l. c.*

*124.*

*Galen.*

*Euporist.*

*l. 9. c. 91.*

*Lemn. de*  
*occul.*

*Naturæ.*

*c. 26.*

*Trallian.*

*l. 11.*

*Pollux.*

*Onom. l.*

*4. c. 10.*

## C A P U T II.

### De vulturum Differentiis.

**V**ulturum duo duntaxat genera **Ari-**  
**stoteles** agnoscit; at **Neoterici** plura  
esse observant.

*Arist. l. 7.*  
*8. c. 3.*

*Primum* est **Albicantius**, & parvum, quod  
in montibus **Rheni**, **Danubii**, **Helvetio-**  
**rum** circa **Clavonam**, apparet, in **Scythia**,  
& subjectis **Septentrioni** regionibus fre-  
quens est.

*Albert. l.*  
*de Ani-*  
*malib. c.*  
*8.*

*Alterum* **σποδοειδές** seu magis cinere-  
um, cujus pilos seu plumulas albas capilla-  
ceas & capillamentorum instar subtiles,  
adeò candidas esse **Bellonius** scribit, ut pel-  
lem subdititiam & elaboratam, mustelæ al-  
pinæ albæ, seu etiam vulpis albæ esse, quis-  
piam existimare posset.

*Tertium* **Bæticum**, quod **Aquilâ** paulò  
minùs habet pennas colli, dorsi, ventris,  
totiusque adeò corporis, castaneo colore  
tinctas, dorsi & laterum exiguas, & squam-  
marum instar latiusculas, quæ dorsum,  
ventriculum, ventrem, & uropigii radicem  
vestiunt, ruffas plumas verticis breviculas  
ac curtas, si **Aquillis** comparetur. Colli an-  
gustas ac longiusculas, quales gallis galli-  
naceis, & sturnis propendent. Crura bre-  
via, plumis undiquaque ad superiorum  
usque digitorum partem contacta.

*Quartum* **Nigrum**, quod est cauda brevi,  
alarum & caudæ pennise ejusdem cum **Bæ-**  
**tico** coloris. **Albertus** minus hoc, sed viri-  
bus præstantius scribit.

*Quin-*



*Quintum* Leporarium, rostro obunco, nigro, fœdis oculis, corpore firmo & magno, alis latis, cauda longa & directâ, collo- re in rutilo nigricante, quod ex vulture & Aquila compositum videtur, & illud quod Homero Albertus *melanocon* vocari scribit. Huic enim peculiare leporibus insidiari: & solus inter cæteros velox & ad docendum aptus est.

*Sextum* Aureum Gesneri, quod ita describit. Longus est à rostro ad extremam caudam sex dodrantes & paulò amplius, ad extremos ungues quinque dodrantes aut paulò minus, longitudo superioris ro- stri quantum illud aperitur, septem ferè digiti transversi. *Caudæ* longitudo circiter tres dodrantes. Tota *pars supina*, id est collum inferius, pectus, & venter & pedes quoque ruffo colore sunt, dilutior quidem caudam versus, rubentior versus ca- put. Digiti pedum fusco vel corneo colo- re sunt. Alarum penna longissima qua- tuor dodrantes æquat. Subnigricant seu fusco sunt omnes alarum pennæ uno ferè colore: parvulæ tamen supremæ in alis nigriores sunt, ut per medium aliæ subruf- fis maculis, aliæ subalbidæ circa imum di- stinguuntur, eo nigriores autem sunt, quo propiores dorso, ubi præ negredine splen- dent. Pennæ per medium dorsum nigræ sunt, splendentque in earum medio cau- liculi albi, præsertim quæ circa medium dorsum sunt, & dimidia colli parte, reli- qua enim colli pars, pennas ex albido ruf- fas habet. Caudæ pennis idem color est qui alarum, nempe fuscus. Hisce addit Albertus quoddam collo crasso, alisque ad dorsum valdè retortis & magno pectore, quod frequenter in ripis maris degit, & quod venatur, eò defert.

### TITULUS III.

#### De Accipitribus.

#### CAPUT I.

##### De Accipitribus in genere.

Porphyr. l. 4. de ab-  
stinent.  
Porphyr. ibid.  
Plutar. de  
Iside &  
Osiride.  
Ælian. l. 10. de A-  
nimal. c. 24.  
Strabo l. 17.  
Geogr.  
Herodot. in Euter.  
Porph. l. c. Diod. Sic. l. 2. c. 4. Euf. l. 2. de

**A**ccipiter vultures excipiat, avis cu- jus tanta apud veteres veneratio, ut & presagiendi post exactam hanc vitam vi pollere, crediderint: & legem qua capitis damnatur, qui cum etiam imprudens oc- cidisset, tulerint: tanta apud Ægyptios, ut ipsum Soli acceptum putarent, picto Osirim proponerent. Tentyritæ & Phila- rum incolæ sanctissimè colerent, interfe- ctum sepulchri honore afficerent, & in ur- bem Butim asportarent; seu quod ipsius substantiam ex sanguine & spiritu consta- re dicerent; seu quòd regionem à vene- natis animalibus eos repurgare cernerent; seu quòd Accipiter priscis temporibus li-

brum puniceis literis scriptum, in quo cul- tus Deorum forma continebatur, Thebas ad sacerdotes, detulisse crederetur.

Dicitur Græcis communiter *ἰεραξ*. Ma- cedonibus *παρὰς*, apud Lybias *πάσας*, Hesy- chio, *κερυκόν*, Tyrrhenis *ἀρακος*; aliis *μαρπυγῆς*. La- tinis Accipiter, seu à rapacitate, seu quòd ter sit acceptus. Unde & sacer ales voca- tur.

*Avem ipsam* si spectes, corporis ipsi *moles* incerta. Nonnunquam vix Aquilis cedit, in Ægypto minores quàm in Græcia, in regionibus Aquiloni obversis & rupibus, quia sanguine & spiritu abundant, majores. Major mare foemina, quòd in illo hu- midum ab immodico absumatur calore; in hac, sanguis cum moderato calore co- piosior, multum argumento materiæ sup- peditet. *Color* ipsis ut plurimum ex albido fulvo & nigro diversus, maculisque distin- ctus alibi, albi & leucophæxi reperiuntur, & qui in frutice spinoso aut acere habi- tant, ad ruffum aut nigrum declinant: qui in fago, ad gilvum seu pallidum. *Caro* est asperior, quàm cuculi, copiosioribus plu- mis integitur, quàm graviore aves, quòd superflua materia ad pennas admandetur, eorumque generationi serviat. *Rostrum* ha- bet aduncum extremo plærumque cor- neum. *Oculos* splendidos, unde Soli sacri, & perpetuò mobiles, quorum color cum ætate mutatur. *Cerebrum* copiosum, lin- guam latam, principio obtusam, nec bifida- dam, nec acutam. *Pectus* acutissimum, mo- dicâ carne munitum. *Alas* rapacium acu- tiores. Anhelitum foetidum, *cor* magnum, cuspide obtusa. *Lienem* adeò exiguum, ut sensum propè modum effugiat. Fel non- nunquam ærugineum, jecori & intestino adjunctum.

Si *loco* spectes, frequentissimi sunt, in Anglia, Suecia, Prussia, Livonia, Russia, quod istæ avibus tardioris volatus, & mul- tæ carnis abundant: minus frequentes in Syria, Persia, Africa, Græcia, & Cretâ. *Nidulantur* in præruptis & altis rupibus, in Alpibus imprimis, sed vel inter vepreta, vel in arboribus, acere imprimis, fago, quercu, abiete, pinu. Qui Massiliæ agros incolunt, humi foetificant, nec alibi nascuntur.

Potu omni, Tinnunculo excepto, absti- nent, si Aristoteli & Suidæ credimus: bi- bere Plutarchus, etiam postquam hominis defuncti corpus tetigerit, si affluentis co- piæ aqua invitetur, Gyllius, prodidere; quandiu viventium sanguis sedandæ siti sufficit, non bibere: si exanguibus vesci co- gatur, potare, credibile. *Cibus* ipsis aves, gallinacei imprimis & columbacei generis, Turdi, Fringillæ; Coturnices, Corvi, Picæ, Cornices; nobilioribus cancri & caro le- porina vehementer sapiunt: vilioribus etiam mures, ranæ, & talpæ; mansuetis quo-

præparat. Euangel.

Diod. l. c.

Nomen.

Descri- ptio.

Arist. l. 9. Hist. A. C. 28.

Athen. H. A. l. 8. c. 9.

Locus.

Homerus Odyss. l. 1.

Plin. H. N. l. 10. c. 8.

Nutri- mentum. Arist. l. 8. Hist. c. 38.

Suidas, in voce ἰε. Plur. de Iside & Osiride. Gyllius in Ælian.



quoque fruges & panis. Nec à cordibus, quod cum Aristotele, Plinius & Ælianus non credidere, teste Alberto & Aldrovando abstinent, quin cerebro è cranio divulso & absumpto, reliquum corpus involant. Nulli ad reliquias prædæ suæ revertuntur, dum sylvestres sunt; nec unquam cadaveri insidere visi: sed omnes interdum tam avidi, ut stercore præ fame deglutiant. *Venatur* autem Accipiter, non tantum Turtures; Gallinas albas maxime propter candoris insigne, Anates, Cornices, Sturnos, Picas &c. sed & proprium genus, quod præterquam Aquilæ & Olori, ut quibusdam placet, nulli aliarum avium cum eo commune est. Cuculus ab eodem absumitur, si quando una apparuere. sola omnium avis à suo genere in terempta. Leporem postquam cœpit, sinistrum pedem terræ infigit, dextro prædam retinet, & quam primum potest oculos ejus eruit. Venaturus solus volitat; præda conspecta humilis prope terram fertur, & omni conamine instar si primo nisi frustratur, persequi desinit, & sibi indignatur.

*Generatio.* Fœcunditate negata, quod humorem ad crura, ungues, pennas, & genitalia loca simul nequeat transmittere natura; *salacitatem* ipsi adscripsit antiquitas. Certe, & cum Aquilis cœunt, & Asteria cum Accipitre congregitur. Quoddam genus, cum in venerem ruit, minimarum etiam avium moribus patet: aliud, more hominum amatoria levitate flagrantium, fœminas semper sectatur; absentes clangore prosequitur. Ægyptii fœminam una die requisitam, quantumlibet secesserit, à marito vocatam, obsequi tradunt, & inde fœminas morigeras titulo Accipitris honestant. Tria ut plurimum quatuor aut quinque quandoque *ova* pariunt, & vicens diebus incubant.

*Ætas.* *Ætas* hujus avis in multos se protendit annos. Ægyptii ad septingentos pervenire, sed falso asseruerunt. Multisieriam infestatur *morbis*, nempe difficultate respirandi, & tum sonum elidit; aliquando oscitatur, & vomit: tineolis, & tum ipsi venter & collum glabescunt: cholera, in qua liquorem viridem evomit. Spongia, qua affectus, præter consuetudinem bibit, multum seditat, nec ex manu, nec expertica discedit. Febri, tum pustulas filigini similes in ore habet. Tineis; tum caudam, frequenter motitat. Suppressione alvi, tum crebro anulum perticæ admoveret, & excrementa nigra reddit. Intemperie frigida, & tum excrementa crocea aut cruenta reddit, alas autem remissas & laxas, capitis plumas horrentes habet. Pituita sicca; & tum liquorem per nares non emit. Gravedine, & tum ipsi liquor per nares, spuma per oculos elabatur. Tremore,

& tum pinnas ut struthiocamelus habet, & volare nequit. Plura apud citatum Authorem vide. *Vox* Accipitribus alia alio tempore, & generi. Apud Græcos verbo *ῥέειν* per onomapopœiam conficte, apud Latinos Pipandi exprimitur. Gallinæ si eam audierint, dum interim incubant, ovavittantur. *Visus* tam acer, ut nullo negotio adversos Solis radios intucatur. Hinc dicitur Aristophani παντίφθαλμος omnioculus. Cum Apolline, qui est sol, magnam convenientiam habere credebatur; & ejusdem imagine solem denotari Ægyptiis solitum.

*Volatus.* *Volatus* sunt velocissimi, & adeo celeres; ut vel ideo *ἰπποπόδες*, *ῥέειν*, & *ἰππικὸς πᾶσι* à facili motu dicantur; soli qui velocissimus sacri sint; & summam cum igne cognationem habere credantur. Ita sane se aliquando efferunt, ut humanum visum effugiant; nihilominus prædam inde visam, jaculo citius demissi, assequuntur. Peculiare illis & cum sola Noctua commune, in aëre sese resupinare, caudam deorsum, & alas expandere, his vice soli uti.

*Ingenium.* *Ingenium* ex parte attigimus, solitariam semper, præterquam tempore coitus volare; justæ magnitudinis cum vulpibus etiam, Aquilis, & vulturibus certare; in Thraciæ parte supra Amphipolim cum hominibus societate quadam aucupatum fuisse; in toto avium genere docillimam esse; avem sibi sorte sub noctem oblatam totam noctem sub pedibus tenere, ex oriente sole manumittere, obviam non persequi, tandem, succo Hieracii herbæ oculus tingere, sic claritatem pristinam recuperare, addi potest. De cætero, mortuum lugere, & in oculos ejus terram ingerere, noctuæ à reliquis avibus infestate auxiliari. Turturem deprehensam dimittere; unde Ægyptii, ne quando imprudentes avem ab Accipitre dimissam gustent, toto eorum genere in cibo abstinent, à Tinnunculo, crocodilo, & vite nigra sibi metuere, cum salvia, mentha, abiete & salice sympathiam habere; Authores quidam prodiderunt.

*Usus.* *Usus* si spectes, pulli suaves sunt valde, adulatorum caro dulcis & levis. Totus assus & in cibum sumptus, morbum sacrum; in rosaceo elixus, oculorum vitia, pulvis in quo se volutavit, lino rutilo agri collo alligatus, quartaniam, adeps oculis inunctus caliginem, oculi à collo suspensi tertianam; depellere, sed frustra creduntur. Stercus in veno dulci tritum, conceptum juvare; frumum vero ex eo, spolio serpentis, opoponace, myrrha, galbano, castoreo, sulfure citrino, & felle vaccino excitatum, & per fistulam in uterum exceptum, fœtum educere, credibile est.



## CAPUT II.

De Accipitribus in specie.

## ARTICULUS I.

De Asteria, Accipitre Palumbario, &amp; Fringillario.

Arist. lib.  
9.  
Hist. c.  
36.

**A**STERIAS, qui & Astur aliis, corpore est grandi & oblongiore, unde Palumbario comparatur, punctis & notis quibusdam stellas referentibus respergitur, hinc ipsi nomen. Capitis pars anterior extensa paulatim est in rostrum. Oculi varii & pellucidi: collum longius Aquilino. Femora longiora quam falconum, crura horum respectu brevia; & crassa. Pedes magni. Cauda ob longitudinem dependet. Est ex eorum genere, qui, quod emissi præterito pugno revocentur, Pugillares mansuefactariis dicuntur. Differentias sortiuntur Astures varias. A natura. Alii aut rupes mari adjacentes incolunt, aut flumina & aquas dulces sectantur, qui humilem prope terram volatum exercent, & clandestino astu prædam adoriuntur. Alii dissitis à mari locis delectantur, & ex excelsis arboribus prædam despiciunt, & infestant. A sexu, in quo foemina colore ad Aquilam accedit, nisi quod maculis densioribus & ruficis aspergatur. A magnitudine, quæ Astures ita commendat, ut in Syria aves quæ prædæ ac aucupio servant, ad pondus emantur. A loco, sunt namque Armeni, qui oculos habens virides: & si cum dorso nigricantes, optimi censentur; crura candida pedes magnos. Persis, corpus grande, plumis bene vestitum, oculi concavi, supercilia pendentia. Græcis caput grande, & raræ in collo plumæ. Africanus dorsum nigrum, oculi, in juventute nigri ætatis progressu rufescunt. Sardis pennæ nigrae, crura brevia, femora longa, pedes pallidi. Illyricis, sive Sclavis, statura mediocris, pennæ rubrae, majori ex parte prunarum candentium adinstar; pedes magni, femora ab interna parte plana, volæ manus instar æqualia. Alpinis corpus magnum, oblongum, pedes fere candidi, sufficiens ad leporum venationem robur. Germanis oculi iris & suprema capiti contingua rostri pars, crura, tibiæ & pedes, crocea. Pennæ caudæ nigris & canis iisque latis & obliquis maculis asperguntur; colli superioris & capitis rufescunt, & punctulis, nigris interstinguuntur. Carcani Astocellus, est forte Tardici & Bellonii Semi Austur.

ACCIPITER PALUMBARIUS, qui Græcis est *φαλασκούριον*, *φαλασκούριον*, & *φαλασκούριον*, seu columbicida, quis sit, certo dici non potest. Aristoteles meram nomenclaturam suppeditat, & simpliciter Accipitrem nominat. Ephesius à Nispho citatus, Falconem gentilem vulgo dictum ex eo facit. Alberto cum

Asture idem esse videtur, Turnero cum Fringillario idem. Aristoteli est Chalcidis avis magnitudine, & Carnivorus: Porphyrio omnium celerrime volat.

l. 3. de abstin. ab animal.

ACCIPITER FRINGILLARIUS Græcis veteribus *Συρίαια*, recentioribus *ἐκρυπτός*, corrupto forte ab Oxyptero vocabulo; Latinis Nifus, quod ei Alberti ni fallor primum ævo impositum est, sed non Ovidii, cui Nifus idem cum Haliæto, aliquibus Sparverius, ab Italorum Sparviero dicitur. Mas qui Muscetus vocatur, & fœmina minor est, quique ab Aldrovando exhibetur, rostrum habet breve, unco acutissimo præditum coloris cornei subcærulei. Oculi pupillam ochræ colore pallido, lutea iris excipit, quod reliquum est intentu flavet. Caput, collum, pectus, venter, crura albicant, & variis maculis distinguuntur. Dorsum & alas maculæ multæ albæ respergunt. Cauda nigris & fuscis maculis transversim ornata, eelique fere corporis longitudinem æquat. Pedes & tibiæ crocei sunt coloris. Fœmina, vertex, collum, dorsum, alæ coloris sunt obscure fusci. In Syncipite, & alarum medio, qua dorso incumbunt, alba macula conspicitur. Pars totius corporis prona, est candida, & transversis lineis luteis intersecatur. Degit tempore hyberno in sylvis cædis, earumque gracilibus. Non ante occidentem solem ad sedem suam revertitur. Plærumque adverso vento volat. In legibus Salicis de eo legitur, quod qui furatus fuerit, centum & viginti denarios persolvere deprehensus teneatur. Dividuntur ab Aetate, in Nidarios, Ramularios qui necdum plumarum deposuerunt exuvium & mutatos. A loco natali in Illyricos, qui ut plurimum lumbos, ac dorsum nigra abtinent, & vitam brevem agunt. Orientales quibus cauda duodenis pennis instruitur, Africanos quibus oculi nigri, pectus nigris & transversis maculis varium, alæ longæ. Tridentinos, qui sunt proceri, volaces, sæpe captas, alaudas in terram deorsum dejiciunt; mox sursum arripiunt. Vincentinos, qui aut in montibus Vincentinis nascuntur & omnes statura sunt exigua; aut in Mucrosticanis Spiranolis dicti, capite magno, reliquis minores, & ad aucupia inepti: & Ignotos, qui corpore mediocres, maculis ferrugineis ad rubrum inclinantibus, resperguntur. A colore Albos namque in Septentrionalibus oris reperiri, Olaus Magnus author est.

## ARTICULUS II.

De Circo Æsalone &amp; Timunculo.

**C**IRCUS Hesiodo *ἱρὸν κίρκον*, Homero & Aristoteli *κίρκον* simpliciter, Festo Circanea vel Circenda, forte, quod, cum insidiatur, circuitum in aëre faciat, dicitur. Si

Nomen.

Arist. l. 8.  
Hist. c. 3.



Descri-  
ptio.

Si descriptionem Bellonii sequimur, haud multo milvo minor est: *Capitis* vertex & guttur inferius ex ruffo albicant, plumulæ quæ auditus foramina tegunt nigræ sunt. *Rostrum* capiti continuum plumbeum est, extremum atrum, *collum* breve. *Crura* gracilia, lutea; falsò altero claudicare, Plinius prodidit.

Locus.

Galliæ est inquilina, & ibidem in Arvenia planis *nidulatur*.

Nutri-

mentum.

Plin. l. 10.

H. N. c. 8.

Arist. l. 9.

Histor.

cap. 5.

Ælian. l.

3 c. 45.

de Ani-

mal.

Homer.

in Batra-

choomyo-

machia.

Vox.

Volatus.

Homer.

Iliad. x.

Eustat. in

citati

Homeri

locum.

Odyss. v.

Nomen.

Nutri-

mentum.

Crescent

l. 10. c. 13.

Plin. l. 10.

cap. 8.

l. 8. Hist.

cap. 3.

Inimici-

tia.

Arist. l. 9.

Plin. l. 10.

cap. 74

Nomen.

Descri-

ptio.

l. 5. Or-

nithol.

cap. 6.

Cunniculos, vulpes, columbos, Turtures, Mures *insestat*. Bibit cum in maritimis versatur. Amariginem, lactucam sylvestrem, vel crocum nido imponere creditur.

*Vox* ipsi acuta, & clangere dicitur, idque tum facit, cum prædæ propinquus, de ea apprehendenda est sollicitus. *Volat* ingyrum, & quidem velocissime, hinc Homero *ἰαφρότατος, τέχνης, ἀγχιότος* Oppiano Equis Iberis velocissimis celerior

ÆSALO, qui Turnero Smerillus, Isidoro Merillus, Crescentiensis Ismerlus, Alberto Mirle, inter rapaces minimus est, & tum coporis specie, tum pennarum colore, Falcones refert.

Perdices & columbas *venatur*. Alaudas tam avide ut adclibanum usque ardentem, puteum, vel hominum vestes offendat, si peritia, & usus accedat, quatuor merilli, cygnum etiam dejiciunt. Solus omni tempore apparet, quod tamen Buteoni Aristoteles adscribit.

*Inimicitias* cum vulpe & corvo gerit, illius catulos interficit; hujus ova confringit. Corvi vulpibus auxiliantur.

**TINNUNCULUS** Gazæ aliquando Tristunculus, ut Italis Tristarellus, & Canibellus & Gavinellus. Græci *κρυχάρις*, *κρυχάρις*, & *κρυχάρις* quod multis milii instar punctis insignis sit, dicitur.

*Mas*, prout ab Aldrovando describitur, habebat, *caput* in summo vertice nonnihil compressum, coloris cum universaervice ad dorsi initium ferme cinerei. *Rostrum* statim deorsum molli declivitate tendens, unco isigni ac longiusculo, cujus pars capiti contigua fulvescit, media colore est cinereo, ad latera appendixerat, hemicycli forma. *Alas* & dorsum ferrugineis pennis notis atris distinctis; gulam, pectus, ventrem flavis maculis nigris perspersis vestitum. *Alas* oblongas, & quinque digitorum spacio ultra Uropygium extensas. *Caudam* maxima sui parte cineream, reliqui corporis longitudinem æquantem. *Fœminæ*, quæ major erat, *rostrum* brevius cum rostro magis recurvo, cinereum. *Dorsum* & alarum pars superior ferruginea ad rufum accedens. Pennæ extremæ dorsi cinerei coloris, & notis transversim fuscis obliquis utrinque in angulum medio scapo coeuntibus maculatæ. Habet Aldrovandus & Tinnunculum fœminam alteram,

cujus descriptionem apud eundem vide.

Nidulatur in altis ædificiis, muris, turribus & cavis quercubus, monedularum more, non super fronde, sed in latibulis.

Fœminas Mas semper sectatur, de absentibus dolet. Illæ supra quaterna *ovia* edunt, minii modo rubentia. *Pullos* tam diu alit, donec proprio volatu vevere possint.

*Vestit* papilionibus, Locustis, vespis, muribus. Inventus aliquando in nido ejus & serpens: sed & ipse in picarum nido cum pullis inventus est. Bibat annon dubium. Aristoteles raro & solum inter uncungues tradit. Ælianus & Suidas nullo potu indigere scribunt.

Cum columbis singularem colit amicitiam, cum Accipitribus aliis, etsi sui generis capitalam hostilitatem exercet. Ideo, Plinius. Avis, quæ Tinnunculis vocatur, cum columbis habenda est. Defendit enim illas terretque Accipitres naturali potentia in tantum, ut visum ejus vocemque fugiant. Hac de causa præcipuus columbis amor eorum, feruntque si in quatuor angulis defodiantur in ollis novis oblitis, non mutare sedem columbas. Fumus ejus albugines oculorum extenuat.

## A R T I C U L U S III.

*De Eubeone, Subbuteone, aliis Accipitrum apud Aristotelem generibus, & sacro Egyptio.*

**BUTEONES**, qui & à numero testibus Triorchis, Marcello, Millo dicitur, quæ ternam discriptionem Aldrovandus exhibet.

*Prima* sub nomine Buteonis ex montibus Vineolanis allati ponitur. *Corpus* erecti duarum Spithamarum erat. *Caput* habebat compressum, figura trigona. *Rostrum* nigrum membrana circa nares lutea vestitum. Iridem circa pupillam in oculis nigerrimam. *Collum* breve & plumosum. *Dorsum* ad caudam coloris ferruginei. *Altera* ex Gesnero sub Bushardi ut Sabaudis dicitur, maris cognomento, eaque duplex. Magnitudine prior magnam Gallinam referebat. *Caput* pennis fuscis integebatur: *Collum* brevissimum erat. Pennæ nonnihil ruffi coloris præ se ferebant; in ventre & pectore albicantes nigrisque plæræque maculis per medium insignes visebantur. *Testes* deerant. *Alteri*, circulus in oculis flavissimus iridem nigram ambibat, colore nonnihil à superiore variabat. *Venter*, latera & crura superius plumis albis vestiebantur, quas latiusculi circuli obscure ruffi per transversum distinguebant. *Testes* bini albi & pusilli ad spinam dorsi inter utrumque renem confederant,

Locus.

Genera-

tio.

Ælian. l.

2. de A-

nimel.

c. 43.

Arist. lib.

3. de ge-

ner. c. 1.

Nutri-

mentum.

l. 3 de

gener. c.

1. l. 2. de

Animal.

cap. 43.

l. 10. Hist.

Nat. cap.

37.

Plin. H.

N. l. 29.

c. ult.

Nomen.

Plin. l.

10. c. 28.

Descri-

ptio.



rant, in quorum medio particula teste minor & flava, testiculo proportionem respondens, viscebatur. *Tertia* est Bellonii sub nomine Guyrani seu Boudree. Huic rostrum est curtum, acie nigrum & hamatum, narium regio & rictus flavescent. Venter candidis plumis, quarum apicem macula nigra, juxta scapi medii ductum insignis, vestitur. Rectrices alarum plumæ, crenas instar ferræ exhibent nigras, ubi albere incipiunt. Caudæ color varietate Artaginis similis. Crura antica & postica annulis imbricata. *Quarta* est illius in quo dissecto tres testes inventi, & qui hætenus descriptis in omnibus fere conformis erat.

*Victus* ipsi ex herbis felarea, asperula seu alyso & Matrisylva; ex animalibus, mures, ranæ, rubetæ, lacertæ, limaces, serpentes, scolopendræ, erucæ. Erepta illi aliquando ab ardea & anguilla; inventa in dissecti ventriculo & talpa. *Volatus* est tardi, tam deses etiam, ut telo petitus vix ad tertium ictum cedere dicatur, ideo nullo negotio capitur.

*Usus.* *Usus* ipsius tum in *cibo*, tum in *Medicina*. Sane & in Balearibus insulis, & apud Arvernos Galliæ populos in honore mensarum est. Carnem quippe habet teneram, hyeme præsertim, & dulcem. Testiculi ex aqua fontis cum melle decocti ad venerem commendantur.

*SUBBUTEO* seu Hypotriorchis, quod nomen Aristoteles illis qui in Accipitrum genere latiores sunt adscribit, prout ab Aldrovando describitur, verticem habet ex cinereo & castaneo ad nigrum vergentem; ejusdemque coloris macula, uua à capite per tempora ad gulæ latera descendit; altera ab initio rictus sub oculis utrimque per gulam in longum protenditur. *Palpebræ* sunt subluteæ. Plumæ menti & gulæ totæ albæ, & color ille continuus, ad cervicis & verticis per tempora initium, quod minori oculorum cantho ex opposito est, perducitur. Pectoris totius plumæ, nec non & ventris medio macula fusca oblonga notatæ in oris albicant. In pedum *planta*, tubercula veluti calli ubique eminent. In nemoribus celsis & densis degit, & homines quos Perdicum vel Coturnicum venationi operam dare conspexit, ipsi insequi solemne est, ut aviculas Canum metu subvolantes arripiat. Sed hæc de istis sufficiunt: quid vero Aristoteles per Pernem, Percum, Rubetarium, & Levem, intelligat, disquiritur. *Pernos* apud Hesychium & Phavorinum genus venatorii est accipitris, ultra ignoratur. *Percus*, seu Percuus idem cum Fringillario propter alarum nigritiem, esse videtur. Aristoteles per Fringillarium, Nisum foeminam; per Percuum marem vulgo Maschettum dictum, forte intellexit. *Levis* quis sit ignoratur. Bel-

lonius Smerillum esse existimat. *Rubetarius* vel idem est cum Levi, quia de utroque Aristoteles. Abunde vivunt, & humivolæ sunt, vel Milvi species. Qui *SACER ÆGYPTIUS* Bellonio dicitur, corporis magnitudine Corvum refert, capite Milvum, colore ad Falconem sacrum accedit. In Ægypto est frequentior, quàm ulla alia Avis quæ raptò vivit. Rara in Syria conspicitur; sed & in Caramania aliquando. Serpentibus potissimum vescitur. Unde ei olim apud incolas tanta reverentia, ut illius vel per imprudentiam occisor, morte multaretur; ipsa mortua honorifice sepeliretur. Herdot. in Euter. p.

#### ARTICULUS IV.

##### De Lanariis & Collurionibus.

**D**E Lanariorum ignobili genere, Buteonibus rectius annumerando hic res est, de nobili inter Falcones agemus. *Nomen.* *Nomen* ipsi seu à laniandis avibus: seu quod plumas lanarum instar molles habeat. Aliquando Lanius Molliceps Falco albus, degener, & buteo albus dicitur.

Aldrovandus duplicem iconem exhibet. *Aldrovandus l. 5. c. 11.* *Prior*, accipitri palumbario magnitudine par, *vertice* erat lato, capite & collo crassis, omnibus uti & ventre, tota parte prona, femoribus uropygio, & cauda inferna. Inter oculi canthum majorem & rostrum, maculam habeat nigram, alas oblongas, longe ultra uropygium protensas, *tibias* luteas, & pro reliqui corporis proportionem valde graciles, easdem à poplite ad ungues paulo plus palmo longas, & culmo triticeo vix crassiores. Unguiculos uncos, sed tenues. *Alteri* lingua erat lutea & nigra. *Caput* & dorsum cum leucophæo fuscum, pectus totum leucophæum, ad anum usque maculis in longum ferrugineis distinctum. Alarum remigia ex sex ordinibus ratione coloris constare videbantur. Uropigium totum caudicabat. *Pedes* habebat luteos, femora plumis ad poplites usque vestita. Tibias erectas & instar stipitum. Ungues longos & admodum recurvos.

*Victum* ex muribus in agris quærit; sed & avium pullos, in nido, vel cum per terram volandi impotentes, reptant, rapit. Albert. l. 23. de Animal. c. 15.

*COLLURIONIS* de minore sunt Lanariorum genere; illique vel *Majores*, vel *Minores*. Ex *majoribus*, qui Æliano Merulæ venaticæ, Foemina est turdi mediocri magnitudine, è longinquo contemplanti tota cinerea. Capite ad reliqui corporis proportionem triplo majore. *Rostrum* habet parte superiore valde inflexum; inferiore sursum modice curvatum. *Linguam* in extremo multifidam, & in fibras acutas, & quasi capillamenta quædam desinentem. *Oculos* totos nigros. *Caudam* picæ similem;

Nutri-  
mentum.  
Bellon. l.  
2. de A-  
vib. c. 10.  
c. Arist.  
9. Hist.  
c. 1. Si-  
monid a-  
pud A-  
then.

Usus.  
Plin. l. 10.  
cap. 49.

Bapt.  
Portal. 3.  
cap. 34.  
Pythog-  
nom.  
Descri-  
ptio.  
Arist. H.  
A. l. 9. c.  
36.

Arist. l.  
9. Hist.  
c. 36.

Differen-  
tia.



lem; que explicata, corniculatæ crescentive lunæ imaginem exhibet. In Mare gula, pectus, venter, femora, cauda prona dilutius quam in fæmina albicant. Vertex & dorsum obscurius fuscescunt, plumulæ harum partium adeo sunt tenellæ, ut pili potius glabri ac leves esse videantur. Erat & alter totus albus, rostro, tibiis & unguibus exceptis. Interdiu semper fere arbori summæ aut dumeto insident: in Helvetia inter frutices spinosos, & confidentes caudam erigunt.

Nutritum.

*Victus* ipsis Papiliones, scarabæi, vermes, juli, erucæ hirsutæ, locustæ, grilli, quos, præda uberior si contingat, defectum penuria providi in aculeis & spinis arborum fingunt: inter aves Turdi, Fringillæ, Picæ sylvestres. Ossâ comminuta devorant, & famelici, tantos carnis bolos in gulam ingerunt, quantos rictus capere potest.

Generatio.  
Bellon.  
l. 2. de  
Avib. c.  
23.

*Nidos* ex musco, lana, fundos eorundem ex erica, componunt. Senos pullos excludunt, parentibus rostro, cruribus, pedibusque exceptis, quia plumularum radices ad virorem nonnihil vergunt, omnino dissimiles.

Vox.

*Voce*, cannum à longè auditum latratum, aut Noctuæ aliam appellantis ululatum referunt, & vocem Houin, quam sæpius iterant, exprimunt. Uniformis ea hyeme & autumnus; verè & æstate varias Avium modulationes imitati, eas ad se capiendas alliciunt. Capti in caveam inclusi, muti & elingues permanent. Hyberno tempore facile capiuntur. Nam avem caveæ inclusam invadunt, decipula decidente, intercipiuntur.

lib. 5. c.  
14.  
Collurio-  
nes minores.

*Collurionum minorum quinque genera* observavit Aldrovandus. Tria aliqua sui parte rubescentia: duo cinerea. Aviculæ sunt Alaudis paulo majores, duos palmos & pollicem circiter longæ. Omnes utraque rostri quod recurvum est, modice tamen parte, ternos pilos instar barbæ prominentes habent. Utrorumque pulli, antequam frequentibus integantur plumis, virescere nonnihil apparent. Tanta eis (expertus Bellonius) similitudo, ut difficillimè dignosci possint. *Cibus* ipsis forices, mures, lactæ, talpæ. Inter edendum, uni tibiæ insistentes, cibum pede altero sursum retractoprehendunt. Humilius volant, & prædæ inhiantes aliquandiu sese in aëre librando suspendunt. In cardius sæpissime quiescunt. Octonam aliquando, senam nonnunquam prolem excludunt. Rubore verticis qui insignes, in Italia inter delicatos cibos.

Bellon. l.  
2. de Avibus c.  
25.

## ARTICULUS V.

### De Milvo & Harpa.

Nomen.  
Plin. l. 9.  
c. 26.

**M**ilvus, quod vocabulum & piscem, & stellam in Septentrionali parte

significat; Græcis *ἰκτιν* Cretenfibus *ἀρπετ*, Oppian. l. 1 de Piscib. Hesychio si locus suspectus non est, *ἰκτιν* Ovid. l. 3. Falcor. Plin. l. 10. c. 10. eidem & Phavorino *σκιλ*, *ἰκτιν* & *καρα* *δελφιν*, dicitur. Plinio ex Accipitrum est generibus: Aristoteli inter carnivoras, sed vix rapacium nomine dignus.

Tria ipsorum sunt genera. *Unum*, *ἰκτιν* Aristoteli dictum, minus nigrum & robustum. *Alterum* majus, colore propemodum ruffo, infirmius. *Milvi regalis* nomine gaudet, quod à binis falconibus sacris in ipsum emissis, intra nubes etiam se condens, summa cum Principum voluntate in terram dejiciatur. Cui & Milvus palustris accenseri debet. *Tertium*, albidius & rapacius, Angliæ, & Septentrionalibus regionibus, in quibus nigredo & albedo in candorem vertitur, frequens.

Differen-  
tiæ.  
l. 6. Hist.  
Avim.  
c. 6.

*Descriptione* operosa opus non est. *Rictum* habet rectum, nulla marginum appendice à freno seu lateribus extremis ad unci usque initium. Intestino & hepatis fel ad junctum habere Athenæus tradit.

Et Bou-  
sati Sa-  
baudo-  
rum, qui  
maximus  
est.  
Descri-  
ptio.

*Loca* temperata Milvo sunt familiaria, nisi quod in Lybia, circa fontes Nili perennare dicatur. Ideo & insula S. Dominici, vicinoque mari multi, quibus bifurcata cauda, visi sunt: & in Anglia, nullo non anni tempore apparent, & quod spurcitiem in plateis & ad flumen Thamesin legant, lege ab omni noxa immunes sunt. Ideo hyeme adventante vel calidiores regiones Ætolii citius, quam Regales petunt, ibidemque hybernant; (sane ultimo Aprilis tot circa Pontum Euxinum Bellonius vidit, ut, si quindecim dierum spacio tot prætervolassent, hominum superaturos fuisset numerum crederet) vel in nidis ad breve tempus plumarum suarum vellere corpus à frigore tuentur: vel in quercubus aliisve arboribus carie exesis, coprus foveant. Ideo denique æstu accedente, calidas regiones deserunt, & in Europam, tardius tamen Ætolii, quam Regales revertuntur; & estu in eadem urgente supra nubes, quò radiorem solarium reflexio pertingere non potest, ideo nec æstus ita urget, elevantur, ibique aliquantisper hærent.

Athen.  
l. 8 c. 8.  
Locus.  
Herodot.  
l. 2.

lib. 2. c.  
28.

*Vivunt* carne animalium, pullorum imprimis gallinaceorum & anserinorum tam vivorum, quam mortuorum, & fructibus. In Ægypto in palmas devolasse, & dactylos comedisse visi sunt. Fruges respuere Aristoteles credidit. Bibunt raro, quia sicco cibo rarissime utuntur; & si quando, ex solis pluvialibus aquis, si Tzetzi credimus; à quibus tamen dum pluit, abstinent. Quod ad fenestras domum in Ægypto advolant, & in insula S. Dominici prope ad homines accedunt, in eorumque conspectu corpus à pulicibus expurgant, mansuetudinis est indicium: quod pueris cibum

Nutritum.  
Arist. H.  
A. l. 8.  
c. 3. Bellon.  
l. 2. de Avibus c. 2.  
lib. cap. 8.  
Arist. l. c.

Bellon.  
lib. 2.  
de Avib.  
c. 28.



## ARTICULUS VI.

## De Cuculo.

Plin. l.  
10. c. 10.Ovid. l. 2.  
Meta-  
morphos.Genera-  
tio.  
Arist. H.  
A. lib. 6.  
c. 6.

Vox.

Visus.  
Apulei.  
in Milefi  
ac.Inavi-  
bus.  
Volatus.  
Juvenal.  
Satyra 4.Bellon. l.  
2 de A-  
vibus c.  
26.  
Ovid. l. 2.  
de Amo-  
re.Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 10.Amicitia.  
Arist. lib.  
9.  
Hist. c. 1.  
Ælianus  
5. H. A.  
c. 48.Horatius  
in Epod.  
Plin. H.  
N. lib.  
10. c. 1.  
Ufus.lib. 5. c.  
16.

cibum è manibus, carnes abludentibus, pisces exenterantibus, pileos deambulantibus in urbe, nidulationis inprimis tempore, eripiunt, rapacitatem arguit: quod in Elide nihil ex funerum ferculis esculenti; nihil Olympiæ ex ara carniū Jovi sacrificatarum, auferre dicuntur, vel falsum est, vel timiditatis, quia turba præsens, argumentum præbet. Creduntur primo anno præ audacia nihil mortuum gustare; secundo præ metu nihil vivum edere; tertio fame interire.

*Pariunt* bina, magna ex parte, interdum tamen terna, totidemque excludunt pullos, post vicenorum dierum incubatum: sed qui Ætoliū vocatur (male Plinius Ægoliū vertit) quaternos.

*Vocem* si spectes, lippire vel jugere dicitur.

*Visus* ipsi satis acutus. Unde Aristophanes παντοφάλαγξ dixit.

*Volatu* & præstant, & in eo aliquid peculiare habent. Illud, tum quia intra nubila se recondunt, & indefesso labore maxima æris spacia emetiuntur: tum quia tanta velocitate se præcipitant, ut sæpe projecta in altum pulmonem bubulorum segmina, unguibus antequam in humum delabentur, arripuisse, visi sint. Hoc, tum quia ducunt per aëra gyros, unde Circææ, κυκλαῖσσι, & περιδύσαι, aves dicuntur; tum, quia immotis alis diutissime in aëre, motus tonici beneficio hærent. Scilicet, elata ea ex parte paulisper ala, unde subit aura, motum aëris in reliquum etiam corpus excipiunt, & ita sustentantur. Sufficitur lata in alarum vicem cauda, quam, prout res postulat, dilatant, constringunt, deprimunt, attollunt. Videatur, inquit Plinius, *artem gubernandi navium docuisse caudæ flexibus, in cælo monstrante natura, quid opus esset in profundo.*

*Amicitiam* colunt cum Harpa & Cuculo. *Inimicitias* cum vulpe, corvo, gallinis & columbis exercent. A solstitiis afficiuntur podagra, ideo tunc frequentius latent.

*Ufus* ipsorum apud pauperiores nonnullis in locis in cibo. In *Medicina* cinis cremati bibitur, contra Epilepsiam; testiculi ex aqua fontis, contra impotentiam; fimus, contra articulorum dolores, quod & vermes, qui ex eo XL. diebus in fimo macerato, nascuntur, faciunt, commendatur. De HARPA inter Aristotelem, Plinium & Oppianum non convenit. Gesnerus vulturem aureum Harpam Oppiani, quod sub mento plumas harbæ instar habeat, esse credidit. Aldrovandus Milvum palustrem opinatur.

**C**Uculus, quo nomine mons in agro Bononiensi, piscis marinus, herba, involucrum papyraceum, & alia veniunt, Græcis κόκκυξ, nomen à voce fortitus est. Accipitri apponitur, quod eum tanta similitudine referat, ut Aristoteles ætate hoc ipso creditus sit prognatus, & apud Gallos Falco cuculi parens communi proverbio dicatur. Plinii is videtur error. Nam Aristoteles, dum Cuculum ab Accipitre interim scribit, quod nulla avis in suo genere solet facere, accipitrini generis eundem non esse docet.

*Duo* sunt ipsorum genera, *Majus* nempe & *Minus*, quæ sola inter se magnitudine differunt. Nec est quod curiose describantur. Neque aduncis sunt inquit Aristoteles unguibus, ut Accipitres, neque capite accipitribus similes. Sed ea utraque parte columbos potius quam accipitres imitantur: nec alio quam colore repræsentant Accipitres, nisi quod isti maculis seu lineis distinguantur cuculi velut punctis. Cave tamen, illud quod de pedibus, extra aduncitatis defectum intelligas. Nec enim iis terni ante & retro unus ut columbis; sed bini antici & totidem postici, ut Picis, & nocturnis avibus, quod Antiquitati ignotum. Sed & id, quod de punctis dicitur, stricte sumendum est. Nam quos Aldrovandus describit, prona parte tota tam cinerei sunt, quam albi, lineis seu maculis transversim ductis oblongiusculis, fuscis, & interruptis interdum, interdum magis continuis distincti. *Crura* corporis magnitudini in iis non congruunt. Nam & femora brevia, & tenuia sunt, & tibiæ vix pollicem latum longæ. Juvenem totum nigricantem maculis subruffis per alas respersum, Aldrov. notavit, foramina narium in rostro multum eminebant. Oris pars interior flavi coloris erat.

*Loca*, si attendamus, ubique fere gentium reperitur, novum orbem, & Æthiopiam, si alvarezius fidem meretur, si exceperis. Æstate pro natura avis, in cujus nido parit, in arboribus, petris, & fluminum ripis degit: hyeme interræ, lapidum, & arborum cava se abdit, in iisque per totam hyemem latet. Auditam ejus latentis vocem fabulantur, cum truncus fornaci calefaciendæ immitteretur.

Cibus ipsi erucæ, muscæ, fruges; sed & carnes, si verum est, grandiusculos nutricis pullos, imo ipsam devorare, quod quibusdam creditum, quamquam exinde carnivorus esse negetur, quod nonnunquam Accipitri in cibum cedat. Hyeme dum latitat & implumis est, vel congestis & ibidem repertis vivere, vel hirundinum & urforum modo vitam sustentare, credendus est.

Quant.

Nomen.  
Athen. l.  
7. c. 27.  
Fernel. l.  
6.  
Methodi  
c. 20.Bellon. l.  
2. de  
Avibus c.  
29.  
Aristoteles H. A.  
l. 6. c. 6Differen-  
tia, &  
Descrip-  
tio.  
Arist. l. c.

Locus.

Nutri-  
mentum.  
Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 29.  
Arist. H.  
A. l. 6.  
cap. 7.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 9.  
Author  
de Natu-  
ra.



*Generatio.* Quantum ad *Generationem*, quia natura est frigida, majori ex parte singula parit ova, raro bina. Genus quoddam in petris *nidificat*; (sic Aristotelis verba sumenda sunt) reliqua in palumbi, alaudæ, luteolæ, sed curruæ in primis nido ovis jam facta, ova sua deponunt: seu, quod ob metum & ignaviam non fore tutam generi suo stirpem opinentur; seu quod propter frigidam corporis constitutionem, ex ovis pullos excludere non possint.

*Ælian. 1. 3. de Animal. c. 30.* De *ingratitude* in nutricem, non conveniunt Authores. Alii, negant, dum, vel avis eum duntaxat in cujus nidum sua importat, ova comedere, propria subjicere: vel deprehensa postquam adoleverint fraude, à nutrice relinqui; vel ad volatum firmos, sibi conscios ad parentem evolare; vel nutricem, seu viso cuculi, cujus ovum citius excluditur, pullo, tanquam eo contentam à suis incubandis desistere; seu exclusos, specie cuculi elegantiore captam (arripit hic cibos avidus, & pinguescit) tanquam superiores occidere, & in cibum cuculi pullo dare, scibunt. Alii affirmant dum, vel pullos nutricis ab iis vel conculari, vel cibo fraudari, vel ipsa inspectante absumi; & jam volandi, potentes, ipsam nutricem corripere credunt. Ut sit, hoc certum est, educare curruam subditum cuculum, adulterato factam nido.

*Volatus* ipsis brevis, interruptus, humilis, & ut hostem effugiant, instabilis. Ideo Milvorum scapulis, quo tempore adveniunt, suscipi putantur, ne per longa aëris spacia defatigati deficiant. Solent autem ineunte vere apparere; cujus adventantis primi post amphispænam sunt nuntii. Caniculæ ortu occultantur, post rarissimè cernuntur. Hyeme deplumes in cavernis torpent.

*Vox* ipsorum propria Cucu. hanc minus explanant, cum se abdituri sunt. Ad ultimum alibi Julium, ad S. Johannis, apud nos, festum, perfectam edit, si ultra, uvæ vix maturefcent.

*Inimicas* tum omnes fere aviculas præcipue cum ova pariunt, habent, seu quod illorum sint fraudis conscia: seu quod Accipitri per quam sunt similes: tum cicadas ex ejus saliva ortas, quæ eos frequenti agmine invadunt, & postquam sub alas irrepsere, moribus lancinant. Ideo sub ortum caniculæ, quo raucis.

*Sole sub ardenti resonant arbuta cicadis.* cantilenam suam abrumpit. De ejusdem cum Milvo amicitia superius dictum est, quod de paliuro in monte Coccygio à Plutarcho refertur, omne animal, solo cucule excepto quod infederit, tanquam visco retinente hære, non minus fabulosum est, ac quod de cicadis ex ipsius saliva natis dicitur.

*Morbi.* Inter corporis affectus referri potest, quod

hyeme deplumescit, pennas imutat, & simul colore immutatur. Exuvio deposito, corpus ejus scabrescit.

Ufus ejus, & in *Medicina*, qui cineres usti ad dolorem ventriculi valent; & in cibo, quia ejus pullo, qui jam volare potest, nulla avium suavitate carnis comparari potest, obtinuit.

## TITULUS IV.

De Falconibus.

## CAPUT I.

De Falconibus in genere.

**F**alconis ut avem significat, vocabulum adeo generale est, ut eo omne rapacium genus Authores incluserint; & Aquila, cum Theodotione & Symmacho, omnes quarum in venatu volatitico usus est, Falcones nominarint: Recentiores illis avibus à falcato unguium hamo nomen indidere, quæ Thuscis Campanis vernacula Capys decebantur, & à nobis jam describentur; nec tamen tam stricte, ut non quædam Accipitribus communia intercurfura sint.

Ad tres ipsos classes *Migratores* nempe, *Campestres*, & *Riparios* Bellonius redigit; ad *nobiles*, *ignobiles*, & *Hybridæ* seu medii generis, quod promiscuo generosorum & ignavorum coitu generentur, Albertus. Sub illis Falconem sacrum, Hierofalcum, Falconem montanum, peregrinum, gibbosum, album, rubrum, cynopodam arboreum, & lapidarium; sub *istis* Buteones, Lanarios, Tinniculos, sed perperam, comprehendit. Sub his, Germanos & Tundanos quidam enumerant, sed & hi omnes, ætate, colore, & corporis forma variant. Hinc *Hornotinorum*, qui eodem anno nati sunt: *Nidulariorum*, qui statim à nido domi adoleverunt, nec ita ut ramularii pencas producant. *Ramalius*, qui circa nidum ramulatim obvolitant; *Mutatorum*, qui vel deplumes sunt, vel plumam veterem cum nova jam commutarunt; nomina.

Quantum ad *descriptionem* exactam, In capite, dorso, superiore colli, ceteriore alarum & caudæ parte cinereus sit & subniger, in aliis passim partibus varius, & virgulis quandoque interruptus: sed primo anno secundus color rufus est, remissæ rubedinis, albescit deinceps paulatim, eo magis, quo pennas mutarit sæpius. Caput habet crassum, nec oblongum, nec strictum, superiore parte à rotunditate dificiens. Collum & rostrum breviter, maculas in maxillis nigras, circa oculos albas, oculos croceos ad rubedinem accedentes, pectus cum osse pectoris acuto & duro. Pedes patulos; creceos, & ad albedinem declinantes. Crura

Ufus.  
Plin. 1.  
10. H. N.  
c. 9.

Nomen.

Albert 1.  
23. de A-  
nimal.

Differentia.

l. 23. de  
Animal.

Descriptio.



Crura breviora. Coxas longas, & pennatas &c. *Morantur* in tota septentrionali plaga, & quidem optimi. Bosnia albos profert, sed & Orientis regiones haud malos. Degunt vel in altissimis montium verticibus vel sylvarum arboribus excelsis.

*Vox.* *Vox* ab acuto in graviolem flectitur.

*Volatus.* Mira quadam *volandi* ratione, in principio, medio, & fine venationis utitur. Ad prædam pergens celeri volatu in sublime adscendit, & rursus compositis ad petus, quibus icturus est unguibus; tanto impetu in avem obliquo volatu descendit, ut strepitum quasi concitati venti suo descensu excitet, in descensu avem percutiens, adeo longum vulnus infligit, ut à capite ad caudam usque discissa, aut toto capite truncata, nonquam in humum decidat.

*Pugna.* *Paræus l. de hom. & Anim. præst.* Cum Ardea ipsi periculosum certamen. Hæc enim ubi infra positam se videt, rostro suo prælongo ac acuto, quod prius absconderat, sursum elato, irrudentem ita excipit, ut eo semet Falco sæpissime medium petus induat, & ambo interdum illis interraneis humo affligantur.

*Morbi.* Cum multis sæpe *Morbis* conflictantur; Febri: Apoplexia, Apostematibus capitis, vertigine, oculorum suffusione, asthma, vermibus, podagra, pediculis, &c. *Antipathiam* cum illis gerit, tum Alauda, quæ in hominis manus, quam falconis unguem mavult incidere: tum Drepanis avicula lacustris, quæ auditis falconis tintinnabulis, tanto opere consternatur, ut malit lapidibus ab homine obrui, quàm volatu se in aëra attollere.

*Antipathia.*

## CAPUT II.

*De Falconibus in specie.*

### ARTICULUS I.

*De Falcone peregrino, sacro & Gyr Falcone.*

Falconum species superius exposuimus. PEREGRINO qui primum ob audaciam & generositatem locum sortitur, nomen ex eo est inditum, vel quod semper de regione in aliam migret, vel quod nidus ejus nullibi gentium inventus, fuerit.

*Differentia.* Quatuor ipsorum à colore *genera* posuit Carcanus, duo ab eodem Belisarius. *Unum* quod pennæ areum colorem præsefert, & in singulis pennarum capitibus ad coronæ modum albedine sigillatim distinctæ pennæ, quasi figuram ostendunt. Si excellere debet; Caput necesse est aliquantum in fornicem, vertice lenitur elevato ac rotundò, curvatum, cinereo colore habeat: simul atque volandi potens evasit, in rostri

parte superius plumulas quasdam, quæ veluti barbulae speciem gerant; ostendet. Gula lineis in longum ductis nigris maculatur. Supercilia & maxillæ admixto modico rubore albicent. Dorsum livescat. Alæ sint longæ in ultimam caudam recumbentes. Cauda longa, crassis pennis constans, in acumen paulatim desinens, femora longa, tibiæ breves, pedes colore inter flavum & plumbeum ambigente tincti, digitigraciles. Ungues magni, nigri & acuti &c. *Natales*, Sardinia, Ægypto, Cypro, Cretæ & Rhodo debet. Si qui in Italia vel alibi capiuntur, vi ventorum eo depulso fuisse creditum est. In Alpibus etiam nidulari, fide veteri cujusdam Falconarii, Albertus M. refert. *Alterum*, Nigrius, quod multis à priore notis variat, femora lineis transversim distincta, crura item colore croceo sed diluto maculata, gerit. Qui ex hoc genere ab Aldrovando describitur, verticem capitis habebat planum ac compressum, Rostrum membrana lutea intensi coloris, nares ambiente, capiti conjunctum. Caput, cervicem, dorsum, alas fusca, per singulas fere pennas maculis atris transversim per alarum majores resperse conspiciebantur. Gula ex albo non nihil flavescebat, parte sui infima, maculis veluti guttis nigris transversis distincta. Pectus, venter, & femora alba, lineis latiusculis nigris transversis variegata. Videtur hoc genus idem cum illo esse, quod Alii Nigrum absolute, alii Carbonarium & Falconarium appellant.

Creditur primo in montanis prope Babylonem visum, post in Salamine apparuisse. Nunc in alpibus & Pyrenæis *reperiuntur*: in Germania adhuc rarum est.

Utrumque rarius in *volando* alas movet, sic à montano distinguitur: & à sublimi in pronum velocissime descendit.

Adeo mites sunt, ut quandoque irasce nequeant; ad hominumque nutus magnitudine quadam animi potius, quam inedia venantur. Cretenses capiunt etiam Grues, Anates, Mergos, Tardas, Phasianos: Ardeas, in primis si cibi abstinentia inducantur. Si aquilam viderint nunquam inopsterum acupantur.

SACER, qui & Britannicus, Ælyus, & Aëriphilus apud Avicennam Falco Sacchari, vel Græcorum imitatione quasi Hierax Accipiter, per excellentiam dicitur, vel à corporis magnitudine viriumque præstantia, ita appellatur. Sane à Bellonio Accipitrum adjicitur numero. Tria ipsorum apud Tardivum *genera*; *Unum*, quod lepores & hinnulos; *alterum*, quod capreas parvas capit, *tertium* peregrinum exprimit, de quo superius.

In descriptione Albertus & Fridericus Imperator dissident, si Carcanum sequimur,

Aldrov. l. 7. c. 1.

Locus.

Volatus.

Ingenium.

Bellon. de Avib. l. 2. c. 14.

Descriptio.



mur, corporis ipsi statura plerumque oblongiuscula. Capite vertice plano canum. Rostrum cæruleum; Nares exiguae, pectoris, dorso, & alarum superiorum maculae fuscae, femora interiora alba. Crura pedesque tota fere coloris cærulei. Cauda maculis circularibus phaseolorum aut renum figuram exprimentibus varia, &c. Excellit, cui color rubicundus, rufus aut incanus, lingua crassa, pes amplus, digiti crassi, & colore cæruleo diluti.

Locus.  
Paulus  
Iovius in  
libro de  
legat.  
Moscho-  
vitico.

Inveniuntur apud Tartaros, & Moscovitas. In Polonia, quod Maximilianus Cæsar per suos exploratores comperit, in arboribus non ita proceris nidulantur. Cum versus meridiem victus quærendi gratia proficiscuntur, ab aucupibus adventus gnaris, in Ægei maris insulis intercipiuntur, & Venetias etiam à Creta afferuntur.

Nutri-  
mentum.

De victu scriptores inter se non consentiunt. Belisarius cadaveribus etiam vesci dicit. Tardivus cibos etiam crassiores facile concoquere scribit. Albertus delicate, eos cibandos, cibo semper recente, cerebellis, sanis carnibus, reliquit. Volacissimi sunt, nisi è nidis abducantur, & nubes etiam transcendunt. Capiunt Anseres sylvestres, Grues, Ardeas, Lepores, Capreolos. His insident, & cerebrum capite perforato excutiunt. In eorum conspectu ne Aquilæ quidem volare audent.

Descrip-  
tio.  
Aldro-  
vandus 1.  
7. c. 3.

Gyrfalco seu Gyrfalcus (male à quibusdam Herodius dicitur) qui id ab Aldrovando describitur, verticem habebat complanatum colore cinereo. Rostrum breve cæruleum, unco modico, deorsum incurvato, subcæruleo, instructum. Dorsum, alæ, venter, cauda alba erant. Verum tergi, alarumque plumæ pene singulæ nigra macula notatæ, quæ cordis quodammodo figuram æmulabantur. Alæ erant admodum longæ. Remiges prope extremum apicem nota majori ac longiori nigra ornabantur, quæ tamen albo claudebantur margine. Gula, pectus, & venter pura tingebantur albedine. Cauda erat breviuscula notis nigris transversim variegata. Pedum digiti oblongi, validi, late expansi, tabellarum continua serie per totum intecti.

Differen-  
tia.

Genera ipsorum à colore petuntur. Alii sunt, flavi, rubei, & cinerei. Albos etiam in Moscovia reperies. Qui in pectore albicant, magis etiam albi sunt, & primo anno dorsum partim albicat, partim subruffum, vel subrubeum est. Ubi vero mutati sunt, color ille subruffus in nigredinem permittitur.

Locus.

Paulus  
Venet. 1.  
1. c. 61.  
Mischov.  
c. 14. A-  
sianæ Sar-  
mat.

Locum ipsis natalem Norvegiam & Hiberniam Belisarius ponit: at certum in Tartaria quoque & Moscovia inveniri.

Vescuntur imprimis Columbibus, & id genus aliis: & postquam semel de aliqua ave gustarint: illa deinceps relicta, novam sem-

per prædam persequuntur. Aggrediuntur & Aquilas. Accipitres, Nisi, Falcones, nis advolantibus, prædam ulterius non prosequuntur, sed pavidæ persistunt. Si in quinque Grues libero aëris campo unus emitatur, non prius persequi desinit, quam singulas in terram dejecerit.

Nutri-  
mentum.  
Pugna.

Duo habent *peculiaria*. Unum, quod cum simul aliquot vehuntur, certo quodam senii ordine cibum capere soleant. Alterum, quod præter cæterarum rapacium morem, nunquam sese aqua abluant, sed sola arena utantur. Frigore etiam tantopere gaudent, ut perpetuo, aut super glacie, aut lapide, marmoreve algido stare gestiant.

Ingenium.

## ARTICULUS II.

De Falcone Montano, Gentili, & Tuncetano.

FALCO MONTANUS, quod sit magis reliquis indomitus per excellentiam ita dicitur. Caput habet vertice fastigiatum & nigrum, coronula quadam cinerea cinctum, cui in fronte non longe à rostro plumulæ quædam exiles, & capillares eminent. Guttur ad sternum usque nonnihil candescit, maculis conspersum majusculis, pectus reliquum versus inferiora, notis quibusdam; quandoque ferrugineis, nonnunquam rubeis, nigricantibus aliquando insignitur, quibusdam guttur & pectus nigris plumis vestiuntur, Dorsum ac lumbi majori ex parte plumis fuscis, minutis obteguntur. Aliqui eorum post medium dorsum, lineas quasdam albicantes, aut rubeascentes, quæ deorsum vergunt, habent. Crura & pedes plerumque crocei, vel ex flavo paleari flavescentes, & squammis densissimis integuntur. Mutatos facilius est cognoscere: & optimus est hornotinus fuscus.

Descrip-  
tio.

Non Anates solum, sed & Anates & Ardeas capit, & persequitur. Visus aliquando & Aquilam, quæ sibi prædam præripuerat, & seipsum interemisse.

Nutri-  
mentum.

Ponit & alterum ejus genus Aldrovandus, quod *Leucophæum* nuncupat. Corpus ejus totum cinerei est ad cæruleum vergentis coloris, pro diversa partium ad lucem obversione dilutioris obscuriorisve. Rostrum crassum, breve, nigrum, robustum, pollicaris crassitudinis, tam validum, ut vix ulli alteri fortius. Pectus valde teres ac grande. Diversum primo ab aliis Aldrovandus putabat: sed cum cum descriptione Montani apud Albertum conferret, & verò Montano, qui aliquoties plumas veteres cum novis commutavit, mediam partem dorso cæruleam affingi, & quo frequentius senectum exuit, eo tergum magis cærulescere, gulam cum pectore, abolitis, quæ distinguebant cum ætate maculis, albe-

Differen-  
tia.



albescere, observaret, *alterum* Montani esse genus conclusit.

Descri-  
ptio  
& Diffe-  
rentia.

GENTILIS per excellentiam propter generositatem ita dicitur. Frederico Imperatori alii sunt Gentiles *Peregrini*, alii *simpliciter* ita dicti. Illi Falconibus sacris sunt minores, & quo plus cum Gyrfalconibus participant, eo elegantioris esse formæ existimantur. Vertex *capitis* debet esse planus, occiput latum. *Rostrum* crassum, & recurvum. *Collum* breve, prope caput subtile; prope spatulas crassius. Habere debent *pectus* foris prominens, & carnosum, cavitationem inter pectus & collum magnam & profundam. *Coxas* plumis complurimis operatas, & sub genibus etiam dependentes. *Crura* crassa ac breviora, pedes amplos, digitos expansos & macilentos. Cum adhuc hornotini sunt. Alii sunt absolute fusci: alii rubris, nonnulli pallidis maculis ceu guttulis perornantur. Alii rufi sunt, aut simpliciter, aut ad nigredinem vergentes. Alii fulvi, vel absolute, vel cum quadam rubedine. Maculae à collo ad pectoris furculam parvae sunt, inde vero progressæ ad anum usque majores evadunt. Fulvis ad rubeum vergentibus, color est ex æquo permixtus. Laudabiliores in suprema capitis parte ceu corona quadam in circuitu perornantur; prope nares durities rostri virescit. Maxillæ sub oculorum parte subrubæ sunt. *Dorsum* fusco est colore, ac rubedinem inclinante, marginibus rubescentibus & majusculis sine guttis tamen exornatum. *Pennæ* alarum majores fuscae cum marginibus. *Cauda* ejusdem cum dorsi pennis coloris, modo quod margines in ea in plurimis sint pallidiores, seu quod à corde sit remotior; seu propter aliam causam. *Simpliciter dicti* trium eidem sunt generum, sicut & peregrini, de quorum datis notis quopluces obtinent, eo magis probantur. Aldrovandus eosdem cum Carcani GERMANIS facit, qui Peregrino forma, capite, rostro & pedibus sunt simillimi. Corona albicans caput ipsis prope collum cingit, femora interna plumis albis vestiuntur. Mutatis caput, collum, & humeri fusca sunt, dorsum cyanea tingitur. Mares seu Tertiarii à maribus Peregrinorum nulla possunt ratione discerni. In volando crebriore spissioreq; alarum motu utuntur. Rapiunt omne avium genus, Aquaticum præsertim, quod si è nido exemptus adhuc pullus ad hoc instituatur. Grues etiam capere audent. In eo solum Peregrino cedunt, quod non sola animi magnitudine, sed etiam cibi aviditate prædam invadere dicantur.

Bellon.  
l. 2. c. 8.

De TUNETANO inter Carcanum & Bellonium non constat. Ille corporis esse exigui, coloris perpulchri, capite flavo, alas nigro, peregrinos pedibus præsertim ita exprimere, ut multi fallantur, scribit.

Hic magnum esse, ad Lanarii similitudinem, plumis & pedibus accedere, diutius & constantius volare, capite crasso & tereti esse, strenue sublimem aëra scandere, reliquit.

### ARTICULUS III.

De Falcone Gibboso, Albo, & Gallorum Lanario.

FALCO GIBBOSUS, quod ei ob brevitatē colli, caput ante juga alarum dum eas supra dorsi latera componit, vix appareat, ita ut gibbum gestare videatur, ita dictus est. *Corpus* habet exiguum, planum collo fere continuum. *Caput* reliqui corporis proportionem magnum. *Rostrum* perbreve & rotundum, oculos flammeos. *Alas* prælongas, & valde exertas, in facie guttas. *Crura* proportionem cæterorum membrorum longiuscula & squammosa. *Pedes* in articulis digitorum, præcipue ad anteriorem plantæ pedem nodosos. *Nidulatur* in montibus inaccessis. Tam alte volat, ut hominis visum effugiat. In aucupio non statim inter descendendum percutit, sed potius cum à descensu rursum ascendere incipit, tunc posteriore ungula ante pectus disposita ferit, & quandoque tam fortiter, ut unguem sibi amputet, pectus lædat, imo seipsum aliquando occidat.

Descriptio.

Est & aliud Falconis Gibbosi genus, quod semper alas tanquam ad volandum extendit, animosius quam robustius. ALBO nomen color imposuit. Albertus eum in dorso & alis subalbum esse, alibi guttas valde albas aliis guttis subpallidis interpositas habere; & regionem frigidam, & humidam in causa esse, scribit. Addit, Falcone Peregrino majorem, & ad similitudinem Lanarii albi, qui per campos muribus insidiatur, accedere. Mittit eum septentrio, & ex illo in primis Norvegia, Suecia, Estonia. Non tam est in volando velox ut Niger: diutius tamen in avium persecutione perdurat. Non debet ad venandum emitte, antequam pennas mutaverit. Ad eum refert Aldrovandus quendam *Sparverium*, cujus descriptionem Roma acceperat, qui corpore toto colaris lactei, maculis flavis perspersi, rostrum habebat album magis quam cæruleum, alas candidissimas ac sine maculis, in cauda pennas duodecim candidas & flavis maculis conspersas: quarum conspectum pennarum præcipua & aliarum quasi tegumentum, tota candida, eripiebat, easdem quasi in vaginam recondens. Pendebat mortua tredecim uncies, pondus in ejusmodi avibus haud leve. LANARIUS (generosum intellige) GALLORUM dicitur, quod Rei accipitrariæ authorum testimonio, Galliae peculiaris & proprius.

Falco alius.

Aldrovandus  
l. 7. c. 10.

Ro-



Descri-  
ptio.  
Lanarii.

Rostrum & crura cum pedibus habet cærulea, plumas anteriores albo & nigro varias, maculis non transversis, sed plumas in longum distinguuntibus. Plumæ dorsi, alarum & caulæ, partem externam si spectes, non admodum sunt variegatæ. Extensarum interiora notis rotundis, instar exiguum nummulum per superficiem disseminatis, conspiciuntur. Sic à Tardivo & Bellonio describitur Xqua Galliæ est perpetuus, semperque tam hieme, quam æstate ibidem conspiciuntur.

Ingenium.

Ingenii sunt tractabilis, & ad omne aucupii genus idonei. Picas, Coturnices, Perdices, Cornices, Phasianos; imo Anates & Grues, si institutio accedat, capiunt, & societate maxime gaudent. Quoniam alis diutissime in æthere supra prædam suspensi hærent, tantopere Anates fatigant, ut & canum opera, & fustibus plurimæ occidantur.

Italici fal-  
cones.

Carcanus *Italicorum* meminit. Habent isti caput totum planum. Rostrum falconis, peregrini & montani rostro minus & cæruleum. Pectus flavum raris & ferrugineis maculis distinctum. Extremas alas veluti ocellis rotundis albisque pictas. Mutatis, caput universum ad humeros usque, flavo colore ad rubeum vergente, & lineis tenuibus distincto, tingitur. Pes, qui ante cæruleus fuerat, in luteum abit. Nascuntur in montibus Vincentinis & Alpibus, quæ Germaniam ab Italia dividunt. Solent alarum æquilibrium, in aëre sese diu admodum & frequenter suspendere, sic metu incusso, ne Perdices, Coturnices, aut Phasiani diffugiant, faciunt, rarer occisas in terram præcipitant. Visus aliquando qui & Accipitrem exanimaret.

#### ARTICULUS IV.

De Falcone Dapidario. Arbarario & Rubeo.

Aldrov.  
l. 7. c. 11.

**F**ALCO LAPIDARIUS recte Lethofalcus dicitur. Est mediæ inter Peregrinum & Gibbosum magnitudinis. In præruptis petris, & Alpium rupibus nidificat. Regitur & nutritur simili modo quo Peregrinus.

ARBORARIUS quem Gesnerus descripsit, rostro erat cæruleo, oculis nigricantibus, pectore albidis & nigricantibus maculis variegato; pennis alarum nigrioribus; dorso nigro, cujus pennarum margines infimos, muculæ ex candido ruffe distinguebant. An idem sit cum Accipitre Fringillario dubitatur. Nidum in arboribus exstruit. Rarus ipsius in aucupio usus; jucundum in conflictu cum monedula spectaculum exhibet. Adeo quoque placidus est, ut per sylvas & agros emissus ad dominum redeat. In dissecti ventriculo plumas & Cantharides reperit Gesnerus.

RUBEUS à guttarum seu notularum quibus distinguitur, rubro colore dictus est. Peregrino minor est, nec citius rubere apparet, quam alas exerat. Calor debilis in superficiem corporis effusus, & fumum humidum, quod ad generationem pennarum excernitur, adurens, rubedinis causa esse putatur. Invenitur in locis planis & palustribus. Phæniscos in Moscovia dari perhibent.

Albert.  
l. 10. c. 9.  
Gleichen.  
l. 23. c.  
12.

Volatus est agilis, sed non diu perseverantis. Nam penna rubea, quia mollior, non diu volandi impetum sustinet.

Volatus.

Facile cicurari, Albertus innuit, difficulter regi Tardivus. Post secundam aut tertiam pennarum mutationem melior, quod remittentibus per ætatem humoribus calidis, non parum temperamentum juvetur. Vita est minus quam reliqui longæ.

Ingenium.

Ad istum duos ex Indiis Orientalibus allatos Aldrovandus reducit, qui parte anteriore tota & alis internis adeo rubebant, ut qui pronos inspexisset, nihil præter colorem rubeum vidisset. Majorem putat fuisse foeminam; minorem, marem. Mares enim ob hoc ipsum Tertiarii dicuntur, quod tertia parte foeminis sint minores. Mentum in foemina, macula oblonga cinerea, quæ inferne desinebat, distinguebatur. Pectus quoque ejusdem coloris notulis anteriori sterno raris respergebatur. In mare color rubeus, saturatior & evidentior erat. Mentum nulla macula insigniebatur. Pennæ remiges interioris notis fuscis transversim frequentibus; statoque intervallo distinctis, albeant.

Alii.  
Aldrov.  
l. 7. c. 14.

#### ARTICULUS V.

De Falcone Cyanopode, & illis, qui promiscuo coitu gignuntur.

**F**ALCO CYANOPUS ad quod referri debeat genus, cum quatuor Falconum genera pedibus cæruleis instructa inveniuntur, difficile est dicere. Ad Lanarium tamen potius, quam aliam speciem pertinere videtur. Est Falconi Peregrino & magnitudine æqualis, & figura similis: sed in hoc differt, quod dorsum ejus, & exterior alarum pars minus nigredinis, & pectus plus albedinis habeat; alæ sint breviores, cauda longior aliquantum; pedes hyacinthini.

Aldrovandus l.  
7. c. 14.

Vocem acutiorem, quia humidior, Peregrino habet. Raro aves Pica, vel cornice majores invadit. Plerumque se præcipitaturus, propter metum loco manet, & suspenditur. Audacior evadit, si aucupis accedat præsentia. Qui in Helvetia reperitur, diversus est ab isto.

Vox.

Nidificat in excelsis juxta aquas, aut profundas valles, petris. Nidis exemptus mansue-

Locus.  
Aldrov. l. 7.  
c. 15.



fit. Capit Perdices, Columbas, Cornices,  
Anates, Phasianos, & Tetraones.

Aldrov. l.  
7. c. 16.

Falcones PROMISCUO COITU ge-  
niti, à Peregrinis plærumque proveniunt.  
Hi enim à parentibus statim expelluntur,  
& cum suæ speciei conjuges non inveniant,  
ad speciem alteram quam sibi simillimam  
invenerint, libidinis tempore convertun-  
tur. Carcanus ex altero parente Peregri-  
no, altero Montano procreatq̃s, *Falcones tra-*  
*versos* vocat. Albertus *quatuor* eorum genera  
ponit. Cæterum, si cum Falcone pedis  
curælei Peregrinus commisceatur, fere si-  
milis Peregrino generatur avis, si cum  
Lanario nigro, ignobilis Falco niger. si  
cum Lanario albo, similis Falconi albo, si  
cum Lanario rubeo, similis colore & figu-  
ra Falconi rubeo. Patrissant autem plæ-  
rumque, & ignobilitatem matris, insti-  
tutio post unum vel alterum annum com-  
pensat.

TITULUS V.

*De Psittacis.*

C A P U T I.

*De Psittacis in genere.*

*Nomen.* **R** Apacibus Psittaci subnectuntur, tum quod rostrum & ungues aduncas habeant; tum quod cicures, carnem etiam ipsam devorent. Nomen sortiti sunt, seu à Psittace urbe juxta Tigrim celebri, seu *Steph. de urbibus.* ἀπὸ τῆς τῶν ψιττακίων πόλεως. Soli virides Psittaci venteribus cogniti. Psittaci fructus, in intimo quoque cortice & tota nuclei carne, insolenter admodum eundem imbibit.

*Magnitudinem* si spectes , in regione cui nomen dedere , brachium cum dimidio longitudine explent. Visus Scaligero qui clathratæ fenestræ fere impleverat spacium. In quadam novi orbis regione Phasanos superant. in insula Banda , columbam nostratem vix excedunt. Alibi , Gallinis , Turdis , hirundinibus , imo Passeribus æquantur. *Color* quoque illis varius.

Scalig. In novâ Hispania, Æthiopia & ultima In-  
Exerc. dia, quosdam totos albos invenies. Circa  
59. sect. 1. Tarnassaram septuplici colore superbos; in  
Ternate Moluccarum una, Brasilia, & Æ-  
thiopia rubros: in quibusdam Æthiopix  
sylvis nigros; in Malabar, prassinos; scute-  
latis, purpureos; cinereos & cæruleos ali-  
bi. Bellonius magnos quosdam totos cane-  
re, mediocres ex rubro variegari, pusil-  
los nonnullos prolixa cauda, totos virides  
esse ait. Circa Javam, alii sunt rubri rostro  
luteo; alii versicolores, candidi quidam. Et  
quis omnes diversitates enumeret, cum su-  
pra centenos magnitudine & colore discre-  
pantes, curiosi observaverint. Antiquis so-  
lus in intimis plumulis & extimis pinnulis,

viror, notus erat. Unde Avis viridis dicebatur. Communia fere omnibus sunt. Caput prægrande, ingenii signum, rostrum, quod qua collo committitur, in solis inferne sub faucibus apertum est, adeo durum, ut ferreis clathris vix parcant. Statius cornu vocet: aduncum idem, ut eo, tanquam hamato & semicirculari forma constructo, se cum devolant, excipiat, illi innitantur, livioresque se ita pedum infirmitati faciant. Mandibulæ superioris, quod ipsis cum solo Crocodilo, & Thæmatopode si Opiano credimus commune, motus. Lingua quæ cucurbitæ seminis figuram repræsentat cæteris avibus latior. Unde *αὐθραπός, λελτ* dicitur. Pectus rotundum. Pedum species, quia ante & pone binos habet, rara; illos in regno Æthiopiæ interioris prope mare arenosum, si excipias, quorum quidam sex in pede digitos habent, quidam tres. Crura breviuscula, infirma, & plærumque fusca. Ungues adunci, quibus escam elevant, & ad os extrorsum convertunt. Capitis Anatomiam apud Al-drovandum vide.

Stat. l. 2.  
Sylv.  
Ovid.  
El. 2.

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 43.

Arist. l. 8.  
H. A. c.  
12.

*Locum* ipsorum natalem solam Indiam esse, veteres credidere. Tempore Alexandri M. in Taprobana primum inventi; Neronis, in Gaugada Æthiopiæ insula visi sunt; Diodori Siculi, in ultimis etiam Syriæ nascebantur. Avorum temporibus, terræ cuidam supra Caput bonæ spei, nomen ob copiam indidere. In regno Calecut tanta ipsorum est ubertas, ut Oryzam sæpissime depascantur; tanta in Occidentali India, ut Psittacorum regioni inde nomen creverit. Nec Nigritæ in regno Senegæ illis carent.

*Locus.*  
Plin. l. 10. cap. 42.  
Pausanias in Cor. Plin. l. 6. cap. 29.

*Victus* ipsis feris adhuc, frumenta, legu-  
mina, semen Carthami seu Cruci, quo  
pinguescunt; cum homopurgetur; fructus  
omnigeni, cum molli tum duro cortice  
intecti. Nux etiam myristica, ad quam in  
Insula Banda sæpissime advolant: Cicuri-  
bus, quicquid porrigetur, caro, panis,  
saccharum imprimis. Bibunt aquam, sed vi-  
num multo libentius, cujus potu non so-  
lum lascivi, & solito loquaciores reddun-  
tur, sed & humano inebriantur more, & in-  
tra bibendum; pedibus suspensi caudam in  
altum, & caput deorsum ad aquam exten-  
dunt. *Nidos* si Cadamusto credimus ex fur-  
culis ad tenellos procerarum arborum ra-  
mos pensilibus, pilæ modo rotundos, per  
quam exiguo foramine, construunt, ut ser-  
pentum insidiis viam præcludant. Maximi,  
gallinaceis haud minora ova ponunt, me-  
diocris columbaceis paria, sæcunditatis  
indiciu, ingens illorum in natalibus lo-  
cis copia; castitatis, quod bini semper,  
mas & foemina agere videantur.

*Volatus* ipsis in natali solo expeditior. In *Volatus.*  
nostris oris propter cœli frigidioris in cle-  
men-



mentiam minus eo valent, impotentiam, reptandi facilitas, qua sursum, deorsum, & in maximam altitudinem scandunt; ob congruam rostri & pedum conformationem, compensat. Illius unco, dum pedes promoveri nituntur, appensos sese sustinent; dum provolant, ne pedes ob corporis deorsum labentis pondus debiles offendant, sese obvio adminiculo apprehenso, eodem velut anchora & præsidio excipiunt.

*Vox.* *Vocem* articulata nullam naturaliter habent; quidam etiam fere muti sunt; nec quicquam unica illa voce Perroquet excepta, quæ in ipsorum nomen abiit, ingeminant.

*Amicitia.* *Amicitiam* singularem colunt, cum lupo, cum quo simul pascuntur; homine, unde in America relictis sylvis interdum prope domicilia agunt, & Turture, quod Ovidius notavit.

*Ingenium.* *Ingenio* prope ad hominem accedunt.

Accipiunt namque verba & pronunciant articulate omnia; facilius, si intra alterum ætatis annum docueris: segniores, ferro in caput verberantur radio. Non sentiunt aliter, propter duritiem, ictus. Sic Ascanii Cardinalis continuatis perpetuo verbis symbolum Apostolicum pronunciabat. Henrici VIII. Angliæ Regis in Thamesin delapsus auxilium implorabat, viginti libras promittens; extractus, quatuor denarios hospitatori suo dari iussit. Meditari eosdem Cardanus addit; Pherecides masculos, eos observare, & deferre, qui venena propinare moliuntur, & in domos important, refert. Quosdam circa Javam intelligere, & ad interrogata respondere, quidam narrant. Non facile crediderim. At pueros interdum imberbes amare; blande attritos libidine, ita ut oscula figant, tangi; quosdam pueros ita odio prosequi, ut in eorum capita de sublimi loco non aliter impetum faciant, atque Falco in Anatem; si inter lugentes agant, lamentari, quod Constantinus Manasses in historia Basilii Imperatoris testatur. Saltantes capitis gestu, depressis agitatique alis imitari, dubitandum non est. Fœminas nunquam aut rarenter humanas reddere voces, Tiraquellus reliquit. Virides macrouros, quibus collum torque rubro cingitur, annulo illo primum apparente, nil præterea discere quidam affirmant. Scaliger acceptas è via publicitus voces reddidisse scribit. In insulis vero S. Michaëlis & Divite simplicitatis tantæ esse, ut ad crocitantem Psittacum innumera, ex arbore in cuius ramis auceps latet, multitudo convolet, facileque se capi patiat, apud Martyrem legimus.

*Ufus* Psittacorum apud Occidentales Indos in cibo, apud Orientales olim, Æliano teste, sacri habebantur. Helio-  
gabalus

capita ipsorum in convivio exhibuit, iidemque leones, pantheras, & alia animalia pavit. Oblectamenti loco apud Romanos olim fuere. Nam cum Gallinis rusticis & Merulis in publicis ornatibus ponebantur. Viros Psittacos manu gestare M. Cato conqueritur. Articulatam ipsorum vocem in tantum eosdem miratos esse, Suidas author est ut eos Indi mercem fecerint. Unde caveis eburneis, argenteis, vel ex alia pretiosa materia factis includebantur. Indis pennæ ipsorum in magno usu. Ex his imagines varias, papiliones, flores, herbas, pileos & perizomata conficiunt; vestes, aulæa & tapetes contexunt; enses & clypeos exornant, aliaque utensilia miro artificio conficiunt. Sed de plumario opere alibi.

*De Psittacis vide quoque infra Mantissam N. 4.*

## C A P U T II.

*De Psittacis in specie.*

### A R T I C U L U S I.

*De Psittaco maximo Cyanocroceo, Maximo Psittaco altero, Psittaco albo cristato, & Psittaco viridi alarum costa superna rubente.*

**P**sittacus maximus Cyanocroceus in aula Ducis Mantuæ ab Aldrovando visus est. Magnitudine bene saginatum caponem exæquabat, ab extremo rostro ad caudam extremam bicubitalis. Vertex capitis erat planus & viridis, rostrum aduncum, in hemicyclum compositum, extrinsecus in perfectam dimidii annuli rotunditatem formatum, palmum longum, totum nigrum; superius longitudine duobus digitis, inferius excedebat. Oculos habebat albos & nigros, quos ternæ lineæ nigrae à rostro ad colli initium ductæ, figuram literæ S. jacentis representantes, in longum succingebant. Guttur veluti torques nigra ambiebat. Pectus, venter, femora, Uropygium, cauda inferior, crocea erant. Cervix superna, dorsum, alæ, caudæ pars superior, colore cæruleo vestiebantur. Qui apud Comitum S. Floræ erat, semel singulo die instante vespera bibebat, notis & familiaribus adblandiebatur. Æstivo tempore aquis se immergebat, aut pluviae donec totus maderet exponebat, à madore frigore correptus, ad solem se vel focum siccat, ex podagra mortuus est.

*Maximus Psittacus alter* apud eundem Principem fuit. Corpus ei non ita ut superiori crassum. Capitis vertex compressus, palmo longior. Rostrum quam superiori brevius, nec longo adeo hamo incurvum, tres propemodum digitos longum, & totidem,

Ælia. H. A. l. 13. cap. 18. Lampr. in Helio- gab. Vatro. 3. dereru- stica. c. 9.

Descri- ptio. Aldrov. lib. 11. Ornith. cap. 24.

Aldrov. 1. cap. 3.



qua capiti comittitur latum; mandibula superiore alba, inferiore nigra. Oculorum regio & tempora albescentia. Dorsum, alæ incipientes, gula, pectus, venter, femora, cauda tota superne, punicea. Remigum tegetes secundo in alis ordine lutei, puniceis marginibus, cæruleo velut ocello prope apicem ornatae, &c. *Psittacus albus cristatus* magnitudine erat columbo domestico par. *Corpus* universum candido plumarum Agmine vestiebatur. *Capitis* verticem habebat plumis grandiusculis, sesqui palmum altis, retrorsum nonnihil incurvis, acuto apice denuo antrorsum reflexis, candidis, denis, velut crista perornatum. *Rostrum* cinereum, ad nigrum vergens, qua capiti committitur naribus patulis pervium, ac harum medio tuberculo, quodam tereti clivosum. *Oculos* iride lutea, pupilla nigra. *Linguam* latam, rubicundam. *Caudam* in altum plumis dodrantalibus frequentibus, candidis, surrectam. *Crura* cum pedibus sublutea. *Psittaco viridi alarum costa superna rubente* pullastri anniculi erat corpulentia, *capitis* vertex luteus. *Rostrum* superius extremo nigrum, post subcæruleum, reliqua rubicundum; inferius vero album. *Oculi* iride croceo aut potius rubente, cincti pupilla nigra, corpus totum viride, parte quidem prona virore flavescente ac diluto, alis vero & dorso saturiore, & qui in maxima & extrema penna remige ad cæruleum nonnihil tendat. *Costa* superna alarum in tantum rubet, uti & cauda eaque breviuscula, parte inferiore ad latera, rubra in longum macula insignitur; superne vero flavescit.

## ARTICULUS II.

*De Psittaco poikilorincho, viridi melanorincho, Leucocephalo & Erythrocyano.*

**P***Psittacus poikilorinchos* magnitudine erat gallinæ minores. Corpore plæroque virescens, dorso obscurius, pectore & ventre, interlucente luteo, radicibus ubique cinereis, dilutius. *Rostrum* superius in parte superiore habebat ex viridi cæruleum; ad latera, colore ochræ, in cuius extremitate macula transversalis candida percurrerat; inferius circumcirca coloris plumbei in medio lutescentis. *Vertex* plumulis aureis ornabatur. *Remiges* parte exteriori, ventrem versus, initio virides, paulatim in colorem subcæruleum, seu amethystinum, purpureumve potius terminabantur; nigra cætera. *Secundæ* in ordine longissimæ totæ luteæ erant. Quæ mediis ferme alis conspiciebantur, ad principium latere exteriori, quod ventrem respicit, primum viridi, dehinc miniaceo obscuro, inde viridi, postremum apice ipso partem violaceo,

partim nigro vicissim variabant. *Cauda* duodenis instructa pennis, quarum quæ è latere sunt, utrinque quaterna, qua enascuntur; initio sui primum virides erant latere exteriori, luteæ interiori, inde rubeo, coccineove colore, tertio ordine denuo viridi, postremo luteo variegata. Reliquæ quatuor mediæ totæ virides, at fine sui nonnihil lutei habebant. *Pedes* plumbei, quaterni *digiti* bini ante, retro totidem, ut in Picis Martiis, interiores quidem exterioribus multo breviores. *Ungues* ut rapacibus adunci. *Tibiæ* brevissimæ, nempe inter poplites & talos, digitum longæ sed crassiusculæ. *Psittaco viridi melanorincho* collum, dorsum cum alis virore pleno tinguntur. *Costa* alæ, qua corpori adnectitur, extrema, coccineo rubet, penna in extremis alis, qua ventrem spectant, est nigra. *Uropygium* inferius coccineum. *Rostrum* totum nigrum. *Caput* & pectus lutea. *Psittacus Leucocephalus* ita ab Aldrovando describitur, &c. *Dodrantem* & digitum unum longus est. *Rostrum* duos digitos crassum, album: & pars capitis rostro continua item alba. *Oculi* pupilla nigra, iris ferruginea. *Vertex* & *frons*, quæ albeant, maculis nigris variegatae sunt. *Occiput*, collum, dorsum, alæ, uropygium supernum obscuro ac pleno virore tinguntur. *Gula* & alatum costa suprema rubore cinnabarinno. *Pectus* ac femora virent denuo. *Pars ventris* inter femora & pectus interjecta fusco subrubido, aut eo colore, quem pictorum vulgus terræ umbræ vocat, insignitur. *Alarum* latera pennas quasdam, quæ remiges tegunt, easque extremas cæruleas habeat, albo tamen nonnihil admixto. *Venter* postremus uropygio proximus lutescit. *Cauda* medio rubra, ad latera rubro & luteo; inde cæruleo variegata est. *Pennæ* pene omnes extremo apice nonnihil nigrescunt, cætera virides sunt. *Tibiæ* & *pedes* cinerei. Posset & hic idem ob multiplicem colorum varietatem *Psittacus poikilorinchos*, id est versicolor appellari. Est enim coloribus non paucioribus quam septem distinctus, quorum tamen præcipuus est viridis. *Psittaco Urythrocyano*, caput, pectus cærulea sunt. *Vertex* summus macula lutea insignitur. *Rostrum* haud ita ut prioribus grande, nigrescit. *Oculorum* regio albicat. *Pupilla* nigra, *Iris* fusca. *Ventris* latera sub summis alis lutea sunt. *Venter* viridis. *Femora* è viridi albicant. *Uropygium* luteum est. *Summum dorsum* dilute cæruleum est. *Alarum* tegetes viridi, luteo, roseo promiscue conteguntur. Sic remiges & cauda totæ roseo perfusa sunt. *Dorsi* extrema pars seu lumborum regio flavescit. *Caudæ* denique pennæ pauculae, eæque virides obtegunt. *Crura* & *pedes* cinereo imbuuntur, cætera roseo. Hic forte ille est, quem in Tarnasari urbe Indiæ pulcherrimum ac septemtempli

Aldro-  
vandus c.  
5.

Aldro-  
vandus l.  
II. c. 6.  
7. 8. 9.



ptemplici colore distinctum reperiri Ludovicus Patricius scriptum reliquit.

## A R T I C U L U S I I I.

De *Psittaco Cinereo*, *Erythroleuco*, *Torquato macrouro*, *Minore macrouro toto viridi*, *Erythrochloro macrouro*, *Erythrochloro cristato*, & aliis & Gesnero positis.

Aldrovandus 1.  
l. II. c.  
10. 11.  
12. 13.  
14. 15.  
16.

**P***sittaco Cinereus* ex Mina adfertur, & à potissimo partium colore ita dictus est. *Corpus* enim totum cinereo obscuro, seu potius æqualiter subcæruleo tingitur, remiges paulo saturiore visuntur. *Oculos* macula candida cingit. *Cauda* vix ultra extremas alas protenditur, & tota cinnabario colore tincta est.

*Psittaco Erythroleuco* magnitudo est caponis grandiusculi, corpus candidum, postrema tergi pars, uropygium, cauda tota, alarum remiges miniacei coloris. *Rostrum* unco quam in aliis longiore.

*Torquatus macrourus* solus antiquis cognitus fuit. *Caput* & corpus omne habet viridi. *Rostrum* minaceum. A rostro inferiori sub mento &c. *Minor macrourus totus viridis* in Hispaniola reperitur, nec totus turdo major est. *Rostrum* habet superna parte rubrum, inferna è rubro ingricans. *Iridem oculi* rubicundam & croceam. *Corpus* herbaceo virore amœnum. *Pedes* & *tibias* rubicunda.

*Erythrochloro macrouro* ex Japonia allato, corpus quatuor coloribus, quorum potiores viridis & ruber insignitum erat. *Verticem* habebat planum; *rostrum* rubeum, exiguum, & inferius etiam aduncum. *Retro* & ante *oculos* maculam cæruleam. *Caudam* corpore toto longiorem.

*Erythrochloro cristato* alæ, cauda ac crista, quæ sex pennis, tribus majoribus, totidem minoribus constabat; sunt rubri coloris, corpus reliquum viridis.

His adde *Psittacum Erythrocyaneum*, nec non *Erythroxantum* Gesneri; quorum ille, parte supina rubet, alis superius in flavo viridibus, cætero cæruleis; cauda partim rubra, partim cærulea, hic, illi per omnia similimus, in hoc tantum discrepat, quod per medium alarum plurimum flavioris coloris habeat, nonnihil etiam in cauda.

Huc etiam Aldrovandus Avem illam, quæ in Hispania capta, magnitudine erat fringillæ; rostro nigro, adunco; capite, collo viridi, vertice ut in Garrulo Bohemico crista insignito; alis cæruleis, extremo nigricantibus; uropygio ferrugineo; femoribus albis; pedibus nigris; digitis quaternis, binis ante, retro totidem; refert.

## T I T U L U S V I.

De *Corvino* genere, & aliis nonnullis *Avibus*, quibus *rostrum durum ac robustum est*.

## C A P U T I.

De *Corvo*.

**C***Orvus*, Græcis, seu à colore nigro seu à capitis magnitudine *κόραξ*. L. *Floro* *Satyra* avis, seu propter salacitatem. *Virile* enim membrum veteres Græci *σάτυρος* appellabant; seu à *Satyra* palude, quæ & *Promptina*, viginti quatuor olim urbium capace loco, dicitur. *Locus* ipsi post *Psittacos* vel eam ob causam datur, quod & ad rapacium naturam accedat, & olim apud veteres in tanto precio fuerit, ut per illum jurarent. Magnitudine *Cornicem* superat, & adeo est ater, ut præ nimia nigredine cæruleus quodammodo appareat, nec ab aquis mutetur. *Rostrum* habet aterrimum, nonnihil aduncum utrisque marginibus incidens; *Oculos* lucidos; *Linguam* in apice latam, ad radicem rotundam, nigram. *Visi* tamen in Septentrionalibus regionibus, Anglia, Neapoli apud Alphonsum *Siciliæ Regem*, *Lestorum Indiæ* extra *Gangem* regione, quin & tempore *Aristotelis*, albi; seu quod ob aspectum nivium in nivosis locis tales nascantur, seu quod frigus id efficiat, seu quod alimento id attribuendum sit. *Interiora* ejus si attendas, *gulam* patentiore prope ventriculum pro ingluvie habet. *Fel* renibus, & parte tantum altera intestino jungitur. *Excrementa* alba esse apud *Horatium* legimus. *Cuidam* vero apud *Livones* & *Botnios* generi, quod *marinum* dicitur, *rostrum* dentium fere instar ferratum, sed forte falso, adscribitur.

Quantum ad *Locum*, in Asia non nasci *Theophrastus* prodidit. *Locis* desolatis, humidis, excultis, turribus, celsis ædificiis, morari, nec ea, dummodo cibus suppetat, deferere; in agris uberrimis gregatim ferri, & ejus frequenti suo numero bonitatem, quam innata sagacitate cognoscunt prode- re, compertum. *Binos* per sterilem & infructuosum campum, nec non arctiora loca volare, quod non satis cibi pluribus, unde in *Cranone Thessaliæ* oppido nunquam plures duobus reperiri, à quibusdam notatum. In *Galliæ* oppido, quod *Corvatum* dicitur, annos plus, quam centem egisse, *Albertus* nescio, qua fide refert.

*Vivitat* corvus frumento, pomis, ficibus, cerasis, quæ cum pediculus deglutit, & dum binis è pastu, horis pulpam rejicit, ossa evomere solet; nec non vermibus, hinc aratoris vestigia rodit; piscibus, unde apud *Anglos* lege sub gravi multa cautum, ne quis

Descri-  
ptio.

In Histor.  
Val. Cor-  
vini.  
Rhodig.  
Antiq.  
lect. l. 29.  
cap. 25.

Aristoph.  
in Avi-  
bus.

Scalig. ad  
lib. 2. de  
caus.  
plant. c.  
17.

Olaus  
Magn. l.  
19 cap. 8.  
Aristote-  
les l. 5.  
de gener.  
cap. 5.

Arist. H.  
A. l. 2. c.  
ult.  
Arist. H.  
N. l. 2. c.  
15.

Locus.  
Plin. H.  
N. l. 10. c.  
29.  
Esa. c. 34.  
Theon. in  
Aratum.

Æl. l. 2.  
de Anim.  
cap. 48.  
Arist. H.  
A. l. 9. c.  
31.

Nutri-  
mentum.  
Athen. l.  
13.  
Aldrov.  
Ornithol.  
l. 12. c. 1.  
Bellon.  
lib. 6.  
de avib.  
cap. 1.



quis vim corvis inferat, cadaveribus, quæ si non attingit, infecta esse conjiciuntur. *Quin* nec à vivis animalculis abstinet. *Alaudam* & passerem devorasse visus est, pullos vero alimonia destitutos, parentem ipsum invadere, & devorare *Ælianus* author est. In *Bothnia* non tantum lepores & cuniculos interimant; sed agnorum etiam & arietum stragem edunt. Constitutum è publico præmium, qui eos occidissent. *Potus* est vehementer appetens. Tradendum putavere memoriæ quidam, visum corvum per sitim lapides congerentem in situlam monumenti, in qua pluvie aqua durabat, sed quæ attingi non posset, ita descendere paventem, expressisse tali congerie, quantum potaturo sufficeret. *Æstivo* tamen tempore sexagenis diebus, dum ficus maturescunt, non bibit, seu quod, nisi *Hyginus* fallit, guttur pertusum, dum ficus maturescunt, habeat; seu quod eo tempore relaxatione alvi se laborare sciat.

*Generatio.* *Generationem* quod attrinet. Ore coire vulgus prodidit, inde fellatorum ipsis noman, sed falso. Nam & vulvas habent, & ova juxta septum, nec cogitare quomodo semen per ventriculum, qui semper quod injectum est concoquit, perveniat, absurdum est, & visi duo *Avicennæ*, qui aliorum congredebantur more. Rostorum sit inter eos ante coitum conjunctio, seu ut alii, cantu prius quodam velut hymenæo demulcentur foeminae; tum mares admittunt, hinc exorta fabella. Ponit bina, sæpe quaterna aut quina ova, post viginti dierum incubatum pulli excluduntur. Exclusi, forte quod color ipsis sit albicantior, negliguntur à parentibus, & ad septimum diem, quo atrocem induunt, seu coelesti rore, ut *Cassiodorus* credit, seu à muscis prætervolantibus aluntur. Agniti recipiuntur in curam, donec firmiores evaserint, mox pulsi, quæ sunt ad vivendum necessaria inquirunt. Circa *Cranonem* tamen singula perpetuo paria degere, & genitores soboli loco cedere *Plinius* asserit. *Ætatem* eis longævam *Hesiodus* tribuit, fabulose si *provenit* pro centum sumas annis; verisimiliter si pro uno, intra quem & omnia, quæ terra profert perficiuntur, & ipse homo in utero: Sic longævitas intra *CVIII.* annos consistet. *Vox* eidem minime sonora, quamvis cantare *Plautus* dixit, quia crocit, raucedine & stridore aures offendens; hanc seu propter diversos effectus, seu imbrum & ventorum instantem incursum, ita mutat, ut *Fulgentius* sexaginta quatuor diversas habere dixerit. *Odoratu* cum vulture fere certat, in *volatu* tardior & gravior est, ideo non mirum aliquando populi clamore dissono gravius ictum, *ἀσπίρ, ἐμβρόντιον* decidisse.

*Mores* & *ingenium* admirationem merentur. Ad trigessimum & quadragesimum

una viventes, conjugii jura servant, uno defuncto alter per vitæ reliquum viduus permanet. Nummos quidam *Erfordiae* furabatur, & sub lapide abscondebatur. Alter *Augustum* ex *Actiaca* victoria reducem, verbis, Ave Cæsar, victor, Imperator, salutavit, viginti millibus seu *D.* aureis solatis emptus. Quidam sub *Tiberio* Principe singulis matutinis in rostra evolans, in forum versus, *Tiberium*, deinde *Germanicum* & *Drusum* Cæsares nominatim, mox transeuntes *P. R.* salutabat. Occisi funus innumeris elatum est exequiis, interfectus, qui occiderat. Taceo illum futoris, Cæsarem salutare edoctum, in quo opera & impensa periisset, nisi operam & impensam periisset, eloqui potuisset. Nec non illum, qui *Cunradum* coquum in fame implorabat, adeo expresse ut ab homine vocatus crederetur. Difficillimum elementum, optime exprimunt. Venatici (primum *Ludovicus Gallorum Rex* instituit) perdices & corvos feros venantur. *Phasianos* aliquando.

*Amicitiam* naturalem colit, cum lauro, quem depasto *Chamæleonte* comedit, cum asaro & aro; quibus remediis in quibusdam morbis utitur; cum salice *Americana*, qua tanquam amuleto nidum munit; cum *Coracio*, qua vim toxici degustati frangit; cum *Oenuta* qua se ad ebrietatem exhilarat.

*Inimicitias* autem gerit, cum *Milvo* & *Pernoptero*, propter cibum, cum *Æsalone*, propter ovorum fractionem, *Chamæleonte*, *Circo*, *Turture*; & aliis. Cum *Erucae* semine, quo interit.

*Tempestatem* plenam præfagiunt, si cum singultu quodam diu multumque vespertino præsertim crepusculo latrant; & si de arbore pendent alas sæpenumero motitant. *Serenitatem*, si contra solum hiantes mane per arborum ramos plumas & alas expandunt, si privatim primo crocitant, mox turmatim congressi liberius vociferantur, aut si sub nocturnum crepusculum gregatim versantur, & dum separantur summo crocitando ad nidos advolant.

*Uti* eius in *Medicina* aliquis est. Pulli mente *Martio* combusti contra *Epilepsiam* propinati sunt. Ova ad denigrandos oculos adhibebantur; à *Villanovano* ad *Epilepsiam* commendantur. Cor portatum vigilias inferre quidam asserunt. Pes à colico paeri tussientis suspensus eum, si *Psello* credimus, sanat.

## CAPUT II.

De Cornice in genere.

**Q**Uæ Latinis Cornix, Græcis vulgo *κράννη*, hæc iisdem hodie *κράννη* vel *κράνα*. *Polyrrhæniis* *Cretæ* populis *κράνα*, Vari-

Albert. l. 23. de Animal. Macrobi. l. 2. Saturn. c. 4. Plin. A. N. l. 10. c. 43.

Macrobi. l. c.

Scalig. Exerc. 237.

Scaliger.

Amicitia.

Ruell. l. 1. de Nat. stirp. c. 2.

Arist. de Mirabilib.

Inimicitia.

Cicero. l. 1. de Natur. Deorum. Arist. H. A. l. 9. c. 1. Ælion. l. 6. de Animalib. c. 46.

Præfagium. Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.

Plin. H. N. l. 18. c. 39. Æl. l. 17. de Animalib. c. 7. virg. Georg. l. 1. Ufus.



tudine vincit graculos. Rostrum, crura, & totum corpus habet undiquaque nigerima, (falsus Strabo, dum peculiare esse Hispaniæ, ut nigræ ibi sint cornices scribit) illud tamen, durissimum alias & acutissimum, prope caput albicat, superiori parte barbula quasdam veluti setas circa palpebras habet, inferiore nigra, eaque minima veluti granula. Albam, capite nigricante, cæteris alarum apicibus in rubedinem vergentibus. Rhodiginus vidit.

*Versantur* circa urbes, domos, maris ripas, fluminum littora & sterquilina. In Britannia ingens ipsarum copia, quoniam in pabulo humido ejus soli vermes abundant.

*Victitant* frugibus, nucibus, olivarum baccis, vermibus, piscibus, & carnibus, & vere *πάμφαγοι* dicuntur.

*Generationem* earum quod spectat, *Nidulantur* in summis arborum frondibus. Non temere nec impudenter inter semiscentur, & candem cum corvis in conjugio fidem servant: hinc solitariæ cornicis occursum, malum in nuptialibus auspiciis omen: eliminare cornicem virgo jubebatur. *Ova* pariunt post solstitium gemina, natura ita dispunfante, ut quæ diu vivunt pauca procreent; *Incubant* foemina tam impense, ut assiduo, in incubitu plumas exuant. Pullos à cauda de ovo exire, seu pedibus primo prævolutis, falsum; cœcos nasci verisimilius est. Non prius pasci quam plumis vestiri incipiant, vulgo creditur. Volandi potentes diu prosequuntur, & avolantes subinde comitantur, ideo iusta naturæ talione & decreto, quantum tempus impendere in fætibus educandis, tantum & ipsæ senio confectæ, à pullis suis aluntur.

Male à solstitio æstivo *habent*, seu quod scapie & lepra afficiantur, seu quod carnes à lupo semefas comedant, *Ætates* ipsi humanas ter tres authores tribuunt. Aratro *ἰννεάχηρα κοράνη* dicitur, forte quod diu vivat *πολύγηραν* namque Theon exponit. Aristophani *πέντε γενεάς ἀνδρῶν ζῶει*, quinque generationis virorum vivit. *Vox* ipsius est *κράζειν* vel *κράζειν*, ob assiduitatem obstreperantus, garrula & loquax dicitur. Quamvis vero eas *πανυγλώσσας* Homerus vocet, id est lingua longa & extensa, tamen tempore Plinii allata, è Bætica, plura contexta verba exprimens, & alia atque alia crebro addiscens.

*Volat* celeriter. *Graditur* lente instante pluvia, celeriter dum pullos pascit.

*Amicitias* colit, cum Ciconiis quibus maria transvolantibus Ducem se præbet, & cum Ardeola, cum qua contra vulpem pugnat. *Intimica* est, Noctuæ cujus ova merdie absumit; Mustelæ, quod ipsius nidos sæpe diripiat; & cum Tympano ave, quam occidit. *Ingenium* earum & singularem

solertiam multa ostendunt. Si nucem perfringere nequit, in altum sublatam ad saxa & tegulas præcipitat. Verbenacam supinam nidis imponit, ut ab iisdem blattas aliasque bestiolas abigat. Apud Marrem Ægyptiorum Regem educata, literas, quocunque, juberet, detulit. Mortuæ sepulchrum ad lacum Myridis prope Crocodilorum urbem erectum est.

Quantum ad *Usum* cerebrum coctum & in cibo sumptum inveteratis capitis doloribus remedio esse Plinius testatur. Carnem in morbis chronicis utiliter sumi, nimum corpori illitum vitæ dies prolongare, olim vane creditum est.

### C A P U T III.

*De Cornice in specie.*

#### A R T I C U L. U N I C U S.

*De Cornice Frugivora, Cinerea, & Cæruleo.*

Cornicis tres sunt species. *Frugivora* nempe; *Cinerea* & *Cerulea*. *Frugivoram* Aristoteles vocat, frugilegam & granivoram alii. Nigra est tota, rostro excepto, quod albicat. Magnitudine est inter Corvum & Cornicem media.

*Victitat* ut diximus frugibus, nec tamen lumbricos respuit. Quia Ardea in earum nidis *nidulari* solet, ideo circa villas nobilium, qui Ardearum aucupio delectantur, in summis arboribus impune nidos faciunt. Angliæ sunt maxime infestæ. Ideo olim sancitum est, ut funditus extinguerentur; precium occisori daretur.

*Cinerea* Turnero Marina dicitur. Minor est Spernologo. Dorsum totum, collum superius, alarum latera, nates & totum ventrem cinerea habet. Æstivo tempore altos montes *incolit*, in quibus soboli propagandæ incumbere, ex eo colligi potest, quod nullibi in planis nidulari reperiatur. Sub autumnii finem ad plana descendit, ibique totam post hyemen prope oppida & pagos degit. Fit id ob rupium asperitates, & nives continuas; vel ob intolerabilem frigoris sævitiam. *Victus* ipsius idem quinigræ. Quadrupedum, hominum suspensorum cadavera & pisces affectat: nec à lacticiniis abstinet. Gesnerus in dissecto ventre, quasdam quisquilias, & cortices granorum, nec non substantiam quandam albam, pinguem, ex iisdem forte granis concretam & lapillos invenit. Nunquam in Helvetia nidulari dicitur. In inferiore Germaniam cibum à plebecula admittitur.

*Cæruleam* cornicibus, quamvis vix sciri potest, an ex earum sit numero, Gesnerus, Kentmannus & Aldrovandus annumerant. Cæruleo passim colore, in capite, alis, cauda,

Plin. H. N. l. 10. cap. 12. Zoroastr. in Geop.

Ælia. H. A. lib. 6. cap. 7.

Ufus.

Plin. H. N. l. 20. cap. 6.

Descriptio.

Victus.

Aldrov. lib. 2. Ornithol. cap. 5.



cauda, circa Uropygium & tota parte supina, nitet, alibi sinceriore, alibi viridi admixto. Dorsi & colli proni color fuscus est: majores alarum pennæ nigræ. Crura fusca, & pro corporis proportionem parva habet. Reperitur trans Albim in saltu Luchoviano, & sylvis finitimis. Versatur in locis non frequentatis. A projectis, præter cætera, cadaveribus victitat, & nidum ut upupa ex oleto construit.

## CAPUT IV.

*De Graculis in genere, & in specie.*

Varro l. 4. de Lingualatina. Quintilia. l. 1. Instit.

Orat. Victus. Plin. H. N. l. 10. c. 29. Ælian. l. 3.

de Animal. c. 12. Vox. Aff. Bus. Ælian. l. 9. c. 1.

Ælian. l. 9.

Nicolaus Leonicus.

Bruger. l. 15. c. 78. de recubaria.

Aristoph. in vespis.

Dalech. in Plin. l. 3. c. 22.

Usus.

Generatio.

Arist. H. A. l. 9. c. 24.

**G**raculus seu quod gregatim volet, quæ etymologia Quintiliano improbat, seu quod jacta segetum semina plurimum gerat, seu quod ex olivetis cubitum sese recipiens binas baccas pedibus, ore vero tertiam ferat, dicitur.

*Victitat* præter segetes, carnibus glandibus, & locustis. Unde à Lemmi insulæ incolis, quod adverso volatu locustarum exitio occurrat, colitur.

*Ad coitum* verno tempore excitatur.

Vox ipsius est *κροῖαν & κλωζεν*, ut Pollux tradit, quorum istud & Gallinaceo quodam generi tribuitur. *Amicitiam* cum Gavia gerit, hospitalitatem cum Accipitræ. Hoc Homerus sub Hectoris & Ænæ Græcis infensissimorum exemplo prodidit. Avem congregem esse, vel vulgaris paræmia, semper graculus assidet graculo ostendit. Mas mortem potius subit, quam conjugem derelinquat, altero mortuo, alter dolore perpetua viduitate testatur. Loquacissimi sunt, coitus inprimis, & quopullos enutriunt, tempore. In vini potumira ipsis lascivia. Manibus retenti, oculos impetere maxime solent, seu quod effigiem suam in illis cernentes, velut ad cognita desideria tendant, seu quod à rebus fulgentibus & mobilibus quales oculi, facillime alliciantur. Cicures voces pronunciare discunt adeo, ut è caveis emissis sponte sua eas repetant. Matutino, vero suboriente sole tempore, citius eas capiunt, & memoriæ tenacius mandant. Suetum id & veteribus. Paxillos enim in parietibus domi suæ, quibus insisterent faciebant. Epileptico morbo obnoxii, velut extincti ex arborum, tectorumque culminibus decidunt. Annuum fastidium lauri purgant folio.

*Usus* ipsorum apud plurimos in cibis.

Quantum ad genera, tria Aristoteles posuit, quartum palmipes, tria & Gesnerus, Tullam nempe Becuam, & Taham. Nos *Coraciam*, *Pyrrhocoracem*, & *Lupum* seu *Monedulam* ponimus.

**CORACIA** magnitudinem habet cornicis, illa inprimis, quæ nigra & pamphaga. *Rostrum* quatuor fere digitos longum,

quodammodo arcuatum, coloris punicei, seu inter aurantium, rubrum & subflavum mediis. *Pedes* ejusdem coloris, unguibus exceptis, qui simul cum toto corpore sunt nigerrimi. *Incolit* præruptos montes, & raro ad plana descendit. Cicur simila ex lacte, carne, pane, & tritico vescitur.

**PYRRHOCORAX** Cornice est minor, Monedulæ æqualis, luteis cruribus & rostro, quod parvum Turnerus, in extremitate nonnihil aduncum. Bellonius dixit, cætera nigerrimis. Tam frequens est in Alpibus ut peculiarem Alpium Plinius scribat, sed & in Anglia, Creta, Cycladibus monte Jura & alibi reperitur. Apud Rhætos hyeme duntaxat cernitur. Agros frumento confertos *depascitur*. Altum vociferat, & *vocem* Merularum acutam, ac ad fistulæ sonum nonnihil accedentem imitatur. Ex ejus volatu alto frigus augeri, humili minui quidam colligunt. Pulli in cibum pauperioribus mensis cedunt.

**MONEDULA**, Aristoteli *λίκο* omnibus nota avis est. Caput, pedes, totumque corpus & rostrum nigra sunt. Nigredo de cinereo aliquid participat; *rostrum* circa narium foramina albicantibus punctulis insignitur, prope ventriculum gulam pro ingluvie patentiore habet. *Loca* plana amant, sed & in altissimis turribus sæpe tam numerose nidificant, ut in una centum interdum nidi conspiciantur. Quia frumenti aliorumque granorum, ubi satiata fuerit reliquias terra recondit, & spicas subsequenti anno ex iis colligit, ideo frumentum ferendi rationem hominibus ostendisse creditur. Auri & argenti furacitas in ea mira. Unde Monedula à moneta dicta creditur. Gaudet in capite fricari, quasi pruriret, ideo carnem ejus pruritum inducere Albertus credidit.

Est & aliud Monedulæ genus, quod collum habet albo torque circumdatum, forte illud quod Hesychius & Phavorinus *σεφάνιον* seu coronatum dixere, forte & illud, quod in Helvetia circa Tugium albo circulo collum ambiente distinctum, cætera alteri simillimum, reperiri, Gesnerus prodidit.

## CAPUT V.

*De Picis in genere.*

**P**icai, quæ Atticis *κίττα* communiter *κίττα*, Laconibus *κίττα*, Hesychio & Phavorino *βασκίλλος*, & *καραγάν*, aliis *σίττα*, *κίττα*, & *πίκνις* dicitur.

*Genus* ipsarum unicum duntaxat agnovisse Aristoteles videtur. Alii in urbanas & sylvestres dividunt. In nulla non regione obviæ sunt. Glandaria in Batavia rara.

*Victum* si attendas, est pamphaga. Suum alveos quandoque cibi causa petit, & quosvis acrodryos fructus. Vifa passerem devorasse;

Plin. H. N. l. 10. c. 48.

Bellon. l. 8. c. 6.

Arist. H. A. l. 9. c. 24.

Plin. H. N. l. 14. c. 17. Ovid. l. 7. Metamor.

Genus.

Victus.



**Cardan.** vorasse, sed & una, à cancro, quem è flu-  
vio abreptum in arborem vicinam porta-  
verat, collo sub forcipibus compresso, mi-  
fere interempta legitur. In libidinem val-  
de sunt proclives.

**Generatio.** Ova circiter novem parere; multos sed  
imperfectos imo cœcos pullos excludere  
**Arist. H.** Aristoteles prodidit. In nidis construen-  
dis singulari utuntur artificio. Nam eum  
**A. l. 9.** in locis spinosis figunt, terra intus obli-  
**cap. 13.** nunt, foris in circuitu; infra & supra spinis  
diligentissime muniunt, foramen unum  
(duo quibusdam placent) idque arctissi-  
mum pro introitu relinquunt. Ova verò  
interdum alio transferunt. Binos frequen-  
ter extruere; ut qui pullis insidiantur du-  
bios reddant, prodidere nonnulli.

*Volatus* ipsis raro altus, quem etiam ala-  
rum brevitate impeditæ parum protrahunt.  
Saliunt, & caudam more Metallicæ  
perpetuo moverit. *Κίτλας κίτλαβίξεν* Pollux  
**Onomast.** scribit; sed singulis fere diebus imo ho-  
**l. 5. c. 13.** ris, vocem mutare, & unius cujusque ani-  
mantis imitari, certum. Puerili vagitum  
expressisse quandam, alteram hædi pri-  
mum veluti à matre separati querulam vo-  
cem edisse, mox vituli instar mugisse, ovis  
more balasse, tandem ad instar pastoris,  
cum post pascua oves ad potum deducit,  
sibilasse, fidè digni authores prodidere.

Aliquid illi apud Plutarchum ne subfuerit  
metuo, quæ alioquin loquacissima; audi-  
tis Romæ buccinatoribus obstupuit; pau-  
cos post dies quasi expergefacta, omnem  
eam buccinatorum harmoniam summa  
cum admiratione expressit.

**Affectus.** *Infestantur* ab Alucone & ulula. Epilep-  
**Arist. H.** tico eas corripit morbo quidam prodidere.  
**A. l. 8.** Variæ quotannis cum rapæ feruntur: cal-  
**cap. 3.** vescere, proprium. In Augusto id fieri Ge-  
**Plin. H.** snerus prodidit.  
**N. l. 10.**

**cap. 29.** *Usus.* *Usus* ipsarum & in cibis & in Medicina ali-  
quis. Glandariæ Bononiæ in foro vendun-  
tur, sed duræ carnis sunt; Athenæus tamen  
Corthyin Thracum Regem apposuisse te-  
statur. Quidam seu vino albo ad consum-  
tionem coctas, seu in ollâ tostas, & in pol-  
linem redactas, seu distillatas, oculorum  
hebetudini, rubori, & dolori prodesse, pro-  
didere. Nonnulli vivam in partes disse-  
ctam, laborantibus articulis imponunt.

## CAPUT VI.

De Picis in specie.

## ARTICULUS I.

De Pica varia seu Caudata, Caudata Indica,  
Glandaria, Garrulo Argentoratensi, Pica  
Marina, & Persica.

**A**ristoteles unicum duntaxat genus  
Picarum, glandarium nempe ponit.

Plinius id duplex, sumpta à pedibus diffe-  
rentia, facit, nec de vario reticet. Nos & has,  
& quæ sequuntur, huc pertinere credimus.

*Varia* seu Caudatæ caput dorsum, col-  
lum, pectus, alæ femora, cauda, pedes  
eorumque; digiti atque ungues aterrima,  
extremum alarum albicans, dorsum & cau-  
da & maxima nigredine viridescendentia,  
tota ventris superficies candida.

*Caudata Indica* quam Aldrovandus exhi-  
bet, ex Japonia allata erat. *Rostrum*, tibiæ  
& pedes rubescebant. *Caput* totum & col-  
lum, quod torquis albus ambit, erant cæ-  
rulea, *dorsum* & scapulæ ferruginea. A su-  
periore rostri parte inter utrumque ocu-  
lum macula tres fere digitos longa, &  
pollicem lata punctulis seu potius lineolis  
nigris transversalibus conspersa ad dorsum  
usque protendebatur. Alarum pennæ ve-  
stitrices castaneæ, sed lineis nigris crassius-  
culis per longitudinem positis resparge-  
bantur, reliquæ virides erant. *Pectus* & ven-  
ter ad anum usque candescebant, &c.

*Glandaria*, Aristoteli *μαλακόκρανς* seu  
Molliceps, recentioribus Græcis *καρχαῖα*,  
aliis Picata Granata dicitur. Differt  
à varia, tum magnitudine, tum maxime  
colore. Habet ad alarum latera transver-  
sales notas cæruleas, quales in nullo fer-  
me volucrum genere conspicias; tam am-  
plum oris hiatum, ut glandes integras de-  
glutiat. *Nares* plumis albis & nigris operi-  
untur. *Rostrum* aliquantulum recurvatur,  
*lingua* bifida est. *Color* corporis varius est.  
Nam cervix ex rufo & cæcio mixta est.  
Uropygium candicat, dorsum pallefcit.  
Cauda longiuscula est; & duodecim pen-  
nis nigris constat.

**GARRULUS** Argentoratensis à garritu,  
& loco in quo maxime degere solet, no-  
men sortitus est, veteribus vel ignotus,  
vel saltem non descriptus. *Caput* ipsi cras-  
sum colore ex cæruleo & viridi mixto, ma-  
culis per longitudinem albis, quæ per to-  
tum pectus ventremque deorsum ferun-  
tur. *Rostrum* mariduos digitos longum, cras-  
siusculum; aliquantulum recurvum. *Oculi*  
magni, nigri, *Dorsum* à secunda, vel ter-  
tia vertebra ad Uropygium usque casta-  
neum. *Alarum* color varius. *Cauda* superna  
parte virescit; inferna partim violaceo, par-  
tim cæruleo permiscetur. *Fœmina* toto cœ-  
lo à mari diversa est. *Caput, collum, pectus, ven-*  
*ter* ex castaneo ad Leucophæum vergunt.  
*Rostrum* est crassius. *Alæ* prope scapulas cæ-  
ruleæ; mox ex cæruleo virides, remiges  
nigræ. *Cauda* latiuscula, ex viridi & cæru-  
leo ad fuscum inclinans.

**PICA MARINA**, quæ & Gaza dicitur,  
tota, caput, cervicem, pedes, & alarum par-  
tem, si excipias, subviridis apparet. *Ro-*  
*strum* habet robustum, paulo quam in Pi-  
cis longius. *Capitis verticem* coloris castanei  
diluti,



diluti, inferiorem ejus partem ad temporaluteam. *Digitos longos*, pedes insigniter aduncos, secundi ordinis alarum pennas ex castaneo dilutas.

**PICA PERSICA**, tota fere subfusca est, rostrum habet breviusculum & albicans. Oculos albos. Alarum secundi ordinis pennas, cum Uropygio, & prioribus in cauda luteas, pedes subcæruleos, tabellis nigris insignes.

NB. De *Picarum generibus quibusdam exoticis vide Mantissam*. Num. 5.

## ARTICULUS II.

De *Garrulo Bohemico, Gesneri, seu Ampelide Aldrovandi*.

Descri-  
ptio.

Aldrov.  
l. 12. Or-  
nit. c. 18.

**A**Vem, quæ Garrulus Bohemicus Gesnero dicitur, Ampelidem, à potiori victu, Aldrovandus appellat. Magnitudine Merulas exæquat. *Caput* habet quodammodo compressum, coloris ferruginei, more alaudæ cristatæ apice retro vergente, coloris versus rostrum sub castanei diluti, retro subcinerei ad fuscum vergentis, terræ Umbriæ haud dissimilis, insignitum. *Collum* breviusculum, antica & postica parte nigrum, ad latera rufum, prope rostrum candidum. *Pectus* castaneum dilutum ad roseum vergens. *Dorsum* subcastaneum, prope Uropygium leucophæum. *Ventrem* totum subcinereum. Exteriores *alarum* pennas nigras maculis spectatu jucundissimis insignitas. Nam primæ numero septem solidæ & quodammodo cartilagineæ albæ sunt, appendices cinnabaris instar rubescunt, has aliæ maculis luteis perornatæ, literam L. figura experimentes subsequuntur, sicque dispositæ sunt, ut in quibusdam septem, in aliis sex, in quibusdam quinque tantum appareant. Ultimæ maculas albas habent. Cauda maris decem, fæmellæ duodecim pennis constat. *Interiora* si spectes, ex Anatome habeto. *Intestina* in dissecta duos, do-drantes longa fuisse, absque revolutionibus & anfractibus, ideo celerius fæces exercebat. *Ventriculum* in medio epatis velut reconditum, exiguum, carnosum & duro callo obductum; tunicam in eo substantiæ diversæ, uveæ quoad colorem non dissimilem, durissimam & quasi cartilagineam; *Iecur* in duas partes æque divisum; pro sua magnitudine maximum. *Lienem* exiguum, linguæ humanæ figura, oblongiusculum: *Pericardium* duplicatum, & veluti pinguedini mersum: *Pulmones* qui in omni fere avium genere ad medias usque costas protenduntur, colli & dorsi vertebri & costarum duntaxat superiorum principiis adhærentes; *asperam arteriam* in principio laxiorem & ovalem, mox angustio rem, tandem latior rem iterum: *Linguam* duram & osseam, & in

extremo, ubi velut alas quasdam habere & sagittam præ se ferre videtur, bifidam, & quasi in duas aciculas divisam. *Os hyoides*, quod reliquis animantibus pro implantatione linguæ datum est, ab osse occipitis ad latera foraminis, per quod spinalis medulla à capite ad dorsum transmittitur, originem suam deducere, & ubi ad radicem linguæ conjungitur, acutissimum angulum efformare videbatur. Ejus medio asperæ arteriæ caput insertum erat. *Oculi* intus adeo magni, ut cerebri ipsius magnitudinem superare viderentur. *Cerebrum* sphaericam referebat figuram; superiores ipsius ventriculi ad mediam regionem capitis collocabantur.

*Locum* si attendas, Bohemiæ quidem peculiaris est, sed migratoria eadem. In Italiam delatæ, in Placentino & Mutinensi agro, ubi XL. simul capiebantur, morabantur; in Ferrariensi, nullæ visebantur, forte quod terræ motum ibi futurum præsensissent. Anno 1552. inter Moguntiam & Bingham, in tanta copia apparuere, ut, qua transvolarent, ex earum umbra, veluti nox induceretur.

*Viçtus* ipsis uvæ, ligustri, juniperi, Cy-norrhodæ baccæ, pineæ nuclei, uvæ passæ, poma, amygdala. Baccas hederæ, carnem, & frumentum non nisi famelicæ attingunt. *Volant* perniciosissime & gregatim.

*Vox* earum erat ziziri, unde forte zinzivellæ quibusdam dicuntur. Facile cicurantur.

Cibum sibi invicem offerunt, mas foeminae, foemina mari. *Caro* saporis est in cibo gratissimi. Nec ergo vere esse Pica videtur, quamvis jam, quia de genere non constat, inter eas reposita sit; quia linguam latam non habet, nec *incendiaria* Plinii, quia nec in incendiis nascitur, nec carbonem apportare visa est, nec *avis Hercynia* Plinii, quia ei noctu lucere non competit, ut in Voilandia sylvis, quædam Turdi minoris magnitudine, colore partim cæruleo, partim aureo, quam croceo, talis esse dicatur; Nec *avis Nova* Plinii, quia columbo minor est. Nec denique *Merops Aristotelis*, qui nec apibus insidiatur, nec vermibus vescitur.

## ARTICULUS III.

De *Pica Brasiliæ & Rhinocerote ave*.

**P**Ica Brasiliæ, aliis à rostri magnitudine Ramphastos, Hipporynchos, & Burynchos, aliis Barbara & Piperivora dicitur. Magnitudo ipsi inter Picam & Merulam media. *Caput* pro corpore majusculum & crassiusculum & atrum. *Rostrum* duos palmas longum, unum latum, ferratum, & velut è squammulis quibusdam compactum, substan-



substantiæ ad instar membranæ tenuissimæ, osseæ, splendidæ, levissimæ, cavæ, atque aëris intus capacissimæ, unde Naribus carere crediderim. *Oculi* in medio capite, illique majusculi. *Collum*, *Dorsum*, atque alæ nigræ. *Pectus* aureo colore cum quadam rubedine prope initium micans. *Venter* & fœmora cinnabarino colore vestita. *Cauda* nigra, & in extremitate insigniter rubescens.

*Vivitat* pipere, quod avidissime devoratum, inconcoctum & crudum adhuc ejicit. Incolæ, vim ea ratione piperis domitam credentes, recenti illud præferunt.

**RHINOCEROS** à cornu, quod in fronte gestat, ita dicitur. Occisa in ipso volatu esse dicitur, cum Turcas Christiani ad Naupactum superarent. Caput erat duorum propemodum dodrantum, cirrhis nigris, altis, deorsum spectantibus ornatum. Rostrum quatuor fere dodrantes longum, instar arcus cujuspiam recurvum. Inferior pars tota ex luteo albicabat; supina versus caput colore miniaceo, reliquum ex luteo, albescat. Cornu è fronte enascebatur, & supinæ rostri parti adhærebat, prope frontem palmum unum latum, in fine recurvum, colore supera & infera parte miniaceo, media luteo, &c. Fit talium Avium apud veteros mentio. Nam & Hesi-chius Rhinocerotem avem in Æthiopia reperiri scribit; & *Tragopanda* Plinii, Aquila major, capite phæniceo, cornibus in temporibus insignitur; & *Tragopa* Golini in capite arietinis cornibus armatur; & Pomponius Mela ejusmodi aves *Tragopemanas* appellat. Et Cardanus avis meminit Aquila majoris, ex luteo & rubro splendidæ, ex cujus rostro fulvocæruleoque capuli parentur.

## C A P U T VII.

De Loxia.

**LOXIA** seu corvi rostra, Trogon Plinii Roberto Constantino esse, videtur; ignota sine dubio Aristoteli. Magnitudine parum maximum vincit. Rostrum habet contra omnium avium morem ab utraque parte recurvum, crassum, & admodum robustum. Unde ipsi nomen est. Colorem singulis annis hyeme inprimis, mutat, ita ut nunc ad viridem, flavum, nunc ad rubrum & cinereum vergat. Rbere primum solet pectore, collo, & ventre, deinde flavescere. In vertice, cervice, & circa oculos cæruleus apparet; in cauda & extremis alis nigricans, crura rubicunda.

Plurima Germaniæ loca incolit, in Italia rarius videtur.

*Vivitat* seminibus cannabis, nucleis abietum, & ut quidam produnt, cadaveribus. Voracissima autem est.

*Nidificat* in abietibus, & verisimile est à

cauda de ovo exire, seu quod, si reliquarum more prodiret, exitus à rostri curvitate impediretur; seu quod, cum media hyeme nascatur, subinde ab ambientis inclementia, calor animalis suffocaretur. Hyemali tempore *cantat*, & quidem suaviter, in æstate abstinet. Caveis inclusa Psittacorum more sursum atque deorsum reptitat. A potu pocillum rostro si potest abjicit imaginem forte suam in aqua conspicata.

## T I T U L U S VII.

De Noctuis.

## C A P U T I.

De Bubone.

**ABSOLUTA** Avium diurnarum Carnivorarum historia, ad Nocturnas deflectendum est. Hæ vero ob cæcios oculos *γλαυκῶπαι*, dicuntur, & magnitudine inter se differunt. Oculos magnos amplos & cæcios habent. Non solum in tenebricosis montium & rupium cavernis, sed & in cavis arboribus, desertis ædificiis, domorum, templorum, & turrium tectis latent. Inter duo denique crepuscula, (de nocte parum aut nihil vident; de die excedens sensibile sensum lædit) lacertas, scarabæos, apes, vespas, mures, hirundines, interdum lepuculos, & cuniculos rapiunt. Numerantur autem inter rapaces nocturnas. *Bubo*, *Asio* sive *Otus*, *Scops*, *Aluco*, *Ulula*, *Noctua*, *Strix*, *Caprimulgus*.

**BUBO**, qui Græcis *βῦας*, *βέταλον*, *οὐλός*, *βέρο*; Goropio Becano, cum Aristotelis Cyminde, Chalcide, Hubride, & Ptynge, idem: Aristoteli forte Ascalaphos, omnium nocturnarum est maximus, nec Aquila minor. *Corpus* ipsi breve, & propter caudæ brevitatē veluti decurtatum. Corporis tegmen plumeum ferrugineo seu obscuro quodam æris colore est. Maculis nigris sparsim & incerto ordine respergitur. *Caput* habet, adeo grande, ut ob ejus magnitudinem pul-lus à cauda primum in lucem prodire credatur; frontem orbiculatam seu teretem, plumis velut auribus eminentibus in regionibus prout in Oto, insignitam. Cavernas ad auditum patulas, hocce pennarum orna-mento ob magnitudinem tectas. Oculos maximos, & qui igneo splendore, ingenti magnitudine, & truci obtutu, terrorem aspectantibus incutiunt. *Rostrum* aduncum; *Col-lum* pro sua magnitudine perbreve; *Un-gues* Aquilinis majores; crura brevissima. Cujus Gesnerus iconem exhibet, magnitudi-ne Anserem vincebat. Alas habebat ad tres dodrantes longas. Caput magnitudine & forma felinum. Pennæ supra utramque aurem nigricante, & tres digitos subrigebantur, Cujus Aldrovandus, in multis ab illo

Aldrov.  
l. 8. c. 1.Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 34.Arist. H.  
A. l. 8.  
cap. 3.  
Strabo  
Georg.  
lib. 17.Plin. H.  
N. lib.  
10. c. 16.Gesnerus  
in Or-nith.Scalig.  
Exerci.  
231. f. 3.Descri-  
ptio.

Locus.

Vitus.

Genera-  
tio.



Aldro-  
vandus  
Ornit.lib.  
8. cap. 2.

differebat. Nam huic quidem etiam ad extremos usque digitos crura; sed breviora, graciliora, nec ita supragenu torosa. Color ei erat per totum corpus ex cinereo ferrugineus, in pectore potissimum, ubi etiam subnigris maculis per longum ductis, promiscue respersus erat. Dorsum & alæ è ferrugineo magis successebant. Et cum ille Gesneri in singulis totius corporis plumis magis variegatus, & tenuibus quibusdam lineolis, transversim ductis Accipitrum & Anatum instar, minatim distinctus fuerit: & universo corpore magis vero dorso & capite, maculas quasdam incerti ductus, lituris nigris, crassis, & quodammodo figuratis gesserit: hic in alarum pennis majoribus, & cauda, lineis subnigris, transversis, largiusculis, distinguebatur; que ita efformatæ in cauda præsertim fuere, ut singulæ latiores superne & inferne instar fimbriarum triplici ordine dispositæ, aliis subtilioribus, clauderentur.

Locus.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 12.

*Locum si spectes* deserta incolit, nec tantum desolata, sed dira etiam & inaccessa. Inter sepulchra etiam diu noctuque versatur; aliquando propter mures, & juxta horrea reperitur. Cœtum aliarum avium fugit. Hinc solicana & devia vocitatur. Nidulatur in altissimis rupibus, ne foetum injuriis exponat, & ut secutius ad prædam evagetur. Ovum ejus Plinii tempore vix visum est, nostris non adeo rarum.

Plin. H.  
N. l. 29.  
cap. 4.  
Cibus.  
Arist. H.  
A. l. 8.  
cap. 8.

*Cibus* ipsi carnes avicularum, cuniculorum, & leporum. Tantum prædæ; dum pullos educat congerit, ut & venatoribus satis lucri adferat. Templâ noctu frequentare, ut se oleo ex lampadibus ingurgitet, vix credi potest. Noctu autem victum quærit, & sublustri crepero gaudet in vespere. Unde Nocticanica, & noctis monstrum vacatur. Si diuturno tempore prodeat, ab aliis avibus seu visu insolens, convellitur. Roboris est magni. Visus & feroces canes abegisse, & cum Aquila depugnasse. Si se viribus imparem sentit, in dorsum supinus procumbit, unguesque ac rostrum sic adversum erigit, ut hostium nullus accedere audeat.

Volatus.  
Ovid. l. 5.  
Metamor.  
Plin. lib.  
10. c. 12.  
Plin. l. c.

Quantum ad *volatum* vix movet natas per inertia brachia pennas, nunquam volat quo libuit, sed transversus. Hebetes ipsi interdiu oculi, minus tum quam Noctua vidit. Non cantu aliquo, sed gemitu vocalis est, & bubulare, quod Grecis est *βούβη*, dicitur.

Ufus.

*Ufus* ejus est, tum in *Aucupio*. Nam & aviculæ dum eam interdiu circumvolant, & percutiunt, facillime retibus capiuntur; & Galli ejusdem opera, Milvos venantur: tum in *cibo*. A quibusdam enim editur: tum in *Medicina*. Cerebrum vulnera cum adipe anserino glutinat; cum aphronitro scabiem sedat. Sanguis asthmaticis est u-

tilis. Cor ejus, si impositum mammæ mulieris dormientis sinistræ fuerit, ut omnia secreta pronunciet; si axillæ, ut canes obmutescant, efficere; sed falso tradunt. Creditur Agrippæ Romæ captivo, primo regnum cum libertate, post mortem portendisse; Chingis Canum ab hostibus victum, quasi servasse, ideo à Tartaris honorari, serenitatem denique si totam noctem cecinerit, portendere.

Plin. H.  
N. l. 20.  
cap. 4.

Joseph.  
lib. 8.  
Antiq.  
cap. 8.

## CAPUT II.

*De Asione seu Oto.*

**A**Sio seu Otus forte ab auribus, qui Alexandro Myndio apud Athenæum Lagotia, quod aures leporinas habeat; aliis apud Aristotelem *Nycticorax*; quia Buboni per omnia, magnitudinem si excipias (magnitudine columbæ esse scripsit Athenæus, quod de maximis intelligendum,) est similis ternos quoque digitos habet anticos, posticum unum (male notuæ similem Plinius dicit, male & Gaza *ὁν σκόπα* per Asionem apud Aristotelem vertit; & Oppianus, cum Athenæo Otum cum Otide confundit) Bubonem sequitur. Aldrovandus binos describit. Priori *caput* erat auribus velut cornibus plumis insignitum, cinereo bætico diluto & nigro ad supercilia usque & nares propemodum colore varium. *Facies* tota anterior, è cinereo candicabat, minutissimis plumulis veluti pilis tota obsita. *Corpus* totum è cinereo seu leucophæo ad ferrugineum dilutum vergebat, maculis ubique fuscis conspersum, tam majusculis, quam punctorum instar minutissimis. Per *ventrem* notæ fuscae in longum recta ducebantur, & in acumen desinebant, &c.

Descri-  
ptio.

Athen. l.  
Dipnos.

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 13.  
Oppianus  
in Cyneget.  
Athen.  
lib. 9.  
Aldro-  
vandus  
Ornit. l.  
8. cap. 3.

*Alterum* semipalmum in longitudine minus, Fulvum Aldrovandus appellat. Toto propemodum anteriori corpore maculas fuscas; in longum protensas, & singulis plumis albicantibus decus datas, ut crucis aut lilii Francici referrent figuram, habebat. *Crura* & pedes ad unguem usque hirsuti, uti totum corpus, flavescēbant. *Cauda* infra alarum longitudinem, uno fere digito erat. Describit & Bellonius tertium, auribus patulis, cruribus ad unguem pilosis, facie Aluconi simili, ventre maculis nigris variegato. Cauda alarum longitudinem æquante, ulula multo majorem, qui vel superiori est similis vel Aristoteli incognitus & Arvernus in Gallia montibus peculiaris species, dicendus. Cranii Anatomen vide in Aldrovando. Auris & oculi hisce verbis idem exequitur. Avi huic supra aures cutis in longum prodicitur complicata, rugosa, sponte concidens, & meatum eoloco occludens, instar membranarum, quæ tamen in amplissimum, si voles, ambitum de-

Bellon.  
l. 8. cap. 2.

Pe'lon.  
lib. 2. de  
Avibus  
cap. 28.



deduxeris. Sunt enim laxæ, implumes in-  
tus, candidæ, foris vero minutissimis &  
pulchellis plumulis confitæ, & quæ orbem  
venustum in marginum ambitu constitu-  
unt. Non alteri rei magis appositæ, hæc  
cutaneas valvas, quam branchiis piscium  
compararim. His apertis, auditus for-  
amen amplum ac patulum in medio appa-  
ret, multis anfractibus instar humani tor-  
tuosum. Oculus inventus fuit substantia  
quadam cartilaginea, velut capsula cir-  
cumclusus, non tamen undique. Nam in-  
fra in parte oculi posteriori haud quaquam  
membrana hæc substernebatur, sed cir-  
cumquaque ad latera, à qua circulus supra  
totum oculum exporrigebatur, ante qui-  
dem hæc membrana angusta erat, intra ve-  
ro & qua magis ad posteriora vergebat, di-  
latata. Oculus ipse ante orbicularis erat  
retro sessilis, & compressus, longe quam vel  
in medio latior. Refecta cornea uveam ab  
illa intus plurimo nigrore tinctam & veluti  
atramento perfusam, quippe quæ etiam  
humores subjectos digitis contrectata tin-  
geret, observavi. Huic in orbem alia tenuis-  
sima pellicula instar annuli circumpone-  
batur, crocea, seu aurea per totam substan-  
tiam, ita uveæ conata, ut nullo modo in-  
tegra ab ea secerni posset. Hujusmodi sa-  
ne nullam, quod equidem sciam, in aliis  
animantibus reperiri puto. Duæ igitur hæ  
membranæ coloribus diversis tinctæ, & per  
corneam transparentes, horrendum illum  
nocturnarum avium oblutum faciunt, con-  
currentibus simul è nigro & croceo ex ad-  
verso radiis & velut flammæ è filice excus-  
sæ micantibus. Humor crystallinus mini-  
me durus aut solidus erat, qualem in Aquil-  
is & aliis observavimus, sed tener & molli-  
culus, utpote qui facillime vel sua sponte  
dissolutus refecta cornea simul cum aqueo  
humore efflueret.

Locus.

*Locum* si attendas, montes plerumque in-  
habitat, locaque edita. In montibus Ar-  
vernæ copiosi inveniuntur, & in Italia in  
monte Plumbicio passim sunt obvii. In  
Ciliciæ campis de die inter Ambrosiæ  
plantas abditum Bellonius invenit, cum  
tamen eo loci, ne ad quartum quidem mil-  
liare, arborem ullam nascentem videre li-  
ceat. Nidulatur in arborum cavernis, &  
foraminibus Aristoteli & Plinio *migratorius*  
est. Nam cum Lingulaca, matrice, & Cyn-  
chamo, Coturnicibus hinc proficiscenti-  
bus ducem esse scribunt.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
12.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 23.  
Volatus &  
Vox.

Levi facillique *volatu* fertur. *Vocem* edit  
ei similem, qua homo frigore affectus re-  
clamare solet hu, hu. Repetit eam solis  
occasu instante, aliquanto intervallo in-  
terposito, sonoram, tanquam si fistula te-  
nui ederetur. Cum à quopiam laceffitur,  
sibulum aut crepitum emittit, qualem felis  
solet. In pugna eadem ratione se defendit

ac Bubo. *νοβάνος* Aristoteli, seu  
quod instar mimorum ac parasitorum  
collum contorquendo nunc in hanc,  
nunc in illam partem ridiculos & mimicos  
gestus edat, seu quod imitatione gaudeat:  
Quicquid facientem aucupem cernit,  
idem quoque agit. Stant illi è regione, &  
viscoso quodam Pharmaco oculos inun-  
gunt, illud post in pelvibus relinquunt &  
abeunt. Accedit Otus & oculos sibi con-  
glutinat, sicque capitur. Aristoteles eum  
in altero aucupe intentum, ab altero circum-  
veniri reliquit. Magi recenti Afionis felle  
glaucomata curari dicunt.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
12.

Athen. l.  
9.  
Dipnoso.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
12.  
Athen. l.  
c.

N.B. *Est & genus exoticum Oti, de quo vide  
in Mantissa. Num. 2.*

## CAPUT III.

De Scope.

**S**Cops, Alexandro Myndio absques a-  
spud Latinos nondum invenit nomen,  
quamvis Bellonius. Ululam ex ipso faciat.  
Græcis vel à voce inepta, vel quod *εραυλ*  
*ερα* habeat *εραυλ*, seu noctu maxime cer-  
nat, vel quod varietate gesticationum,  
quibus naturaliter utuntur homines, *οκων*  
*τας*, id est, qui alios deludere solent, re-  
ferat, sic dicitur. Habet fere cum omni-  
bus nocturnis aliquid commune. Cum Bu-  
bonibus & Otis, quod auritus sit. Cum  
Ululis & Aluconè, quod pedes utrinque in  
æquum digitorum numerum dispertitos  
habeat. Cum Noctuis, quod pedum com-  
positione, figura, colore denique & ma-  
gnitudine, his quam aliis propior sit. Ab  
Athenæo & Æliano ita depingitur, ut mi-  
nor Noctua esse, in colore plumbeo albi-  
cantia puncta habere, & ab utrisque tem-  
poribus duas pinnas subrigere, dicatur.

Athen. l.  
9.  
Dipnoso.  
Bellon. l.  
2. de A-  
vibus c.  
35.  
Eustat. in  
Odyss. 5.

*Duplex* apud veteres ipsorum *genus*. Alii  
sunt *vocales*, qui omnibus temporibus pa-  
tent; ideo *αειονωνες* dicuntur, glauci sunt  
ac esui propter vitium carnis inepti. Alii  
*muti* qui autumno interdum apparent, nec  
plus uno vel altero die commorantur, Sco-  
pes absolute dicuntur, & ab Aëiscopibus  
crassitie differunt, turturi & palumbo si-  
miles. Tot & apud Neotericos differen-  
tiæ. Una Italiæ frequens, quam isti Chiu-  
vino vocant. Altera huic apud Germanos  
similis, paulo albidior, cauda & auriculis  
longioribus. Illa prout ab Aldrovando  
describitur, noctua est minor, palumbo  
par, omnium fere nocturnarum minima,  
illam si excipias, quæ Alaudam non supe-  
rat, & rara est. *Caput* ei teres plumulis co-  
loris ubique plumbei vestitum. Aurium  
plumulæ una tantum pinnula constabant,  
quæ in mortuo vix appareat. Totius cor-  
poris superficie tenus color cinereus est,  
hinc inde nonnihil admixto, plumbeo,  
macu-

Genera-  
tio.  
Athen. l.  
9.  
Dipnoso.  
ex Calli-  
macho.



maculis albicantibus distinctus. Majores alarum & caudæ pennas; maculæ albæ, transversim ornant; minores reliquas omnes etiam linea in longum nigra secat. Circa collum & alarum initium ruffo decore promiscue respergitur. Pedes, habet exiguos fuscis, ad plumbi colorem abscurum accedentes; squamosos, depiles, in digitos binos anticos, & totidem posticos dispartitos, unguibus fuscis instructos.

Generatio.  
Arist. H. A. 1. 9. c. 28.  
Plin. H. N. 1. 10. cap. 49.  
Vox.  
Athen. lib. 9.  
Dipnos.

De *Generatione* ipsius nihil exploratum esse scribit Aristoteles, nisi quod Favoniis flatibus appareant. Plinius amplius nasci negat, forte quod ipsorum satyricos motus, cum insident, plarisque memoratos concipere mente non possit.

De *Voce* superius dictum est. Quod ei ex Athenæo potius quam Æliano à Gyllio applicatur, *πάντα τὰ τῶν ζῴων ἐν γλώττια & διηρθραμένα εἶναι τὴν φωνήν*, quasi omnes oris expressione & articulata voce longe superet; ad aves, quarum lingua latiuscula pertinet. Ridiculos sæpe exercent gestus. Cum enim colla retro agilia habeant, caput modo adducendo, modo protendendo, vertice nutando, humeros, jactando, & saltitando, histriones imitantur. Unde Scops saltationis apud antiquos genus, quod & Scopiam nominabant, *ἔχον τινα τῶν τραχέλα περιφορῶν καὶ τὴν τῶν ὀρεῶν μίμνησιν*. Habebant quandam colli circumvolutionem ad avium imitationem. Periri mali Punici grano, Gyllius in Æliano addit.

Pollux 1. 4. c. 14.  
Meur. in Orchestra.  
Æli. H. A. 1. 6. c. 46.

## C A P U T VI.

De *Alucone & Ulula*.

**A**LLUCONIS, qui Græcis *ἀλκυὼν*, non *ἀλκυὼν*, nec *ἐλαῖος*, nomen, vel ab Italo- rum Alochone Gaza formavit; vel à Germanorum, ut Lazius vult, locken, quod allicere significat, desumptum est. Duo ipsorum sunt genera. Unum majus, alterum minus.

Bellon. lib. 2. de Avibus cap. 32.  
Aldrov. 1. 8. c. 5.  
Arist. H. A. 1. 8. cap. 3.

Majus Caponis est magnitudine, hoc peculiare habet, ut palpebram à summo oculo ad imum ad ducens, conniveat. *Auriculis* caret; sed eorum loco coronam quandam è plumis constructam, quæ faciem totam, pinnulis supra oculos superciliorum aliorum modo, elevatis, & utrinque per tempora nec non sub mentum descendendo in orbem coeuntibus, flammei muliebris forma, habet. *Rostrum* ipsi album. *Oculi* cavitatem profundam, à plumulis undique surrectis constitutam, magni, & toti atri immerguntur. *Dorsum* coloris est plumbei, notulis albidis variegatam. *Crura* plumis candidis conteguntur, *pedes* duntaxat pilis. *Incolit* tam laco campestria, quam saxa prærupta, rimas turrium, & cavernas quercuum. Muribus & aviculis & inter has picis

*viçtitat*. Quod forte animalculum ccepit, deglutit, integrum. Tam ampla enim ei gula, ut bolos ovo majores integros transmittat: neque quicquam cibi sumit antequam ossa, pilos, & plumas rejecerit. Transversim, Ardearum more inter volandum fertur.

Arist. H. A. 1. 8. cap. 3.

*Minus* simili cum majore maculorum diversitate variegatur; domesticam columbam magnitudine non excedit. Vertex capitis, collum, dorsum, alæ ad pennas remiges usque plumis vestiuntur ab initio prope radicem cinereis obscura; reliqua ferruginies dilutis. Anterior capitis pars, plumulis candidis informam flammei cinctæ videtur, quas circulus luteus undiqueque ambiens claudit. *Oculi* nigerrimi versus interiorem canthum plumeis luteis obsidentur.

*Tibiae* & pedes villis horrentes nonnihil rubent, binis ante & totidem retro digitis instructi. *Unguibus* armatur longis, validis, acutissimis, & aterrimis.

*Vocem* noctu edit adeo terribilem, ut pueris & foeminis terrorem incutiat. Rarior multo conspectu est, quam major. *Ulula flammeata* Gesneri eadem cum Alucone.

Vox.

**U L U L A**, Græcis *αἰγάλιον*, *ὀλολυγὴ*, & *ὀλολυγῶν* dicitur. Quæ à Gesnero describitur, magnitudine erat Gallinæ, vel supra, colore ruffa, vel nigro respersa. *Rostrum* breve & aduncum albicabat. *Oculos* habebat magnos nigros, pupillam obscure ruffam, pinnulas inter oculos & rostrum multas, densas, cinerei fere coloris, margines palpebrarum rubicundi, membrana nictanti superne abducebantur. *Collum* erat multum retro agile. *Crura* albicantia punctis conspersa lividis, hirsuta ad pedes usque. *Pedum* digiti bini ante, totidem retro. Quam Aldrovandus describit, & inter ululas, quod vocem non flebilem ejulando, sed Gallinaceorum haud absimilem rostro frendendo, ediderit, reponere metuit.

Aldrov. lib. 8. Ornithol. cap. 6.

Caput, dorsum, alas, caudam colore cinereo, maculis albicantibus ac nigris distinctam habebat, sub ventre albicabat, & nigris maculis variegabatur. Capite erat valde magno, tereti, enormiter crasso, admodum plumoso. *Oculis* ex toto nigricantibus, & plumulis albis undique in orbem cinctis, in quorum ambitu, ad palpebrarum oras lippientium, instar rubescens circulus conspiciebatur, superiori tantum palpebra inter nictandum oculos contegebatur. *Rostrum* erat subvirescens, &c.

*Colit* & campestria & saxa, *διθαλάσσιον* est, *seugemeni cibi*. Fruges in humilioribus colligit. In excelsis rapinas agit, & carnes in cibum parat. *Picas* venatur: sed & colorem (subest mendum, nec nota cuiquam avis) forte collurionem, rapit. Est *νυκτινόμοσ* & *αἰεὶας*

Locus & Cibus.  
Arist. H. A. 1. 9. cap. 17.  
Arist. H. A. 1. 8. cap. 3.  
Idem. H. A. 1. 9. c. 1. Idem lib. 9. c. 17.



ἡμέρας ὁλιγαίς φάνεται. Noctu vagatur; de die raro apparet.

**Generatio.** Parit quaternos, si bene Plinius Aristotelem intellexit. Nam ne de Ætolio Milvo res sit verendum est. *Vox* ejus est ululare, seu mœsta & flebili voce plangere, idque vespertino tempore.

**Ufus.** Fel ejus prædicatur ad albugines, suffusiones, & caligines. Adeps ad claritatem.

## C A P U T V.

*De Noctua in specie sic dicta.*

**Generatio & descriptio.** **N**OCTUA Latinis quod noctu canac & volet, Græcis γλαυξ, κοκοβάειν, κρηνη & τὸ τῶ dicitur. Duplicis ipsarum generis mentionem faciunt Authores, Majoris nempe & Minoris. Utrique collum breve, gula pars inferior paulo latior. *αποφύδες* seu appendices infra ubi intestinum definit paucæ, *λιεν* tam parvus ὡς λαμβάνειν ἑλγυς πὴν αἰσθῆσιν, ut sensum multorum effugiat. *Cauda* brevis, & si Bellonium audimus, pedes pilosi. *Capitis* vertex ex plumularum ibidem positu veluti introrsum excavatus. Quæ ab Aldrovando describitur, erat columbæ magnitudine, *capite* majusculo superne depresso. *Oculis* magnis & glaucis. *Rostrum* longiusculo, dilute flavo, *corpore* toto plumis partim bætico, partim albo distinctus. *Cruribus* plumosis, & ad pedes usque hirsutis, coloris è cinereo bætici. *Pedum* digitis subfuscis, cinereis, implumibus. Quam Germani *saxatilem* nominant, tota parte pronafusci, modico ruffo permixti, & albicantibus maculis distincti est coloris. Crura & digitos pedum habet hirsuta, plumis albidis. *In extincta* rostrum superius rubebat, cum prius in viva rubere non videretur. Inter oculos & rostrum pennulæ quædam ceu pili aut barbulæ rigent.

**Locus.** *Locum* si attendans, in Creta nasci negat Plinius, illatam mori tradit, nec in Alpinis Helvetiæ regionibus inveniri scribit. E Gallia Cisalpina, Longobardia, & Germania ad Rhenum eò advehuntur. In Attica plurimæ. Unde Noctuas Atheneas. Saxatiles montana & saxosa incolunt. Ideo ad frigus arcendum plumas cruribus & digitis natura induit.

**Vitus.** *Cibus* ipsis vespæ, apes, lacertæ, mures, quarum cicurata, in domibus etiam ventionem exercent, semel saturata trium dicrum in ediam perferunt, nec novem abstinentia læduntur.

**Generatio.** Quantum ad *Generationem*, quod de Buphone, id & de hac Plinius dicit, solam inter uncungues, & carnivoras non cecos parere pullos, Eustathius & Varinus falso tradunt; nec verius, cum formicas à suis pullis abigere cupiunt, vespertilionis cor in nido tanquam amuletum habere, Oppianus reliquit. Si enim ipsa lepus est,

cur aliunde pulpamenta quærat. Nec de die omnino *cacutire* verum; nec propter insitam vim igneam *tenebras penetrare*, ac luna silente videre, quod Eustathius, & Varinus scribunt. Die exorto quasi splendore visus ejus hebetatur, & quasi quibusdam errat in tenebris. Sicca nimis & tenuis humoris substantia facili negotio dissipatur. Noctu, quia aëre, qui visionis medium est, non illuminato, objectæ colorum species non exprimuntur, si proprius accesseris, haud loco sese movebit. Moderata lux quia Noctuæ conveniens, ideo *ἀρχὴ ἰσότητος ἐπὶ τῇ ὕψι*, per vesperam & circa matutinum crepusculum venatur. Sonum edit duplicem, unum tou, tou; alterum vocant cucabare. Aristophani *κικαβᾶν*. Pollux eam *ὀΐζειν* scribit. Nigidius novem habere voces prodit. Apulejus ferum & intortum ejus cantum vocat.

Est etiam *saltatrix*, & corpus & cervicem frequenter in orbem contorquendo, nunc torvo & fixo obtutu hominem aspicit, nunc capite huc illuc acto scurras & histriones imitatur. Luce vagantem aviculæ reliquæ flurnatim admirantium specie primo circumvolitant, mox impetunt. Ab his circumdata, resupina pedibus repugnat, collectaque in arctum, rostro & unguibus tota tegitur.

*Inimicitias* gerere dicitur cum cornice, seu quod sibi ova meridie absumat, seu propter aliam causam. Lucretius sane cornices metu Noctuarum in Athenarum mœnibus unquam volasse negat: cum orchilo, ejus ova itidem exedente, cum Pico Garrulo, & ovibus. Contactu frondium platani torporem contrahere, sic à ciconiis à nido submoveri, fabulatur Ælianus. Auxiliatur ei contra aviculas collegio quodam naturæ passer, bellumque partitur.

**Ufus.** *Ufus* captæ tum in *aucupiiis*, prout in Oto dictum est: quod genus aucupii hodie, à pipatu avium circumvolantium noctuam Pipatam vocant. unde Pipare quod decipere; tum in *cibis*, apud tenuioris fortunæ homines; tum in *Medicina*. Nam cibus aqua in qua Noctua lavit perfusus, Gallinarum piritam pellit. Sanguis inter psilothra numeratur, jecur parotidas sanat. Anginis cerebro succurritur. Ebrios ova per triduum in vino data, tædium ejus adducunt.

*Præfagia* si respicias, si nemore deserto frequentior in urbibus apparuerit, sterilitatem; si vespertino crepusculo de suis lustris citius pro consuetudine egressa, plurimum concubaverit, pluvias; si pluvia durante, cessaverit, serenitatem, polliceri creditur.

NB. De Noctua genere exotico vide *Manitissam*. Num. 2.

Ambr. lib. 5. Hexam. cap. 24.

Bellon. l. 2. de Avibus c. 24. Arist. H. A. l. 9. c. 34.

In avib. Pollux Onom. l. 5. c. 13. Plin. l. 10. cap. 17. Apulejus l. 3. Milesior. Ingenium. Crescent. Agricult. l. 10. c. 6. Plin. l. 10. H. N. c. 17.

Inimicitia. Arist. H. A. l. 8. cap. 1. Lucretius l. de Naturæ rerum. Arist. l. 9. H. A. c. 1.

Plin. l. 10. H. N. c. 17. Ufus.

Præfagium.

Aratus in phænomenis.



## CAPUT VI.

## De Strige &amp; Camprimulgo.

Descri-  
ptio.l. 11. H.  
N. c. 39.

**S**TRIX quænam sit avium, non constare arbitrat Plinius. Ovidius eam brevi compendio descripsit, dum scribit.

## —Strigum

*Grande caput, stantes oculi, rostra apta ruina,  
Canicies pennis, unguibus hamus inest.*

Ovid. 6.  
Fastor.  
Isidor. l.  
12.  
Origin.  
cap. 17.  
Vox.

Ubra eas infantium labris immulgere, sanguinem in cunis noctu exugere, imo & dilaniato unguibus corpore mortem afferre, credidit superstitiosa Antiquitas. Isidorus vero propriis pullis lacteum humorem instillare, eosque ultra modum amare prodidit.

*Vox* ipsarum proprie stridor est Latinis. Omen semper triste habebatur.

l. 8. O. ni-  
thol. c. 8.

Aldrovandus huc *nocturnam* quandam *avem* refert, quæ habebat caput magnum, rotundum, anteriore parte plumulis exiguis, in orbem velut flammeum positis exornatum. *Oculos* grandes cum iride dilute flavo ac pallente, pupillas maximas, & vehementer atras. *Rostrum* corneum, fuscum. Pennas universi corporis ferrugineas, maculis fuscis in remigibus transversim distinctas. *Caudam* palmo fere alis longiorem *Crura* ad digitorum ungues usque instar pedis leporini pilosa. *Digitos* pedum binos ante, totidem retro. Magnitudine erat *Asionis*. Dicebatur caprarum ubera exugere.

Descri-  
ptio.Arist. H.  
A. l. 9. c.  
30.  
Plin. l. 10.  
H. N. cap.  
40.

**C**APRIMULGUS etsi specie à reliquis multum differat; nocturnis tamen, ratione visus, accensetur. Græcis *Ἀεροδίνης* παρὰ τὸ ἐξ αἰγῆς περιλακύναι; quod capras fugat, dicitur. Magnitudine est paulo major quam Merula, minor quam cuculus, seu ut Plinius, grandioris Merulæ aspectu. Cujus iconem Aldrovandus exhibet, erat cuculo ita similis, ut nisi inusitata pedum, crurumque exilitas & brevitudo cum diversa constructione obstitisset, is idem esse crederetur. *Caput* habebat vertice longo & compresso. *Oculos* grandes, iridem & pupillam nigerimas. *Rostrum* vix passerino majus, modicum aduncum, pulmulis tanquam pilis quibusdam superne ad nares & inferne sub mento, ornatum, &c. Quam Gesnerus exhibet, rostrum habebat aduncum, & tibias plumis obvestitas.

Locus.  
Arist. l. c.

*Degit* in montibus circa mare inprimis in Creta, propter viciniam stabulorum quibus capræ includuntur. Intrant namque isti fures nocturni pastorum stabula, caprarumque uberibus advolant; propter suctum lactis, qua injuria uber emoritur; capræ, quas ita muldere, cœcitate percutiuntur. Adeo terribilem clamorem habent, ut etiam audientibus pavorem incutiant. Duo aut tria cum plurima ova pariunt. De visu ita Aristoteles: ἵσκει δὲ οὐδὲν ἄλλο

τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ ταῖς νυκτὶς βλέπει. Parum acute interdum videt, sed noctu perspicax est.

## TITULUS VIII.

## De Carnivoris media natura.

## CAPUT I.

## De Vespertilionem.

**V**ESPERTILIO, LXX. *νυκτερίς*, Hesychio & Phavorino *φάλη*, Philo *νυκτάλιος* & *φιλί-*

*σπερος*, Victorino *Avis forex*, Vallæ *seminus*, Platoni in ænigmate, *Avis non avis* dicitur. *Τοῖς πλῖνοις ἐπιζῶν ἐπαμφοτερέζον ἐδὲ τὸ αὐτο-*

*τέρων τὸ ἐδιδίττων μετεχρεῖν*, bene scripsit Philosophus, male Macrobius, quatuor pedibus ingredi, & inter quadrupedes referendum, ut inferius patebit. Color nonnullis fulvus, aliis niger, subalbus, cinereus. *Magnitudo* diversa. Majores in urbe Assyriæ

Borsippa, quam alibi, in novo orbe columbas adæquant, in Brasilia monedulas, circa Urabam turtures, in Orientali India, si Pompilio Azalio credendum, tanti, ut illas transeuntes, alarum verbere prosternant, multos etiam occidant. *Caput* quibusdam murinum est, caninum aliis.

*Rostrum* à cæteris avibus diversum. *Nares* vituli instar. *Dentes XXXIV*, in mandibula inferiore octodecim, sedecim in superiore Bellonius observavit, viginti quatuor in singulis mandibulis duodenos, eosque ferratos, teretes & longiusculos Aldrovandus utrinque in superiore mandibula senos, in inferiore septenos quorum anteriores cæteris longiores; omnes valde albi, Clusius. *Maxillas* intus & foris pilus oblongus, niger, obvestit. *Auriculas* interdum binas, quaternas interdum habet: similitudo eis Asininarum, & superiores quadruplo sunt inferioribus majores. *Mamilla* soli volucrum datæ sunt, lacte sola nutrit ubera admovent. *Alas*, quæ pellitæ, exangues quidam dixerunt. Ab armis incipiunt, & per latera per axilas continuo ductu ad crura usque feruntur, easque circumambiunt. Quatuor hæ flexus, plicas seu articulationes habent, quibus alas inter volandum dilatant, & contrahunt, medius superiorum, (cubitos Albertus nominat) quique in plures alios deorsum flaxas divaricantur, *digituli* singuli, unguiculis hæmatis instructi, quibus parietibus se affigunt, annectuntur. In supremis aliis rudimenta, quædam *brachiorum* nervosa apparent, quæ in uncum desinunt. *Pedes* illibini, in quibus digitos dissecti & unguiculis acutis instructi, singuli in medio, ac si palmam efformarent, ampli. Innituntur inferiori alarum membranæ, atque ex ventre ad caudæ, si quæ est, latera, exporriguntur. *Cauda* quippe aliis nulla, ut recte Aristoteles, Africanis

Descri-  
ptio.lib. 4. de  
partib.  
Anim. c.  
13. l. 7.  
Macro-  
bius. Sat-  
urnal. cap.  
16. Strab. l.  
15. Livius  
Hist. c. 10.  
Gomara  
Hist. cap.  
61.l. 9. Orni-  
thol. c. 1.Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 61.  
Strab. lib.  
15.



de par-  
tib. Ani-  
mal. l. 4.  
c. 11.  
Bellon.  
l. 2 de  
avib. c.  
ult.

fricanis murium instar oblonga, & quatuor digitos extra membranas alarum prominens. Aldrovandino mediis atque infimis alarum membranis sub ventre involvebatur, & ad extremam earundem exporrigebatur apicem. *Penis* mari sat magnus; exertusque, qualis simiarum est, genitalis foeminae meatus pone podicem apparere solet. Quid sibi Plinius, verbis, *Coxendix huic avi una traditur*, velut, cum duo crura habeat, intelligi vix potest.

Locus.

*Locum* si spectes, loca obscura, cavernas, & meatus subterraneos amant. Ideo & in labyrintho Cretæ inter Cnossum & Cortinam, Borsippam, urbem adde, plurimi, & in Appennini prope Puteolos, speluncis multa millia, & in monasterio quodam Misniæ tanta, ut excrementorum acervis multi carri onerari possint. Delectantur

P. in. H.  
N. l. 10.  
c. 61.

in *victu* culicibus & muscis, sed & lardum, candelas, & alia pingua arrodunt. Succidiam sæpe ita exedunt, ut in excavata scrobe stabulentur. Invadunt & nudam corporis partem culicum more, & sanguinem exugunt, in Dariene ita infestatos Hispanos, tabe contracta obiisse, Martyr author est. Gallinas, canes & catos morsu aculeo in cristam in fixo interemisse addit. Solus volucrum, animal tantum. *parit*, & foetus lacte uberibus admotus nutrit. Recens nati musculis sunt similes, glabri, infantis humani instar; sed omnibus partibus absoluti, matris uberibus, cum primum enixa est adeo tenaciter adhærent, ut ne à mortua quidem sponte decendant. Nullis secundinis obtectos quidam putavere produci, refellit Bellonius, qui plures vigenis se in Pseudolabyrintho Cretæ prægnantes secuisse tradit, has etiam mater devorat, dum proli nuper natæ ob teneritudinem metuens, primo vel secundo die ad pastum evolare prohibetur. Cum duo tantum ei natura ubera dederit, plures geminis uno partu non edit; quia vero magnæ eorundem interdum copia ingruit, haud male quidam è putri etiam materia oriri, opinati sunt.

1. 6. dec.  
3.

Plin. l.  
cit.

*Volant* mane & vesperi potissimum; foeminae sæpe geminos implexæ infantes; volatu ob timorem indirecto seu tortuoso, atque haud longe à terra semper. Volitatione fessi, hamis digitulorum, quorum in mediis alis rudimenta habent, parietibus saxi, arboribus, aut cavernarum fornicibus sese appendunt, & continuata serie, ac veluti catena quadam inter se coherant. Melius de nocte *vident*, quia spiritus ipsorum visorius tenuissimus & dilucidissimus, per noctem modice incrassescens, idoneus ad conspectum redditur, de die extenuatus, expanditur & evanescit, ideo face vel gladio volantibus objecto, decidunt.

1. 2. de A-  
vib. c. 2.

Gemma  
Cosino  
cret. c. 8.  
*Volatus.*

*Voce* exili gannitum potius & latratum canum imitantur, quam murium sibillum.

Homer.  
Odyss. µ.  
Homer.  
Odyss. α.  
Alex. A-  
phrod. l.  
1 prob.  
66.  
Ingenium.

*Voce* exili gannitum potius & latratum canum imitantur, quam murium sibillum.

Latinis stridere, Græcis *τρίζεν* *τετρίζεν* & *τετρίζεν* dicuntur.

Singularis ipsis cum columbis *amicitia*, dietinentur istæ, si caput vespertilionis in peris summo columbari fastigio suspendatur. *Inimicitias* vero gerunt cum Ciconia, quæ à solo illius contactu hujus ova sterilescent, ni platani foliis in nidum positis sibi caverit: Cum *platano*, qui præ foribus suspensus ne involent, prohibet, cum hederæ, cujus suffitu & odore perimuntur; cum formicis, ad quarum nidos si alas suspenderis, nulla ipsarum egreditur; cum locustis, quæ locum ubi vespertilio suspensus non transvolant.

*Ufus* vespertilionum est tum in *cibis*; nam à Borsippæ condiebantur, ab incolis in fularum Catigan & S. Johannes eduntur, ferventi aquæ immersi & excoriati eduntur, in Oriente gallinas sapore vincunt; tum in *Medicamentis*, toti præparati, beneficirho, & podagræ adhibentur. Sanguinem trichiasi conducere, Archigenes & Serenes credunt, Galenus & Julius Alexandrinus negant. Cor & lingua hydrophobiam inducit. Caput dextro alligatum brachio vigilantis somnum impedit. Magicæ revera vanitatis est quod tradunt, si ter circumlatus domui vespertilio vivus per fenestram inverso capite infigatur, amuletum esse, præsertimque oculibus circumlatus toties, & pedibus suspensum in superliminari.

## C A P U T II.

De *Struthocamelo*.

*Struthocamelus* *στρουθοκάμηλος* Philostrato & Aristoteli, *στρουθοκάμηλος* Hesychio, *στρουθοκάμηλος* Oppiano, *στρουθοκάμηλος* recentioribus Græcis dicitur, melius Chænocamelum, quia *χην* sive anserem potius, quam *στρουθ* sive passerem, nisi cum Scaligero, gallinam reddere malis, dixissent. Plautus cum Passeram marinum appellavit, Phavorinus Lybicam avem, Diodorus Siculus Cervinam dixit. Aristophanis *στρουθοκάμηλος* Horatii *Afra avis*, gallinæ potius sunt, quas prægrandes Africaterra tulit. Maximus est omnium avium. Diodorus Camelo parem esse. Plinius equitis equo insidentis magnitudinem excedere; & verum est, si collum quantum potest erigat. *Rostrum* habet exiguum sed acutum. *Caput* in quo fere nullum cerebrum, parvum, exiguis pilis, in foemina pallide lutescentibus, in mare flavescentibus, collo ad rubrum colorem vergente. *Palpebras* utrinque solus omnium alitum ut homo, pilos in superiore palpebra. *Collum* longissimum. *Dorsum*, cujus pennæ in mare nigerrimæ, in foemina fuscæ, lanæ quandam substantiam sua mollicie efficiunt, tam latum, ut puerum la-



Oppian.  
Cyneget.  
l. 3. v.  
490.

Albert. l.  
23. de A-  
nimalib.

Oppianus  
l. c.

Locus.  
Theo-  
phr. l. 4.  
Hist.  
plant. c.

Pli. H. N.  
l. 10. c. 1.  
Xenoph.  
l. 1. Exp.  
Strab. l.

18.  
Diod. Si-  
cul. l. 3.  
c. 13.  
Vetus.  
Strabo.  
l. 6. Ge-  
ogr. Lan-  
gius E-  
pist. 12.  
Aphro-  
dit. in  
procem.  
probl.  
Vossius in  
emend.  
ad l. 3. de  
Idol.

Genera-  
tio.  
Plin. l.  
20. c. 52.  
Arist. H.  
A. l. 9. c.  
15.

otentem insidentem ferre possit. *Alarum* pennæ ejusdem sunt coloris, sed in superiori parte candidissimæ. Gordianus miniatos habuit. In interioribus alarum cubitis spicula secundum quosdam, quibus ferit, habet; ossæos in extremis alis, secundum alios, mucrones, quibus ceu calcaribus ad cursum velociorem se incitat. Aldrovandus observare eos non potuit. *Caudæ* pennæ in mare subalbidæ, in fœmina subfuscae sunt. *Coxæ* prægrandes, quod in angustum sensim juxta femur finiantur; *femur* humanum potius imitantur. *Pedes* Camelorum cruribus similes *δαμνησιν ἀρηράμενοι φοιτῶσιν*, frequentibus firmati squammis ad geminos, usque duos poplites integuntur. Pedes more boum bifidi, in binas *ungulas* dividuntur. Cur bisulcum potius quam solipedem aut digitatum natura fecerit, ignorare me fateor.

Reperiuntur, in Africa, Lybia, Æthiopia, Arabia, & Syria. Amant deserta & fere aquosa, & tanta eorum aliquando conspicitur copia, ut velut equitum quandam aciem eminus efforment.

Quantum ad *Victum*, Carpophagum esse ex Strabone colligi potest. ferrum, lapides, ossa, & quicquid obtigerit, sine delictu devorare certum fere est: sed an eadem concoquet, dubitatur, si sit, quod Languis credidit, specificæ potius proprietati, quam intensissimo calore tribuendum id erit. Nam leo strutho camelo calidior, ferrum concoquere non potest. Interrogatus, qui circumducebat, à Brentio, deglutire quidem ferri particulas sed iterum, vel integras, vel summum perpusillo imminutas, respondit.

In Venerem proclivis est, & Cameti Bactriani instar, averfus coit. Complura ponit ova, octuaginta nempe, & quidem mense Julio; illaque lapidea quasi crusta

munita, & XV. plus minus libras pendencia. In arena condita, & neglecta, solis calore fovetur: solo visu ex iis pullos excludi quidam credidere, quod intueri ea avem viderent, nec propter gravitatem iis incubare posse scirent. Non *excluduntur* simul. Pars intra ova formatur, pars in lucem prodit, pars fovetur.

De ejus *voce* nil memoratu dignum occurrit. Non elevatur à terra propter corporis molem; festinantissime tamen interdum incedit, ingruente in alas vento, & tanquam vela eas extendente. Naturaliter eum *calvere* Plinius dixit; equum odisse alii tradunt. Collum frutice occultat, seu quod *διὰ τὴν πρόσπονν ἐν νυθρόν τετα ψυχῆς*, latere se ita existimet; seu quod eam corporis partem, quam se inferiorem habere novit, contra persequentium injurias muniat.

*Usum* si spectes, ova propter amplitudinem pro quibusdam habentur vasis. Garamantes patoria & capitum tegmenta ex iis conficiunt. Pennæ conos bellicos & galeas adornant, quas apud Turcas solis Janitzaris gerere concessum. Lapis in ventriculo repertus, & collo suspensus, concoquendi vim promovet. Sebum efficacioris ad omnia quam adeps anserinus usus: ideo cum auctio regia per Catonem Uticensem fieret, LXXX. sestertiis vœniit; & apud Æginetam emplastrum diacinnabarios ingreditur. Carnes Arabibus, Æthiopibus, Numidis & aliis in usu, hinc Struthophagorum nomen. Heliogabalus sexcentorum capita una cœna, ad edenda eorum cerebella apposuit. Firmus Seleucius, qui Hippopotami adipe delibutos inter crocodilos impune natabat, totum uno die comedisse dicitur. Sceletum apud Pareum vide.

NB. Est & alia *Struthocamelorum species*.  
Vide *Mantissam* N. 3.

Ælian. de  
Anim. l.  
14. c. 13

Vox.

Plin. H.  
N. l. 11.  
c. 37.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 1.

Ufus.  
Plin. l. c.

Lamprid.  
in Helio-  
gabalo.

l. 24. c.  
22.



## HISTORIÆ NATURALIS

DE

## AVIBUS,

LIBER II.

## De Avibus Phytivoris.

## TITULUS I.

De Avibus Granivoris, Non Canoris.

## CAPUT I.

De Pulveratricibus Sylvestribus.

## ARTICULUS I.

De Pavone.



Absoluta Avium Carnivorarum historia ad Phytivoras pergendum est, inter quas pulveratrices tam sylvestres, quam domesticæ primo occurrunt. Inter illas primus *Pavo*, propter

exquisitum pennarum ver, & gemmantes colores, quos adverso maxime sole, quia sic fulgentius radiant, expandit; Junonium incessum, ingenium, de quo in sequentibus singulare, & magnum apud veteres æstimum occurrit. Athenis statuto precio singulis noviliis per anno XXX. spectabatur, multi Lacedæmone & ex Thessalia spectatum confluebant. Alexan. visis iis apud Indos, gravissimas in eum qui occideret poenas constituit. Tiberius ob subtractum è viridario unum, capite multavit. In Lybia si quis tantummodo lædisset, non impune ferebat, si Eustathio credimus. Quod si *precium* spectes, mille drachmis marem & foeminam venditos fuisse Antiphon scripsit: & tempore Varonis ova earum denariis vanebant quinis, ipsi facile quinquagenis, grex centenarius facile quadraginta millia sestertia reddebat, ut quidam Albatius ajebat, si in singulos ternos exegisset pullos, perfici sexagena potuisse. Dicitur & Medica, Persica, Junonis; & picta avis.

*Diversitas* illorum à colorum inprimis, & loci diversitate sumitur. Nostrates satis sunt noti. In Terra Firma quidem ventre & pectore nigris, cætera flavi; alii pectore & ventre flavi, cætera nigri conspiciun-

tur. In Curiana regione sunt sylvestres, qui per nemora vagantur, & adeo viles sunt, ut unica sunt, ut unica duntaxat vendantur acu, alibi in palustribus inveniuntur. Quod si & *Sexum* attendamus, foemina mare multo minor est, neque in cauda oculos illos gerit, Japonensem si excipias, quæ quatuor in Uropygio obtinet.

Placet maris & foeminæ *descriptionem* exhibere. Mas igitur capite, collo, & pectoris initio intense cærulei, seu sapphirini coloris est. *Caput* pro corporis proportionem habet exiguum, & quodammodo serpentinum, maculis duabus oblongis candidis, quarum una oculos superequitat, altera brevior at longe crassior subjacet, ornatum. *Apicem* in vertice è nudis quodammodo scapis tenerrimis, viridescens, in summitate ejusdem coloris liliorum flores ferentibus conspicuum. *Rostrum* candidat & insigniter hiat. *Collum* est longiusculum tenue & exile. *Dorsum* ex albo cinereum, maculis atris transversalibus conspersum. *Cauda* in duas quasi dividitur. Non longioribus quæ ex dorso prope podicem oriuntur pennis, in rotam extensis, minores quædam eæque fuscæ non rigent, sed ut in reliquis avibus extensæ conspiciuntur, datas ut longiores sustinerent crederes. Oculi *τετράπτε* quatuor circulis, aureo, castaneo, viridi & sapphirino constant, & varios ad solem obversæ colores jaciunt. In *foemina* pauca colorum conspiciuntur varietas. Alæ totæ, dorsum, venter, coxæ, ac pedes coloris sunt fusci ad cinereum vergentis. Capitis vertex & apex ejusdem coloris, in vertice tamen aliquot maculæ exiguae, veluti puncta virescentia interferuntur, &c.

Quantum ad *Locum* in Asia fuisse inventos Theophrastus author est, transmarinos Varro. Babylonia multos pulchriore quam alibi varietate aluit. Media gu-

Martyr.  
dec. i. de  
reb. Oc-  
ciani l. 8.

Descri-  
ptio.

*Locus.*  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 29.  
Varro de  
re rust. l.  
3. c. 6.  
Diod. Si-  
cul. l. 2.  
c. 53.  
Rhodig.  
Antiq.  
lect. l. 1.  
c. 10.

Lucian. de domo.  
Plin. H. N. l. 10. c. 20.  
Varro l. 3. de re rust. c. 6.  
Oppian. l. 2.  
Lucret. l. 2. de Natura rerum.  
Ælian. de Animal. l. 5. c. 21.  
Ælian. l. 1. c.  
Sueton. in Tiber. In Orat. contra Erast. Varro l. 3. de re rust. c. 6.  
Suidas. Aristoph. in Avibus.  
Statius l. 2. Sylv. Athen. Dipn. l. 9. c. 19. Genera.



Clemens  
Alexand.  
in Pæda-  
gogo.  
Æl. l. 5.  
de Ani-  
mal. c.  
21.  
Gell. l. 7.  
Noct.  
Attic. c.  
16.  
Athen.  
Dipn. l.  
14.  
Generatio.  
Columella l. 8.  
de re ru-  
stica c.  
11.  
Pallad. l.  
1. dere-  
rusti. c.  
28.  
Columel.  
& Pal-  
lad. l. c.  
Ælian. l.  
5. c. 32.  
Columella l. 5.  
c. 32.  
H. A. l.  
8. c. 11.  
Columella l. c.  
Ælian. l.  
5. c. 32.  
Athenæ-  
us Di-  
pnof.  
Columella.  
Ælian de  
Animal.  
l. 5. c.  
32.  
Ætas.  
Arist. H.  
l. 6. c. 9.  
Ælian. de  
Animal.  
l. 11. c. 33.  
Vox.

loſis celebratos. Ex Aſia in Græciam pri-  
mum, Samum inprimis, unde Samii tan-  
quam præſtantes commendantur, poſt  
in Italiam & alias oras delati ſunt. Athē-  
nis in precio fuiſſe ſuperius dictum. Roma  
tempore Athenæi plures fuere quam Co-  
turnices. In Suetia quoque, Oſtrogothia,  
& apud Normannos in agro Lexoviendi  
aluntur. Amant edita *loca*, paſcuntur ta-  
men cum Gallinis, & Gallinarium ſub ve-  
ſperam ſimul repetunt.

Summa iſtis *Coëundi* cupiditas. Maſcu-  
lus quinque fœminas deſiderat, & ni adſit  
alia, incubantem invadit, ac ova frangit.  
Agnoscitur iruiſſe libido, quoties circa ſe  
amiſtum caudæ gemmantis incurvat, &  
ſingularum pennarum capita occulta, locis  
ſuis exerit, cum ſtridore procurrens. Ac-  
cenditur eadem, ſi leviter toſtam fabam  
tepidamque jejunis quinto quoque die ex-  
hibeas. *Coëunt* ab Idibus Februarii ad Mar-  
tium, vere præſertim, locis fere apricis,  
cum Favonii ſpirare cœperunt. *Partus* à  
trimatu obvenit, cum varii colores fun-  
duntur, brevi à coitu agitur tempore. Ter-  
tis anno à fœminis, quæ non incubant edi-  
tur: at quæ ſovent ova totum tempus fœ-  
cunditatis aut excludendis, aut etiam  
educandis pullis conſumunt, ita ut vere  
ſemel in anno parere Ariſtoteles dixerit.  
De numero *ovorum* non conſentiunt autho-  
res. Ariſtoteles octona in primiparis nu-  
merat, duodecim aut paulo pauciora in  
aliis; nec iſta continuatis, ſed binis terniſ-  
ve interpoſitis diebus ponuntur. Alii pri-  
mo anno unum & alterum, ſequenti qua-  
terna quinave, cæteris duodena edere vo-  
lunt; ne hic numerus tranſcenditur. Quæ  
ter pariunt, earum primus partus, quin-  
que ovorum eſt, quatuor ſecundus, trium  
aut duorum tertius. In Temiſtana viginti  
imo triginta aliquando enituntur. Conci-  
piunt tamen & *ſine coitu*, & ova Zephyria  
ſeu *ὄπρὲς μῆα* Gallinarum more, non plura  
tamen duobus ponunt. Ut *commodius exclu-*  
*dantur* Gallinis, ſed non Rhodiis ſupponi  
poſſunt, recentiora; luna nonaria existen-  
te, hoc eſt, novem à primo Lunæ incre-  
mento diebus. Commodius inquam. Nam  
& mas ſeu libidine turgens, ſeu incuban-  
di flagrans deſiderio, illa interdum frange-  
re ſolet; ideo à fœmina celantur; & quia fœ-  
mina non continue duorum dierum inter-  
vallo incubat, refrigerata, infœcunda eva-  
dunt.

*Ætas* iſtis viginti annorum tribuitur. In-  
dicus centum memoratur vixiſſe. *Volatu* pa-  
rum valent; ſeu quod Uropygium flecti in-  
eptum obtineant, ſeu quod longitudine  
caudæ & corporis gravitate premantur.

*Vocem* ſi attendas, Philomelæ authoreas  
pupillare dixit, Varro à voce ſua dictos  
tradit.

Si *Ingenium*, inceſſum ſuum ita compo-  
nit, ne maculetur, pullus adhuc, ſi mada-  
ſcit (ſide Alberti refero) moritur. Lauda-  
tus gemmantes expandit colores, adverſo  
maxime ſole, quia ſic fulgentius radiant,  
ſimul umbræ quosdam repercuſſus cæteris,  
qui in opaco clariſus micant, conchata  
quærit cauda, omnesque in acervum con-  
trahit pennarum, quos ſpectari gaudet,  
oculos. Si tacitus ſpectes recondit ſuas  
opes. Refrigerationis indigus, paſſis pen-  
nis, & in anteriorem reflexis, corpus ſuum  
operit ingruente à tergo vento, alas pan-  
dit, & ſuaves auras excipit. Lini radicem  
naturale faſcini amuletum, ſub altera la-  
rum retrorſum geſtat. Qui eos venenum  
deregere, deſoſſum eruere referunt, fidem  
ſuam exſolvant.

Duplici inprimis *morbo* afficiuntur. Do-  
loribus nempe dentientium infantum ſi-  
milibus cum criſta produci incipit, & pen-  
narum deſluvio; de qua Plinius. Idem cau-  
da annuis vicibus amiſſa cum foliis arbo-  
rum, donec renaſcatur iterum cum flore,  
pudibundus ac mœrens, quærit latebram.

De *Vi præſagiendi* hoc dixiſſe ſufficiat,  
cum plus ſolito clamitant, noctu inprimis  
pluviam imminere. Vocis enim illius ob-  
ſtreperæ congeminatio, vegetum & acu-  
tum intus cum calore vocalem Spiritum,  
per arteriam vaporoso aëre imbutum,  
erumpere teſtatur. Quod vero extra tem-  
pus cantillantem, Paracelſus mortem alicu-  
jus ea in domo præſagire tradit, fabula eſt.

*Uſum* & in *Medicina* & in *cibis* aliquem  
præſtat. Nam jus pavonis pingue pleuri-  
tidem ſanat, linguarum uſus ab epilepſia  
præſervat. Ova uſta & in aceto trita impe-  
tigines emendant, ſumus è pennis exce-  
ptus ruſcentes oculos, propter ſignatu-  
ram curat. Fimus podagræ fervorem mi-  
tigat. Caro propter ſiccitatem & frigidita-  
tem; dura & concoctu difficilis audit. Etiam  
mortui poſt annum nec olet; nec putre-  
ſcit, viſa poſt quadriennium cariem fœ-  
niculi odore, ſaporis amari & falſi con-  
traxiſſe. Primus eos Aufidius Lurco cir-  
ca noviſſimum bellum piraticum ſagina-  
re inſtituit, & ex eo quæſtu, redditus ſeu  
ſeſtertium ſeu minorum ſexaginta millia  
habuit. Hortenſius Orator, primus editiali  
cœna cibi cauſa occidit, & ideo in jus vo-  
catus eſt. Cerebella Vitellius in famoſa illa  
patina, quæ Minervæ clypeus, cum aliis  
prodigioſis cibis appoſuit. Quæ vel de  
virgine à Pavone in Leucadia adamata,  
vel de Pavone Indico, Jovi conſecrato,  
quem ſacrilegi ſuffurari non potuerunt, di-  
cuntur; inter hiſtorica recenſeri debent.

Ingenium.

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 20.Ovid. l. 2.  
de arte a-  
mandi.Ælian. l.  
11. H.  
A. c. 11.

Morbi.

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 20.Præſa-  
gium.Mizald.  
in E-  
phem.  
text. 1.  
c. 43.

Uſus.

Porta  
Phytogn.  
l. 3. c. 29.Auguſt.  
de Civit.  
Deil. 21.c. 2.  
Aldrov.  
Ornithol.l. 13. c. 1.  
Plin. H.  
N. l. 10.c. 20.  
Ælian. l.  
5. de A-  
nimal. c.21.  
Sueton.  
in Vitel-  
lio.Athen. l.  
13.  
Ælian. l.11. de A-  
nimal. c.  
33.



## A R T I C U L U S II.

*De Pavone albo, Pavonibus Japonensibus  
& Gallopavone.*

**P**AVONES ALBI Septentrioni peculiares esse credebantur: & in calidioribus regionibus eosdem nasci, successu temporis compertum est. Vidit Aloysius Cadamustus in Maderis; Johannes Laurentius Ananias in parva insula, plures, Scaliger in Gallia binos; Gaudentius Merula Mediolani plures; Aldrovandus unum Bononiæ natum. Cum ex Norvegia Coloniam adveherentur, numero per seminium aucto, cum penitus in frigidiora loca commearent, & matres in ipso vere ovis incubantes nivosa loca perpetuo ob oculos haberent, vulgationis facti sunt. Tales & in calidioribus regionibus nascentur, si caveas in quibus incubant & excludunt ova, ex parte albis velaminibus obtendas.

**P**AVONUM JAPONENSIIUM maris & fæmellæ descriptionem Marchioni Facchineto, qui eam à Julio IX. Pontifice accepit, Aldrovandus debet. Mas nullam cum nostrate præterquam in cauda & pedibus similitudinem gerebat. Rostrum erat, ut in nostrate cineritium, sed longius & subtilius. Vertex capitis, qui planus erat, & collum superius virescebant, & maculis cæruleis ceu punctis, quæ pariter in medio exiguas lineas albas deorsum descendentes habebant, respergebantur. Apex in capite quatuor ferme digitos longus partim viridis, partim cæruleus, figura filiginis spicæ non omnino dissimilis. Oculorum pupilla nigra, iris lutea, hanc ruber circulus ambiebat. Pectus & dorsum velut exsquamis, sed colore variantibus constabant. Pectoris enim squamæ, si ita vocare licet, ex cæruleo, viridi & aureo: dorsi excæruleo & viridi tantum tingebantur. Alarum principium ejusdem cum dorsi erat coloris, sed squamæ illæ virides haud ita apparebant, cæruleæ vero majores erant & lucidiores. Pennarum secundi ordinis primæ ejusdem erant cum superioribus colores; reliquæ in medio virides, ubi lineis nigris transversalibus notantur: post subluteæ similiter nigris lineis notatæ; in extremitatibus denique nigræ. Venter, coxæ, & denique pedes colore leucophæo & maculis nigris insigniuntur, quarum quæ in ventre sunt, lineas albas habent. Cauda pennis, quam in nostrate rarioribus colore, magis fusco ad castaneum vergente, calamo candidissimo. Oculi caudæ multo quam in nostrate majores, primum aurei, dein cærulei, postreme virides, ut in nostrate. Fæmina mari quidem minor est, sed capite toto, collo, dorso, pectore & alis simillima. Illud vero in hac admirandum est, supra uropygium, nempe ad dorsi finem, quid veluti cau-

dam habere, eamque oculatam, ut in mari: sed oculi, licet quam in illo sint minores, sunt tamen pro pennarum portione magni. Habebat itidem caudam viridem peninis in ambitu cæruleis, & calamis albis. Postremo in eo etiam à mare differebat; quod ventrem haberet prorsus nigrum. GALLOPAVO, aliis Gallus Indicus, Peregrinus, & Calecutensis dicitur, & idem esse cum Meleagride, cujus synonyma sunt, Gallina Africana, Numidica, Afravis, Numidica guttata, & alba Lybica, videtur; si vera est illa descriptio, quam ex Clyto Milesio Athenæus adfert. Verba ejus sunt. *Circa templum virginis, Minervæ nempe in Levo* (sic legendum non Olero. Insula est maris Icarii Sporadum una) *Meleagrides aves sunt. Locus ubi aluntur est* <sup>indone</sup> non paludosus, (ut quidam vertunt, Meleagrides enim Aristoteles ab avibus paludicolis distinguit, & Hesychius <sup>νατοινδίας</sup> <sup>ὀρνέας</sup> vocat) sed arboribus confitus. *Animal illud non ita prolem amat; & juniores pullos adeo negligit, ut sacerdotibus illos curare necessum sit. Avis magnitudine ut gallinæ generosa est, capite ampliore, quam pro modo reliqui corporis, glabro, ac super ipso crista carnosæ, duræ, rotunda, quæ clavi modo super caput extuberat, colore ligneo.* (Sic lege, *ῥάμα* non *σάμα*. Lignei coloris facit & Theophrastus mentionem; forte est subflavus.) *Ad malas jacet instar barbæ longa caro, incipiens ex ore, rubentior quam in gallinis: at eam quæ rostro Gallinarum insidet, & quam barbam, nonnulli vocant minime habet, tanquam ea parte sit mutila: rostrum acutius & grandius quam gallinæ. Cervix nigra, crassior & brevior quam Gallinæ. Corpus totum varium. Migrescit enim totum, crebris maculis albis notatum ac compunctum, lenticula majoribus, quæ rhomborum figura parvis nigrisque circulis ambiuntur, & pennarum illam varietatem efficiunt, quia niger color aspergitur candido, & vicissim candidus nigro. Alarum pennæ linearum ductibus candidis serratisque distinguuntur, in spiras protractis, intervallo parè diremptis. Nullum calcar in cruribus, quæ gallinaceis similia sunt. Maribus adeo fæminæ similes, ut vix Meleagridum sexus discernatur. Similitudinem in colore & mole corporis intellige. Eo enim veluti clavo ligneo carent. Quem Aldrovandus ex Gyllio describit ex novo orbe allatus erat, eadem qua Pavo proceritate. Collum ei simul cum capite à plumis omnino nudum, tantum purpurascente pelle obducebatur, & tam erat crassum, ut pellem quæ antea laxa & vacua; cum vocem emittebat, spectabatur, sic inflaret, ut ad brachii crassitudinem accederet. Cum quis ad Gallinam accederet, totis inhorrescebat plumis, & gradu superbo exterrere accedentes conabatur.*

Quantum ad Locum Bœotii soli indigenæ Meleagrides esse videntur. Ætolie peculiares, Menodotus sanius facit, & inde

Varrol. 3. dere rust. c. 2. Plin. H. N. l. 10. 26. Athen. l. 14. Dipnos. Casaubon. ad Athen. l. 14. c. 20. Dalech. ad l. eund. Æl. l. 5. cap. 27. de Animalib.

Casaubon & Dalech. Theophrast. ad l. c. Histor. Plaut. l. 7. cap. 3.

Locus.

Cadam. Cap. de Navigat. In fabrica. Anan. Mundi to. 3. cit. Aldrov. Aldrov. Ornith. l. 13. c. 2.

Descriptio.



*Vitulus.*  
Athen. l.  
14.  
Diodor. l.  
3. Bibliot.  
cap. 12.  
Strab. l.  
16.  
Geogr.  
Scylax  
Carian-  
denfis in  
Periplo  
orbis.  
Plin. l. 16.  
H. N. c.  
44.  
Colu-  
mella lib.  
8. de re  
rust. c. 2.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 26.  
Generatio.  
Bapt.  
Portal. 2.  
Mag.  
Nat. c. 14.  
Vox.

Pausan. in  
Bæoti-  
cis.

de in alias partes translatas credit. Diodorus ultimam Syriæ partem, Strabo Arabiam ipsis tribuit. Certum, nostras calidioribus locis delectari, una cum Gallinis pasci, & longius à domo per agros divagari. Quod autem Scylax Cariandensis lacui Chephisio, in Africa, Mnaseas lacui ibidem Cratum amnem de se promenti, eas vendicat; vel error est, vel Gallinis, quibusdam Africanis, quæ paludes amant, rutilam galeam & cristam in capite gerunt, quæque novissimæ peregrinarum avium in mensas propter ingratum virus (quod nostri Meleagridibus non competit) receptæ sunt, nomen Meleagridum propter similitudinem indidere.

*Coëunt* aliquando cum Pavonibus, & excluduntur pulcherrimi pulli, nitidissimis pennis fulgentes. *Incubant* verno tempore diebus tricenis.

Ad *Vocem* earum extendit Pollux verbum *καυαδίζεν*. Crocitationi Gallinæ Pavoninæque non dissimilem edit, cum fragore per collum longe lateque vagantem, & instar liquoris in dolum infusi optrepentem. De usu ipsorum in cibis non est quod dicamus. Olim Isidi Tithonæ à pauperioribus immolabatur.

### ARTICULUS III.

*De Phasiano, Urogallo seu Tetraone, majore & minore.*

**P***Phasianus*, Galeno Gallus Sylvestris, Statio Phasidisales, Scythica volucris Juvenali, Itis quibusdam dicitur. Magnitudo non omnibus eadem. In regionibus Ergimul & Cerguth quæ Magno Chamo subsunt, maximos reperiri Paulus Venetus scribit, cum tantæ prolixitatis cauda, ut decem & octo palmos excedant. Is quem Aldrovandus describit libras tres duodecim unciarum pendebat. *Rostrum* coloris erat cornei, pollicis transversum longitudine, in extremo recurvum, superius inferiore longius. Membrana carnosâ, qua capiti conjungitur tuberosa, sub qua nares occultantur, instructum. *Caput* in vertice colore cinereo fere micabat; ad latera supra coccineam maculam, & prope rostrum viridi, & admodum vel in sole, vel in umbra varia. Ab utraque capitis parte è regione aurium pennæ, quas Plinius cornicula vocat, elevabantur, sub his caruncula seu musculus qui cornicula illa movent, apparebant. *Aures* erant admodum latæ, profundæ, & rotundæ. *Colli* pennæ infra prope pectus, & pectoris etiam prope collum tribus coloribus variabant, fusco nempe prope radices, dein aureo & viridi, sed viridis nisi complicatis simul pennis non conspicitur, si unicam à corpore ablatam examines,

niger jam apparet, sed & aureus, si pennas invertas splendorem amittit. *Tergoris* pennæ erant totæ ferruginæ ad rufum vergentes, & velut in exigua flamenta desinebant. *Cauda*, quæ organi pneumatici figuram obtinet, duos dodrantes, cum duobus palmis explebat. &c. Fœmina mare per omnia deformior est, Coturnicis fere colore.

*Locus* ipsis Phasis amnis, unde nomen fortiuntur Athenæus ex Media accersiri solitas quasi meliores, tradit; in Indiæ hortis cum Pavonibus enutritas Ælianus. In Curiana regione tam numerosi capiuntur ut singuli duabus aciculis venditi fuerint.

In Scandinavia aliquando absque cibo sub nive latent. Fridericus Saxonæ Dux ducentos emissos capi vetuit. *Vititant* granis, feminibus & baccis. Avena inprimis delectantur.

*Coëunt* mense Martio & Aprili. Unus mas duabus fœmellis sufficit. Viginti fere ovis, illisque rubris pariendi ordi concluditur. Semel in anno fœtificant, & trigesimo die maturos pullos emittunt. Optime Gallinis incubanda committuntur, ut una matrix quindecim ova operiat. Quomodo vero ex Phasiano mare & Gallinis Gallinaceis simul coëuntibus Phasiani procreari possint, docet apud Aldrovandum, Longolius. Interëunt pediculis nisi se pulverent. Pennas dum nimis pinguescunt, si quibusdam credendum, amittunt. Capite in terram immisso, totos se latere existimant; & dum propriam imaginem admirantur prius se capi sinunt, quam aufugere possit.

Quantum ad *usum medicum* non pingues bene purulentis in cibis exhibentur. Vinum in quo unus extinctus est bibitum, torsiones, si Marcello Empirico credimus, tollit. Adeps, tetanicis, marricis suffocationi, & renum affectibus prodest. In *cibis* vehementer laudantur, nec vel Perdicibus vel gallinis domesticis, si pulli edantur, cedunt. Olim inter summas delicias numerabantur, à quibus Ptolomæus abstinebat: at quibus Heliogabalus Leones & alia bruta pascebat.

**U R O G A L L U S** major, qui veterum Tetrao Aristotelis Tetrix, ut Gesnero; Agricola, Jovio & Aldrovando placet, à quibusdam cum Otide seu Starda, vel Tarda; à nonnullis cum Ortygometra confunditur; ex Gallinaceorum est genere. Quem Aldrovandus describit, habet *collum* dodrantale, palmis nigricantibus, cinereo diluto colore sparsim notatis. *Caput* nigrum, rostrum breve, gibberum, latum. *Supercilia* & pelliculam circa oculos rubra. *Pectus* & ventrem coloris nigri. *Alarum* pennas longissimos palmorum quinque nigricantes,

aut

*Locus.*  
Athenæus  
Dipnos. l.  
Ælianus  
l. 13. de  
Animal.  
cap. 18.  
Martyr. l.  
8. Decad.  
Ocean.  
cap. 1.  
*Vitulus.*

*Generatio.*  
Pall. de re  
rust. c. 29.

Aldrov. l.  
13. Ornith. c. 5.

*Ufus.*  
Trullian.  
lib. 7. c. 2.

Galen. de  
ren. affect.  
cap. 4.

Philosfr.  
l. 8. de  
vita Apollin.  
Lamprid.  
in Hellog.  
Descriptio.



aut potius fufcas , minores fub alis albiffimas. *Poplites* & femora plumis albis, crura ad digitos ufque fufcis veftita. Ex albis in cauda maculis ætas conjicitur, quo majores funt, eò pauciores illas habere feruntur. Reperiuntur qui libras quatuordecim Germanicas : imo & viginti tres Italicas pendunt.

Genera-  
tio.

De *coitu* ipforum mira tradit Encelius. Ore coire, Gallum fperma ex ore tempore coitus emovere; Gallinas poftquam id deglutiverunt, concipere; mox comprimi. Reliquias rore vel pluvia fuperveniente, putrefacta materia, in serpentes mutari, non fuperveniente, in gemmam tranflucidam & candidiffimam abire, fit penes authorem fides.

Ufus.  
Suetonius.

Saporis funt gratiffimi. Caligula fibi eos immolari voluit.

*Urogallum* minorem Stumpfius, Phafianum montanum appellat. A Gefnero confpectus multo majora fupercilia & pelticula rubente, quandoque cærulea, quam *Urogallus* habebat, Rofttrum longitudine tranfverfi digiti, plumas in vertice nigras. Collum plumis Indicis, &c. In Septentrione, fi Olao fides, fub nive duobus aut tribus menfibus laritant. Capiuntur laqueo, ita ut collo adftricto fuffocentur.

#### A R T I C U L U S IV.

*De Grigallis & Attagine.*

**G**Rigallus vel *major*, vel *minor* eft. Illam fub nomine Tetracis Nemefianus Poëta defcribit, dum ait.

*Et Tetracem Romæ, quem nunc vocitare Taracæ  
Ceperunt, Avium eft multo ftultiffima.*

Aldrovandus duplicem tradit defcriptionem. *Prima* eft illius quia à Medico Cracoviendi miffus fuit. Erat magnitudine anferina, roftro nigro adunco, gibbofo. *Capite* plano, à roftro ad narium foramina ufque cinereo, nigris maculis confperfo. Reliquum, collum item, pectus, venter, & coxæ coloris erant ruffi, modo nigris, modo albis maculis afperfi. *Cauda* ruffa, fed magis quam reliquo corpore ad caftaneum accedens, maculis nigris maximis confpergebatur. *Digitis* nudis, cinereis, quatuor erat inftructa. *Oculorum* cilia coccineus color ambiebat. Tota avis fi rofttrum more rapacium & ungues aduncos habuiffet, & parvo fuiffet corpore, vel Lithofalcus, vel Accipiter Fringillarius videri potuiffet. *Altera* ex Gefnero defumpta eft, cujus Grigallus erat toto corpore Perdici fere, præfertim rufficæ infar colorato, & punctis maculisque nigricantibus diftincto, ima colli pars prona intercedentibus lineis ex cæruleo virentibus rubebat, in ventre plurimum albedinis confpiciebatur. Propter mirificam colorum varietatem, Attagenem Alpinum vocare poffes. *Minor* perdice eft

Aldrov.  
Ornithol.  
l. 13. c. 9.

major, fed eidem perfimilis. Creditur à betulæ colore Germanis Birckhun dictus. Supremum à betula corticem fi detrahas qui albo fubeft, in nigroque ruffefcit, præcipuum hujus alitis colorem imitatur. Densa & opaca loca ut bombardarum minas fugiat petit, ideo fæpe in betuleto latet, & inde in fata & fæmilia callidiffime excurrit.

ATTAGEN, Perdix Afelepica quibusdam inter pulveratricis ab Aristotele ponitur; quod inter paluftres ab Aristophane & ejus fcholias; vel error eft, vel ideo factum, quod interdum ex montibus ad loca vicina descendat ibidemque moretur; vel illa, nifi Turnetus fallit, intelligenda eft, quæ ad ripas fluminis moratur. Gallinagini ita fimilis eft, ut nifi paulo major effet, & pectoris color magis ad cinereum vergeret, altera ab altera difficulter diftingui poffet; rofttrum habet longum, fed capta triticum non fecus ac columbi comedit. Quantum ad veterum *defcriptionem*, Alexander Myndius, perdice paulo majorem, totum circa dorsum *κατὰ σπάρρον*, id eft verficoloribus maculis pictum, figulinæ testæ colore, fed magis ruffum, corpore gravi, alis brevibus facit. Quantum ad Recentiorum, Gefnerus Attagenem Corylorum Gallinam effe putat. Bellonius fuum Anati campeftri, quem eoturnicibus bene maculatis comparat, fimilem effe fcribit. Julius Alexandrinus genus quoddam longiore collo & cruribus, plumis non iisdem macularum notis diftinctis, ex Hifpania allatum fe vidiffe refert. Florentiæ obfervatus roftro nigro fed in extremo rubefcente, oculi pupilla nigra, iride cinerea, maculis per ventrem albis, dorfo ferrugineo, nigris maculis infignito, pedibus ferrugineis. Aldrovandus avem ex Sicilia montibus allatam pro Attagene ponit, quæ magnitudine & toto habitu ad Phafianum accedit. Rofttrum habet breve, nigrum, & in acuto recurvum. Colorem totius varium. Caput inprimis afpectus pulcherrimi, cristam in medio vertice erectam, subluteam, nigris & albis maculis variegatam. Pupillam oculorum nigram, iridem luteam, fupercilia ex pelticula coccineo colore rubente. Sub roftro & gulæ principio ceu barba ex tenuiffimis plumis dependet. Collum eft longiusculum, & ad corporis habitum affimilatum, tenue, & exile, cinereum, maculis albis nigris confperfum. Pedum digiti anteriores longi, pofterior brevis, finguli adunco hamo armati.

*Loci* fi ratio habeatur, nulli funt in Campania, quod ibi aconitum, quo purgantur, non proveniat. In Creta nonnifi in Cydoniatarum regione. In Cypro etiam domi aluntur. In Rhodo & Jonia laudatiffimi habentur, fed & in Hifpania Pyrenæis, Ar-

F

vernien-

Discri-  
ptio.  
Arist. II.  
A. l. 9. c.  
49.  
Aristoph.  
in Avi-  
bus &  
v. 13.  
Bellonius  
5. de A-  
vibus c. 6.

Bellonius  
l. citato.

Jul. Alex.  
l. 13.  
falub. c. 5.

Aldro-  
vandus  
lib. c.

Locis.  
Ambr.  
Leo Pro-  
blem.  
343.  
Plin. H.  
N. l. 8.



vernientibus Gallia & Alpibus reperiuntur.

*Visus.* *Visitant* granis & frugibus. Loquuntur nomen suum qua possunt voce, & decantant. Vocales capti, obmutescunt, si Plinio & Aeliano credimus: in suas sedes dimissi *ἐπὶ τῷ θύμῳ* & τὴν πρῆσιν recipiunt. Ex Lydia in Ægyptum aliquando deportati, & in sylvam dimissi, coturnicis primo vocem emisere, post *ἡς τοῖς κατὰ τὰ παλαιὰ* explanatissime protulisse finguntur.

*Affectus.* Amant cervos & dorsis illorum insiliunt. Cum Gallinaceis vero inimicitias exercent.

*Alim.* Caro in *Cibo* est laudatissima, seu sanguinis optimi generationem seu excrementi paucitatem, seu concoitionem alimenti attendas. Candida est, tenera, & fibris prorsus carens. Conceditur purulentis à Tralliano; Nephriticis à Galeno. Cerebrum genituram augere Avicenna reliquit.

## ARTICULUS V.

### De Gallina Corylorum.

*Descriptio.*

**G**allina Corylorum Alberto Bonafas & Orix, Longolio falsò Otis, Bellonio Gallina rustica M. Varronis, aliis Perdix montana & Sylvatica dicitur. Caput ipsi & rostrum ex descriptione Bellonii & Gesneri, est instar Perdix, rubet in superciliis. *Dorsum* pennæ superiores Ascolopacis similes: sub ventre è regione ventriculi albescunt, nigro maculatæ, in utroque latere sub alis. Remiges alarum ad instar Aluconis maculantur. *Cauda* grisea, in extremitate alba, deinde nigra ad pollicis magnitudinem; macula, qua superiores pennæ quæ cæteras tegunt, carent, tincta, cætera colli Tetraonis colore. *Tibiae* plumis ad digitos usque teguntur, quæ villos leporinos fere referunt. Digiti pedum corticosi, squammosi, glauci, multis lineis articulati. Aldrovandus fuscæ maculæ meminit, è qua ejusdem coloris tenues quædam pennæ ceu villi dependentes, tanquam barbæ efficiunt.

*Locus.*

*Reperiuntur* in Hercynia sylva; sed & circa radices Alpium, ubi Coryfi & rubia abundant. Iis enim insident, rapacium volucrum insidias magis timentes quam hominum astum.

*Vitus.*

*Vescuntur* granis, sed imprimis julis seu nucamentis, quæ piper longum referunt.

*Generatio.*

Pullos educatos extra locum educationis ipsorum abducunt: illi vero bini, mas & foemina aliorum se conferunt.

*Ufus.*

*Cibum* suppeditant laudatissimum, & caro earum quatuor diversis coloribus secundum Gesnerum tingitur, secundum Albertum foris est nigra, intus alba. Mulieres quædam pennæ certo tempore decerpitis, adversus uteri suffocationem, utuntur. Stumpsius Epilepticis salubres tradit.

Hippiatri tres quatuorve earundem ventriculos una cum cibo in eis contento, equis asthumaticis devorandos, dari præcipiunt.

## ARTICULUS VI.

### De Otide sive Tarda.

**O**tum & Oridem ex veteribus Aristoteles, Athenæus, Plinius & Oppianus confudère; Starnam & Stardam seu Tardum ex recentioribus Conciliatoribus rapacem Albertus facit, & Bistardam vocat. Tetraoni congenerem non esse, quod ex Plinio Bellonius opinatur, vel peculiaris pedum constitutio, trydaactilos enim est, evincit.

Quantum ad *Formam* fidipes est Athenæo, tribus insistent digitis, magnitudine Gallinacei majoris, capite oblongo, oculis amplis, rostro acuto, lingua ossea, gracili collo. Bellonio & Gesnero, crassior est & validior, gravis, tredecim cum dimidio libras interdum pendit. *Caput* habet inconcinnum, cinerei cum collo, & ad ventriculum usque procedentis coloris. *Rostrum* robustum valde, *linguam* ferratam, utrinque acutam, & in extrema duram. *Meatus* auditorius adeo patulus, ut extremitas digiti immitti possit. Si introspectas duo apparent sub plumis anfractus, unus rostrum versus, alter recta ad cerebrum vergens. *Pectus* crassum ac rotundum, cum ventre & cruribus quatenus plumis vestiuntur ad media usque femora albicans. *Dorsum* castaneis ac subnigris maculis respersum. *Alarum* pennas majores candidas, circa finem nigras. Pennarum radices rubras. *Caudam* pennæ ruffis, cum tenuis quibusdam & maculis nigris superiore interioreque parte albis ornatam. *Tibiae* pollicem crassas, medium pedem longas, squammosas. *Pedes* admodum crassos, sub quibus talus magnus instar muscoli conspicitur. Digitos pedis utriusque contra reliquarum avium morem ternos tantum. *Interiores partes* si spectes, *ventriculum* habet magnum, in quo interdum calculi albi inveniuntur, in extrema gula ante stomachum partem capaciore ex multis rotundis carunculis compactum. *Intestinis* diductis & extensis id quod à fundo ventriculi ad alvum recta procedit, dodrantum est septem cum dimidio, appendices vero duæ ab alvo retrocedunt; quarum altera tenuior est tres dodrantes longa; altera amplior, duos cum dimidio; tres vero isti meatus juxta alvum in unam capacitatem conveniunt.

Quantum ad *Locum* in Italia non visuntur, nisi forte turbine advectæ. Hispaniæ peculiares esse credit Plinius, sed falso. Nam & in Græcia circa Cephissum Bœotia

H.N. lib. 10. c. 22.

*Descriptio.* Athen. Dipn. l. 9.

Bellon. l. 2. de Avibus c. 1.

Gesner. in Ornith.

*Locus.* Aldrovandus Ornithol. l. 13. cap. 12.

Pausan. in Phoci. cap. 11. Plin. H. N. lib. 10. c. 22.



Hector  
Boëtius  
in Hist.  
Scotica.

tia nascuntur, & in Britannia magnosunt numero, & in Belgium sub autumnum gregatim advolant, ibidemque in agris procul ab urbibus distitis morantur, nihil de Polonia dicam. Falsum itaque cum coturnicibus quod à Plinio traditur, quæ ab eo tempore Italiam deferunt, avolare. Arboribus nunquam insident, nec aquas nisi eas, quas post pluvias in camporum foveis relinquuntur, sitis sedandæ causa, frequentant.

Victus.  
Longol.  
Dial. de  
Avibus.  
Generatio.

*Vescitur* frugibus sed & herbis, ut auricula muris; & rapis ventrem implet.

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 23.

*Nidificat* in terra, tricenis diebus incubatum absolvit, & parit cum matura seges est.

Volatus.  
Xenoph.

*Volatu* est propter corporis pondus admodum brevi & tardo, & capitur manu, si quis celerius insitet.

Amicitiam.

lib. 1.

Amicitiam.

lib. 2.

Animal.

cap. 28.

Plut. de

Solertia

Animal.

Oppian.

lib. 3.

Ælian.

l. 6. de A.

nimal.

cap. 24.

Idem lib.

5. c. 24.

Usum.

Athen. in

Dipnos.

Demetrio

l. de Ac-

capitrum

cura.

Alex. lib.

13. de

Sabba

cap. 5.

Plinius in

H. N.

*Amicitiam* cum Equo colit, huic appropinquare & simum deicere gaudet, ita capitur. *Inimicitiam* vero cum vulpe & cane exercet. A vulpe inversa in terram abjecta, caudamque ut collum avis extendente, capitur. *Humilitatis* ob ponderosam corporis molem sibi conscia, simul ac canes latrantes audiveris. *Humilitatis* ob ponderosam corporis molem sibi conscia, simul ac canes latrantes audiveris. *Humilitatis* ob ponderosam corporis molem sibi conscia, simul ac canes latrantes audiveris.

*Usum* & in *Cibus* & in *Medicina* præbent. In *Cibus* caro Xenophonti apud Athenæum suavis, à Demetrio Constantinopolitano Accipitribus tanquam suavissima præscribitur. Julio Alexandrino quamvis nigra & durior, valenter tamen alit; si vel exquisitam in ventriculo concoctionem adeptæ fuerit, vel captæ & jugulatæ durities dometur.

In *Medicina*. Nam adeps apud Phryges & Lycaones mammis puerperio vexatis applicabatur. Fimi usum Avicenna contra impetigines prædicat. Ova eodem teste capillos nigro colore tingunt. Piscatores repræsentatis ex ipsarum pennis muscis, piscibus insidiantur.

## ARTICULUS VII.

*De Anate Campestri & Ave Stella dicta.*

**A**Nas Campestris propter consimilem digitorum numerum Oridi succedit. Bellonio Anas Campestris, Canne Petiere Gallorum: & Tetrax, & Galliæ peculiaris esse creditur; à rusticis Gallis Oliva dicitur. Ex ejusdem descriptione, est Phasiani corpulentia, *Capite*, si crassitiem demas, Coturnicem; *rostro* quod nigrum pullum gallinaceum refert. *Dorsum* tribus aut quatuor coloribus, nempe flavo tendente ad rubrum, subcinereo, & rubro intermixto variegatur. Quatuor pennæ alarum in superiori parte in extremitatibus suis nigrescunt. *Pectus* alba torquis juxta ingluviem circumdat. Radices omnium plumarum

rubræ sunt & sanguineæ. Tres duntaxat in pedibus *digiti*. Omnia intus in avibus granivoris communia.

*Vescitur* granis absque discrimine omnibus, nec non formicis, scarabæis & muscis. Quamvis color colli & capitis semper idem non sit; & in hoc maris à fœmina differentia consistat; dorsum tamen & alæ nunquam colorem immutant.

*STELLA* tribus quoque digitis incedit. Totum corpus, si ventrem & caudam & alas majores excipias ex albo, luteo, & nigro ita variegatum est, ut qui color superet difficile sit judicare. *Rostrum* est longiusculum, in extremitate parum recurvum, nigricans. Venter & coxæ candicant. *Cauda* maculis nigris plurimis, quarum binæ transversales insigni sunt magnitudine, consperguntur.

## ARTICULUS VIII.

*De Oedice nemo Bellonii, & ejus congeneri Aldrovandi.*

**A**Vis, quam Bellonius Oedice nemo à tibiærum infra genu propter os quod valde crassum est, qua nota vel sola agnosci potest, singularem crassitiem, vocat; magnitudinem habet Elori, *rostrum* longiusculum, in extremo nigrum & flavum qua capiti jungitur. *Alis* intus albis, extra nigris Otidem, *dorso* Attagenem refert. Coloris enim est fumosi, maculis nigris per longitudinem ductis variegati. *Digiti* habet in pedibus ternos, *tibias* ut supra. Tarde parit; & ineptæ ad volandum, sub finem mensis Octobris repertæ sunt. Huic respondet illa quam sub CHARADRII Aristotelici nomine Gesnerus descripsit. Galliæ parvæ aut columbæ ei magnitudo. *Rostrum* longiusculum, anterius nigricans, posterius flavescens, extremis partibus inferiore & superiore leviter decussatis. *Pennæ* in collo, capite, & pectore maculosæ, posteriore colli parte ad fuscum tendente; in dorso & alis fuscae, maculis quibusdam rufis insignitæ. *Crura* oblonga, coloris sublutei. *Digiti* terni, brevibus interiore parte membranis juncti. *Ungues* brevissimi & mutili. *Degit* in pratis palustribus: & aliquando in lacu Tugurinenfi glacie adstricto manibus se capi permisit.

*Vicitur* muribus quos, de nocte venatur.

*Vocem* tanquam fistulæ edit. Domi inclusa subinde ambulat, aliquando in orbem ad multum tempus, circa columellam aut aliud quidpiam; aliquando recto tramite; & si quid impedimento fuerit, transilit potius, quam à via recta deflectat. Oculos etiam si digitos admoveas, non claudit.

Addit Aldrovandus aliam Oedice nemo

Victus.

Descriptio.  
Bellon.  
l. 5.  
de Avib.  
cap. 5.

Gesnerus  
in Ornith.

Victus.

Vox.



congenerem. Crassitie corporis & pedum constitutione Otidem refert. *Rostrum* habet superius & inferius æquè longum, rutilum, rictu amplissimo, naribus valde, ut in Anser patulis. Caput, cervicem, dorsum, caudam, & alas, ex flavo & castaneo elegantissime diluta & maculata. Ventrem totum, & femora, intus candida. Gulam & pectus albicantia, intercurrentibus maxime in pectore, maculis. Tibias si digitos pedum compares longissimos.

## ARTICULUS IX.

## De Perdicibus in genere.

**P**erdix, Græcis *πέδιξ* & *περίων*, Creten-  
sibus *πῆριξ*, Pergæis *Περδικαίον*. Hefychio  
*κακιδβα* dicitur. Quo nomine nostra ætate  
hæc avis indicetur, non satis est  
compertum. Perdicem rufum, veterum  
minorem vulgarem Perdicem esse placet  
Turnero; sed rostrum illius cinnabarinum  
non admittit. Quidam apud Longolium  
Otidem cum Perdicibus confundit. Bel-  
lonius ex eo quod Aristotelis Perdicem  
cum aliis avibus modo magnitudo par sit,  
coïre scribit, Coturno Græcorum, qui cum  
Gallinis rem habuisse visus est, id nominis  
imponit. Aldrovandus cui Coturnus, &  
Coturnix, magnitudinem quæ pro diversi-  
tate terrarum variat, (sunt in Allobrogibus  
Perdices midiocri pulso non minores,)   
si excipias, eadem; Coturnicem, Perdi-  
cem ruffam esse sentit, & Perdices mino-  
res ab Athenæo appellatas, easdem cum  
Avibus novis Plinii esse, & Starnas tan-  
quam externas vocari contendit; Rusti-  
culam autem Plinii, quam Dalechampius  
& Suesianus Perdicem minorem esse cre-  
dit, Gallinagini quam Ascolopa seu Scolo-  
pacem Aristoteles vocat, ex descriptionum  
tollatione accenset.

*Genera* ipsarum sunt plurima. Strabo In-  
dicos vulture & Anser majores tradit. De  
Græca seu majore ruffa aliquid diximus.  
Ælianus Syroperdicem vocat avem, per-  
dice minorem & nigram, rostro ruffo, man-  
suescere nesciam, quæque circa Antio-  
chiam Pisidiæ lapidem exest, & conficit.  
Idem Perdices Cyrrhæos vocat, qui neque  
ad certamine valent, neque pulchre cantare  
sciunt, & allio vescuntur. In Chio insu-  
la sunt rubræ, Gallinæ magnitudine. In  
Ægypto cineræ, alibi albæ. Apud Tro-  
glodytas Gallinacei magnitudine, rostro  
& cruribus seu fuscis seu luteis. In regno  
Barnagassi, quædam Caponum magnitu-  
dine, pedibus & rostro luteis, minores Gal-  
linis, alias pedibus & rostro purpureis, non-  
nullas rostro & pedibus cineries. In Hispa-  
niola diversicolores, suavissimi saporis. In  
continente, si Oviedo credendum, Hispani-  
carum Gallinarum magnitudine, duplici

pulpa, alia alteri substrata, eaque tantæ mo-  
lis, ut unam ne insignis quidem helluo ab-  
sumere queat. Colore sunt in pectore, alis  
& collo cinereo. Ova ponunt ovorum no-  
stratum Gallinarum magnitudine, colore  
lapidem cæruleum æmulante.

Quantum ad *internam constitutionem* bina  
habere in Paphlagonia *corda*, falso forte,  
prodidit Teophrastus, hybernis mensi-  
bus nullos habere, *testes* eadem fide alii. In-  
gluviem ventriculo in ipsis præjacere ap-  
pendices non superne ut piscibus, sed in-  
ferne ad extrema intestini haberi, cum  
coëunt turgidos valde testes obtinere; ve-  
rissime Aristoteles prodidit.

*Loca* si quæras, In Hibernia & Lemnio-  
rum insulis nullæ sint, si Botero & Liberali  
credimus, nec minores in Creta, ruffæ in  
Belgio raræ. A duabus in Anapheu insu-  
lam immissis, tanta vis procreata, ut incolæ  
de loco deferendo cogitarent. Apud  
Tarnassaros, Æthiopas, Samios, Creten-  
ses, &c. eximia ipsarum fœcunditas. In in-  
sula Caprea adeo pinguescunt, ut adipem  
eximant incolæ, & in futura convivium ser-  
vent. Quæ in Bœotia, fines in Atticam non  
transvolant, si Athenæo fides, & si forte  
aliquo migraverint, voce ab indigenis di-  
gnoscentur.

*Vescuntur* limacibus, unde ibi nulli, ubi  
Perdices, in Sciatho insula cochleis, allio,  
quod de Cirrhæis Ælianus prodidit; Sa-  
bulo, granis & aliis. Pamphagam esse su-  
spiceris.

*Libidinis* sunt profusissimæ, unde salaci-  
tatis veneræ Symbolum. Sane *Mares* non  
tantum visis fœminis, sed & voce illarum  
audita, semen emittunt, ex animi forte  
impressionem. Nam & si speculum contra  
eos posuerimus ad imaginem suam accur-  
rentes idem faciunt. Idem, si Alexandro  
Myndio credendum, hiantes coëunt, &  
toto coitus tempore lingua exerta volant.

*Nata* jam ova, ne circa pullitei educa-  
tionem occupatis fœminis, earum societa-  
te frustentur, frangunt, in aucupantes in-  
terdum Veneris impatientia ruunt, & ca-  
pitibus ipsorum insident. si fœminarum  
copia non detur, vociferantur & pugnant  
inter se. Victum ajunt Venerem pati, &  
quidem tamdiu donec ipse alterius victor  
evaserit, quin in proprios pullos idem sce-  
lus committunt, eosdemque simul ferme  
ac exclusi sunt, subagitant, nec Gallinaceo  
parcunt generi, ex quorum cum Perdicibus  
congressu, tertium quid progigni Ari-  
stoteles reliquit. Nec remissior *Fœmella* fa-  
lacitas. Si contra mares steterint, aura ab  
his flante prægnantes fiunt. Hiantes per  
tempus exerta lingua æstuant, concipiunt-  
que supervolantium afflatu, sæpe voce  
tantum audita masculi. Adeoque vincit  
etiam libido fœtus charitatem, ut illa furtim  
& in

Athen.  
lib. 9.  
In Dia-  
logo de  
Avibus.  
Bellon. l.  
5. de Avi-  
bus c. 13.

Scaliger  
Exerc.  
236. l. 3.

Athe-  
næus  
Dipn. l. 9.

Genera.  
Geograph.  
lib. 17.  
Ælian. l.  
17. de  
Animal.  
cap. 17.

Athe-  
næus  
H. A. l.  
4. c. 13.  
Athen.  
lib. 9.  
Dipnos.  
Nicol. de  
Nicolais  
lib. 2.  
Itin. O-  
rient. c. 8.  
Scal. Ex.  
236. 13.

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 35.  
Ælian. de  
Animal.  
l. 16. c.  
15.  
Arist. H.  
A. lib. 3.  
cap. 1.  
Arist. H.  
A. l. c.  
ult. Arist.  
H. A. l.  
3. cap. 1.

Athe-  
næus  
l. 9. Dipn.

Viñus.  
Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 37.  
Athen.  
lib. 9. c. 4.  
Æl. H.  
A. l. 4. c.  
13.

Scalig. in  
Arist. de  
plantis.  
Genera-  
tio.  
Athe-  
næus  
Dipn. l. 9.

Ælian. l.  
2. de  
Anim.  
cap. 5.

Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 8.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 33.

Ælian. de  
Animal.  
lib. 10.  
cap. 47.

Arist. l. 2.  
de Gener.  
cap. 2.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 33.

Athe-  
næus  
Dipn.  
lib. 9.



& in occulto incubans, eum sensit foeminam aucupis accedentem ad marem, recanat, revocetque & ultro se præbeat libidini; quod tamen Plutarchus inficiatur. *Nidum* cæterarum avium more non exstruunt, sed partui vicinæ aream seu receptaculum è festucis substernunt, idemque spina & frutice; tum ut contra feras abunde valentur; tum ne ova à rore decidente vel imbribus & sic infœcunde evadant, afficiantur, muniunt, nec in quo loco peperere incubant. Septem vero diebus nidum contexunt, septem in pariendo consummunt, septenos pullos enutrient, si Æliano credimus: *Ova* bis quotannis ponere Albertus dicit; decem, sæpius quindecim & sedecim, illaque seu alba, seu ovis columbæ similia, alii addidere. An utraque *Perdix incubet*, ab aucupibus inquirendum est. *Exclusionem* quod spectat, pullos moræ impatientes, occupatis spatiis sponte erumpere peritusque ovis, ubi primum caput exeruerint, pedesque protulerint, reliquo corpore adhuc adhærescente, procurere, sibi que cibum ductu matrum inquirere, ajunt. Sane more Gallinarum, plumis obvestiti, in agros ubi messis stetit, deducuntur, quod mater suo volatu iis cibum subministrare nequeat. *Vitam* ad quindecim vel sedecim annos extendunt, quod ad vigesimum quintum pervenire, apud Aristotelem legimus, mendum est. Olfactus ipse exquisitus.

*Volatus* ob corporis gravitatem & brevis & humilis; velox tamen & impetuofus, hyberno tempore gregatim, verno, cum proli student, binæ tantum volant. In Bœotia sui cum volant non esse juris, sed in ipso aëre, quas transire non audent, metas habere, inde ultra notatos jam terminos nusquam exire, nec in Atticum solum transmeare, Solinus fabulatur. *Vocem* non eandem habent. Bœoticas exili voce uti ajunt. Athenis circa Corydalum pagum oppidum versus caccabant, ultra vero *πυρρὸς*. Hesychius *καυκίαν* scribit; Ælianus quasdam vocis contentione & cantu valere ait. Ex ipsarum cantu certissimum jam appropinquantis diei signum, sed falso asserit Bellonius.

De *Pugnacitate* earum quædam produntur. Alexander Severus *Perdicum* & *Cattulorum* certamine sese oblectabat. Cyprii easdem ad ejusmodi certamina enutriunt. Apud Gesnerum è Sedunis allata, selem mordebat. Pugnant & inter se cum gregatim per nemora pascentibus, foemina ceu futuri certaminis spectatrix sese offert, & nisi victori copiam sui faciens.

*Victus* nunquam in conspectum prodit.

*Pulli* cum primum ad coitum educuntur, sua cute armati, quam vel ad arbores affricando, vel luto oblinendo asperam red-

dunt, pugnant. acuitur pugnacitas, si trichomannes & polytrichum in cibo offerantur, si Liberali credimus.

Sed & singulari pollere *Perdices ingenio* certum est. Si ad nidum coeperit accedere auceps, præcurrit ad pedes foeta, prægravem aut prælumbem sese simulans, subitoque in procurfu aut brevi aliquo volatu cadit, fracta aut ala aut pedibus, procurrit iterum jam jam prehensurum effugiens, Spemque frustrans, donec in diversum abducatur à nidis. Eadem pavore libera, & materna vocans cura, in sulco resupina, gleba se terræ pedibus apprehensa, operit. Discunt & pulli astum, & quamprimum hominem adesse sibillo significavit mater, supini se collocant, & corpus quisquiliis tegunt. Nec deponit has venator fraudes. Anteretia propositus, cantum ad pugnam læssentem orditur. Sylvestribus ingruentibus pedem refert, ipsi in laqueos incidunt. Nolo sermoni humano enunciando aptos dicere, quod aliqui ex scriptoribus innuere, & latiuscula earundem lingua suadere videtur: Non caret tamen fide, interdum ita cicurari posse, ut, cum Gallinarum domesticarum cohorte promiscue habitent, quod apud Aloysium Mundellam factum; domi educatæ, ad montes interdum victum inquirendi ergo sub custodibus dimittantur, sibilo revocatæ sub vesperam redeant, quod Nicolaus à Nicolais in Chio insula communiter fieri prodit; & ab homine de loco in locum ad quatuor millia, ita ut ille terra iter faciat, istæ per aërem volent, quiescente quiescant, ducantur, quod in Ponto visum, Odoricus de Foro Julii tradit. Ova deperdita per alterius matris damna, ut adoptione alienæ sobolis suæ orbitatis incommoda reparent, resarcire; Natos in campos eductos, ut fuerint materna voce commoti, ovorum genitricem petere; ubi sensere medicamentum lætale parari, vociferari. Cirrhæas seipsas, ut ab aucupibus spernantur emaciare: porro ad vocem sonoram conciliandam uti; vulneri ori anum, mansum imponere; lauri foliis annum fastidium purgare; arundinis lecta, & seu comesta, seu in nidum imposita coma, oculorum fascinationemvertere, adductorum Authorem fide refertur.

*Usus* Cirrhæarum in cibo, nullus aliis enim vescuntur: nostrates laudem apud omnes, Martialem si excipias, muruerunt, qui pullos veteribus, alas reliquis partibus præferunt. Fuere & exta & ova in usu. Helio-gabalus Palatinis ingentes dapes iis refertas exhibuit. Sed nec *Medicina* illis destituitur. Caro Elephantiacis, lue venerea affectis, fluxu alvi laborantibus prodest. Medulla & cerebrum cum vino, ictericis; ventriculus ex vino

Lieralis in cong. mit. narrat.

Ingenium. Plin. H. N. l. 10. cap. 33. Arist. H. A. lib. 9. cap. 8. Ælian. l. 3. de Animal. c. 16.

Plut. de solertia Animal.

Statius lib. 2. Sylv. Athenæus Dipn. l. 3.

Aldrovandus l. 13. Ornithel. cap. 16.

Nicol. lib. 2. Navig. Oriental. cap. 8.

Calliodr. var. l. 2. Ætius l. 13.

Ælian. l. 4. de Animal. cap. 13. Arist. lib. 2. Problem. lib. 19. Ælian.

lib. 5. de de Animal. cap. 46. Plinius in H. N. Ælian. l. 1. de Animal. cap. 35.

Idem lib. 4. c. 13.

*Usus.* Lampr. in Helio-gag. Cardan. in Comm. in Aphor. Hippocr. l. 3. de diæt. Plin. H. N. l. 30. cap. 6.



Idem l. 16. c. 18. Galen. l. 10. de simplic. Discorid. l. 2. c. 72. Plin. lib. 30 c. 14.

nigro iliatis; jecur aridem comitiali morbo laborantibus, sanguis suffusioni oculorum; fel in hebetudine visus, & albuginibus cum melle commistum; pennæ combustæ ad uteri strangulatum; ova ad lactis copiam, facere creduntur.

## ARTICULUS X.

De Perdices in specie.

## PUNCTUM I.

De Perdice Græca Bellonii, Perdice ruffa. Cinerea &amp; Damascena.

Bellon. l. 5 cap. 13.

**P**ERDIX GRÆCA crassa quoque & Coturnus ex descriptione Bellonii dicitur. Nostratibus duplo crassior est; rostro pedibusque rubris, maculis ad anteriorem ventriculi partem eisdem quibus rostra respersa, mediocris Gallinæ magnitudine. Frequens est in rupibus Colmenibus, insulis Cycladibus & Cretæ maritimis. Vox nostrarum voce major, coitus inprimis & partus tempore. Nidificant sub dio mense Majo. Ova edunt sub aliquo magno lapide octodecim, quandoque sedecim, ovis Gallinæ similia, minora, alba, maculis subrubris exiguis respersa, usui peridonea, sed quorum vitellus non congelatur.

**P**ERDIX RUFFA five major, columbam exprimit, rostrum habet Cocci colore, pedes minus rubent. Color cinereus per dorsum, pectus & caput decurrit. Oculorum palpebræ in marginibus rubent, ab iis linea nigra retro per collum tendit, inde reflexa per pectoris partem supremam sæpe circulum facit: quod intra eam est albicat.

**P**ERDIX CINEREA, seu minor, Græcis ignota, ex descriptione Gesneri, coloris est varii, nec descriptu facilis. Rostrum subfuscum. Caput è ruffo fuscum; synciput, partes circa oculos, proram capitis simpliciter ruffa: collum & pectus cinerea, exiguis maculis nigris quasi per versus, crispas & undantes, interstincta: Dorsum, caudam & alas varios colores præ se ferendo, crura ex fusco albicantia. Gregatim volat, vere vero bimatim.

Perdix quæ sub DAMASCENÆ nomine Aldrovando transmissa est, brevitate & crassitie corporis ad Perdices accedit, minor tamen est, rostrum habet prolixius; pedes quodammodo luteos. Nec tamen Æliani Syroperdix est, etsi magnitudine respondeat. Nec enim est nigra, neque rostrum habet ruffum, inmo illa mansuescit, cum hæc semper in feritate perseveret.

## PUNCTUM II.

De Perdice alba, seu de Lagopode.

**P**ERDIX alba, Lagopus à pedibus leporinis & villosis; Aristoteli, qui nullum animal præter unum leporem pedes villosos habere scribit, incognita; Hesychio & Phavorino *λαγῶπις*. Horatio Lagois, nisi fortè piscem Romæ rarum & ideo carum, quod interpretes volunt, intelligat; aliis Perdix petrosa dicitur.

Duorum autem sunt Generum.

*Prius* est columbarum magnitudine, tanti candoris, ut à venatoribus hoc solo, quod nives superat, visu deprehendatur, pedes tamen & rostrum nigricant, supercilia in mare inprimis rubent: collum maculis quibusdam nigricantibus perspergitur, & radices pennarum nigrescunt.

*Alterum* nomine eodem à coturnicibus magnitudine tantum differens croceo tinctu; quod Aldrovandus Perdicem Bellonii Damascenam, seu Syroperdicem esse credit. Dorsi & colli colore Gallinaginem æmulatur. Alæ quæ corpori junguntur, albas, fuscas & fulvas pennas habent; decem remiges cinereæ sunt; pars interior & venter albet, & torquem in pectore rubro, fulvo, flavoque coloribus constantem habent.

Describit & Gesnerus aliud, quod per æstatem fulvescere, & ne per hyemem quidem albescere dicitur.

*Reperiuntur* Lagopodes in Alpibus, & Pyrenæis montibus inque summis jugis imminentibus ei valli cui nomen Arbusi, qua fauces aperiunt, iter. Ita vero frigore, nive, & glacie delectantur, ut ubi locis inferioribus liquantur nives, altiora & soli averfa prosequantur loca, in quibus nix perennat.

*Vocem* edebat, quam Gesnerus describit, cervinæ non dissimilem.

*Naturam* si spectes, non extra terram, in qua nascuntur, iis vesci facile; quando nec vivæ mansuescunt, & corpus occisarum statim marescat. Latent quidem homine conspecto; coque dissimulato sese motu prodere cavent, tanta iis fallendi similitudine nivis fiducia; sed tantæ etiam simplicitatis sunt, ut à venatoribus dispositam lapidum seriem transire non audeant, sed secundum illam, quasi secus murum insuperabilem decurrentes in decipulas incidunt.

*Ufus* earum & in cibus est. Præcipua sapore esse Plinius dicit. Saluberrimas teste Scaligero Norici credunt gustu, subamaras Gesnerus reliquit.

NB. Perdices Indicas vide in Mantissa. N. 8.

Arist. H. A. l. 3. cap. 12.

Horat. l. 2. serm. Satyra 2. Aldrov. l. 13. Ornith. c. 21.

Genera. Plin. H. N. l. 10. cap. 48. Scalig. Exercit. 59. Aldrov. lib. cap.

Gesner. in Ornith.

Locus. Plin. l. c. Scal. l. c.

Vox.

Ingenium. Plin. l. c.

Stumpf. apud Aldr.

Ufus.

Scaliger Exerc. 59.



## A R T I C U L U S X I.

## De Coturnice Latinorum.

Genera.

Arist. l. de  
colorib.  
Crome-  
rus l. 1.  
de Polo-  
nia.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 23.  
Athen.  
lib. 9.  
Aristot.  
in Phy-  
siogn.

**C**oturnix Græcis antiquis *ὄρνις*, modernis *ὄρνις* & *ὄρνις*. Villa-novano, Quisquila, Gasio Quaquila dicitur. Unum duntaxat ipsarum observatum genus. Visa tamen & Alba, si Aristoteli credimus; & in campis Russicis & Podolicis virentibus pedibus, quarum usus spasmus inducat, inveniuntur. Notæ quas suis veteres tribuunt, & in nostris reperiuntur. Parvæ sunt, pedes fissos, & pinnas duras habent. Theophrasto forte Perdices nanæ dicuntur. *Mas* & *Fœmina* distinguuntur; quod Fœminæ totus color quodammodo testaceus superius ad cervicem, dorsum, caudam & alas, ad mentum & pectus subluteus; ad ventrem fere albus. A rostro ejus supra oculos & aures linea insignis longitudinis alba, circulares aliquot maculas habens excurrit. Cauda pro proportionem major est. In *Mare* rostrum magis nigricat. Supra illud capilli quidam extant. Collum lineolis albis intercurrentibus rufescit. Pedes minus lutescunt; digitus vero eorum ita constituti sunt, ut medius primo & tertio longe major sit, posterior quem pro calce habet, longe exiguus. In *internis partibus* singulare quid obtinent. *Ossa* ipsis dura & solida. *Ingluvies* & gula prope ventriculum ampla & lata. *Cor* *πεύζον*, seu muricis modo in tres cuspides divisum. *Jecur* & fellis conspectaculum intestinis agglutinata. *Fellis* ad intestina labentis canalem vix aspectabilem. *Testes* jecori subditos.

Arist. H.  
A. l. c.  
Athen.  
l. 9.

Gal. l. de  
promi-  
scua do-  
ctrina.  
Athen. l.  
9. Joseph.  
Antiq. l.  
13. c. 1.  
Procop.  
l. 13. de  
bello  
Vandalico.

Polyhist.  
c. 18.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 23.

Quantum *ad Locum* Averrhoës in Andalusia, teste Galeoto Martio reperiri negat, in mediterraneis Galliæ tractibus sunt raræ. In Delo, unde nomen Ortygiæ sortita est; ad sinum Arabicum, in superiore Æthiopia, Terra sancta, Madera, Capreis magna ipsarum copia, ad Tanarion, quæ nunc Cerempolis, tanta, ut hodie Porto de Qualeis nominetur. In agrum Neopolitanum tantum numero ex Africa propelluntur, ut glomeratim sæpe in ædes maritimas incidant, & sine ulla difficultate capiantur. Migratorias esse aves, omnes, Albertum si excipias, concedunt. Adveniendi habent tempora æstate depulsa. Cum maria tranant, impetus differunt, & metu spaci longioris vires suas nutriunt tarditate. Ubi terram persentiscunt, coeunt cattervatim, deinde globatæ vehementius properant, quæ festinatio (sunt verba Solini & Plinii) plerumque exitium portat navigantibus. Accidit enim plerumque noctibus, ut vela incidant, & præponderatis sinibus alveos invertant. Austro nunquam exeunt, nam metuunt vim flatus tu-

midioris. Plurimum se Aquilonibus credunt, ut corpora pingujuscula atque eò tarda facilius provehat, sicciior & vehementior spiritus. Ortygometa dicitur quæ gregem ducit. Eandem terræ proximantem speculatus Accipiter rapit, ac propterea opera est universis, ut sollicitent ducem generis externi, per quem frustrentur prima discrimina. Quod de tempore dixit erratum est, nisi de terris tepidioribus æstate apud eos depulsa intelligantur: quod de continuo volatu cum malis & velis infedisse observavit Bellonius, in Delum sæpissime delatas alii; in Ponticis insulis inquietiendi causa paucos dies morari Varro; falsum, quod de navigantium exitio vix credibile, nec tantam simul abire multitudinem verisimile, cum nonnullo corporis pondere & vento apto destitutæ, in locis apricis & tepidioribus remaneant. Austro nunquam exire falsum. Cum & Bellonius à Septentrione in meridiem tendentes, cum è Rhodo Alexandriam Ægypti navigaret, observavit; & Aristoteles Austro tanquam humido & gravi moleste volare prodiderit. Sec nec de Ducibus inter authores convenit. Aristoteles hæc loca adeuntes, sine Ducibus pergere; abeuntes. Lingulacam, Otum, Ortygometa, & Cynchramum Duces habere; ab hac noctu etiam revocari, scribit. Plinius id ad ventum transfert, & de Ducibus ita. Glottidem seu Lingulacam initio blandita peregrinatione avide profectam, poenitentia in volatu cum labore scilicet subit. Reverti in comitatum piget, & sequi, nec unquam plus uno die pergit. In proximo hospitio deserit. Verum invenitur alia anno intercedente relicta: simili modo in singulos dies. Cynchramus perseverantior festinat etiam pervenire ad expetitas terras.

Bellon. l.  
5 de Avi-  
bus c. 20.

Varro l.  
3. de re  
rust. c. 5.

Bellon. l.  
5. de A-  
vibus c.  
17.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
11.

Plin. H.  
N. l. c.

*Vicitant* granis milii, tritici, & aliarum frugum. In Capreis insulis Acinis herbarum; apud Holandos Bryoniæ, secundum Portam malo Punico, semine canabris, lolio, & tritico saginantur, sed & Hellebori semen perinde ipsis cibis, ac sturno cicuta, quæ hominibus venena esse creduntur; (ideo Plinius veneni semen dixit) recuperandæ sanitatis causa, cum Epilepsia tentantur, quod Aquæ placet, seu peculiari quadam naturæ suæ prærogativa, concoctio enim non vi duntaxat caloris, sed tota ventriculi substantia perficitur; seu, quod, cum pertenuis habeant ad corda penetrantes meatus, antea devoratum cicutam concoquant, quam inde lethale gelu ad præcordia pervenerit, ut Divus Basilii censet. Aquam simul ac bibere, turbant, seu quod tali delectentur, seu quod singularem cum Camelis & Elephantis, quibus idem solenne, amicitia gerant.

*Vicitant*.

Junius in  
Noven-  
dal.

Lucret.  
l. 4. de na-  
tura re-  
rum.

Arist. l. de  
plantis.  
Galen. ad  
Pison.

Aphro-  
dis. in  
proem.  
Problem.

Ambr. l.  
3. He-  
xam. c. 9.

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 23. &  
72.

Solin.  
Polyhist.  
c. 18.



Genera-  
tio.  
Arist. H.  
A. l. 9. c. 8.  
Athen.  
lib. 9.

*Salacitas* ipsis quæ Perdicibus, sæpius coitum repetunt, & humi nidulantur. Sunt qui quotannis quater *prolem* edere velint; bis in his quas petunt, bis in his ad quas revertuntur regionibus. Utut sit, quo loco pariunt non incubant, ne quis locum longiores temporis mora percipiat. Sed eim ova cornicis similia, si, Bartholomæo Anglico credendum, excludunt; ex his pulli foeminae, rursus ad decem mense Augusto pariunt. Unde non mirum tantam Coturnicum copiam, & mense Majo incubanti insidiantem, spem centum & amplius perdere.

Volatus.

*Volatus* sunt modici, Austro præsertim flante, cuius humiditas corporis gravitatem auget, sed defectum cursu compensavit natura, hinc Comestori Currelii dicuntur.

Vox.

*Vocem* mari Aristoteles ademit, exilem Albertus credit, foeminae crassam. Mensis Aprilis initio canere incipiunt; num subito cum ad nos venerint, dubium. Vox nemini nota non est, & ideo apud Athenæum Pratinæ placuit, ut *ἀδύγων* dixerit. Sapientes olim pro gnomone utebantur, quod verum cantu suo horoscopi emersum signare crediderint; cum in eo certum numerum fervet.

Pugna.  
Arist. in  
Physiog.  
Dioscor.  
in l. 4. c.  
131.  
Aristoph.  
in pace.

*Pugnacitas* quæ avibus duræ pennæ communis, in istis adianthi usu accenditur, & occasionem, ut Aristophanes Carcini Poëtæ filios, *ὀρνίθας ἀποκρυφείας* dixerit, & pugnax *ὀρνίθας ψυχὴν ἔχειν* dicatur, dedit, fatis olim Athenis & alibi nota fuit: ubi ad certamen tanquam ad gladiatores ludos effusissime conveniebatur, & Solon pugnantibus spectandis tempus impendere iubebat. Nec ignota Neapolitanis hodie, aliquoties victrix, duodecim sæpe aureis venditur. Augustus quoque tanti fecit, ut Erotem Ægypti Præfectum, quod victricem per contumeliam edisset, morte infami multaverit, & Areopagitæ puerum, quod Coturnicibus quas comprehendere posset, oculos erueret, damnaverint. *Antipathia* ipsis cum Pelicano, sed & cum Luna & Scole exorientibus, si Oro credimus. His visis terram fodicant, pupillasque identidem conscribillant.

Quintil.  
lib. 5.  
Instit.  
Orat. c. 9.  
Ælian.  
l. de Animal. c. 49.  
Morbi.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 23.  
Hippocr.  
l. re morbo sacro.  
Arist.  
Comment. in  
Aristot.  
in Plantis.  
Rhod.  
lib. 6.  
Antiq.  
lect. c. 7.  
Ingenium.  
Oppian.  
in Ixeuticis.  
Plin. H.  
N. f. 10.  
cap. 29.

*Epilepsia* eas laborare, experientia comprobavit, sed solas præter hominem quod Plinius prodit, falsum; cum Hippocrates, capras & oves, Scaliger canes, Rhodiginus feles & arietem, Absyrtes Equos, Brodæus Accipitres & Graculos, eodem morbo vexari scribant. Quæ de *Ingenio* ipsarum Oppianus & Plinius, nempe adverso flatu pondusculis lapidum appensis aut gutture arena repleto stabilitas volare, & cum mare transvolant, singulas ternos ore lapillos ferre, singulos per intervalla dimittere, sic utrum mare tranarint observare,

produunt; *τεπαρώδη & πύσσας πύσσαι* esse videntur. Bellonius in naves lapsas aperuit, & milium duntaxat reperit, lapidum non obliturus, si aliquos invenisset.

*Ufus* Coturnicum olim in cibis apud quosdam nullus, quod veratro vescantur, & comitiali morbo laborent. Galenus quosdam, qui edissent, in Doride, Bœotia, & Thessalia musculorum distentionibus correptos observavit. Nos nihil tale sentimus, ut nec ex capris vel avibus quicquam, ex modico esu assarum inprimis optimum pollicetur sanguinem Aldrovandus, ex immodico, pinguiorum inprimis, putredinalem febrim minatur. *Usum in Medicina* si requiras, cerebrum ex unguento myrteo tritum, & stanneo vase repositum, Epileptico paroxysmo medetur, si faciem eo illeveris. Adeps cum pauco helleboro membro pudendi inunctus, venerem auget, cum melle, myrrha, & chalcanto albo oculorum vitia corrigit. Cum Zingibere tritus, Equorum oculos incolumes servat. Caro inveterata porcorum & piscium escæ immiscetur.

Vox.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 23.  
Galen.  
lib. 6.  
Epidem.  
comm. 5.

Galen. de  
Euporist.  
cap. 15.

NB. *Coturnicis genus exoticum vide in Mantissa. N. 7.*

## ARTICULUS XII.

### De Ortygometra.

**D**E Ortygometra quam Plinius & Gaza Matricem, Villanovanus Ethygommetram, Scaliger Coturnicomatrem, & verius vocat; vix, quid certi dicendum sit, habemus. De forma nihil fere ab Antiquis traditum est. Aristotelem si excipias, qui palustribus avibus facie similem esse reliquit. Sed nec ex Recentioribus quicquam certi colliges. Scaliger non absimilem gallinagini, magnitudine partem, colore tamen dilutiore, facie tota coturnicis, esse, & ab aucupibus matrem Qualearum, ab aliis Rascle dici, scripsit. Bellonius duplicem ponit. *Unam* quam Rascle quoque nuncupat. *Alteram* quam in genitis degere affirmat, magnitudine Ortygometræ nigræ, quam falso Rallum nominat, colore præcipue ruffo, in alarum costis subrubente, in femoribus castaneo, maculis albis interstincto; capite perdici cineræ simili. Aldrovandus, qui aquaticarum hanc fere speciem esse putat, ut crura habeant oblonga, digitum qui pro calce est perbreve, corpus gracile, plumas plærunque varias, ventrem albicantem, caudam brevem, rostrum longiusculum, modice flexum, avem, quam à Cardinali Palcotto acceperat, quæque rostrum coturnice majus, caput, collum, dorsum, & maiorem alarum partem testacei coloris, alas qua ventrem contingebant rufescentes; crura pedesque

Plin. l. 10.  
Scaliger  
in Comm.  
ad l. 8.  
Arist. H.  
A. c. 15.  
Arist. H.  
A. l. 8. c.  
12.  
Scalig. loco citato.

Bellon.  
lib. 4. de  
Avibus  
cap. 19.



ribus Hortulanis similia; color duntaxat  
in omnibus pallidior.

C A P U T II.

*De Avibus pulveratricibus domesticis.*

*De Gallo Gallinaceo.*

**G**allus Gallinaceus, Græcis ὄρνις ἀλεκτρυών, ἀλεκταρ, βρητός, κικιρῶ, κοκορῶας ὄρνις, κόρυθων, κόπ-  
 τω, κροκίας, κοτίκας μυθιδος, ὀλόφανω, ὀρθεβόας, ὀρθαλιχω,  
 πέρτικω ὄρνις, σέρκω, σέλκω, ᾧδω ὄρνις, Latinis cohor-  
 talis avis, lucis, cristati oris, &c. dicitur. Gal-  
 linam ἀλεκτρυῶνα ἀλεκτόριδα, κίκαν, ὀρθαλιδα, Cortis a-  
 vem, Mylagridam, appellavere. Νέσσοι νίκαρες  
 ἴπποι, νεοτίδες ὀρθαλαχοί, pullorum sunt nomina.

Genera.

Arist. H.  
A. l. 6.  
cap. I.

Athe-  
næus  
Dipn. l. 7.  
Plin. l. 10.  
cap. 53.  
& 56.  
Colu-  
mellade  
re rustica  
lib.

Reperitur & prope Theſſalonicum ge-  
nus quoddam Gallinaceorum perpetuo  
mutum nunquam familiari his alitibus  
cantu vocale. Nonnullæ quoque ſunt *Lani-  
gera*; ut in quadam Orientis urbe, & nivei  
coloris

Petius  
Martyr  
in Deca-  
dib.  
Ælian. de  
Anim. l.  
15. c. 20.

G coloris

*Locus.* Reperitur in agro Bononiensi & Florentino, ex milii esu vehementur pinguescit, & magno numero depilata, & scatulis asservata, Romam transmittitur, ibidemque caro pretio venditur, sunt vero & alia Hortulanorum genera, *Flavus* nempe colore prope modum paleari, alarum costis & remigum penarum extremitatibus albis. *Albus* cygno ipso fere candidior, & *Hortulano* congener. Caput ipsi excinereo ad flavum vergit, collum cinereum nigris maculis punctatim distinguitur. Venter, crura, pedesque crocea sunt. Cauda tota fusca ad latera latefcens. *Albicilla* cujus cauda alba, cætera vulga-



coloris in regno Mangi pilis more felis nigri videntur. De reliquis suis locis agemus.

Formæ.

Arist. H.

A. l. 9 c.

8.

Laert. in

Salone.

Plin. H.

N. l. 10 c.

17.

Arist. H.

A. l. 2 c. 8.

In itinere

Mosco-

vitico.

Quantum ad *Formam*, Gallum galinaceum Alucone scilicet majore *minorem* prodidit Aristoteles. Soli fidipedum altitum *colores* diversi sunt, & nitorem hunc si attendas, majori speciositate quam Crecus vestuntur. Spectatissimum insigne ipsis, corporeum ferratum, nec carnem id esse, nec cartilaginem, nec callum jure dixerimus, verum peculiare. Christam Latini

ῥομφαία, κυρβασίαν vel κυρβασίαν, κορυφήν, & λοφίον

Græci, dixerunt. Semper est exerta & ru-

bens dum integra sanitate fruitur, &

mirum de ea Herbersteinus. Cum cuidam

in Moscovia frigore jam fere enecto, ab-

scissa fuisset, sibi restitutum, erecto statim

collo cantasse. Plicabilem Gallinæ

obtinere, & per medium capet deorsum

dependentem. *Oculos* omnes habent splen-

didos, salacitatis indicium. *Paleæ* (Aris-

toteles καλλαιν ob purpureum floridumque

colorem vocat) ex rutilo albicantes, sub

mento & collo, velut incanæ barbæ de-

pendeant. *Rostrum* robustum, in superiori

parte aduncum, coloris plerumque cornei

visitur. *Caro* quæ rostrum undique cingit,

nonnullis mentum, *Columellæ* gena est.

*Iubæ* (sic longiores cæteris plumas Columella

dixit) collum & cervicem undique

ambiunt. Vel pectus vel pars ventris poster-

ior *Navis*, à qua pullum aperiri jubet Apici-

us, vocatur. *Cauda*, quam ἑτραν Hesychius

vocat, maribus major, quam foeminae, binæ

longissimæ incurvi arcus imaginem pro-

pter teneritudinem præ se ferentes, in fo-

eminis sunt; quæ capis saginandis sub cau-

da evelluntur, pinguefactorias Germani

dicunt. *Calcaribus* quæ πλάκτα & κέντρα, arman-

tur mares; inque iis in magnam quando-

que molem excrescunt, sed & gallinæ

cum mares vicerint, cucuriunt, crista etiam

caudaque erigitur, ita ut difficile sit, an sint

foeminae, cognoscere, nonnunquam calca-

ria parva, errore naturæ an opere ignoro,

iis enascuntur. Plinius Gallinas probat im-

paribus digitis, aliquando & super quatuor

transverso uno, *Columella* quinque, ita ta-

men ne cruribus emineant transversa cal-

caria, sed hæc ad Oeconomiam spectant.

*Internarum partium* ista est ratio. *Ossa* habent

consistentiam laxam, cavam & levem. *In-*

*gluvies*, quæ πρόλκτος & φόνος ventriculo præ-

posita est. Appendices habet infra, qua

desinunt intestina, ut vere ultra ventricu-

lum esse Plinius scripserit. Pellicula intra

ventriculum stercorei destinata, *Echinus*,

ab aspredine dicitur, *Dioscorder* κοιλίαν vo-

cavit. *Testes* gallinaceis sunt sub jecore, fœ-

minæ supra caudam. Uterus ex descriptio-

ne M. Antonii Ulmi duplex habet foramen.

Infernum per quod ovum ab externa

respiens jam perfectum egreditur:

supernum & internum per quod sub septo transverso inchoatum, ad formam perfectam suscipiendam ingreditur. Totus in parte sinistra ad spinam situs est, dextram abdominis & centrum, intestina obtinent. Exitum ipsi in superna ad spinam desinente parte dedit natura, quia animalia supergressu coeuntia, instrumenta in proximo habere oportebat, in inferiore podicis ad ventrem positus, quia infra illius est officium. Uterque tam proxime cute, quod præputium dixeris, & musculo, sphaericæ figuræ, ut extensioni magis accommodi essent, obteguntur, ut arctissime conniventia, sensim ipsum aliquando fallere possent. Uteri substantia membranæ & crassa est, figura concava, trium digitorum longitudine, qua ad exitum pertinet latior. Porrigitur ab infimo abdomine, juxta ipsorum intestinorum exitum, ad locum conceptionis ovorum sub septo transverso, estque cum extenditur longitudine dodrantali, cujus longitudinis ratione, membranam obtinuit à spina dorsi proportionalem omnino ac persimilem intestinorum mesenterio, quam & venæ frequentes percurrunt, cum ad nutritionem ipsius uteri, tum ad ovi intrinsecus contenti, dum pertransit à loco sub septo transverso, ad ipsius uteri exitum, alitionem. Membrana autem (verba sunt Ulmi) spinæ colligans, eadem prorsus existit ipsi mesenterio intestinorum, quin imo eadem est & substantia, & origine: quapropter consensum habet uterus cum ipsis intestinis. Figura uteri inæqualis, alibi angusta, oblonga, alibi lata, brevis, juxta hanc varietatem, varia quoque fortiri nomina debet. Nam uteri latitudo infimo abdomini proxima, & in qua ovum jam absolutum continetur, estque ipsemet uterus, reliquum vero corpus angustum, oblongum, rotundum, quod ad septum transversum extenditur, vel *uteri stomachus*, vel *uterus productus* extensusve, vel *uteri gula*, nuncupari posset. Est autem membranæ & tenuis, admodum diversa à reliquo utero protenso, & à substantia ipsius uteri, qui ad exitum jacet. Nam finis hic membraneus subtilis & pellucidus existit, ac exanguis. *Intestinum* quoque *uteri*, ratione figuræ & quantitatis, cum cum longitudine rotunditatem cavernosam habeat, merito diceretur. Cui accedit membranæ occasio hanc uteri extensionem, vel productionem spinæ colligantis, quod *Mesenterium uterinum* appellamus. Intermedia pars uteri, quæ est illius portio ab utero propriè dicto, finem interjacens, crassam obtinet substantiam, albam, lacti similem, & in semetipsam confidentem, cujus mesenterion multiplices venas habet. Hujus substantia cocta ovi albuminis gustu saporem exhibet.

De *Vitæ* non est quod multa dicamus. *Vitæ*.

Præ-



Præcepta faginandi ad Oeconomiam pertinent. Uvis & ficibus impense, sed infeliciter vescuntur. Steriles enim evadunt, & pituitosi, si vel semen cannabis apposueris; numerosorum ovorum partu gaudent, si vel hordeum semicoctum, vel Nasturtii semen cum furfure & vino subactum, exhibueris; majora deponent, ad faginandum tum triticum cum aqua coctum, potu interdicto; tum Cytisus vehementer laudantur.

Mathioli  
in Dio-  
scor. l. 3.  
cap. 148.

Generatio.

Quantum ad *Generationem*, & quæ ei adherent. *Sexus* in hac ave manifestis signis distinxit, & mas erecta crista, juba, à cervice per collum dependente, cauda majore, & insigni ad præliandum calcari superbit. *Salacitatis* vero sunt inexhaustæ. Nam et si peculiare ipsis coeundi tempus, verum esse, unde majores forte tum testes, Aristoteles innuere videatur, & ad unum ovum fœcundandum multoties cum eadem gallina gallus coeat, quin & quidam effœminati à primo ortu nascuntur, ut nec cucuriant, neque fœminas ineant, & Theophrastus agrestes cortalibus ad venerem procliviores dicat: certum tamen simul, singulis diebus quinquagesies & amplius uxores suas Gallum inire, si eas mori contingat, moerore animi interdum contabescere, si illæ desint, ne à masculino quidem genere sibi temperare, unde lege vicomburio damnabatur, alias non sui generis volucres, Phasianos nempe & Perdices aggredi, & semen ad Gallinarum & conspectum & vocem emitte. Quin nunquam qui in æde Herculis pascebantur ad Gallinas, quæ in Hebes, interfluente utramque ædem rivo perenni, transvolabant, nisi cum libidinis vexabantur stimulis. Non æque tamen salaces omnes, laceratosi, rubenti, erectaque crista; rostro, brevi, pleno, acuto, oculis ravis aut nigris, palea rubra, collo vario, fœminibus pilosis, unguibus longis, cauda magna, frequentibus pinnis, profusissimi in Venerem esse creduntur. *Coitus* tempus mari, statim ac à cubili surgit, fœminæ, progressu jam die, superveniente illo, confidet ista humi. à coitu inhorrescit, sæpe festuca aliqua se lustrat, & vapore per libidinem excitato membra extendente, sese excutit. *Departu* & *ovis* ne hoc caput nimia mole legentes perturbet, in sequentibus separatim dicemus. *Animales actiones* quod spectat, quia Gallinæ unico oculo sursum elevato, rapaces aves observant, *Visu*, quia aridissimum quodque modo id ore recipere queant, illico dejudicant, gustu pollere videntur.

Oppian.  
in Ixeuticis.  
Arist. l. 9.  
cap. 49.  
Theophr.  
apud Athen. l. 9.

Ælian. l. 4.  
Plut. in l. num.  
brutara-  
tione utantur.  
Athen. lib. 9.  
Dipn. Ælian. lib. 7.  
cap. 46.

Arist. H. A. l. 5.  
cap. 2.

Scaliger  
Exer. 266.  
Vox.

*Vox* Gallinæ mutabiles. Circa partum *κικλίζει* seu singultit, dum incubat, glocit seu glocitat. Cum iniri debet, mancam & exilem vocem format, in genere gracillare & pipare dicitur. Cantus, pro malo

omine accipitur, & inter obstetricum numeratur observata. Galli prope Thessalonicam nullam habent, apud nos graviolem, sed vere *ἀνδρῶν*, qui nec choro, nec fidibus concordat, *ἀδῶν* & cucurrere solent. Vigiliis hos nocturnos excitandis in opera mortalibus, rumpendoque somno natura genuit. Norunt sydera, & ternas distinguunt horas interdum cantu, cum sole eunt cubitum, quartaque castrensi vigilia ad curas, laboremque revocant, nec solis ortum incautis obrepere, diemque venientem nunciant cantu, ipsum vero cantum plausu laterum, hinc *κικλίζων*, & lucis prænucius dicitur, & veteres gnomonibus horariis destituti, noctis deliquium & diei accessum commetiri solebant. Matutinum cantum, quidam alimenti desiderio, (avide animal calidissimum nutritur:) alii salacitati (initurus cucurrere incipit) nonnulli auræ mutationibus, quæ ex solis contingunt motibus, multi cum & satur, & à coitu canat, occultæ cum sole a micitiæ vendicant. Qui profunda nocte validius, mane remissius cantare putant cantum vento ferri, ventum noctu magis quam sub crepusculum spirare, sic gallum longius audire, opinantur. Muti evadunt, si vel circulum è sarmentis callo addideris, vel caput & frontem oleo inunxeris, si Plinio & Alberto credendum.

Plin. H. N. l. 10.  
cap. 21.

Plin. H. N. l. 29.  
cap. 4.

Singularum iis inesse *Fastum* tum inde colligi potest, quod imperitant suo generi, & regnum in quacunque domo sunt exercent: tum quod nullam ineundi sui absque atrocissimo certamine copiam faciant, tum quod ædes ingressuri, sese, ne scilicet crista uspiam offendatur, inclinent.

Plin. H. N. l. c.  
cap. 21.

Athen. lib. 9.

*Pugnacitas* nulli est ignota. Ejus spectaculum, quo Miltiades Græcos in Persas felicissimo successu animavit, Socrates Iphicrati Duci animos adjecit, Themistocles exercitum contra persas ducens instituit, Pergameni quotannis celebrare. Eo Tarnassari Indiæ populi, Ambivariti, apud quos per octo dies summo partium studio in curia quotannis committuntur, Galli, Angli, hocce tempore delectantur. Accendi, & allio, unde *ἀσπορὸν δισπλέων*, politricho, trichomane & adiantho, forte quod cristam Galli quodammodo æmuletur, dicuntur, apud veteres stimulis ferreis æneisque, quos plectra vocant, armabantur, ut se facilius tutarentur in pugna. Nec hæc caret singulari artificio. Videre est ibi intenta projectius capita, in flatas comas, vehementes ictus, cautissimas evitationes, & in omni motu animalium rationes expertium nihil non decorum. Si ex certamine victoriam reportavit, tum oculorum eminentia, tum cervice erecta simul, & cantus contentione insolenter effertur, & triumphantis similis est, vere *Ἀπασίον* Martis pullus.

Ælian. de Animal. l. 4. c. 29.  
Pugna.

Bezan. in Gottodan. l. 7.

Rhodig. Ant. Lect. lib. 16. c. 13.  
Plin. H. N. l. 22.  
cap. 1.

Porta in Phitogn. August. l. 1. de ordine Politian. in Rusticis. Plin. H. N. l. 10.  
cap. 20.  
Ælian. de Anim. l. 4. c. 29.



Victus.

Victus idcirco non canit, quod ex illa mala pugna spiritus, fracti vocem supprimunt. Cujus offensionis verecundia confusus, in primam quamque latebram sese occultat. Ad *Sympathiam* & *Antipathiam*, quæ sequuntur, pertinent. Quod de Gallinis circa præsepia decedit, immistam pabulo necem bobus affert. Porphyrionem tanto amore Gallum prosequutum, ut hoc occiso; ille inedia perire voluerit, *Ælian.* nus oculus testis est. Apes deficiente cibo gallinarum carnibus, & uvis passis refo-  
cillantur. Leo Gallum, & maximè album, ut Ambrosio placet, metuit, quem ex cantu à longe, ex crista propius agnoscit, seu ob occultam quandam causam, nam à leonibus & Pantheris homines non attingi, qui jure Galli peruncti fuerint, maxime si ei allium admisceatur, Plinius verè an falso prodit: seu quod sint

Affectus.  
Colu-  
mell. de  
R. R.Æl. H. A.  
1.5. c. 28.Ambros.  
Hexam.  
lib. 6.  
Æl. H. A.  
1.8. c. 28.Plin. H.  
N. 1. 29.  
cap. 4.  
Lucret. 1.  
4. de Na-  
tura re-  
rum.

—— Gallorum in corpore quedam

*Semina, quæ cum sint oculis immissa Leonum, Pupillas interfodiunt, &c.*

Basiliscum, cum cucurrientem audit adeò tremere dicunt, ut emoriatur. Sic in Cyrenensium arenis ab itinerantibus abigitur. Vulpes una nocte quadraginta interdum & amplius aufert. Voce mustellæ Gallinæ fero exanimantur. Superventu vero eorum, qui serpentis vel canis rabidi morfu læsi fuere, incubitus vitiantur. Eo tamen die quo peperere, à serpentibus non læduntur, & caro earum tum à serpentibus morsis remedio est. Florem vitis si comederint maturescentium uvarum esu abstinere. Ex Sambuco magis conoram buccinam fieri pastor credit, si ibi cædatur, ubi Gallorum cantum frutex ille non exaudiat, seu quod in locis sylvestribus, in quibus Gallorum cantus non auditur, ficciora & solidiora ligna nascantur, ex talibus tibia magis sonora tornetur, seu & ob aliam causam. Nam ob streperam Galli vocem, stridore suo fungosam sambuci materiam convellere, vix verisimile fuerit. Denique taxi baccis quidem impunè vescuntur, sed sparti semine, & hominis qui helleborum bibit excremento, ut Avicenna testatur, intereunt: si cum incubant tonuerit, ova pereunt, & semiformes pulli interimuntur. Auro liquefcenti si Gallinarum membra misceantur, consumunt id in se, ita hoc venenum auri est, falso scripsit Plinius, & ab experientia confutatur.

Dioscor.  
1. 4. c. 75.Arist. in  
H. N.  
Plinius in  
H. N.  
Colu-  
mell. de  
R. R.  
Plin. H.  
N. 1. 29.  
cap. 5.Scaliger  
Exer. 88.Morbi.  
Plin. H.  
N. 1. 20.  
ca. 6.  
Colu-  
mella de  
rerust.

*Morbi* Gallis peculiares, Phtiriasis & Pituita. Hac inter messis & vindemiæ tempus, & cum ficus ac uva immatura ad fatietatem permissa est, laborant. Aqua in qua origanum maduit, præservantur, restituntur sanitati, si vel urina rostrum ablueris, membrana qua tum lingua obducitur leviter unguibus avulsa, vel scillam in aqua maceratam cum farina exhibueris.

Aphthiriasis maximè dum incubant instantur, si arena littorali vel saponariorum è lixivio relicto cinere cura mulierum sese pulverent, liberantur. Solent & cum abortu canflictari, qui ovi candido affato, cum uvis passis tostis æquo pondere tritis & ante alium cibum exhibitis, præcavetur. Pulli facile Podagra tentantur, si sterminus pedibus eorum adhæreat: quanquam an Galli quibus calor multus, cibi abstinencia non minor, ea laborent, dubitetur. Capis sane quibus pusillus calor & edacitas multa familiaris est.

Scaliger.  
Ex. 277.  
f. 2.

Quæ de *Ingenio* dici poterant superius sunt attacta, singulari familiam amore prosequi, & simul ac aliquid escæ nactus est, Gallinas & pullos ad vescendum invitare, easdem contra Milvos defendere, parientibus foeminis condolere, & moerorem exili testari voce, Luna exoriente lætari, & quod summa admiratione dignum est, cum sese sanguinis copia aggravari sentit, unguibus sanguinem ex cristis prolicere, sic plethora levare, helxine se herba purgare, adjecisse sufficiat.

Ingenium

Nec omittendum, Gallos si tempore pluviae canant serenitatem, si noctu citius, quam solent, aëris mutationem & ventum, si paulo post solis occasum vel à vespertino crepusculo, insolentes in raucifonum cucurritum non sine alarum motu prorumpant, tempestatem prædicere. Scilicet, Auster vocalia instrumenta replet, ea sarcina dum se per motum exonerare volunt, ad cantum insolito modo stimulantur. Sed & Gallinæ, si vel mane exire recusant, vel pediculos quærant, & paludes more Anatum alis verberent, vel pectora rostro purgent, vel in arena ultra solitum sese concutiant, vel in principio pluviae locum operum quærant, imminentes imbres maximos prælagire, creditum est. Tempestive ferendum esse monent, si pennas, cum deplumantur, ut ante hyemem solent, à capite amittere cœperint; ferotinè, si à posterioribus.

Porphyr.  
lib. 3.  
Ælian. de  
Animal.  
1. 4. c. 29.  
Plin. H.  
N. 1. 8. c.  
27.  
Præsa-  
gium.  
Ælian. de  
Animal.  
lib. 7.  
cap. 7.

*Ufus* harum avium in cibis frequens & ab omnibus laudatur, faginatarum in primis. Ideo hoc primum antiquis cœnarum interditi exceptum invenio jam lege C. Fannii annis undecim ante tertium bellum Punicum, ne quid volucrum poneretur, præter unam Gallinam, quæ non esset altilis, quod deinde caput translatum, per omnes leges ambulavit. Inventumque diverticulum est in fraudem earum, Gallinaceos quoque pascendi lacte madidis cibis, multo ita gratiores appobantur. Nec tamen in hoc mangono quicquam totum placet. Pertinax Imperator lumbos amicis mittebat, & dorso laganis sunt similes. Messalinus Cotta cristas cum palmis pedum & Anseribus torrere, atque patinis condere reperit

Ufus.

Plin. H.  
N. 1. 10.  
cap. 50.Aldrov.  
Ornith. 1.  
14. c. 1.Capito-  
lin. in vi-  
ta ejus.  
Athen.  
lib. 14.

Ce-



Cerebrum assum cum pauco sale & pipere editur. Jecinora inter omnia edulia Cardanus celebrat. Ventriculus si concoquatur, uberrime nutrit. Intestina quæ & Gileria vocabantur, cum aliis quibusdam rebus incocta edebantur. Testes apud Bononienses Calend. Augusti comedere solemne est. Uropygium inter militares cibos à Gallis computatur. Erant Galeni tempore, qui & sanguinem Gallinarum edebant. Apud Ægyptios nigræ arte certa faginatæ in familiari sunt usu. Jus foeminæ in balneis potant, sic pingues evadunt. *Apparatum* pullorum Conchiliatorum, Parthiorum, Oxyzoniorum, laseratorum, cum cucurbitis exiliatorum, Varrianorum, Frontonianorum, tractogalatorum, farsilium, leucozoniorum, & his similibus, in Apicio vide, ex quo multa Aldrovandus desumit. Olim tamen qui morbo sacro laborabant, Galli carnibus abstinebant. Britannis olim nefas Gallinam gustare, hodie in Socotora insula eandem contingere, religio est.

De *Usu in Medicina* quis unquam dubitaverit. Inde olim superstitiose Æsculapio immolabantur, nec quisquam fere est morbus cui depellendo non adhibeantur. Reperti qui ex forbili ovoterquaterve ex creverunt, si Brasavelo fides. Febrientibus albumen ovorum in aqua concussum exhibuit Hippocrates. Testes in hectica commendantur. Cerebrum Gallinarum in tremore & narium fluxu. Melancholicis Gallina nigra per medium dissecta bene supra caput imponitur. Sunt qui Gallinæ pennam in aceto intictam ad somni profunditatem conferre tradunt. Jus Galli veteris Asthmaticis prodest. Stercus album Galli ad occultas anginas commendatur, & certò vomitum educit, nec male in colica exhibetur, & cum oleo & nitro mixtum clavos pedum sanat. Membrana ventriculo subdita cornu similis trita, stomachicis feliciter exhibetur. Jecur assatum Illæo resistit. Marcellus denique Empiricus prodidit, ossiculum extremum ex ala Gallinacea cochleari terebratum, nodisque septem litio ligatum, atque ita brachio vel cruri ejus partis, quæ inguina habet suspensum, iis mirabile remedium exhibere. Pro Colophone notandum est, quod Coelius Aurelianus reliquit, quendam à Gallâ pugnante leviter læsum, in rabiem cecidisse.

## A D A R T I C U L U M I.

## A P P E N D I X I.

## De Gallinarum ovis.

**D**upliciter Gallinam ova concipere, *Per se* nempe, & *Ex congressu*, constans

fere veterum & recentiorum est sententia. Priori concipiuntur modo, quando mare absente, desiderio ipsius projiciunt intra sese semen gallinæ; sic, tanquam maris initum passæ essent, prægnantes fiunt. Excitat tingentem in partibus genitalibus pruritus, seminantis materiæ abundantia, quam mutua inter se libidinis imaginatio lauget, sed & si tempore certe suaviter attrectentur, idem motis attrectatione humoribus faciunt, ut haud falso, etiam pulvere Plinius dixerit. Accedit ventorum Austrinorum Autumno & vere auxilium. His flantibus, aves multiparæ loca amper quæ concipiunt, obvertunt, iis ad libidinem concitantur. Continuis caudæ ut motus, semen quod copiosum, nec menstruorum discessio ulla, ad matricem attrahit. Hinc à vento concipi aliquando creditum. Hæc ova *σπενίμια* seu subventanea & zephyria dicta sunt, ut cynosura & urina illa, quæ æstate ab humore contento inutili generantur. Neque tamen omnino inania credas. Omnes enim partes habent, minora *σπενίμια*, liquidiora, minus suavia, & infœcunda per se, à superveniente Gallo fecundantur. Nec obeft vel ex luteo in album mutatio, ut Aristoteles credidit, vel utriusque à membrana ambitus. Ex albumine enim pullus generatur; ova piscium jam exclusa, post à mare injecto semine fecundantur, & ovum in matrice subventaneum, præter testam & pellem completum, à semine Galli fecundari Albertus M. testatur. Quanto tempore maturescant, incertum; tardius propter caloris in semine penuriam, verisimile. Reliquias eorum quæ è semine generata sunt esse falsum. Nam in gallinarum & Anserum genere, à novellis sine coitu edita, compertum est.

De *Ovis quæ ex congressu* sic habe. Postquam foemina de superiore loco quæ præcincturæ seu septo transverso subest genituram excepit, formantur ex ea à facultate formatrice ibidem ova, quæ spinæ pedunculis adhærent, exiguum tum primo quiddam ut candidum videtur, & venulis distinctum, rubrum dein & sanguineum, luteum, & flavum totum tandem. Mox de spina in intestini uterini principium decidua & ad primos uteri loculos transmissa continuato congressu eo citius, quo iste frequentior, augescunt, & albugo à croceo secernitur. Tum in secundos loculos detrusa, justam molem acquirunt, & luteum albumine involvitur. Deveniunt tandem in tertiam cellulam, in qua testæ natura duritiem largitur, eam tamen, ut mollia adhuc exeant, nec nutritio, quæ per eadem fit, impediatur. Sic vitello & albugini constantia, (gallatura seu sperma Galli, si Alberto & Aldrovando credimus, per to-

Aristot.  
H. A. lib.  
10.

Arist. H.  
A. lib. 6.  
cap. 2.

Varro R.  
R. l. 2. c. 1.  
Arist. l. 6.  
H. A. c. 2.  
Scalig. in  
l. 10. Arist.  
Hist. animal.  
cap. 6.

Arist. l. 6.  
H. A.  
cap. 2.  
Aldrov.  
Ornith.  
l. 14. c. 1.



tum albumen, usque ad vitellum pertingit, huic versus partem ovi acutiorē infigitur. Decimo à coitu die perfecta, tribus tunicis, quarum una vitellum ambit, altera tanquam pia mater albumen complectitur, tertia inter quam & illam humor crudus nascitur, & dum formatur foetus excernitur, testæ adhærens, duræ meningis locum implet; intus instructa, mollia, ne dolorem pariant, latiore parte, ut mollius deponantur, & quia acutior adhæret, ideo postrema exit; egrediuntur, ac refrigerata, evaporato humore qui exiguus, relictæque portione terrea, justam duritiem, sed acuta parte, qua pullus exit, & ubi grandinem generationi inutilem, qui non cernitur nisi fracto putamine, & injecta parte lutei infra; Aristoteles ponit, exactiorem, servata sua figura, acquirunt. Poni confecta brumâ incipiunt. Circa Calendas Januarii etiam locis tepidioribus ac fecundissimis. Optima foetura ante æquinoctium vernalis editur, post solstitium nata, magnitudinem non implent, tantoque minus, quanto serius provenire. Parituras se singultu produnt; eodem, peperisse testantur, facilius, si festucam ore apprehensam dorso imposuerint, si Oppiano credendum, libentius, si jam prius ovum in nido conspexerint sine dolore, vel exinde quod testamembrana mollis fuerit, egresso demum induretur, colligas.

Numerus pro ætatis ratione variat, quæ multa pariunt, bis in die ponunt, sed hyperinæ evadunt, & cito commoriuntur. Sunt qui quasdam noctu tenera, & nisi ad magnam diei partem, dura, eniti credunt, tenera edituras, dura, si aliquot horis antelucanis lumen viderint, ut sub ortum solis ponere cogantur, & falis supponatur paululum. *Monstrosa* interdum circa ea accidere certum. Vidit Aldrovandus cujus putamen punctis & lineis sanguineis conspersum. Uterum læsum vix dixerim. Sanguinem quo uteri interdum turgent venæ transfudasse verisimile est. Vidit & Albertus totum sphæricum, duabus testis inclusum, absque ullo vitello, cum albumine aquoso tenui, & altero intra interiorem testam. Dantur & sine testa tam hypenemia, quam vera: forte quod illa aquosa sint, & exiguo, si humidus Gallinis cibus apponatur, calore dotentur: his propter ictum, vel ex multitudine compressionem tale quid accadat, si Nicandri opinioni standum est. Nec inter rara trilecitha, id est triplicis vitelli habentur; illaque plerumque in medio testæ cavitatem habere Elluchasis prodidit. Vidit & Gesnerus aliquando cujus putamen, ab altera parte extrema, in angustum velut collum instar cucurbitæ se colligebat. Unum sphæricum ad columbarum vix accedens: alterum anserino haud

minus, plicis rugisque insigne in Aldrovandus Musæo reservabatur. Cæterum *ponatve* & *Gallus ova* inter doctos quaeritur. Nonnulli decrepitem & ad coitum ineptam, septimo, nono, aut ad summum decimo-quarto ætatis anno, pro virium vel imbecillitate vel robore ponere ajunt. Ortum id putrefacto intus semini debet, vel ex humorem colluvio conflatur. Editur sub caniculæ exortum, quod tunc maxime ab ambientis calore expultrix languida in alite decrepita juvetur. Visum in Imperati Musæo oblongum, ab Aldrovando rotundum, colore modo luteo, buxæ, flavescente, lurido, sed & quoddam ruptum, vitello omnino carere dixisses. Quin & Lemnius Zirizæ duos annos Gallos non tantum ovis incubasse, sed & ægre fustibus ab illo opere abigi potuisse, reliquit. Confracta tandem ova, & strangulata à civibus Gallus, quod, ne Basiliscus excluderetur, metuerent. Et hæc est quorundam opinio. Ovo simile aliquid ex conglobata intus putri concretione, in ultimo senio, cum non amplius coit, concipere, verisimilius est: At ovum cum non magis testa excludere potest, quam vir foetum; cum parere non didicerit. Basiliscum ex eo produci in primis si rubeta incubaverit, nugæ, testa carere, & adeo duræ pellis esse, ut fortissimis ictibus resistat, fabulosum.

## A P P E N D I X II.

### De Generatione Pullorum.

**A**bsoluta ovorum historia, de generatione pullorum aliquid nobis dicendum est. Horum vero principium veteres Græci, & inter eos Alcmaeon Crotoniates, & Hippocrates Cous in vitellum; nutrimentum in albumen coniecere. Recentioribus contrarium sentire placuit. Ex albo liquore ovi corporatur animalibus vitellus alimento destinatus est, & τοῖς δὲ σαυγαμένοις τῶν μωρίων ἐν τῷ δένῃ αὐξήσει, inde membris subinde constituendis incrementum administratur. Et certe pullo jam constituto sæpe vitelli pars extat, & cum albumen πυρρῶμενον, *ignitum*, quod incubatione fit & fotu, σίρεον *solidum* fiat; luteum δὲ τοῖς πάροις πύρρυνται, θερμαζόμενον ὑγραίνεται, *gelu duratur* & coit, calore humescit. Excluduntur in cubatu, vel αὐτόματα in terra. Nam in Ægypto & defodiuntur in fimo terra obruto, & turmatim fornacibus Cairinis exclusi prodeunt. Syracusis, potato-rem quendam ovis sub storea humo stratis tandiu potare nunquam opera intermissa solitum fuisse dum excluderentur, proditum est. Liviam ovum in sinu exclusisse, apud Plinium legitur; & vas in quo absque Gallinæ opera excluderentur, à Porta descripsit. Oblonga & acuta excludunt foeminam, obtusa rotundaque

Arist. l. 3.  
de Gener.  
cap. 2.  
Hippoc.  
de Natura  
pueri.

Arist. H.  
A. lib. 6.  
cap. 3.

ab

Columella de  
R. R.

Oppianus  
in Ixeuticis.



ab ea parte quæ acutior esse solet marem. Incerto id argumento ab Aristotele proditum, contrarium apud Columellam legimus. Dies ter septem exclusioni adscripsit Philosophus, minuuntur, si tepidus aër accesserit, *ἡ πλείστη θερμότης τῆς* Concoctio calor quidam est, sed & depravantur aliquando nimio, & urina evadunt, *ἥσσον οἱ ὄντες ἐν τοῖς ἀνθρώποις ὁρῶνται ἀντηρεπομένης τῆς ἰδύος* quemadmodum vina facie subversa in calore acescunt. Formationem, & quomodo alimentum pullus factus assumat, diligentissime exposuit Aristoteles; hunc Aldrovandus secutus, sequentia nobis reliquit, quæ ipsius verbis proponemus. *Secundo* inquit ab incubatu die, luteum observavi deferri ad cacumen, aliquo pacto alteratum, & in medio quasi subalbidum: cuius rei inprimis Aristoteles non meminit. In aliqua vero parte albuminis, quæ pariter erat alterata, semen Galli apparebat, quod tres illas videbatur obtinere qualitates, quales jam ante diximus. *Tertia* die ablato putamine in parte ovi obtusa, vidi albumen, & reliquam substantiæ ovi partem in superiori putamine separatam. Recesferat autem albumen aliquantulum à putamine, quemadmodum fieri videmus in ovis omnibus, quæ minus recentia sunt. Hinc Plinius ova schista appellat tota lutea, quæ triduo incubatu tolluntur. Vocat autem *schista*, teste Hermolao, quia dividantur, & discedebat vitellus à candido. Videbam item manifeste admodum membranas illas tres quas ovis inesse ex Alberto dixi, & ex Aristotele etiam colligitur: neque verum est, quod secunda earum sit recentior genita. Si enim illud ita esset, minime in ovis nondum incubatis conspiceretur. Inest autem & his, ut etiam vidi, sed albior in incubatis caloris causa. Eadem die vitellus videbatur versus ovi partem acutam: atque hoc est, quod dicebat Philosophus. Effertur per id tempus luteus humor ad cacumen, ubi est ovi principium, nam ibi est major calor, & vis spermatis: Apparebat etiam in albumine exiguum velut punctum saliens, estque illud quod Philosophus cor statuit. Ex eo vero evidenter admodum videbam enasci venæ trunculum, & ab hoc duos alios ramulos proficisci, qui meatus illi fuerint sanguiferi, quos ad utramque tunicam ambientem vitellum, & albumen protendi ille dixerat. Sum autem omnino ejus sententiæ, ut ejusmodi vias credam esse venosas, ac pulsátiles, sanguinemque in iis contineri puriorem, principalium membrorum generationi, jecoris nempe, & pulmonis, similiumque idoneum: adeo ut recte dixerit Philosophus, tertia die signa apparere, an ova fecunda sint futura: licet ejusmodi observatio in majorum avium, utpote Cycnorum, An-

serum, ac id genus aliarum ovis locum minime habeat. In ejusmodi enim, ut idem Philosophus testis est, paulo tardius ea signa apparent. *Quarta* die bina videbantur puncta, & quodlibet eorum sese movebat: quæ haud dubio cor, & jecur fuerint, quæ viscera in ovis triduo incubatis idem dixit. Apparebant item duo alia puncta nigricantia, nempe oculi: & jam luteum manifeste ad acutam ovi partem, ubi major calor est, & spermatis vis sese receperat. Trahitur autem à spermate illud pro carnis generatione, ut in omnibus animantibus fit, quæ sibi simile generant. *Quinta* die non amplius punctum illud, quod cor esse diximus, extra videbatur moveri, sed obtegi, ac coperiri, & duo illi meatus venosi evidentiores conspiciebantur, alter vero major altero: nec verum est, quod Albertus scripsit, apparere in tunica illa, quæ albumen includit: nisi forte id de tertia tunica, seu secundaria dixerit, cui evidenter venæ insunt, nam alioqui in illa nullius venæ vestigium inerat. Harum venarum insita vi reliqua albuminis portio quasi in palearum colorem immutatur. Videbantur etiam ramuli ad locum tendere, in quo caput formatur, eo scilicet puriorem materiam, à qua caput, ac in eo cerebrum fiat, una cum virtute formatrice deferentur: Erat autem capitis fabrica valde rudis adhuc ac informis: oculi vero conspectiores, atque ervi quasi magnitudine. *Sequenti dein die* ablato superiori partis obtusæ putamine, ejectisque duabus prioribus tunicis, tertia evidenter cernebatur venulis referta: de hac locutum fuisse Philosophum arbitror cum inquit: Membrana etiam fibris distincta sanguineis: atque hæc meo judicio secundina dici potest. Dein inter hanc, & quartam membranam, quæ foetum involvebat, humor erat aquosus: quem autumo ferream albuminis partem esse, quæ post natum foetum superest, tanquam ad generationem inepta. Eam vero membranam innuere videtur Aristoteles à meatibus illis venarum ortum ducere, quatenus scilicet vibrarum à venoso illo meatu ortarum in palearum, vel sanguinium colorem immutatur. Cernebatur deinde totus foetus moveri, & oculi jam majores erant, quam in præterita die: at partes inferiores, thorax nempe, venter, & pedes, erant valde imperfectæ, nec discerni adhuc poterant, & rostrum erat muccosum: ut recte dixerit Aristoteles: pars inferior corporis nullo membro à superiori distingui inter initia cernitur. Caput denique tota inferiori corporis parte majus erat. *Septima die* aperta quarta tunica foetum conspeximus parvum adhuc, ac indistinctum cum oculis tamen magnis, triplicique in illis humore, crystallino nempe, vitreo & aqueo. Aperto capite

jam



jam cerebrum aperte cernebatur, minus vero reliquæ partes. Unde dicebat Philosophus. Paulo post (intelligit meo iudicio diem quintam usque ad nonam inclusive) & corpus jam pulli discernitur, exiguum admodum primum, & candidum, conspicuum capite, & maxime oculis inflatis, quibus ita permanet diu, uti nos conspeximus: & fero, inquit, decrescunt oculi, & se ad ratam proportionem contrahunt; quod quidem verissimum est: siquidem in quarta decima, aut quinta decima die aliquantum resident deminuti propter caloris digestionem. *Octava* rursus *die* oculi majores adhuc videbantur, utpote ciceris fere magnitudine. Totum corpus tunc sese velociter movebat, & jam crura, & alæ distinctè cerni incipiebant. Rostrum tamen interim mucosum adhuc erat. Sed forte quispiam quærat, cur prius superiores, quam inferiores partes in ejusmodi formatione appareant: cui responsum velim, virtutem, seu facultatem formatricem in superioribus magis quam in inferioribus vigere, quod spiritales sint, & per consequens plus caloris obtineant. Cæterum isthæc omnia, quæ hac die videbam, *sequenti* manifestiora apparebant. *Decima die* non amplius caput toto corpore majus erat, magnum tamen, ut in infantibus etiam videmus: magnitudinis autem causa est humidissima cerebri constitutio. Quod vero Aristoteles dicit oculos fabis majores esse, id profecto minime verum est, si de vulgaribus nostris fabis locutus fuerit, cum alioqui ervi, vel ciceris albi, magnitudinem non excederent: atque hinc etiam non absurde quispiam colligat fabas antiquorum fuisse rotundas, quales araci sunt, quem ideo fabam veterum quidam existimant. Neque etiam verum est: quod tradit, tunc scilicet oculos pupillis adhuc carere. Etenim hæc non tantum hac die apparebant, sed duabus etiam præcedentibus, una cum omnibus partibus ac humoribus. Quod vero ait, detracta cute nihil solidi videri, sed humorem tantum candidum, regidum, & refulgentem ad lucem, nec quicquam aliud, id de crystallino humore mihi dixisse videtur, qui tamen haud solus apparebat, sed vitreus quoque & albugineus, unde non parum hallucinatus videri potest Philosophus, uti etiam Albertus, qui eo tempore nil duri, & glandulosi in iis reperiri existimat, cum crystallinus humor solidus sit, ac quam maxime conspicuus. *Eadem* item *die* vidi omnia viscera, nempe cor, jecur, pulmonem. Cor autem, & jecur erant albicantis coloris: & cordis motus non solum apparebat; antequam foetum aperirem, sed jam secto etiam thorace moveri videbatur. Erat autem pullus involutus quartæ illi membranæ plurimis venis

refertæ, ne in humore jaceret. Cernebam etiam vasa umbilicalia prope anum ad umbilicum deferri, ibique inferi, ut cibum per illum petat foetus. Vide denique, quod Aristoteles non advertit, in dorso prope uropygium pennarum principia nigricantia menti humani cuti non absimilia, cui pili abradi sint. *Die subsequenti* hæc omnia erant manifestiora, & in superioris rostellæ extremitate erat quid albidum: cartilagineum, & subduriusculum, quod rursus die decimertia magis erat conspicuum. Erat autem rotundum milii grano haud absimile. Sagacissima rerum parens natura id ibi fabricasse videtur, ut impediatur, ne rostello suo vel venulas, vel membranulas, vel alias quascunque tenerrimas particulas pertundat. Ajunt mulierculæ, pullos jam natos cibum capere non posse nisi prius id aufertur. *Decimaquarta die* pullus jam totus plumescerebat. *Decimaquinta* in digitis ungues albicantes apparebant. *Die vero decimasexta* ovum aperire placuit in opposita parte, ubi nativa tunica, sed unica tantummodo apparebat, eaque alba. Alteram enim quam in altera parte semper videbam, hic observare minime datum est. Itaque dubitabam an ea tantum pro albuminis tutela nata sit, cum scilicet ovum non sit recens, vel ad pulli defensionem in ovo incubato. Nam indies illa magis magisque decidere videtur, & foetum sequi, qui sui gravitate deorsum decidit. Aristoteles etiam unicam tantum esse ejusmodi tunicam his verbis innuere videtur: Sunt, inquit, quandoque locata ova hoc ordine, prima postremaque ad testam ovi membrana posita est, non testæ ipsius nativa, sed altera illi subjecta: liquor in ea candidus est, quasi diceret, omnes partes in ovo locatæ sunt hoc ordine: nempe prima, postremaque ad testam ovi membrana posita est. Intelligit meo iudicio per primam, & postremam membranam, eas membranas recens in incubato ovo genitas, eas videlicet, quas aliquoties appellavi tertiam secundam, & quartam, quam involventem foetum dixi. Nam cum dicit testæ nativam non esse, ostendit nec primam, nec secundam esse, quæ ab altera ovi parte reperitur. Videtur igitur excludere hanc nativam sive primam, vel secundam, & intelligere tertiam, quam secundam sæpe vocavi. Cum vero dicit, sed altera illi subjecta, intelligit eandem secundam, nempe testæ subjectam, quod vel ex hoc maxime liquet, quod candidum in ea liquorem inesse dicat. Is enim, ut supra ostendi, inter tertiam & quartam continetur. Hinc manifesto errore Suesanus convincitur, qui ex Ephesio per primam interpretatur eam, quæ testæ adhæret, per postremam vero, quæ albumini.

Quæ



Quæ omnia à nobis observata quotidie in sequentibus diebus evidentiora, utpote in perfectissimo pullo apparebant *Die vero vigesima* pullus putamine à parente Gallina ablato hora vigesima secunda sua sponte exivit. Post exclusionem reperiri in putamine tunicas duas albas nativas una cum duobus aliis in incubatu genitis secundina nempe, & quæ foetum ipsum involverat, in qua excrementum adhuc inerat subalbidum. Evidenter adhuc apparebant in pullo tria illa *vasa umbilicalia*, duæ scilicet arteriæ, & vena una, & orificium umbilici valde erat contractum. *Vena* vero jecori per alium rarum, qui recta ad illud tendebat, inferi videbatur. Mirum autem erat, quod extra id nihil lutei appareret, cum tamen in cavitate abdominis, ubi intestina sunt, prope anum pullus per umbilicum totum fere id absorbuerat, simul cum quinta tunica, quæ id involverat. Tanta autem ibi lutei inerat copia, ut vix duplo plus sit in ovo nondum incubato. Aristoteles etiam scripsit, decima ab ortu die, si alvus abscindatur, aliquid adhuc lutei in ea conspici. Sed consideratione inprimis dignum est, quomode ejusmodi membrana, quam una cum vitello à pullo absumi diximus, post ejiciatur. Videtur autem dicendum, quod per eandem viam, umbilicum videlicet, regredi debeat, vel per anum, quod potius credo. Tunicæ huic duo vasa implantantur, quorum unum arteriam esse, & à corde proficisci, pulsus indicat: alterum vena est, deferiturque ad intestina, lutei videlicet vehiculum: Hepar erat coloris admodum lutei, forte quod ex luteo per venas attracto nutriatur. *Hactenus Aldrovandus.* Auxit naturæ dotes ingenium. Fœminas habebis si luna plena nata, eadem supposueris. Eo colore nascentur, quo tincta ova fuerint, pulcherrimi excludentur, si cum Palumbi mare Gallina creverit, & ne de monstrosi laboremus, à Johanne Baptista Porta absque causa provisum est. Solent in partu numerofo quod conceptus cohæreant sæpe monstra nasci; nec vel geminas vel quadrupedes pullos, nulla sectis membranæ vitellis, vidisse, rarum est.

## A R T I C U L U S II.

*De Gallis Gallinaceis & Gallinis in specie.*

## P U N C T U M I.

*De Gallinis Patavinis, Pumilione, & aliis quibusdam monstrosis.*

**H** AËTENUS de Gallis & Gallinaceis; in specie occurrunt nobis Gallinæ, Pumilio, Patavinæ, Gallinæ Turcicæ, Persicæ, Galli Scotici sylvestres, Palustres, Gal-

li & Gallinæ Indicæ, Guineenses, Capi-Gallina PUMILIO seu Nana, quam Aldrovandus describit, erat fere tota nigra. Majores alarum pennæ in extremitatibus candicabant. Maculis in collo mediam lunam æmulantibus ornabantur. *Oculos* macula sublutefcentis coloris rotunda ambiabat. Caput erat cirratum. Paleæ & crista intensius rubebant. Ungues impense candicabant.

EX PATAVINIS Gallina tota ex nigro virescebat. *Cristam* gerebat exiguam coloris vix rubri. Pellicula quam prope aurium foramina obtinent, albebat. Mas quinque duntaxat coloribus ornabatur, nigro, albo, viridi, rubeo & luteo. Corpore erat ater, caput cirrhatum, cirrhi radices erant albæ, rostro & pedibus luteis. Vifa aliquando Gallina tota candida, cristata, vifa & alia in lapideam substantiam inter parietes conversa, caudiculis suis absque pennis histricis instar horrida. Dantur & pedibus pennatis seu hirsutis quarum descriptionem apud Aldrovandum vide. *Cristam* Gallus habebat duplicem non admodum magnam. Vifi aliquando & monstrosi. Tacebo gallinam quæ tres pedes, tertium prope anum enascentem habebat, pullum, qui totidem instructus, tertium velut ex Uropygio enatum ostentabat. Nihil vel de eo dicam, cui pes à podice natus, quinque digitis instructus, visebatur, vel cui seu quatuor, priores imperfecti & pallidi; perfecti & lutei posteriores, seu quinque erant, vel de eo pullo cui quatuor alæ erant: non tantum contrarium alarum pennæ situm; sed & cervicis plumulas caput versus cirri instar erectas Tagliaferus Medicus observavit in quodam. At qui in aula Hetruriæ Ducis visebatur Gallus, habebant caput & paleas ex plumis militum, conos quibus galeas exornant æmulantibus duos in fronte pennarum calamos velut duo cornua surrectos; totidem ab utraque rostri prope nares parte, qui in extremitate plumas tenuissimas setarum instar edebant, unum in cervice, qui è principio fere ejusmodi setis ornabatur. Pennæ veluti squammas toto corpore æmulabantur. Prope Vropygium qua cauda exit tuberculum rotundum & subalbidum visebatur. Cauda carnosa, pilis nuda; in extremitate floccum album habens propendebat. Tibiæ velut ocreis induebantur.

Aldro-  
vandus l.  
14.  
Ornit. c.  
5.

## P U N C T U M II.

*De Gallinis Turcicis, Persicis, Gallo Scotico Sylvestri & Palustribus.*

**T** U R C I C U S Gallus, quem Aldrovandus describit corpore erat candicante. Alis & alvo nigris. Cauda partim viridi,  
H partim



partim nigra. Tibiis & pedibus sub cæruleis. Toto corpore, modo argenteis, modo aureis lineis variegato. Gallina tota erat alba, maculis ubique nigris conspersa, pedibus subcæruleis. Vifa & alia cum pedibus cæruleis ex albo & nigro maculata. Post carneam cristam, aliam ex pennis albis Alaudæ instar habebat, ut in icone expressum est.

*PERSICUS* cristam veluti caudam obtinebat, pedes cinereos, ipse totus niger erat. Gallinæ totæ coloris ferruginei visuntur.

*Gallus SCOTICUS* sylvestris Phasianæ carne ac magnitudine est similis, sed nigra pluma, rubentibus admodum palpebris. Mas collo, pectore, alis, coxisque punctis rubicundis aspersus est; foeminam leucophæam, maculæ nigræ variant, superciia & barbulae in utroque sexu maculis nigris asperguntur. Similis est huic ille, quem Turnerus Morhenam vocat. Mas enim totus splendentis est nigredinis, eam caudæ partem, quæ podicem tegit, quæque alba est si exceperis. Caput ruber sed corneus cirrhus tegit, & circa genas duo veluti lobi rubri & carnei. Foemina tota maculis distincta est, & à Perdice nisi major esset, & ruffa, magis ægre dignoscitur. Degunt in desertis, & erica consitis locis. Granis, & summis erucæ germinibus, vescuntur.

*Gallo PALUSTRIS* corpus est subrufum aut sufflavum, punctis nigricantibus undique distinguitur. An idem sit cum illo qui frumento abstinet, & enascentibus minutisque Cytisi foliis vescitur, ut Boëthius prodidit, dubito.

### PUNCTUM III.

*De Gallinaceis & Gallinis Indicis.*

*G*ALLUM INDICUM duplicem nobis Aldrovandus exhibet. *Primus* est auritus, tridactylos, nulli volucrum generi pulchritudine inferior. *Rostrum* illi in superiore parte aduncum, totum rubrum. *Caput*, *pectus*, & *venter* integer colore roseo diluto, qui in pectore maculis subroseis dilutioribus exiguis, in ventre longe majoribus, quas alba linea transcurrit, insigniuntur. *Cristas* habebat duas, carneam unam, quæ prope rostrum est, inter quam & rostrum superius, macula oblonga cærulea est: alteram pennis luteis prope primam cristam parvis, mox majoribus quæ sursum primo ascendunt, mox descendunt deorsum, constantem. *Oculi* eundem fere qui in homine est præ se ferebant situm, oblongum scilicet, in cuius medio illi positi. *Aures* habebat erectas asininis non absimiles. *Alas* admodum diversi coloris. *Caudam* duplicem. Priorem exiguam, quinque pennis ruberrimis constantem. Aliam novem longissimis, diversum colorem obtinentibus.

De collo superiori & Vropygium pennæ cæruleæ albis calamis ornatae dependent. *Alterum* simpliciter Indicum idem nominat. Coloris toto corpore erat atterrimi. *Rostrum* superiore adunco, utroque caput versus luteo, cætera atro. Ubi foramina narium aliis, ibi rotundum quid & luteum cerasi magnitudine conspiciebatur. *Cristæ* loco cirros gerebat. Cauda & calcaribus carebat. Tibiæ pedesque tabellis albicantibus præditi erant. *Gallinas INDICAS*, tres idem exhibet. *Primam* colore corporis fuso. Capite cirrhato, rostro in medio ruberoso, albicante, nigris maculis insignito. Coxis ex ferrugineo lutescentibus. Cauda nulla. Vropygio, simiæ instar, nudo. *Alteram* corpore à rostro ad caudæ extremitatem exiguo, ad cæruleum vergente, rostro recurvo & rubicundo. Cauda longa, ut in Pica extensa, candida, & lineis nigris conspersa, quæque in fronte tuberculum magnum, figura ficus, coloris fere cærulei gerebat. *Tertiam* colore fusco, in collo & alis ad cinereum vergente, rostro rubicundo, sed non adunco, tuberculum simile in fronte gerentem. *Numidica* dicebatur.

### PUNCTUM IV.

*De Gallinis Guineis.*

*G*ALLINÆ GUINÆ à regione ita dictæ, Bellonius l. 5. de Avib. c. 9. Perdices Terræ novæ quoque dicuntur. Corpulentia vix nostrates Gallinas superant, iisdemque quoad mores & vocem fere similes sunt. Peculiare ipsis acervum quendam pilorum supra caput obtinere, sed qui in anteriori parte reflectuntur, à prima vertebra aut ossè colli procedendo per posteriorem capitis partem. Gallum Mauritanum ita Gesnerus ex Cajo descripsit. Pulcherrima inquit avis est, magnitudine corporis figura, rostro & pede Phasianæ simiis, vertice corneo in apicem corneum à posteriori parte præcipientem, in anteriori leniter acclivem elevato, armatus. Eum natura videtur inferiori capitis parti tribus veluti laciniis se promittentibus committere atque deligare: inter oculum & aurem utrinque una omnibus ejusdem cum vertice coloris: ita ut insideat capite eo modo quo Ducalis pileus Duci Veneto, si quod jam adversum est aversum fieret. Rugosus is est inferius per circuitum, qua se attollit in directum in summo collo ad occipitium, nascuntur erecti quidam atque nigri pili in contrarium versi. *Oculi* toti nigri, æque & in orbem palpebræ & cilia. Si maculam in summa & posteriori parte supercilii utriusque demas. Imum caput per longitudinem utrinque caro quædam callosa colore sanguineo occupat, quæ ne propendeat veluti palea, ut replicaretur, natura voluit, & averso ductu in duos process-



processus acutos à capite liberos finiret. Ex hac carne atollunt se utrinque carunculæ, quibus nares in ambitu vestiuntur, & caput in anteriori parte à cetero rostro pallido separatur. Harum ad rostrum margines inferiores, replicantur leviter sub utraque nare. Quod inter verticem & carnem est à dextra & sinistra parte, squammosa duplici incisura notatæ: in posteriori nulla sed læves, & vultui punctis quibusdam sui coloris respersæ. Color illi in faucibus exquisite est purpureus: in cætero corpore per summa contuenti, qualis confurgit, si album & nigrum pollinem, ut cunque tenuiter tritum, colori fusco rarius aspergas, nec tamen commiscens. Tali colori maculæ ovaes aut rotundæ per totum corpus inesse visuntur, per summa majores per ima minores comprehensæ intervallis linearum, ut apparet in plumarum compositione naturali, qua se mutuo interfecant obliquo hinc inde ductu per summa tantum corporis, non item per ima. Id non ex toto corpore solum deprehendes, sed ex singulis avulsis pennis. Superiores enim obliquis lineis se interfecantibus, aut si mavis, orbiculis quibusdam ex albo & nigro, ut dixi polline confectis, & per extremitatem conjunctis; ut in favis aut retibus, maculas ovaes aut rotundas, in spaciis fuscis comprehendunt, inferiores non item. Utræque tam simili lege positæ sunt. Nam in aliis plumis ordine ita junctæ sunt, ut fere triangulos acutos faciant; in aliis ut ovalem figuram repræsentent, &c. *Vox* illis divisus sibilus non sonior, nec voce Coturnicis major. Similem Gallinis communibus scribit Bello-nius. Fœcundæ sunt, & nutriendis pullis sedulæ.

## A R T I C U L U S III.

## De Capo.

**C**Aporum tot sunt genera quot Gallorum, & sola castratione ab his differunt. Capitis tamen juba major est quam Gallis, caudæ pennæ longiores sunt, & calcaria in majorem mollem excrescunt. *Vox* etiam magis demissa & rauca. Scaliger unum insigni magnitudini, perpetuum convivam habuit, qui cum ater fuisset totus, anno quarto evasit candidus, quamquam erant alii quibus nulla pluma nigra fuerat. Duobus olim *castrabantur* modis, lambis nempe adustis candente ferro, aut calcaribus ad infima crura usque. Hodie vulnere tanto quantum digito superius lumbos subsepto, ubi testes adhærent immittendo sufficit, inflicto, testiculi per posteriora evelluntur. Mori interdum contingit, si erratum fuerit: & Gallum à castratione ita intumuisse Aldrovandus observavit, ut pellis digitis pulsata, tympani bellici

instar sonum ederet. Breve quidam *pinguere* scribunt, si cerevisiam aquæ loco apposueris.

*Uusus in cibo* multus est. Optimum enim sunt nutrimentum & perfectum generant sanguinem, ut omnium avium laudas quantum ad obsonia pertinent, una caro Gallinacea, cujus patina stomachum juvat, pectus lenit, vocem sonoram facit, corpus obesat, Platina comprehendat. Maxime circa sex, septem, vel octo mensium ætatem probantur. In *Medicina* jus caponum ad virium restaurationem commendatur. Quidam ossa crurum medicamentis ad alba mulierum menstrua, immiscent. Alii Fistulæ indolenti pelliculam ventriculi interiori, in sole torrefactam, & in pulverem redactam inspergunt. Græci asserunt, fabæ semina caporum sanguine macerata, ab adversantibus herbis immunia fore; & si pridie quam seruntur aquæ simplici infusa fuerint, citius nascituras; sin nitrata difficilimam coctionem non habituras.

## C A P U T III.

*De Avibus, quæ se pulverant simul & lavant.*

## A R T I C U L U S I.

## De Columbibus.

**A**Ves, quas Latini Columbas, seu quod in culminibus villarum degere soleant; seu quod bibentes rostrum aquæ diutius immergant, ut Hermolao videtur; (*κολυμβᾶν* Urinare est) seu quod lumbos frequenter colant, ut Alberto M. placet, dicunt; Græcis *αειεῖται*, & *περιεῖται*, *πέλειται* aliquando *πηνῶνες* *πηνῆρες*, & *εὐριπτοι* apud Homerum, Hesychium, Phavorinum & alios dicuntur. Descriptionem non est, quod apponamus. Proprium omnibus utraque connivere palpebra. Aristoteles pedibus & ungibus cucullum repræsentare dixit. *Internas* si spectes *partes* Ingluviem parvam & fere rotundam ultra ventriculum, id est geminos sinus habent; unum in quo merguntur recentia, ut guttur: alterum in quem ex eo dimittunt concoctione maturata. *Ventriculus* ipsis ferventior. *Lien* tam exiguus, ut visum fugiat. De *felle* inter eruditos non constat. Sunt qui habere negant, Galeno rediculi, sunt qui affirmant, seu in Vropygio vel dorso, quod vesimile non est: seu non eo loco, quo cætera animantia, sed & inter eas aliis ventri, aliis intestino jungitur. Cysti carere dum affirmat Galenus, ne discipiatur metuo.

Quantum *ad Locum*, ubique fere conspiciuntur. Ingens olim earum in Assyria circa Ascalonem, quia sacra, & lege edi vetita; in Cypro, Papho, Cythera, Sicilia, Cnido, quia Veneri dicata, copia. Tanta apud

Usum.

Varro l. 3. de re rust.

Arist. l. 2. de partib. Anim. c. 13. Arist. H. A. l. 3. c. ult.

Arist. l. 3. de partib. cap. 7.

Galenus de atra bile.

Locus. Eusebius præp. Evang. l. 8. cap. 5. Athenæus lib. 14.



Textor in Cornu copiae. Polyhist. cap. 9. Pœonas & Illyrios, ut incolas militari contra eas ordine exire, Textor nescio cujus fide, prodiderit. Nil de portu, & navali, Thisbæorum, Insula Columbaria Solini, quæ in Tyrrheno mari sita est; Lucais insulis, in quibus columbis quandoque onerantur naves, regno Pegu, Fessa, & aliis dicam. Amant vere propter innatum pavorem eminentia loca: naturaliter tamen specus & latebras quærunt. quæ de *nidulatione* in arboribus dicuntur, Palumbis potius competunt. *Sexum* difficulter, nisi interiora scrutentur, discernas. Vox tamen exigua fæmellam, gravior marem prodit.

Horat. l. 1. oda. 2. *Coituri* mutuo se exosculantur, & senior quidem primum congressum ob osculo exorditur, sequentem sine osculo celebrat, at junior quoties libet coire, osculatur. observatum tamen sine osculo marem admitti, si fæmellæ ereptus post triduum eidem restituatur. Si mares defunt, ruunt in mutuos amplexus fæminæ, ita singulis diebus ad octiduum & ultra hypenemium ponitur. *Ovum* quinto à coitu die perficitur: per oblivionem factum, quod Plinius intra decem maturescere scripsit, & fæmina sæpe ipsa qua peperit, postridie aliquando, marem repetit, ut forte ad partum alterius ovi alacrior accedat. Vexata, vel sponte paulo morosior, ovum per tristitiam retinet. Bina fere ponuntur, ita natura moderante, ut aliis crebrior sit foetus, aliis numerosior. Sed & quia volaces, consumitur volatu materia, & in alas pennasque abit. Ex priori marem, fæminam ex posteriore edi veteribus creditum, visæ tamen binas fæminas aliquando, binos aliquando mares uno exclusisse partu. Bene autem Plinius crebriorem iisdem foetum innuit, & falso *διγενον* appellavit Varinus. Singulis namque seu tricenis, seu quadragenis diebus concipiunt, pariunt, incubant, & pullos enutriunt. Continuatur toto anno fœcunditas, si locum apricum; unde Ægyptiæ duodecies pariunt; & cibum, quem facile acquisitum eximio corporis & ventriculi calore nullo negotio conficiunt; (hæc fœcunditatis causa Aristoteli) habuerint, si horum aliquid defest, à bruma ad æquinoctium hybernū otiantur. Sic duodecim ex eis imo tredecim & quatuordecim, haberi possunt paria. Æstate enim binis interdum mensibus terna edunt, sæpe inter pullos ova inveniuntur, & alii provolant, alii erumpunt, hi rursus simul ac creverunt, & robur habent, cum matribus pariunt, & quam Aristoteles intra annum eos coire, semestres incipere. Venerem agnoscere scribat: Plinio tamen quinquemestres fœtificare scribenti, Albertus & experientia subscribunt. Non est ergo mirum quod M. Varronis temporibus, quinque millia

columbarum quandoque in uno peristeprothio colebantur, cum vel decem paria paucis annis in talem numerum crescere queant. *Incubatio* maris & fæminæ perficitur opera, hæc noctu, ille interdum incubat, de tempore inter scriptores non constat. Plinius, æstato octave decimo die excludere putat, vicesimo aliàs. Apud Aristotelem, quod ovum prius editum fuerit, intravicesimum diem & absolvitur & excutitur à pullo. Pertundunt ovum pridie quam excludatur pullus. Alberto denique completur septem in utero diebus, fovetur per quatuordecim, postea fisso ovo, pullus exit. Experientia ab Aristotele militat, qui etiam cœcos & imperfectos, quod, quia pauciparæ sunt, copia alimenti cum prole parere soleant, pari affirmat. Possunt ab ortu versicolores haberi; si miscentibus jam oscula maritis,

*Sargula flammeolis oculis rubrosque tapetes  
Et vestes ostro perfusas objicit auceps.*

*Vitam* culumbarum octonis annis Plinius definivit; quos etiam allecetricibus, excœcatis Aristoteles tribuit. Albertus domesticis viginti annos adscribit. Athenæus ad triginta producit, fuit, quæ viginti duos annos vixit, & semper, excepto ultimo generavit.

*Vocem* per *γογγίζειν, γογγύζειν, τινδορίζειν*, & *τοτίζειν*, quod Latini gemere, murmurare, & meditari dicunt, expressere Græci.

*Volatum* quod attinet, nullæ domesticarum neque longius domo, neque diutius abvolant, sed & alte per aëra volitasse, in Paphlagonia Bellonius observavit, ut conspectum effugerent, seu iis cum aëre tanta intercedit familiaritas, ut securius in eodem degant: seu alia causa. Celeritatem multi testantur authores, hujus opera uno eodemque die victoria Taurosthenis ex Olympia Æginum parenti ipsius nuntiata est. Sueta intacta fides, ut Hircius & Brutus in Mutinensi obsidione; Lydenses in sua; Romani in Circum vel Theatrum euntes, quæ vellent domum nuntiaturi; Ægyptii, Cyprii, & Cretenses nautæ ad terram appropinquantes; Benenses Cattiæ urbis incolæ eis usi tanquam tabellionibus fuerint; effecit. Frustra valum & vigil obsidio per cœlum eunte nuncio. Duplicatur celeritas, dum se à rapacibus insectari sentiunt. Sed & strepitum in volatu quandoque edunt, qua ostentatione, ut vinctæ præbentur Accipitri implicatis strepitu pennis, qui non nisi ipsis alarum numeris eliditur. Speculatus occultus fronde latro, & gaudentem in ipsa gloria rapit.

Ad *Ingenium* & *Mores* Columbarum pertinet, quod cum bibunt, collum non resupinant, sed quia breve & amplum, multarumque

Athen. l. 9. c. 16.

Plin. H. A. l. 10. cap. 58. Arist. H. A. l. 6. cap. 4.

Arist. l. 4. de Generibus c. 6.

Oppian. l. 1. de venat.

Ætas. Plin. H. N. l. 10. Arist. H. A. l. 9. cap. 7. Athen. l. 9. Diognos.

Vox.

Volatus.

Bellon. lib. 6. de Avibus cap. 23.

Virgil. lib. 5. Æneid. Ælian. variat. lib. 9. Plin. l. 10. c. 37.

Bellon. l. 6. de Avibus c. 21. Botter. in Relationibus. Virgil. Æneid. lib. 5. Plin. H. N. l. 10. cap. 36. Ingenium. Athenæus Dipn. l. 9. Plin. H. N. l. 10. cap. 34. Arist. H. A. l. 9. cap. 7.



rumque aquarum capax habent, large jumentorum more bibunt, quod

— ubi mollia frangunt

*Nubila, jam longum caeloque domoque gregata,  
Si junxit pennas, diversoque hospita tractu*

*Venit avis, cuncta primū mirantur & horrent,  
Mox propiusq; volant, socium jamq; in aere ipso*

*Paulatim fecere suum, plausuque secundo*

*Circumeunt hilares, & ad alta cubilia ducunt.*

quod corpus primo humectant, dein pulvere sese conspergunt, sic à pulicibus & omni sorde mundantur, quod mane foeminas vagantes in nidum compellunt, & incubare cogunt. Sæpe ex hac causa castigatio pigrius intrante foemina ad pullos, quod conjugii fidem non violant, communemque servant domum. Nisi coelebs aut vidua nidum non reliquit, & imperiosos mares subinde etiam iniquos ferunt: quippe suspicio est adulterii quamvis natura non sit. Tunc plenum querela guttur, sævique rostri cibus, mox in satisfactione exosculatio, & circa veneris preces pedum orbibus adulatio. Appetunt tamen maribus defunctis, cujuscunque coloris, non digrætantum, quod proditum quibusdam, novas nuptias; & si domini jussu conjugia permutent, pristino domicilio redditæ, prioribus spretis, novissimis adhærescunt, quin & nonnullas ex maritatis cum aliis coire Aristoteles dixit: & ut nigra apud Ægyptios mulier perpetuo vidua, quod pulla semper incederet significabatur: sic ingrati apud eosdem columba, quod masculus validior factus, partem rostro incessit, & à matre abigere conatur. Huc etiam pertinet, quod mas adultos pullos, cum ex nido tempus prodeunti est, subigit, quod eis pavore percussis (sunt autem timidissima) mediæ natium partes tremunt, quod, dum etiam sub mensis cum Gallinis conversantur, hominum consuetudine se delectari ostendunt, quod denique Aquilam sublimipetam ab humipeta discernere norunt, & si hic invadit, in sublime feruntur, si ille, deorsum versus ruunt. Nec tacendum, recens natis pullis vel terram falsuginosam, quam in locis lotio conspergi suetis quærent; vel salis ipsius grana, seu ut livorem abigant, ne fascinantium noceant imprecationes; seu, ut ad recipiendos cibos præparentur; seu, quod verisimillimum, ut eis tam foecunditatem quam cibi appetentiam ingerant; inspuere, corporis mundicie impensius studentes, nidos à fimo repurgare. Helxine, herba ad evacuationem uti, laurinos ramulos tenues primum pro amuleto colligere, deinde ad pullorum custodiam nidis imponere. Colores suos varietatemque dispositam nosse. Memoria, ideo temporis, quando foemina in cucubitu succedendum est, nunquam mas obliviscitur, pollere. Ita denique

cicurati, ut & literas ferant, & cibum ex auribus, quibus præstigiis nebulo ille Saracenus Muhamedes ususest, capiant.

*De Pugna* satis est dixisse, in nidorum vicinia mares pro uxoribus has pro illis pugnare. Antequam coiverint, mares adhuc coelibes, suas aliis subtrahere conantur. Vidit & Avicenna duas pro foemina pugnantes; hæc victori adhæsit; quem, pugna repetita, deseruit victum.

*Amicitia* eis intercedit cum homine. Alliciuntur in columbaria & manent, si vel humano sanguine cum pisces integris in vase figulino circumactis illinantur, & pisa deglutiant; vel cranium hominis senis in iis suspendatur; vel lorum quo homo strangulatus est, deponatur; vel lac mulieris puellam à bimatu lactantis, occultetur. Cum capite captæ, quod excruciatum, cum multo sale, & cumino Romano coctum, ac ibidem depositum, eos retinet. Cum tinnunculo & vespertilionibus ut suis locis expositum est, denique cum vite agresti, peristerione, saliva, carlina, femine viticis, & aliis. Detinentur vel peregrinas adducunt, si aliquid horum vel in columbario sparseris, vel suspenderis in nido.

*Inimicitia* autem exercent cum circo, ad cujus vocem perhorrescunt, quod vociferans invadat; Milvo, Aquilis, marinis inprimis; Bubone, qui ova exsorbet. Noctua, corvino genere, vulpibus, catis, Mustellis, helleboro albo, & dentibus humanis, quibus virus quoddam inest, quod & foetus implumes necat, taceo de aliis.

*Affectus ipsorum* sunt, Pulices & pediculi, quibus nisi mudentur, macilentæ evadunt; varioli circa oculos, qui mense Augusto inprimis infestant; & vitiligo ac lepra ob quam à Persis pulsas apud Herodotum legimus.

*De Usu columbarum in Medicina* multa prodita sunt. Ventriculo quia sunt ferventior, lapillos comesos conficiunt, Margaritas eis exhibitæ poliri Cardanus prodidit. Pestiferis haud corripit morbis, qui carne assidue in cibo usi fuere, ex Ægyptiorum accepimus arcanis. Odor etiam sylvestrium in aërem resolutus, ab Epilepsia & Paralyssi, si Villanovano & Abenzoari credimus, præservat. Cerebella cœcitatem inducendi proprietatem habere, metuo ne falso, dicuntur, medicamentis venerem promoventibus recte præscribi, certum. Sanguis cruorem membranæ cerebri emanantem cohibet, & oculis suffusis eximie prodest. Lusciosis bene illinitur. In masculis efficaciori Hierocles eundem medicamento ad stranguriam Equi admiscet. Adeps ad dysuriam commendatur. Pennæ primum enatæ & cum urtica ustæ podagræ dolores leniunt, ut Marcellus author est.

Pugnæ

Amicitia

Gefnerus de columbis. Albertus de Avib. Palladius l. 3. c. 44.

Inimicitia

Hont. l. Epod. od. 16. Ælian. l. 3 de Animal. cap. 45. Serapio. l. 4. de Methodo cap. 11. 4. Plin. H. N. l. 11. cap. 37. Morbi. Crescent. l. 9. c. 90. Herodot. lib. 1. Usus.

Cardanus de varietate Rer.

Dioscorides. Galen. de Simp. Medic. cap. 3.

Arist. H. A. l. 9. cap. 49.

Plin. H. N. l. 10. cap. 34.

Aldrov. Ornithol. l. 15. c. 1.

Arist. H. A. l. 9. cap. 7. Ezechiel. cap. 7. Tzeket Chilia. 12. 433.

Æl. H. A. l. 3. c. 45. Arist. H. A. l. 9. cap. 36. Arist. H. A. l. 9. cap. 24. Æl. H. A. l. 3. c. 45. Gomefius l. 1. de Sale. Athenæus Dipn. l. 9. Æl. H. A. l. 1. c. 35.

Rhodig. l. 20. c. 10.



est. Ovis recte condyloma fovetur; sed desidere ante æger in aqua debet, in qua verbenâ decocta est. Fimus tanti est fervoris, ut ignem sæpe concipiat, & in ea Myfia quæ est Asiæ pars, domus hac ratione conflagrarit. Cum hordeacea farina vel aceto mixtus, strumas discutit; arefactus, & cum nasturtii semine tritus, inveteratos coxendicis, cervicis, & lumborum dolores extirpat, ut scriptum Fernelius reliquit. Prodest calculosis, si vel in aceto maceretur, illud propinetur colatum; vel in eodem septem diebus infusus, & aquæ rosaceæ instar destillatus exhibeatur. Excudit foetum, si cum Castoreo, opoponace, myrrha, vel felle facchino suffitus excipiat. Emplastrum cum aceto forti, recte super ani ficus posueris. Imbecillius tamen domesticarum stercus, validius earum quæ in montibus vagantur. De reliquis consule Aldrovandum.

Laudatus & in cibis Columbarum usus. Commendantur in epatico morbo ab Hippocrate, in virum, post diuturnum morbum imbecillitate à Rhase; & Peguani ita iis delectantur, ut advenis, interdum vendere nolint. Sylvestres, quas elixabis, domesticis, quæ assæ, magis valent. Pulli propter molliorem succum veteribus, vernaes æstivis & autumnalibus (vescuntur tamen & hæc melioribus granis) præferuntur. Et videbis exiis, apud scriptores Messos, Cruistas, Miranse Catalonicum ludebat, quod & Rui dicitur, & alia cibarii genera. Pullos tamen, caput & oculos lædere, lepram nimio usu gignere, Simeon Sethi; Cynanchen inducere Rhasis, meminere. Quod vero Varronis tempore, singulorum paria ducentis nummis, & si eximia essent, singulis millibus sestertiorum vendebantur, quod Columellæ diebus sunt inventi, qui quaternis millibus nummum bina paria mercabantur: quod denique Plinius L. Axium Equitem Romanum ante bellum civile Pompejanum denariis quadringentis singula paria venditasse scribit, luxuriæ potius & deliciis quam usui adscribendum est.

## ARTICULUS II.

## De Columbibus Domesticis.

Genera. Varro l. 3. de rust. c. 7. **G**enera columbarum tria Varro posuit. *Unum* agreste, seu saxatile, quod in turribus & culminibus villæ habetur, quod falso Perottus *πτελάδας* esse credidit, quidam male cum illo saxatili, quod in agro Bononiensi capitur, prorsus ferum, saxatilibus Varronis majus, coloris lividi, rostro rubicundo, conferunt; quodque Galeno *νίμυς* & *βόονας*, dicitur. *Alterum* clementius, quod cibo domestico contentum, intra limina januæ solet pasci. *Κατοικίδιον* seu

Domesticum Galeno. *Tertium* ex his stirpibus Miscellum fructus causa. Aristoteli sex sunt species, nempe, *Columba*, *Oenas*, *Gazæ* vinago, *Phabs*, *Phassa*, *Pelejas*, & *Turtur*. Aldrovando vero ex magnitudinis ordine, *Phassa* primum, *Phabs* secundum, *Oenas* tertium, *Columba* quartum, *Livia* seu *Pelias* sextum, *Turtur* postremum locum occupat. Palumbum Pyralidem, Columbam, & Turturem, nihil inter se similitudinis habere falso à Callimacho dictum; insequentibus exponitur. In Sylvestres & Domesticas commodissime distinguuntur. Et Domesticæ quidem, si Differentias attendas coloris, magnitudine partium, & coitus ratione variant. Fuere in insula Capitis viridis & Madera sylvestres adeo mites, ut domesticarum more se capi manibus paterentur. In Therapne maximas nasci ait Perottus, Spoleti perexiguas. Tantum duodecim passuum millia efficiunt descrimen. Habentur in Norvegia totæ albæ, quas & alibi vulgatissimas conspicias. In Græcia eo primum tempore visæ sunt, quo Persicus exercitus circa Athon montem interiit. In Eryce Siciliæ ingens numerus unum rubrum tanquam Ducem sequitur. In Persia denique Columbi si qui sunt, oblongo & anserino illi sunt collo. Genera tam indigenarum quam Exoticarum plurima apud nos sunt, quæ an veteribus cognita fuerint, jure dubitari potest, etiam si Romanos Columbarum amore insaniisse Plinius prodiderit. Sunt *Gutturosa* vulgaribus domesticis duplo fere majores, pedibus hirsutis, quæ inter volandum, & dum murmurant, fauces in ingentem tumorem inducunt, Plinii Campanas dixeris. Aliæ *Cypriæ*, seu ut Gesnerus nominat, Rusticæ, Anglicæ, Monachicæ, seu Ferrarienses, ex quibus quædam *Cucullatæ*, cristam gerunt, & pedes vel pennas ornatos vel nudos habent: quædam crista carentes, rostro sunt admodum exiguo, pedibus nudis. Aliæ *Turcicæ* & *Persicæ* colore toto pullo seu betico, præter oculos, qui miniacei, pedes qui pallide rubent, & rostrum, quod lutescit. Aliæ *Indicæ* rostro Anatis, nihil præter pedes, & magnitudinem cum columbis commune gerentes, quarum illa quam Aldrovandus Vienna acceperat, rostro albicabat, circa nares rubescebat, postremo serpentum instar subcæruleis & nigris maculis, quæ per totum ferme verticem producebantur, variegatam erat. Sub oculis macula longa alba totum caput tanquam torquis ambiebat. Aliæ, quæ, quod in honorem fœmellæ, vel suæ vel aliarum post longa murmura à terra sese elevent, & ultra illas volando alas quatiant, Belgis *Overflagers* dicuntur. Aliæ *Gyratrices*, quæ dum in orbem supra fœmellas maxime obvolitant, tam fortiter alas quatiant, ut duorum as-

Ælianus l. 1. varia. hist. c. 15.

Athenæus. Dipn. l. 9. cap. 16.

Ælianus l. 4. de Animal. cap. 2. Scaliger exerc. 23 l. c. 7.

Plin. H. N. l. 10. cap. 17.



asserum simul colliforum sonitum superent. Unde remiges earum pennæ semper ferinæ fractæ conspiciuntur. Aliæ *Galeatæ*, quarum caput, cauda, remiges, semper alius coloris sunt, quam reliquum corpus. Taceo hic *monstrosas*, quarum una in Germania prope pagum Rikenhoven capta, præter quatuor pedes, duplicem alvum habebat; altera duplici quoque alvo Bononiæ nate est; tertia bicorpor quodammodo erat, ex uno nimirum corpore, alterum par pedum remittens, cum reliqui duo alteri corpori perfecte inessent.

## A R T I C U L U S III.

## De Columbibus Sylvestribus.

## P U N C T U M I.

## De Palumbis.

**S**ylvestres columbæ quæ sint, præterito ex Aristotele articulo recensuimus. Primus ex illis *Palumbus*, qui vel *Major*, vel *Minor*. Hic Phabe Philosopho dictus, à nemine hæcenus descriptus est. An ille sit, qui in Marchia Anconitana *Palumbo* vocatur, incertum.

*Nomen.* *Majorem* Græci *φάλας*, Attici *φάλας*, moderni *φάλας*, Niphus Torquatum, Servius, Titum vel Titium, sed per hos forte vultures intellexit Persius ut Aldrovandus opinatur; Villanovanus Cadonem vocant. An *Generis* diversitatem admittat, nondum liquet. Hispani in quadam novi orbis insula grandiores nostris. Gustu & sapore meliores *Perdicibus* qui aromaticum spirabant, odorem, & quarum dissecta ingluviæ floribus plena deprehensa, invenere.

*Descriptio.* *Corporis* crassitie ad Gallinas propemodum accedunt, magnitudine haud multo minores. Color est cinereus, *caput* ex rubro & cæruleo mixtum, alæ in lateribus maculis albis insigniuntur, torquis coloris est à capitis, dorsique colore diversi. Ingluviem ventriculo præpositam habent. Ideo bene Plinius, Aves quædam sinum unum habent, quo merguntur recentia, ut guttur alterum, in quem ex eo demittunt, coctione maturata, ut *Palumbes*. *Testes*, cum Venerem exercent, insigni magnitudine augentur; hibernis mensibus, ne ullos quidem habere arbitrantur nonnulli.

*Locus.* *Locum* si spectes, nullibi noti non sunt. Apud Delphinates, & Vesates Aquitanos, magnus eorum proventus. Raro humi insidere visæ arboribus vel editioribus locis delectantur. Aristoteles dum campestres vocat, per loca campestria, illa quæ arboribus consita sunt, intelligere videtur. Migrare prodidit Plinius, nec abnuat experientia. Nec hybernare quidem apud nos sese pati, falso apud Aristotelem dicitur. Nam si tepidiora de fuerint loca, in angu-

stis montium jugis sese recondunt. Ideo verno tempore deplumes conspiciuntur. Phattas semper conspici, quod apud Aristotelem extat, error est. De Phabisid intelligendum Athenæus innuit.

*Cibus* eis inprimis Fabæ. Vnde Fabarium apud Ferrarienses nomen, Gallia glandibus sæpius, cum ilicis cocciferæ tum suberis, ilicum viridium, nec non fragorum repletum inventum in Gallia stomachum, Bellonius affirmat. Hinc Glandifararum appellatio. Alica vehementer saginantur.

*Coerunt* & foetificant trimestres, unde tanta ipsarum copia. In Venerum accensæ, mutuo sese ante initium exosculantur. Ante veris ingressum, intenso adhuc frigore nidificare, & plumas sibi, ut pulli calidius recumbant evellere, ex inspectione, an auctoritate. Alciat. prodidit. *Nido* locus arbores, juniperi inprimis, si Theocrito credimus. Bis quotannis parere ex Plinio habemus, semel ex Aristotele. Terna plurimum pariant ova. Sed quamvis tot peperint, nunquam plus duobus educunt. Tertium quod irritum est, *Vrinum* vocatur. *Palumbes* incubat foemina post meridia, in matutinum cætero mas. Incubatus citius quam à columbis perficitur. Decem & quatuor diebus uterum ferunt. Totidem iterum foetus, sed cæcus & imperfectus involucris evadit, atque perficitur. *Vivere* palumbes ad XXX. annum, aliquos ad XL. habemus auctores, uno tantum incommodo unguium eodem & argumento, senectæ, qui citra perniciem reciduntur. *Marem* prius mori credunt, cum in avibus cæteris foeminae prius albicant. Salacitas forte in causa. Nam & in passerum qui salacissimi genere idem contingit.

Quantum ad *Vocem* gemere Philomela authore, minurire Spartiano dicitur. Cantus omnibus similis, inquit Plinius, atque idem trino conficitur versu; præterquam in clausula gemitu. Hyeme mutis, revocalibus. Audiunt tamen, si ex asperima hyeme placidem & serenum tempus successerit, si aurito testi Nipho credimus. Genere ordinarie vere incipiente, & nisi confecto solstitio incipiunt. Sic hujus tempus indubitatis notis signavit natura. Et vox rusticis præsentis veris signum habetur.

De corporis affectibus nil occurrit, unguium in senectute incrementum, de quo supra, si exceperis.

Sed nec de *Ingenio* & *Moribus* multum. Amisso corporali consortio solitariae incidunt, nec carnalem ultra copulam requirunt. Adulterio corruptæ, corruptorem, si assequi possunt, interimunt. Ingenii sunt simplicis, ideo in eorum nidis deponit ova cuculus; & Plautus hominem ignavum, Palum-

*Nutrim.*  
Scalig. in  
Arist. de  
Animal.  
l. 5. c. 12.

*Generatio.*  
Arist. H.  
A. l. 6.  
c. 4.  
Cyprian.  
de venat.

*Mantuan.*  
lib. 1.  
de Cal.  
Tempor.  
Eidyll. 4.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 58.  
Arist. H.  
A. l. 6.  
c. 4.  
Plin. l. c.  
Arist. H.  
A. l. 6.  
c. 4.  
Arist. l. 4.  
de Gener.  
c. 7.  
Plin. l. 10.  
H. N. c.  
35.

Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 7.

*Vox.*  
Plin. H. N.  
l. 13. c.  
35.

Plin. H.  
N. l. 18.  
c. 28.

*Morbi.*

*Ingenium.*  
Isidor. in  
Originib.

Porphyr.  
l. de Ab-  
stinencia.

Martyr.  
Decad.  
Oceani  
l. 10.

Arist. H.  
A. l. 2. c.  
ult.

*Locus.*

Arist. H.  
A. l. 1.  
c. 1.

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 24.  
Plin. H.  
A. l. 8. c.  
12.



Æl. H.  
A. l. 4. c.  
46.  
Ufus.

Palumbem vocat. Vulnere denique accepto origanum imponunt, & ad sanitatem redeunt.

Dipn. l. 4.  
Hippocr.  
l. 2. de  
morb.  
mul. er.

In venere & in cibis & in *Medicina* Usum. In Carani nuptiis appositae Athæneus; in Nasidieni convivio sine clune ceu lautiores Horatius meminit. Carnes in flexu mensium pituitoso Hippocrates: in tympanite Trallianus; in Elephantiasi Aretæus, in colico affectu Aëtius; in pestilentia Alexander Benedictus; in dysenteria & colica Plinius præscribere. M. Cato Censorinus ægrotis exhiberi voluit. Paulus tertium inter aves locum eidem assignavit. Venerem propter glandium esum extinguere creditum quibusdam Oculi, quia confossi renascuntur, ad vulnera oculorum & cicatrices commendantur. Jumentorum verminatio finitur, ter circumlato verendis Palumbo, palumbus emissus moritur, jumentumque liberatur confestim. Sanguis vulnera purgat. Fimus urinam provocat, & calculo in faba sumptus resistit. Lapilli in ventriculis inventi, potioni contra eosdem insperguntur.

Portal. I.  
Phytog.  
c. 14.  
Plin. in  
H. N.

## PUNCTUM II.

*De Oenade seu Vinagine, Alchata seu Filacoa Arabum & Columba Livia.*

**O**enas Tzetzi, Οὐνός, non tam ἀπὸ τῆς ἰσῶν à fibris carnis, quæ dura, & nisi tergus detraxeris esui inepta est; quam, vel à colore uvarum nigrarum maturarum, quas οἰνωπὸν Græci vocant; vel à vindemiæ tempore, quo & conspicitur & capitur; unde Lycophroni οἰνωπρονος φασ dicitur. Gaza vinaginem, Josephus Scaliger Vinitorculum, alii viniferam, Julius Scaliger Rupicolam vocavit. Major est columba. *Rostrum* habet; si Oenas est quam Aldrovandus exhibet, cinnaberinum, longum, in extremo acutum. *Caput* totum ventrem & alarum pennas cinerea. Remiges notabilis magnitudinis & nigrantes. Cervicem, intercurrentibus plumis nigris viridem. *Caudam* versus Uropygium cineream cæteronigram. *Pedes* rubros.

*ALCHATÆ* quam cum Filacotona eandem Aldrovandus facit, alæ sunt oblongæ, pennæ & plumæ coloris coturnicum, cutis extrema dura, in Syria pedes nigri & breves. [Ad eam proxime accedit illa, quæ nomine Angeli Monspeffulani venit, quamque Perdici persimilem, rostro & pedibus nigris, plumis ex fusco colore in nigrum vergentibus, & luteis ruffum, esse Rondeletius ad Gesnerum scribit.

*COLUMBA LIVIA* Alberto Cavernalis, Græcis πέλεια, ex descriptione Gesneri, est columba domestica minor *Rostrum* ipsi albicat, & circa nates parum

purpurei habet. *Collum* pronum ad latera habet pro diverso ad lucem posita varie splendens, in se partim subviride, partim purpureum. Supinum ex cinereo tale. Plumas ubique cinereas, alarum pennas quatuor longiores cinereas, medias, partim cinereas, partim ad extrema nigricantes, ultimas dorsum versus subruffas. *Pedes* rubros.

*Vescitur* glandibus & granis. *Nidificat* in arborum cavis & templorum muris. Migrat, & in cibo, palumbo tantum tenerior, præfertur. In India, prodente Æliano, virides pennas, habent, Psittaco simillima: Cruribus & rostro Græcam refert Perdicem.

## PUNCTUM III.

*De Turture.*

**T**urtur in Columbaceo genere ultimo loco ponitur. Tria aut quatuor earum in Hispaniola observata genera. Visæ in locis frigidioribus; & nivosis candidæ & in Aquitania duas ejusmodi se vidisse testatur Scaliger. Turcarum vero imperator, par rari & Peculiaris generis Henrico Galliarum Regi transmisit. Ex Alexandria diversi à nostratibus adferuntur coloris. Observatum & nostro ævo quoddam genus, cujus foemella candicat naturaliter; mas coloris est cinerei ad subruffum vergentis, habetque torquem nigrum.

In *Descriptione* non est quod immoremur. Falso Orus Apollo soli inter omnes volucres dentes & mammas tribuit. falso Ovidius nigrum dixit. *Collum* torquis ambit longe aterrimus, viridibus maculis conspersus, ante vix conspicuus. *Alæ* sunt versicolores. *Dorso* & pectori vicinæ elegantissimo colore rufescunt, nigris, quarum extrema viridia, intercurrentibus. Hinc virides cum ruffis marginibus sequuntur. Remiges sunt atræ; si albi aliquid occurrit, in extremitate illud est. Foemina nisi interiorum aspectu difficulter cognoscitur. Ex *Indicis* foemina, pedibus exceptis, qui rubri, & rostro quod nigricans, tota est candida. Mari caput, collum, pectus, alæ ad remiges, dorsum ad Uropygium dilute rufescit, nec ulla macula respergitur. Iris in oculis minaceo colore resplendet. Torquis tenuis & nigra circum quoque collum ambit. Venter prope anum lutescit. *Pedes* rubei tabellis albicantibus ornantur.

*Nullibi* fere non visuntur, rarius alicubi vel frequentius. In Æthiopia tanto numero per aëra volare traduntur, ut nebulas effundant, & solis radios impendant. Apud Tartaros quia in cibis prohibetæ, abundant. Sed & Peru numerose easalit. Morantur fere semper vel in montium jugis vel ulmi aut aliarum arborum cacuminibus,

*Differentiæ.*

Scalig.  
Exerc.  
19.

*Descriptio.*

Ovid. in  
Epistol.

Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 7.

*Locus.*



bus Hyeme vel latent , vel tepidiora loca petunt. Vnde Trimistres , quod totidem membris nobiscum agant , Plinio. Cum ad Italiam veniunt , in Pontiis insulis , prima volatura requiescendi causa paucos dies morantur. Redeunt ad nos adventantis veris nunciæ , cum jam prolem fecerunt.

*Vescuntur* frugibus , glandibus & olivis. Milio vehementer delectantur. Æstate sua sponte dummodo sit facultas cibi , hyeme offa panis vino madefacta pinguescunt , & si novella sunt ætate , in tantum , ut pinguedine suffocati intereant , tanquam nimio infartu elisis faucibus.

De *Generatione* eadem fere quæ in Palumbis occurrunt. Bis anno pariunt & trimestres foeticant. Mas & foemina vicissim incubant. Nidus inter densos arborum ramos ex duris & nodosis lignis construitur. Indicæ quotiescunque ova rumpeantur , nova pariebant ; forte non facturæ , si illa exclusissent. Proprium omnibus crepitus ventris ; & cum vocem edunt , novissima pars alvi vehementer citatur.

Octonis annis *vivere* , reliquit Aristoteles ; quindecim iisdem cubare Bartholomæus Anglicus.

*Gemere* Latinis dicuntur ; Græcis *πρῶτον* , quibusdam *σύνειν*. Tum *volatu* , tum pedibus plurimum valent.

*Amicitiam* colunt cum Psittaco , Merula , Pavonibus.

*Inimicitiam* cum corvo , & chloreo exercent. Helleboro , quo columbæ intereunt , propter peculiare temperamentum impune vescuntur ; malo punico trito perimuntur.

Ad *Ingenium* pertinet , quod si mori alterutrum contingat , à secundis nuptiis abstinere , soli volare , nec ramis frondentibus insidere , nec limpida aqua bibere , nido suo contra lupi incursum , squillæ folia , quæ isti fugere consueverunt , superjacere , & gladiolum , seu tanquam fascinationis amuletum comedere , seu nido imponere ; quæ fide non addo , prodatur.

*Usum* quod spectat , Ægypti iis , quod Accipitris sacri sibi alitis unguis aliquando evaderent , abstinebant. Martialis , cuius ævo capita Turturibus amputabantur , clunes laudat. Vulgus pinguiore commendat. In *Medicina* idem quod Palumbes præstant ; Fimus albugines extenuat. Facilitatur partus , si tribus juniperi septem lauribaccis , cum cinnamoni drachma & corticis cassiæ drachma una & semis farta affata & pinguedine Gallinæ ad ignem inuncta , vesperi bis in hebdomade sumatur. Non tangi venereis , qui in corio lupi cor Turturis delatum gustavit , falso à Mizaldo proditum est.

## A R T I C U L U S I V .

## De Passeribus in genere.

**P**asser , Græcis *σπάρδοι δίζηρες* , *δίζηρες* , *δίζηρες* Nomen. *γες* , Macedonibus *δρῆς* , Eleis , *δερπίται* , Athæ- aliis *ἐλλόποδες* & *ἐλλοί* , ut apud Hesychium *ναύς* extat , dicuntur. Eidem *σπάρδοικον* passer- Dipn. l. 3. culus est.

Aristoteles vix alios præter domesticos novit : ideo omnino quæ de illis scripsit , hisce conveniunt. Athenæo ex Alexandro Myndio , alii sunt *sylvestres* , quorum foemina corpore sunt debiliores , rostri colore magis testaceo , facie id est anteriore parte , nec nigra , nec valde alba ; Hollandorum forte lignipetæ : alii *Domestici* , qui *σπάρδοι*

*πυρρίται* Galeno , *ἀσπεργίτας* modernis Græcis. Alberto sunt quidam in vertice rubei , in cavis arboribus nidulantes. Visuntur & alibi ; & semper , si Pseudo-Aristoteli credimus , tempestatem nunciant conspecti.

Sunt in insula S. Thomæ virides , canori. Meminit Avicenna cuiusdam , qui quindecim diebus continuis in principio veris suavissime cantillet , post colorem immutet , mutescat , & sese abscondat. Est in India *Passer Nocturnus* , qui noctu volat , interdum quiescit. Hirundinibus est alis & volatu similis , ex cinereo niger , nisi quod in mediis alis albam habeat fasciam. Noctuum odio ingente prosequitur. Forte Aristotelis *Colares* , quem ab ulula capi affirmat , vel Actuarii *Passer sylvestris magnus* , in summis fruticum furculis desidens , colore & magitudine Alaudæ , voce garrula , hyeme latens , quique à Noctua capitur. Sunt ibidem & Turdo minores , velocissimi volatu , qui aquas sequuntur , & natant. Sunt & alii de quibus inferius dicetur.

*Descriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.

*Discriptionem* non est , quod quis à nobis postulet. Pennæ quoties acriora urgent frigora abeunt in albas. Non est ipsis gula , nec ingluvies , sed ventriculus longior. Ad imum intestinum paucae appendices visuntur. Fel aliis ventri , aliis intestinis jungitur. Nullibi non inveniuntur. In Media tanta aliquando eorum copia , ut incolæ , quia semina terris concredita absument , alio commigrare coacti fuerint. Delphis in Hollandia , sæpe una die in uno cerevisiariorum granario aliquot centuriæ capiuntur. Migratorios esse vel sese occultare , Hieronimus innuere videtur. Athenæus mares hyeme latere , foeminas permanere , ex eo quod color in ipsis mutetur , collegit. Aldrovandus inter migratorias vel latentes poni credit ; quod , mares vere , calore tam interno quam externo accrescente , quando iterum calor accrescit , conjugēs suas ad sobolis propagationem adhortari incipiant.



bus milio, muscis, formicis, grillis, scarabæis, vespis, apibus delectatur & hordeo, cujus corticem celeriter à grano separant. Sed nec grana sambuci rejiciunt. Et hyofciami semina absque ullo detrimento, seu propter venarum exilitatem seu causam de Coturnice redditam, devorant.

**Generatio.** *Generationem* quod attinet, salacissimi esse comperiuntur. Vidit unum Scaliger in cavum quoddam plus decies ad foemellam quam iniret, ex adverso muro, pusillis interpositis momentis advolasse. Vidit Aldrovandus alterum, qui longe minori quam hore spacio, vigesies foeminam inivit, pluries initurus, nisi ista locum mutasset. *Nidulantur* vel sub tegulis tectorum, vel in foraminibus parietum, & ut pulli mollius cubent in foeno & plumis. Occupant & hirundinum aliquando nidos. Vnde apud Ægyptum ob limum, quem invehit Nilus, cum hirundinibus artem parietum è luto construendorum invenisse, creduntur. Pariunt cæcos & imperfectos pullos: bis terve quotannis, octo ad summum, quatuor ad minimum, ut plurimum septem.

**Ætas.** *Ætas* passerum diversimode definitur. Mares negantur anno diutius vivere, argumento, quia nulla veris initio appareat nigrigudo in rostro, quæ ab æstate incipit. Foeminas longiusculum spacium, ait, Plinius. Albertus id à tempore coitus computat. Scaliger nullum excedere bimarum verisimile esse credit. Ex illis, inquit, parum captatur, minimum capitur; foecundissimi sunt, frequentia non magna. Aldrovandus eam ad quadriennium extendit, quod columbæ etiam salacissimæ, decimum sextum imo plures attingant. Cognoscitur ætas ex rostro, cinereum hoc, & circa fauces croceum juvenibus, nigrum ac durum proventis. *Vox* eorum apud Græcos est *σπεδίζεν*, quod stridere vertitur. Apud Homerum *σπίζεν* apud authorem Philomeli pipære. Rhadivus cantillare dixit. Cum gradiuntur, saliant.

**Ingenium.** *Ingenium* si attendas, ita sunt timidi ut sæpe à somno excitentur, ad domorum fastigia concurrunt, ut à suspectis casibus reddantur alieni, qui multis periculis probantur obnoxii. Visus qui ab Accipitre impetus in Xenocratis sinum confugit. Taprobanenses in alto mari emissos, terram petitori, sequuntur. Evadunt interdum ita domestici, ut ad puerorum manus vocati advolent. Ad Noctuam confugere, dum aucupis artes effugere conantur, quod Orus Apollo prodidit, falsum. Quid iis nocturnis avibus?

**Inimicitia.** Gerunt & *Inimicitias* cum Vulture, Mustela & aliis. Calamodyles, qui ex Passerum genere esse videtur, folio cedri perit. Pestem à milio atque panico, Sturnorum, Passerumve agmina, scio abigi herba, cujus

nomen est ignotum, in quatuor angulis segetis defossa: mirum dictu, ut omnino nulla avis intret, inquit Plinius: Eodem referente multi ad remedia ejusdem segetis rubetam noctu arvo circumferri jubent, priusquam ferriatur, defodique in medio inclusam vase fictili: ita nec Passerem, nec vermem nocere; sed eruendam priusquam metatur, alas amarum fieri.

**Uusus.** *Uusus* Passerum in cibis rarus. Galenus tamen eos alibi cum columbis, Perdicibus, & Phasianis inter cibos attenuantes numerat. Alibi autumnio maxime laudabilem carnem habere testatur; & Suidas in deliciis habitas prodit. At Platina ob nimiam caliditatem male alere, difficulter concoqui, & libidinem excitare ponit. Invenere & in *Remediis* locum. Caro venerum excitat; & rite Epilepticis, Tympaniticis, renum calculo, vel articulorum vitio laborantibus præscribitur. Idem de cerebellis & ovis prodidere scriptores. Adeps Nicolai ad tophos Emplastro inseritur. Fimus, faciem purgat; quæ facultas ex maribus agnoscitur, quod guttatim albis, & nigris punctulis distinguantur. Idem cum vino potus virgam erigit. Cum sputo hominis illitus, varices extirpat, cum adipe porcino inunctus alopeciam sanat. Stomachum exsolutum & nauseabundum inspersus corrigit. Cum oleo calefacto proximæ auriculæ infusus, dolorem dentium pellit. Cinis denique pullorum utiliter ad eundem infricatur.

### De Passeribus in Specie.

### PUNCTUM I.

#### De Passere Albo, Flavo, Maculato, Albicilla, & Montano.

**P**asser *Albus* totus est candidus, rostrum, pedesque, quæ partes flavæ sunt, si excipias. Oculorum etiam nigram pupillam lutea iris ambit.

*Flavus* ad Aldrovandum delatus, totus erat flavus, præter oculos, qui nigri. Supra per dorsum, caput, alas, & caudam ad castaneum vergebat colorem. Quali etiam femora, tibiæ, & pedes tegebantur.

*Maculatus* qui dicitur, albo, nigro, & subflavo constabat colore. Caput totum, ac collum alba, intercurrentibus maculis subluteis. Rostrum erat flavescens in superiori parte, in inferiore omnino flavum. Alæ tribus prædictis coloribus ornantur. Oculorum iris candida. Cauda tota pene flava erat.

*Albicilla* rostrum & cauda ex cinereo candidat. Caput & omnes inferiores partes ex alba lutescunt. Dorsum maculæ coloris ferruginei amplæ, lineolis admodum candi-

Plin. H. N. l. 18. cap. 17.

Uusus.

Platina lib. 5.

Plin. H. N. l. 30. cap. 15. Galen. l. 6. de sanitat. tuenda cap. 2.

Portal. 5. Phytogn. cap. 16.

Archigen. apud Galen. lib. 8. sec. loca cap. 4. Plin. H. N. l. 30. cap. 3.



candidis, exiguis decoratæ, percurrunt. Pennæ alarum castaneæ sunt, circumcirca luteæ, tibiæ pedesque fuscæ.

Aldrov.  
Ornith.  
l. 15. c.  
15.

*Montanus* est omnium Passerum nostratum pulcherrimus. Vertex capitis est coloris fere punicei, vel potius castanei. Mentum, ut vulgaribus atrum; inter quod & verticem color albus est, qui descendens rotum ventrem occupat. Ad oculorum latera maculæ sunt binæ, una altera major, utraque nigra. Dorsum atque alæ partim flavæ, partim nigræ. Alæ, qua ventrem contingunt, modo ferrugineæ, modo atræ, modo albæ. Cauda tota ex luteo fuscescit. In fœmina sunt omnia pallidiora, & mentum eam maculam non habet.

## PUNCTUM II.

*De Passere Sylvestri, Torquato, Pusillo in juglandibus degente, stulto Bononiensium, & Illyrico.*

Aldrov.  
Ornith.  
l. 15. c.  
16.

**P**asser Sylvestris verticem capitis habet ferrugineum ad cinnabarinum vergentem. Oculorum ambitum album, iridem flavam. A mento ad podicem cinereus est, sed plumarum extremitates ad subruffum inclinant. Mentum & collum inferius lineæ admodum continuæ, transversales. Nigriusculæ percurrunt; cum aliâs in omnibus Passeribus maribus totum atrum statuendum sit. Dorsum, cauda, & pedes ex ferrugineo fuscescunt, nisi quod pennæ in extremitatibus suis omnino sint luteæ. Alæ eundem colorem exhibent, sed pennæ primæ costas obtegentes, in notabilem desinunt candorem.

Idem lib.  
c. 18.  
Bellon. l.  
7. de Avibus c.  
20.

*Torquatum* Bellonius ab albo torque oculos sub supercilio ambiente vocat. Macula ei lutea est. Dorsum & alæ cinerea. Habitat in sylvis, in cavis arborum nidulatur, vocem edit magnam, & aliter se & pullos, quam is, qui in urbe degit, alit.

*Passer in juglandibus degens* omnium est minimus. Rostrum admodum brevi, nigro, crasso; pedibus, cruribus, capite, alis, Passeri murali similis.

Idem c.  
20.

*Passer stultus Bononiensium*, est avicula habitu Passeribus similis, sed colore diversissima. Totus namque flavescit, maculis ubique ferrugineis, aut potius ruffis, oblongis, sed per dorsum multo longioribus & crassioribus, ubique deorsum descendentes conspersis. Rostrum ipsi est ruffum, crassum, curtum. Oculi majusculi, quorum pupillam lutea iris ambit. Cauda & alæ ad nigrum vergunt; extremitates tamen penarum minorum in alis candidæ sunt, pedes toti ex luteo rufescunt.

Idem c.  
2.

*Illyricus* nostratibus majori est, colore fere similis. Pronus enim plane candicat. Supinus pallide rufescit, nullo intercurrente alio colore. Oculi & rostrum, quod candi-

cat, pro corporis proportionem sunt magni. Cauda bifurcata, pedes lutei, lineis transversalibus coloris pene carnei ornati.

His adde *Passerculum Brachyurum nostratæ*, cui cauda admodum brevis. Totum corpus flavescit. Pectus & venter magis albicant, Rostrum intensius luteum est.

Sed & avicula *Passeribus congener* huc refertur, cui rostrum, ut in domesticis, candicat, totum corpus maculis subruffis, oblongis, deorsum descendentes tingitur. Venter ac femora albescunt. Tibiæ, pedesque sub flavi sunt.

Idem c.  
17.

## PUNCTUM III.

*De Passeribus Indicis.*

**P**asseres Indici sunt varii, sed præcipua ipsorum genera sunt quatuor. *Unus est macrourus, & hic duplex. Alius rostro miniaceo* magnitudine domesticis, caudam si excipias, par, rostro brevi, crasso, & prædicti coloris. Capite plano prope cervicem elevato, intercurrente subviridi ad cæruleum vergente colore, subnigrum. Guttur, collo inferiore, pectore & ventre candicantibus. Alis subviridi ad cæruleum vergente, albo, nigro, & lutescente colore tinctis. Cauda duplici minore nempe, alba, quæ majoris fulcrum; & majore quatuor pennis longitudine dodrantale angustissimis constante aterrima. Tibiis & pedibus ex nigro & albo maculatis, unguibus nigris & acutissimo hamo armatis.

Aldrov.  
Ornith. l.  
15. c. 22.

*Alius rostro cæruleo*, cui caput ut in illo planum, sed in cervice magis elevatum totum nigrum. Oculi nigri, circulo albo circumdante, & inde lutescente. Collum & pectus coloris coccinei; venter & coxæ candicant. Alæ, tergus, & caudæ nigricant. Caudæ longiores pennas, quæ sunt binæ longissimæ quinque nimirum palmarum, & latissimæ, tertia primum etiam lata, sed in exilia admodum filamenta desinens, minores alæ sustinent.

Idem c.  
27.

*Alter est Brachyurus* superioribus omnino dissimilis, minor nempe, & præter pedes & rostrum, quæ carnei coloris, totus niger. Cauda brevior. Oculis nigris, albo circulo cinctis.

Idem c.  
26.

*Tertius est sine Uropygio*, & hic vel Erythromelanus, in quo totum corpus prone & supine, item alarum principia coccineo colore splendent. Reliquum alarum atrum est. Rostrum pro corporis proportionem exiguum, & domesticorum rostro minus, colore qua capiti jungitur albo, cætera nigro, acutum & exile. Uropygium nullum. Inde ex ejus pennis opera plumaria conficiunt: vel *Cyanerii thromelanus* superiori longior, rubri, cyanei, & nigri coloris; quique habet caput, collum, pectus & inferiora omnia coloris rubri saturati: ad colli latera

Idem c.  
27.



maculas binas, contiguas, similineas, magnas cæruleas; rostrum parvum, recurvum, nigrum, prope frontem album; alas admodum longas, nigras, ad latera cæruleas; pedes breves & nigras.

Idem c.  
28.

*Quartus Porphyromelanus*, cui caput, dorsum, Uropygium coloris sunt purpurei saturati. Rostrum collurionis æmulum, superius nigrum, qua capiti adhæret album. Remiges alarum nigræ. Cauda quinque digitos longa, decem pennis nigerrimis constans.

#### PUNCTUM IV.

*De Emberiza Alba & Pratenfi.*

Gesner.  
in Ornithol.

**H**Æ Passerini etiam generis esse videntur. *Albam* ita Gesnerus describit. *Emberiza alba*, quæ mihi demonstrata est media hyeme apud nos capta. major est flava, *rostro* brevi, latiusculo. flavi nihil habet. *Colore* similis *Alaudæ*, alioqui dissimilis, ventre albicante, à quo etiam *Albam* cognominavimus. In superiore rostri parte retro mucronem, tuberculum intus conspicitur. Digiti fusci sunt; crura album & puniceum colorem præ se ferunt.

De *Pratenfi* sic idem: *Emberizam pratensem* voco quam aucupes nostri *Wise Emberitz* è pratis in quibus versari solet appellant. Hæc, ut pictura indicat, colore est testaceo, seu figlino, cruribus, pectore, ventre, alis & cauda media. Utrunque enim in ea nigræ sunt pennæ. *Dorsum* quoque nigricat, & in alis superius maculæ nigræ sunt subrotundæ: inferius vero margines *pennarum* secundum longitudinem nigricant. *Rostrum* fuscum, *vertex* niger, infra quem utrinque macula albicans retrorsum tendit: tum rursus alia duæ nigræ & albicantes per intervalla sequuntur. Hanc avem circa lacum *Verbanum* *Cepa* vocant.

#### TITULUS II.

*De Avibus Granivoris Canoris.*

#### CAPUT I.

*De Carduele, Spino & Passere Canario.*

Nomen.

**C**ARDUELIS, Carduelus, & Cardelus *Gazæ*, *Hermolao* & *Gesnero* *Thraupis*; *Aldrovando* ab aurea in alis vitta, *Chrysomitres*. *Aurivittes*, *Kirandi* *Jena*, & *Avis Jovis*; aliis *Corydalis*, *Græcis* *ἀκανθίς*, *ἀσπαράγινος*, *παραδίνος*, *ποινίνης*, *γαιδάρης* etiam dicitur.

Descriptio.  
Schwëkfeld. in Aviar. Silesiæ.

*Avis* est parva, cui *dorsum* cinereum & fuscum, *Alæ* croceo colore, nigroque mixtim & alternatim variatæ, albisque notatæ maculis; *vertex* nigricans; *rostrum* acutum

rubens apice fusco. *Oculi* ambitus exterior niger, hunc miniatus, miniatum cæsius circumdat. Nec tamen hæc colorum pictura in omnibus apparet. *Fœmina* alas habet cinereas, guttur album. *Visa* nondum adulta ubique unicolor, ex cinereo ad rufum tendens. *Visa* & alia, quarum quædam in anteriori capitis parte & in mento aliquid rubri obtinent, dorso, pectore, ventre, & reliquis capitis partibus albescunt: quædam totæ prorsus albæ sunt, capitis partem rubram si demas, & aliquat lutescentes in alis pennas.

Aldrov.  
Ornithol.  
l. 18. c. 3.

*Sexus* facile cognoscitur, si coloris, ut supra attigi, vocis & plumarum habeatur ratio. *Vox* fœminis exilior, nec diuturnus cantus. *Plumæ* costas obvestientes cinereæ aut fusæ, maribus aterrimæ.

Sexus.

*Vicitat* feminibus lapparum, papaveris, rutæ, dipsaci. *Cannabino* adeo pinguescit, ut cantandi alacritatem amittat. Quæcunque vero edit, rostro decorticat, ut puta medulla vescatur.

Nutritum.  
Portal.  
de Villa.

*Nidum* in truncis arborum & spinis construit, ter in anno, Majo nempe, Junio & Augusto. Aliquando & in hypocaustis pullitiam educit. Septem sæpe ova, octo interdum, quinque aliquando ponit. Præstant cæteris, qui mense Augusto excluduntur. In dumetis nascuntur, atriores sunt, & prunis aut malis aurantiis potius quam aliis arboribus insident.

Generatio.

*Canunt* omni tempore, sed maxime, cum alias è suo genere adventare cognoscunt.

Vox.

*Volant* gregatim, & ad duo millia quandoque.

Volatus.

*Ætatem* ad XX. annos producant. *Visa* *Moguntia* viginti tres egressa, cui singulis annis rostrum ac ungues præcidebantur, ut cibum potumque capere posset. Depositis geminis pennis canæ, quo locabatur vel prona vel supina jacebat. Plus voce quam patina hominem delectant. Haud mali tamen sunt alimenti, si pingues, & non nidificant. *Assas* iliacis & colicis prodesse *Kiramides* author est.

Ætas.

*S* 1 u s seu *Ligurinus* avicula est, pectore luteo, rostro mediocri, tenui & acuto. Duas habet maculas nigras. Alteram in fronte, alteram sub mento. *Mari* capitis macula multo nigrior; idem toto corpore magis quam fœmina lutescit.

Descriptio.

In frigidioribus regionibus vel nunquam vel raro apparet, nec in Italia quotannis cernitur.

Locus.

Isdem quibus *Carduelis* vescitur, nasci inprimis & comizæ semine.

Vitus.

*Nidulatur* in montium sylvis. *Ova* secundum nonnullos duodecim, secundum alios quatuor aut quinque ponit. Amænissime cantat; & non tantum *Carduelis*, sed & aliarum avium aliquando vocem imitatur.

Generatio.

Vox.

Aldrov.

Ornithol.

l. 18 c. 4.

*Volant*



Volans.

*Volant* gregatim, & toto agmine facillimè autumnò capiuntur. Sanguis ejus cum sali sanguine non coit. Afino vero, quod spinas tempore verno depascens, nidum dejiciat, infensus est.

Descriptio.

PASSER CANARIUS ab insulis Canariis, unde adfertur, ita dictus, avis est vulgaris Pari magnitudine; rostro albo, parvo & in acutum tendente; alarum & caudæ pennis totis viridi colore. Mari pectus, venter, & pars superior capitis, quæ rostro adjacet magis lutea sunt, quàm fœminæ.

Vitus.

*Pascitur* Phalaridis semine, saccharo, & auricula muris, qua ad cantum excitatur.

Vox.

Concentu est valde amœno & acuto, quem spiritu diu non interrupto nunc in longum, nunc in altum varia vocis inflexione extendit.

Præferendi quibus cauda longior, corporis magnitudo minor.

## CAPUT II.

*De Fringilla, Montifringilla, & Linaria.*

Descriptio.

FRINGILLA, seu quod frigus prænunciet, seu quod plures in frigore convolent, ita dicta, Spiza est Aristoteli, modernis Græcis Fringillaro. In ea capitis & colli pars prona ad subcæruleum vergit; quod hinc ad Uropygium subvirescit. Pectus & venter inter rubrum & spadiceum ambigunt. Fœmina minus vegetis ornatur coloribus; pectus & venter ex ruffo albescunt. Visa totò corpore candida. Visa & ex albedo flavescens.

Locus. Arist. H. A. l. 9. cap. 7.

*Locis* gaudent hyeme moderate frigidis, æstate tepidis. Nam in Helvetia fœminæ per hyemem recedunt, & valido frigore ita offenduntur, ut volare nequeant; & manibus capiantur.

Generatio.

In infimis arborum, & summis fruticum ramis *nidulantur*. Nidus intus ex lana & araneorum telis, extus ex musco constructitur. Quinque aut sex ponere ova aucupes referunt.

Vox.

Non uno eodemque modo *canunt*. Quædam concise quasi quæulantur, quædam in longum trahunt. Maribus vox alta est & plena. Fœminis exilis & submissior. Fringutire vel frigere authores dicunt, si suavius ut canat volueris, locustam mandendam appone.

Ingenium.

Difficulus ob astutiam capiuntur; facilius vel zephyro flante, vel fudo. Nam & demissius rùm volant, & melius alleetricum voces audiunt. Quædam nunquam manüescunt; & inedia consumptæ commoriuntur. Omnes primis captivitatis mensibus præ mœstitia obmutescunt; nec nisi blanditiis exhilarantur. Mane si canant, tempestatem præagiunt.

Theophr. de signis tempest.

Descriptio.

MONTIFRINGILLA magnitudi-

ne fringillam excedit. Color in capite, dorso & cauda nigrior quam Fringillæ. Supina pars albicat. Pectus cum gutture nonnihil ruboris habet. Alæ duabus transversis lineis ex ruffo flavescens distinguuntur, media linea interjecta. In fœmina, vertex, cervix & dorsum plus habent ferruginei: alarum linea superior adeo est angusta & brevis, ut ferè delitescat. Non adeo suave canunt, & caveis inclusæ aliarum alitum Passerum inprimis voces imitantur.

Descriptio.

LINARIA Passeris est magnitudine, specie admodum similis, colore testaceo seu ferrugineo ad cinereum vergente, eoque in mare intensiore. Idem in pectore maculis respergitur ruffis, fœmina fuscis & majoribus. Alarum rectrices pennæ nigricant, sed ad latera & in extremitatibus suis candicant.

*Cibus* ipsi Phalaridis, lini, cannabis, raparum, & caulium semen, panicum, avena fracta, &c.

Nutritum.

Laborat interdum *morbo*, quem subtilem dicunt, in quo mœsta silet, pennæ obrigent; venter solito tumidior venis rubris conspergitur, pectus ex carne apparet.

Morbus.

Exoriente canicula obmutescit, ac plumas vellicando circa medium excutit, sic certum canicularis syderis exortum indicat. Celebris est apud Italos ejus astutia. Unde proverbium *egliè un Fanello*.

Vox.

Huc pertinet *Linaria Rubra* Gesnero à coccineo verticis colore dicta, sive illa A. ster Oppiani, sive aliud quid Advolant aliquando turmatim, & fere pestilentiam brevi futuram circa Norimbergam indicare putantur.

Gesner. in Ornithol.

Nec non *Linaria marina* Aldrovandi, quæ rostro lutea, vertice miniacea, pectore & ventre candicans. Collo & dorso ex luteo fusca est. *Alteri* quam exhibet per tergus & superiora prorsus leucophææ, percurrentibus strijs deorsum vergentibus, color miniaceus magis splendet, alæ sunt longe pallidiores; Gula & pectus leviter lutescunt; retro oculos macula fusca, rotunda data est.

Aldrov. l. 18. c. 9.

Quæ circa Argentinam *Gyntel* nominatur, per caput, dorsum & caudam fusca est, pectore ruffo, fuscis distincto maculis, cruribus rubicundis, ventre inferiore alquicante; seminibus papaveri & aliis vescitur; & gregatim volat.

## CAPUT III.

*De Alauda in genere, & in specie.*

ALAUDA, seu Cassita & Galerita, quæ tamen cristatis vocabula proprie conveniunt, Græcis veteribus *κρίστος κορυδαλός*, *κρόσσος*, *πίφις*, ut apud Hesychium lego; modernis Cuzula, *γαλιττα*, & in Creta,

Nomen.



Scaliger  
Exerc.  
233.

teste Bellonio, Chamæchilados nuncupatur. Cirim non esse, tum cirri seu innulæ oblongæ pulcherrimæ, tum pedes rubri, qui in alauda non sunt; Scaligero agente, evincunt. *Formam* non describam, obvia omnibus est avicula. In posteriore digito pedis longissimum habet unguem.

Locus.

Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 8.  
Agricola. l. de  
Animal.  
subter.  
Nutri-  
mentum.  
Plut. l. de  
Iside.

In Andalusia non reperiri, Averroës tradit; nunquam arboribus insidere Aristoteles. Visæ tamen in illis cristatæ, si rugosum nec levem habuere corticem. In angustis montium hyeme alicubi conduntur: in Italia & Gallia omni eas videbus tempore.

*Vescuntur* granis, sed & vermes deglutiunt, attelaborumque ex genere locustarum ova diligenter perquirunt: ideo à Lemniscoluntur.

Generatio.

*Nidum* ex siccarum herbarum radicibus humi ter in anno, nempe circiter Calend. Maji, Junii, & paulo post Idus Julias construunt, eundemque auræ obversum ita in segetibus & gramine recondunt, ut prætereuntium & accipitrum minime obvius sit oculis. *Ova* quinque pariunt, quæ à bufonibus foveri falsum; quia auræ exponuntur. Superincidentes solis radiis parentum defectum supplere videntur. Pulli exclusi implumes adhuc deducuntur ad pastum, ut prædantium eripiantur injuriis.

Arist. H.  
A. l. 6. c. 1.

Vox.

Quantum ad *Cantum* mira alacritate pennis exertis in aëre vocis modulatione, lætæ serenitati temporis, quasi applaudit. Nam nubilo pluviove cœlo, vix aut unquam canit, ut neque humi, sed inter ascendendum. Ascendit autem paulatim, subito vero & instar lapidis descendens cantillat. Matutino vero potissimum audiuntur, meridiano silent.

Inimicitia.

Arist. l. 9.  
H. A. c. 1.

*Inimicitias* exercent cum Pella ex ardearum genere, cujus ova diripiunt, ut Aristoteles vult; cum Acanthyllide, ut Philus & Ælianus; cum corvis, quod ab iis devorentur; cum Accipitribus Alaudariis, à quibus adeo expavescunt, ut in hominum sinus confugiant; cum Arcturo sydere, quia in ipsius cum sole exortu, obmutescere incipiunt, ægrotant, & plumas vellicando excipiunt. Denique cum sinapis semine, quod nulli non innoxium, alaudas conficit.

Anton.  
Myzald.  
cit. Aldrov.  
Ælian.  
H. A. l.  
6. c. 46.

Morbi.

Laborant morbo comitali, & alterius oculi cœcitate, idque nono accidere anno Albertus experientia propria nixus testatur.

Usus.

De usu in cibis taceo. Juniores & pinguiusculas nemo non appetit.

Species.

Species Alaudarum sunt, *CHRISTATA* & *NON CHRISTATA*. Illa est vel *Major* vel *Minor*; quarum hæc Aristoteli incognita, Schwenckfeldio *Arborea*, *Fera*, ἀνάνυμτος, apicem pro corporis magnitudine longiusculum, & pedes rubros habet.

Cum frigus intensum est, & nix agros tegit in sterquiliniis & prope horrea versatur, per æquinoctium avolat, si Longolio credendum; nidum in fossis senticosis sternit; nullam particularem cantiunculam habet; sed inepte aliarum quibus cum vicitat vocem refert: Congener est ipsi Alauda *Sylvatica*, quam Germani *Waldlerche* vocant, parte inprimis prona albicantior.

*Major* rostrum habet cavum; cristam, cujus radices inter utrumque oculum situantur, aliquantulum nigricantem. Dorsum cinereum albo maculatum. Ventrem albicantem, pectus cinereum albis maculis conspersum. Caudæ plumas nigras. *Linguam* exiguam fere furcatam, quia ramis raro insidet; unguis longiusculos. *Habitat* in agris, circa flumina, & lacus; hyemis tempore ad vias. Non volat aliarum more, sed vento cogente, nunc ima nunc summa petit.

*Non cristata* suavius canit.

Laudatur ad colicos dolores, seu cocta seu assa. Quidam cor alligari femori jubent: alii recens tepensque devorant. Consularis Asprenatum domus est, inquit Plinius, in qua alter è fratribus colo liberatus est ave hac in cibo sumpta, & corde ejus armilla aurea incluso; alter sacrificio quodam crudis laterculis incluso corde, ad formam camini, atque ut sacrum peractum erat, obstructo facello. Thraces vivente adhuc Alauda cor exemptum sinistro femori pellendæ colicæ ergo circumdebant, ut Alexander Trallianus scribit. Porta causam in loquacitatem conjicit. Nimia enim garrulitate, flatus, ex quo morbus sæpe exoritur, eximitur.

*Non CRISTATA*, Hermolao, Sipontino, & Grapaldo Terraneola, Niphō falsò Aristotelis Tetrax, colore similis est cristatæ, sed magnitudine minor. *Caput* habet nigrius fulvo colore intermixtum. *Dorsum* spadiceum, cinereum, & subnigrum. *Pectus* pluribus maculis distinctum. *Ventrem* subalbidum. Posticos digitos & ungues ejusdem magnitudinis cujus & posteriores. *Degit* in planis locis, erica & Junipero confitis. Hyeme gregatim volant, æstate binæ. Alta petunt volatu, diutius in aëre hærent, & majora spacia conficiunt. Amœnitate vocis inter omnes excellunt. Galli ex uno temperamento in alterum facile transire, & proventorum diversitate, diversimode etiam immutari, tradunt. Flante Austro marescunt, Aquilone pinguescunt. Captura hyeme largissima, nisi nives diutinx sedent, & maxima sit frigoris inclementia.

Ad hanc *Colandra*, *Alauda pratorum*, & *Alauda congener* spectat.

*Calandra* Græcis χαλάνδρα & χαλάνδριον forte ὑπὸ τῆς καλῆς εἰδέν, seu suavitate cantus; aliis, sed falso. *Acredula*, *Charadrios*, *Gur-*

Bellon. l.  
5. de A-  
vibus c.  
22.

Usus.  
Galen. de  
simpl.  
Medic.  
facult.  
l. 1. r.  
Diosco-  
rid. lib. 2.  
c. 48.

Arist. H.  
A. l. 9. c.  
25.

Bellon.  
H. A-  
vibus l.  
5. c. 23.



Gurgulio, ad Sturni magnitudinem accedit. Alaudæ de cætero in omnibus similis. Collum qua jubæ Capite connectuntur gracile habet, & rostrum crassius. Viçtitat duriusculis granis. Vocis modulatione audientes mirifice oblectat, ac omnes avium voces expressissime imitatur. Capta, vix unam diei horam sine cantu præterit.

*Alauda Pratorum* Alaudis est minor. Rostrum habet tenue, & longiusculum. Plumas cutem contegentes omnino nigras. Caudæ, in extremo albicantes. Humi dormit. In pratis nidificat. Difficulter educatur, sed educata suavissime canit. Cum Accipitrem supervenientem adspicit, in arborum ramis latitat.

*Alaudæ Congener* illa Aldrovando dicitur, quæ Bononiæ Petrone, Genuæ Petronella & Chiapparone dicitur. Cristatæ majoris magnitudinem æquat, vel superat. Eademque colore fere similis est. Pectoris & totius ventris color magis ad subflavum vergit. Ungues in tantam longitudinem non excrescunt. Tibiæ & pedes albicantiora sunt. Humi sæpe quiescit vel curstat; in arboribus vero & fruticibus summa semper cacumina petit, quibus diu immobilis insidens, suavissimas cantilenas modulatur.

#### C A P U T IV.

*De Cloride, Citrinella & Serino Gesneri, & Luteis earumque congenerere.*

**C**H L O R I S Germanis Grunfinck / seu Fringilla viridis, magnitudine est alaudæ, aliquando tota viridis, aliquando valde lutea. Mas à fœmina in hoc differt, quod hæc spadiceo partim, partim, cinereo ubique coloratur, minusque multo lutei coloris, imo modicum admodum habet. Pedes ei & crura mollicula, carnea fere substantia & colore. Gula, venter, pectus, uropygium, & alarum suprema ora, pulcherrimo ochræ colore flavescit.

Aristoteles vermiculis viçtitare scribit. Verum pascitur quoque feminibus; Carduorum majorum, Lapparum, raporum, & phalaridis. Adeo aliquoties cicuratur, ut una manu detenta, cibum altera porrectum, capere non recuset. Nidum ex hymphito stirpitus evulso facit. Sed stragulum ex lana & villo subjicit. Quatuor aut quinque ova parit.

*Congener est* huic illa, quam Aldrovandus *Chloridam Indicam* vocat, quæque prono, ventre nimirum & pectore est candidissima, rostro subviridi ad fuscum vergente, capite toto dorso & Vropygio viridibus; pennis, alarum remigibus & tota cauda cæruleis, scapis albis, pedibus nigris.

*CITRINELLAM* Gesneri, quam Gal-

li Tarin vocant, Thracipedem Aristotelis Bellonius esse opinatur. Color capitis dorfi caudæ intensior est quam in Ligurino, ideo ob flavedinem magis fusca videtur. Mas plus flavi coloris in toto corpore & præsertim in pectore circa nates habet, quam fœmina. Vescitur iisdem feminibus, quibus aliæ canoræ. Raro plures quam septem, aut octo uno incubitu excludit, & in cantu omnibus hujus generis excellit.

*SERINUS* Gesneri Ligurinum magnitudine & colore refert, pectore & ventre ex viridi flavescens; parte superiore, partim ejusdem coloris, partim fusca. *Congener* est illa, quam Germani Hirngrylle vocant, magnitudine Ligurini, sed magis lutea. Capitur in Helvetiæ montibus. Auceps cum sexum utrumque domi aleret, ita ut aliqua volandi libertas esset, pullos etiam ex eis habuit. Sed cum aliquando pro mare Gryllo marem Ligurinum adhibuisset, ova quidem nata sunt, sed ex quibus foris nihil provenit. Suavissime cantillat.

*LUTEARUM* duo sunt genera; *Unum*, quod Ciam simpliciter Itali vocant; *Alterum*, quod à colore paleari, Ciam Pagliariam, seu Pagliaricciam, Angli Gelgorstam dicunt. Capiuntur facillime omni aucupii genere. Vescuntur granis hordei, triticeï, pane; hyeme alimentum in equinis stercorebus quærunt. Capta per duos vel tres menses merum Cici ingeminant; servitutis oblitæ ad suos modulos revertuntur. In caveis sæpe cum morbo comitiali conflictantur. Media hyeme magno numero in Italia apparent, & in pratis ingentes earum catervæ conspiciuntur. Quæ de harum *congenerere* addit Aldrovandus vide si libet capite vigesimo primo, libri decimi octavi.

#### T I T U L U S III.

*De Avibus Baccivoris.*

#### C A P U T I.

*De Turdis in genere.*

**A** Vis Latinis, seu per Onomatopœiam, seu à colore, Turdus dicta, à Græcis veteribus τῆχλη, τῆχλα, ἱχλα; à modernis Schynopouillos, ac si lentiscinas aves diceret, vocatur. Genera ipsorum tria prodidit Aristoteles. *Viscivorum* seu ἰζοβόρον picæ magnitudine. *Τριχίδα* à stridore dictum, quantitate Merulæ; & *Ilías*, omnibus minus, minusque maculis distinctum, quod gregatim volat, & nidos à luto hirundinum more construit, & apud Gallos non extare putatur. Recentiores plura enumeratis annumerant. Nami & *Turdela* Hermolao est genus Turdi alterum, quod in Veneta provincia Drexanos vulgo vocant, major Turdo, penna subfusca, varia; & Tur-

Gesner.  
in Ornith.

Bellonius  
Osser. l. 1.  
cap. 10.

Athenæus  
Dign. l. 2.  
Scaliger  
in H. A.  
Arist. l. 9.  
cap. 26.

Bellon. H.  
Avium.  
l. 5. c. 24.

Descrip-  
tio.

Victus.  
Arist. H.  
A. l. 8.  
cap. 3.

Arist. H.  
A. l. 9. c.  
13.  
Generatio.  
Æl. H. A.  
l. 4. c. 47.  
Aldro-  
vandus  
Ornithol.  
l. 18.  
cap. 18.



Turnero illa, quæ Saxonice *Brachvogel* / (commune hoc fere illis nomen, quæ in no- valibus & quiescentibus agris immoran- tur) color fusco, terreo, obscuro, ut humi sedens agnosci vix possit, ex Turdorum est genere. Idem Germanorum *Trostel* / Tur- dum pilarem esse putabat. Scaliger secun- di apud Aristotelem generis, *duas species* fa- cit; quarum una *Trida* à Vasconibus, alte- ra *Turdus* dicitur, figura & facie adeo diffi- miles, ut nonnunquam in agnoscendo fal- lantur. Saxonum *Ziepdruschel* colore Ilia- co similis, quæque circa rubos versatur, & fructibus eorum victitat, minimum Tur- di genus, & *paris* Aristotelis quibusdam, Germanorum vere *Klein Ziemer* / Merula minor, rostro acuto, brevibus pedibus, ejusdem nonnullis Cyanus. Helvetii ha- bent Turdum sylvestrem. Carinthiorum avis dicta *Heimtrostel* / pedibus albis, Tur- dis minoribus annumeratur. De *Albis*, qui in Septentrione, non est quod aliquid dicam.

*Forma* si spectetur, cinereus color eis fe- re peculiaris est, huic quam illi remissior vel intensior. Omnes per collum inferius, pectus & ventrem maculis æstate consper- guntur, quas per hyemem deponunt. Un- de Plinius, *Turdus color æstate circa collum va- rius, hyeme concolor*. Visus tamen viscivorus; nescio quo anni tempore captus, qui ita plumbei coloris evaserat, ut quodammo- do ad amethystinum accederet. Visus & Turdus vulgo dictus, tribus diversis colo- ribus diversis nimirum temporibus cap- tus. *Rostrium* omnibus est longiusculum, crassiusculum, rectum. *Lingua* lata, & ad imitandum humanum sermonem parata. *Pedes* figura similes, & colore non in om- nibus eodem. *Intestinum* appendices non habet, nec gula versus stomachum di- latatur, nec superius ingluviem habet. Nullibi non sunt obvi. *Daphnios*, seu à Laureto illo Alexandrino, ubi baccis ve- sci poterant; seu à Daphne delitioso quo- dam Syriæ suburbano ita dictos, Clemens Alexandrinus celebrat. Advenas esse, & quotannis in Italiam circiter æquinoctium autumnale transmare, verno revolare, Au- thor est Varro. Unde trimestres Plinius dirit; per hyemen latere scripsit Aristoteles: nec tamen omnes, vel ex eo evidens, quod in Helvetia circa Tigurum per hye- men abundant, hyeme in Italia loca mari- tima juniperis & myrtis consita, frequen- tent. Ab Ambrosio inter eas quæ sub hye- mis initium ad nos accedunt, numeren- tur; Bononiæ denique Martio etiam men- se copiose habeantur.

Quantum ab *Victum*, delectantur baccis myrti, juniperi, sambuci, hederæ; nec non olivis, ut est apud Calphurnium Poë- tam. Unde Olivariorum nomen; fagi glan- dibus, insectis, lumbricis & culicibus. Ex

femine ab ipsis excreto provenire viscum Theophrastus & Plinius prodidere, tam falso quam Satura & Orchides ex eorum genitura nasci, falsum est. Quot enim in arboribus Turdus stercus excernit, & ta- men viscum non generatur? Quot in re- gionibus Turdi non sunt, ubi viscum na- scitur? Concoquitur in Turdi ventriculo granum cum labruscarum longe duriora & majora concoquantur gigarta: & exhibitis uni visci baccis, nulla in excrementis re- perta est species. De faginatione videantur *Oeconomica*.

In cacuminibus arborum *nidificantes*, pe- ne contextim in successu, generant. Ova, decem à conceptu diebus pariunt & foveant. Increbuit alicubi mos, ut vasa ibidem col- locentur.

*Vox* eorum trutillare, ut Philomelæ au- thor inquit. Sermoni assueti, tanquam è modulis fermocinantur. Habuit Agrippi- na, qui omnium sermones imitabatur. Et mirum est adeo furdos dici, ut vitium in proverbium cesserit. Invenere & in

*Medicina Usus*. Myrtorum baccis farti & assi ventris profluvio laborantibus exhi- bentur. Tempore pestis in cibo, macera- ti, laudantur.

*Quid de usu in cibis dicam?* Duriores qui- dem concoctu, Perdicibus, Attagenis, Phasianis & Gallinis, Galenus facit: sed quia idem Phasianos Gallinis concoctio- ne & nutriendi pares, edendi suavitate su- periores alibi scribit; alibi laudatis cibariis, quæ neque tenuem neque crassum succum gignunt annumerat, vel locus prior men- dosus est, vel sibi ipsi contradicens, falli- tur. Græci sane ova cum Turdis, lepori- nis carnibus, ac mellitis placentis secundæ mensæ frequentius inferebant. Iisdem Turdorum turmæ in propomatibus seu primis cœnæ ferculis in usu. Eorundem pectora in patinam Apicianam conjicie- bantur. Et quantus circa eos Romanorum luxus, sive copiam, sive pretia spectes. Tan- ta Turdorum aliquando fuerit aviara, ut ex iis stercorarentur agri. Lucullus alios videbat Turdos in mazomo positos co- ctos, alios volitare circa fenestras captos. Ex uno Ornithone quinque millia scio væ- nisse Turdorum denariis ternis (id est computante Budæo denis solidis Turoni- cis & semisse) ut H. S. sexaginta millia ea pars villæ reddiderit eo anno, inquit Var- ro. At nunc ætatis nostræ luxuries quotidiana fecit hæc pretia, &c. Nostra ætate quo- quo modo capti eduntur. Quibusdam je- cur ovis integrum cum medulla panis con- tunditur, & per linteum transmittitur. Hinc aromatibus ad saporem colorumque commendandum inspersis ferverescit. Tur- di in jure carniū elixi, & modice frixi imponuntur.

Theophr. de Caus. Plant. l. 2. cap. 23. Plin. H. N. l. 16. cap. 49.

Scaliger in Exerc. 168.

Genera- tio.

Vox. Scaliger in Exerc. 237. Plin. H. N. l. 10. cap. 42.

Usus. Plin. H. A. l. 30. c. 7.

Bellon. l. 9. de Avi- b. c. 31. Galenus Method. lib. 7. lib. de ci- bis boni & mali succi. Alex. ab Alex. l. 5. Genial. dier. c. 26.

Athen. in Dipn. l. 2.

Plin. H. N. l. 17. cap. 9. Varro de R. R. l. 3.

Varro l. 3. de R. R. c. 2.



## C A P U T II.

*De Turdis in specie.*

## A R T I C U L U S I.

*De Turdo Viscivoro & Trichade.*

**T**urdus Viscivorus, Aristoteli *ἰσοβόρος*. Athenæo *ἰσοφάγος* dicitur. Major est cæteris Turdis, & paulo infra columbam. Capite, alis, & ventre fuscus; plumis tamen juxta caudam aliquid flavi admixtum apparet. Cutum intra rostrum pallidum & subrubum colores mixti tingunt. Collum parte prona, venterque totus nigris punctis in albicantibus plumis, & alicubi flavis variant. Pedes digitique, posteriore præsertim tibiæ nervo, flavescunt. Aldrovandus semel unum adeo, in cauda maxime, & alarum remigibus albescentem observavit, ut pene albesceret; capite vero, tergo, & supernis alis omnino cinereus esset. Nullo non tempore apud nos visuntur. *Cibus* ipsis albiætis viscum & resina; æstate inprimis; hyeme fructiferarum arborum semina. Sed & baccis arborum, Juniperi præsertim & Ligustri, inhiant. Dum singuli singulas visciferas arbores occupant, & prope eas morantes, alios persequuntur, facilius capi, prodidere nonnulli. Observata in iis à rusticis & præfagia. Diu nempe duraturæ hyemis, si circa hujus finem in cacumine arboris cantillent. Futuræ æstatis, si in ejus medio considerant.

**T**richas, qui Pilaris perperam dicitur, & à stridore nomen fortitus est, totus fere magnitudine & figura est Merulæ. Rostrum habet subflavum in extremo nigricans. Os & linguam flavo colore tincta. Collum primum cinereum maculis nigris aspersum. Dorsum charopum, & per medias pennulas nigricans. Pars circa Vropygium cinereis plumis obtegatur. Caudam nigræ pennæ constituunt. Collum superius & pectus varia sunt. Pennæ alarum partim nigricant, partim ruffo colore tinguntur, &c. Nunquam aut raro in æstate in Anglia *visitur*, hyeme tanta illorum multitudo, ut nullius avis major. Vescitur baccis juniperi, Aquifoliæ, & sorbi minimæ. Apud Helvetios postremo advenit. Acutè sonat, & quamvis colorem mutet: vocem tamen non variat. Volat gregatim, & inter volandum obstreperusest.

## A R T I C U L U S II.

*De Turdo Illade, & simpliciter dicto.*

**T**urdus Illas, Tyllas Alexandro, Myndio dicitur. Fuscus est per totum dorsum. Pectus est varii coloris, medius venter albicat; utrinque rubet. Eodem

colore pars sub alis tingitur. Interiora oris penitus flavescunt. *Nidificant* in Bohemia vel Hungaria. Gregatim plarumque in dumetis *degunt*. Initio hyemis per quatuordecim fere dies ante Pilares in Helvetiam advolant, circa Pascha recedunt. Racemis *visitant*, vineisque multum damni inferunt. Ideo tempore vindemiarum capiuntur. Gesnerus in dissecti ventriculo mense Novembri baccas spinæ albæ quam Oxycantham dicemus, repetit.

Quem Aldrovandus *Terdum simpliciter dictum* vocat, is Bellonio *Turdus primus Aristotelis*, & *Turdus viscivorus minor* dicitur. Crura in eo ex descriptione Gesneri albicant. Pectus, ventrem, & latera puncta nigra insigniunt; illud subflavo & ruffo colore in unum commixtis insignitur. Idem sub alis color merus. Tota fere pars prona fuscescit. Alæ fusco ruffum miscuerunt, & maculas subflavas habent. Venter candidus est. Crura albicant. Proprium illis esse apparet, ut circum oculos maculentur. Sexum solo cantu discerni posse dicunt.

NB. *Genus Turdorum exoticum vide in Mantissa. Num. 9.*

## C A P U T III.

*De Merulis.*

**M**erula, Græcis *μέλας*, *μέλις* & *μέλις*, quibusdam à nigro colore Nigretta; Latinis quod solivaga sit & sola pascatur, *Merula* dicitur. Duo ipsarum *Genera* Aristoteles ponit. *Vulgare* seu nigrum, & *candidum*, quod tantum circa Cyllenam Arcadiæ nasci scribit: nos & in Norvegia, & in novo orbe inveniri scimus. Varro inter res inusitatas reponit. Addit & *tertium* fusco colore, & minoris magnitudinis, quod Passerem solitarium vel Merulam montanam quidam esse judicant. Vidit Aldrovandus totam ex flavo ad castaneum vergentem, mutato forte priore colore. Magnitudinem ei Turdi Trichadis Aristoteles tribuit citante Athenæo, colorem nigrum, rostrum puniceum vere an falso nescio. Albertus rostrum & pedes crocea. Sed ut plumarum colorem pro temporis diversitate mutant: ita & rostrum idem non servat. Nam id anniculis, teste Plinio, in ebur transfiguratur, at maribus duntaxat. Scaliger pullos nigrum habere, anniculos buxum affirmat. *Sexus* optime discernitur. Fœmina namque fusca est, rostro inferius tantum lutescente; supra plane fuscido. Gula pectusque totum ex albicante & fuscescente coloribus maculantur. Nominat Aldrovandus quandam *Leucophalum*, cujus caput præter tres maculas oblongas nigras, quæ retro oculos conspiciebantur, prorsus candidum erat, rostrum & oculorum

*Genera.*  
Arist. H.  
A. l. c. 9.  
c. 19.  
Var. de  
R. R. l. 3.  
c. 9.

In Aristoteli  
H. A. l.  
9. c. 5.

Ornith.  
l. 16. c.  
6.



iris lutea, pedes fuscescebant. Cauda & venter aterrimicoloris. Alæ albo maculabantur. Apponit & *candidam totam*, rostro duntaxat rutilo, & pedibus lutescentibus. Aliæ ex albo & nigro sunt maculatæ, minus quam fœmina, cauda nigra, rostro & pedibus intense in mare rutilis, pallide in fœmina flavescentibus.

*Locus.* Quantum ad *Locum*, versantur in locis densis confitis arboribus, spinetis, angustis montium angulis, & lapidum fissuris.

*Arist. H. A. l. 9. cap. 16.* Mutant ut Turdi locum, & hyeme in vicina demigrant aprica. Parasitus tamen apud Athænæum, si algor sub dio perpetiendus sit, se Merulam esse proficitur.

*Vitus.* *Vescuntur* iisdem quibus Turdi. Sed & promis forborum, omni sanibucique acinis. Caveis inclusæ etiam carnibus. Plantæ ex quibus præcipue cibum decerpunt, sunt Oxycedrus Dalechampii, Ilex Aquifolia ejusdem, Myrtacanta, philyrea angustifolia, myrtus laurea maxima, myrtus exotica Plinii, & arca Theophrasti effigie alni.

*Generatio.* *Nidos* figura hæmisphærica oblongiuscula, admodum scutellæcavos, ex furculis ramulisque exilibus, & fibrosis radiculis luto inter se contextis, subitrata molliore materia construunt. Bis anno, omnium avium primæ, ante exactam hyemem, in Helvetia mense Martio vel Aprili *pariunt*. Numerum pullorum nemo exponit. Nido Aldrovando allato quinque inerant. Persarum Magos ex salvia sub ficu putrefacta, dum sol & Luna secundam solis faciem occupant, avem Merulæ similem procreasse, cujus adustæ cinere lampadi insperse domus serpentibus repleta videbatur, author est Langius.

*Epist. Medic. 38. Vox.* De earum *Voce* fringulicire quidam usurpat. Veteres ejus non exprimunt proprium, sed inter canoras ponunt. Quidam adeo in novem vocum modis exprimendis excelluisse, ut nullus hominum perfecte eam imitari potuerit, Albertus author est. Incipiunt autem vere canere, continuant per æstatem. Hyeme cohibendo vocem, strepunt & tumultuose vocalantur Plinius hyeme balbutire, circa solstitium mutas esse ait.

*Arist. H. A. l. 9. cap. 49. Plin. H. N. l. 10. Amicitia.* *Amicitiam* cum ea Rubecula colit. Sequitur enim eam, & noctu, vel juxta ipsam, vel in proxima arbore conquiescit. Ipsas Noctuæ ita infensas quidam volunt, ut quotiescunque clamantem audiverint, tanquam injuriam vindicaturæ, advolent. Mali Punici grano perire Ælianus author est.

*Æl. H. A. l. 6. c. 46. Ingenium.* *Ingenium* resipit, quod humanum sermonem, quamvis linguam strictam, rostrum rectum, & angustum habeant, imitantur: & quod Laurifolio annum fastidium purgant.

De *Ufu in cibis*, hæc pauca dixisse sufficiat. In pectore ipsarum adusto haud parvam collocasse voluptatem Romanos. Inter popinæ vero professores clunesne tergoribus sint præferendæ, disceptatum. Tarde tamen concoquuntur, parumque alunt, si Platinæ credimus; interlaudatas censerī debent, si Salernitanis. Nonnulli à Noctua captas præferunt. Alii pingues & retibus vel laqueis captas eligunt.

Quantum ad *Medicinam*, bene illis qui laxa sunt alvo præscribuntur. Plinius inasfatas cum myrti bacci dysentericis mederi scribit, Porta Melancholiæ. Fimosex aceto mistus, si orizam avis comederit, extirpat lentigines. Caput ad brachium sinistrum, cum leporis pedibus portatum, audaces facere, mendacium est.

## CAPUT IV.

### De Merulis in specie.

#### ARTICULUS I.

##### De Passere solitario & ejus congeneri.

**P**asser *Solitarius*, quod cum nullo sui generis unquam, nisi tempore generationis versetur vulgo dictus, quem tertiam Aristotelis Merulam esse Gesnerus, Niphus, & Aldrovandus asserunt, Merulus solitarius circa Tridentum, Merulus stercoreosus, quod in latrinis habitare credatur Romanis, si Alberto credendum; Merula faxatilis Placentiæ dicitur. Avis est Merula paulo minor, tota nigra, rostro longiusculo, parumper arcuato, capite pro corporis proportionem parvo, superius plano, nigroque ad latera, nempe circum oculos, aures, & in collo inferiore cæruleo. Fœmina tota fusca est, & pectore maculis lutescentibus variegatur, mari plane dissimilis. In saxi & testis (non tectis, *κεράμιον*, namque textus habet) diversorium habere Aristoteles dixit. In parietibus aliis Passeribus conjungi, & cum eis ad pastum volare Albertus. In dumosis rupibus circa Larium lacum nidulari, neque cum aliis avibus degere, Gesnerus affirmat. Canorus est, & Mediolani ac Genævæ magno propter cantum precio venditur. Quem Bellonius descripsit, & Charadrium esse primo aspectu putabat, Turdi Iliaci est crassitie, Luscinia moribus præditus. *Rostrum* habet rotundum, acutum, subalbum, in extremo nigrum. *Pennas* sub pectore & duabus costis colore dactylorum, maculis interstincto. *Dorsum* cinereum, fulvo maculatum. *Pedes* Turdo similes, *Caudam* ut in Luscinia ruffam, quam mox ut è nido eximitur, immutat: *Mas* quia pulchrior, coloris elegantia à fœmina distinguitur.

In rupibus solitariis nidificat, & raro in plano

*Ufus.*  
Horat. l. 2. sermon.  
Plin. H. N. l. 10. cap. 50.

Platin. l. 5. de tuenda sanis.

Portal. 3. Phytogn. cap. 11.

Gesner. in Ornithol.

Arist. l. 9. c. 19.

*Forma.*

*Generatio.*



plano aut per valles cernitur. Certo anni tempore sub tegulis seu imbris *degit*. Canit noctu æque ac interdiu ad lumen candelæ maxime : Franciscus Gallorum Rex tanti ejus cantum fecit, ut nullam præter hanc audire dignaretur.

PASSERI SOLITARIO *congener* est illa avis, quam quidam Petrocoscyphum, Germani *Steinrotele* & *Blaubogel* vocant, Bellonius Cyaneum Aristotelis, sed falso (Ex Picorum enim genere est, rostro etiam ad saxa durissimo; & quis Merulam totam cæruleam vidit) dixit. Magnitudine est Sturni, pectore, cervice, & lumbis Cyanea: dorso & alis nonnihil nigricans. Rostrum ei sesquidigiti longitudine subter nares fuscum, imo aculeatum superiore parte adunca, inferiorem ut plurimum contegente.

*Degit* in altissimis, præruptis, & nivosis scopulis, in Creta, Citharea, Corcyra, Zacyntho, Eubæa, & circa fluvium Athe-sin.

*Nidificat* in deviis solitudinibus, pullosque, quos ternos aut quaternos excludit, ut à rupicapris etiam tuti sint, in cavernas deorsum condit.

*Vox* ipsi articulata, amoena & varia. Media & intempesta nocte expergefacta, ad astantis provocationem claro spiritu canit. Ante tempus autumnii cum colore etiam vocem mutat, ac alis expansis novos, secum continuo murmurans, excogitat cantus, nec veteris obliviscitur.

Color sub hyemem niger è cæruleo evadit. Circa veris initium, in pristinum commutatur. Adulta vel è nido semel egressa & volatui adsueta, nullis astutiis capitur. Moris denique ei, oculos hominum aliorum alitum more adpetere. Tamque diligenter res observare, ut plæraque, vocis aliquo articulo indicet.

## ARTICULUS II.

*De Merula Montana, Germanorum Torquata, Bicolore, & Saxatili.*

**M**ERULA Germanorum MONTANA, avis est paulo infra Turdum majorem. Caput, dorsum & alæ, ruffo quodam modice admixto nigricant. Pectus est, ex plumis partim subfulvis, partim nigricantibus obscure maculosum. Os interius & lingua lutei seu melini coloris. Ventris color ex nigro & cinereo mistis; crura ex glauco nigricante, & ruffo, constant. Cauda est atra.

TORQUATA, quæ & Montana, Saxatilis, & Equina, quod in sylvis vermiculos in fimo equino quærat, avis est barbatula, magnitudine fere & colore Turdi. Parte pro-na inter collum habet albas duorum digi-

torum latitudine plumas, reliqua maculosas, nigris in medio pennis, ambitu albis, superiore fuscas, alarum pennis, margine extrinseco albicantibus. *Fæmina*, quam Aldrovandus descripsit, erat corpore toto subnigro; rostro circa nares, & in apice nigro, ad latera flavescente, pennis remigibus alarum nec non ventris, extimis oris, nonnihil albicantibus, cætera candicantibus. In ultimo gutture seu pectoris principio macula albissima pollicem lata ad humeros pertingente, vel torque candido, ornabatur.

Merula BICOLOR quod duobus potissimum coloribus fusco aut subnigro, & luteo rubescente variet, dicta, est avis Merula paulo minor, capite fusco, lineolis candicantibus variegato, rostro in luteo rubescente, qui etiam color in tergore & cauda intensior; in pectore & ventre remissior, videtur. Alarum remigibus fuscis, in extremis oris albis, pedibus breviusculis, digitis pro proportionem longis luteis, unguibus rubicundis.

SAXATILIS, quam Turnerus ex Graculorum genere facit, quidam Cyanon Aristotelis credunt, nonnulli Rubiculam Saxatilem, Nucifragam, Merulam Alpinam vocant, avis est cum *Caryocatactæ* Gesneri eadem, merula major. Sturni ferè instar maculata, supra nigricans, minus tamen in capite & dorso, quàm in alis, maculis ubique distincta semilunaribus, quæ pariter per tergus & alas majores sunt quam per caput. Prone à rostro ad anumusque lutea maculis ferrugineis albisque, quæ & ipsæ magnitudine variant, percurrentibus. Alarum pennas majores habet nigras, & in extremis oris candicantes. Caudam supine nigram, prone ferrugineam, pedes fuscus. Vaga est, nec invenusta.

## ARTICULUS III.

*De Merula Rosea, Exoticis, & Merula congener.*

**M**ERULA ROSEA, ab aucupibus, Italici Sturnus marinus vocatur. Est merula paulo minor; tergore, pectore, & alis supernis roseis seu carneis, capite cir-rhato, rostro qua capite jungitur nigro, cætera carneo, alis & cauda nigris, remigibus fere subcastaneis. In *fæmina*, color est dilutior, caput si excipias. Reliqua enim pars colli, alæ & cauda minus quàm in mare nigrescunt. Plurimum adipis corpori adjiciunt, & in cibo maxime commendantur.

EXOTICA est duplex, *Brasilica*, & *Indica* Apos. BRASILICA ut à Bellonio describitur, differt magnitudine à Merula. Rostrum illi breve. Color totius corporis, si



Aldrov.  
Ornith. l.  
16. c. 16.

caudam & alas, quæ atræ sunt, adeo intense rubet, ut nullus intensior rubor possit excogitari. Cauda oblonga est, crura nigra. Illius, quam Aldrovandus exhibet, pennæ superius omnes ad scapulas rubent, dein nigræ succedunt, has rufus rubræ excipiunt. Rostrum est insigniter recurvum, intus luteum. Pedes, qui pro tibiæ proportionem majusculi ex cinereo leviter fuscescunt. APOS monstrafo forte est. Rostrum habet Merulæ in extremitate nigrum & recurvum, infra qua capiti jungitur candicans. Caput, venter, dorsum, colore coccineo intenso & vegeto, alæ & cauda nigro, unde Porphyromelanos dici posset, tinguntur.

CONGENER Merulæ est duplex. Una rostro, prope quod linea rubra conspicitur, nigro; capite, dorso, & cauda, ad subcastaneum vergentibus, extremis oris albicantibus. Prone pectore, ventreque toto & cauda, lineis quibusdam cinereis per transversum ductis albicat. Altera Merulis erat minor, Passeribus major, capite cinereo, oculis nigris aureo circulo circumductis, rostro pro corporis proportionem robusto, luteo, crassiusculo, in extremitate nigro & acuto. Dorso ad caudam castaneo obscuro, pennis alarum quæ dorso junguntur albis. Qua ventri nigris. Remigibus in extremis oris cinereis. Simelis Collurioni cinereo videbatur.

## CAPUT V.

### De Sturno.

Genera.

**S**turnus, Græcis *στέρν*, *στέρνα*, *στέρν*, & *στέρν*, quod apud Hesychium & Phavorinum leges, dicitur. Avis est ob colorum varietatem, & conspersas per corpus maculas, elegans, & bene, picturate à Poëtis dicitur. Non tantum autem albis maculis tingitur; sed rubescit quoque, lutea aliquando; in alis, prope oculos, & in infimo tergore viridescit. Rostrum habet Picorum non absimile, in fine fuscum. Caudam brevem & nigram. Pedes fere cro-

ceos. Aristoteles solum vulgare genus, quod super tecta cantu suo aures fatigat, agnovisse videtur. Aldrovandus tres exhibet, *Unum* totum album, rostro quod ex luteo rubescit, & pedibus, qui leviter carnei, exceptis. *Alteri* caput, collum, & rostrum erant alba; Maculæ supra oculos binæ nigræ: venter candidus, alarum principia maculis subcæruleis varia. Remiges alarum & cauda ut in Sturno vulgari. Pedes lutei. *Tertii* totum corpus ex cinereo lutescebat. Pectus punctulis conspergebatur. Rostrum & pedes nigri coloris erant.

Locus. &  
Vitus.

*Locum* si attendas, nullibi non inveniuntur. Avenis, pratis aquosis, ubi armenta pascuntur, & agris gaudent. Turribus in-

primis & tectis hyeme latent. Si *victum*, pamphagi sunt. Nam præter baccas & uvas, quibus impense delectantur, & pinguescunt; milium quoque, panicum, cicutam, stercorea, & lumbricos, imo suspensorum cadavera, ideo ab eorum esu Belgæ abstinent, depascuntur.

*Nidulantur* iisdem fere locis, eodemque pene modo, ut Passeres. Ter anno parere dicuntur; & uno tempore septem vel octo ova ponunt. Græcis dicuntur *κικλίζεν*; auctori Philomelæ pisitare. Summo mane maxime sunt obstreperi, nocte silent. Vixi qui omnium avium voces imitabantur. Et in Galliæ urbibus habentur, qui sermonem explanate, longiori etiam contextu, exprimunt. Habebant & Cæsares juvenes ejusdem peritiæ unum.

Proprium ipsis catervatim *volare*; & quodam pilæ orbe circumagi omnibus in medium agmen tendentibus. Vespere potissimum aggregantur, & tanta multitudine atque impetu quandoque volant, ut nubem facere, & tempestatis modo sonare videantur. Dicuntur sibi ipsis medicinam facere. Atterebat pedi luxato ova formicarum, comminuta, & sub alis calefacta, unus. Sic integer intra paucos dies evasit. *Metuunt* Accipitrem, eundemque superne vel à latere accedentem, alis eventant, subtus volantem stercoreibus opprimunt. Semine alii intereunt, & à canibus metuuntur.

Galenus eos inter *cibos* attenuantes & boni succi refert; quod vel de juvenculis, vel de illis, qui in montibus degunt fumendum est. Vindemiæ tempore pabuli melioris copia non inprobantur. Suaviores evadere, si mox captis capita amputentur, Cardanus auctor est. Stercus oryza pastorum ad faciem exornandam facit.

NB. *Sturni genus Indicum vide in Mantissa. Num. 6.*

## CAPUT VI.

### De Coccythraustis.

**D**uplicem Coccythraustem Aldrovandus exhibet, *vulgarem* Gesneri, & *Indicam cristatam*. Illa ita dicta, quod rostro suo coccos & interiora cerasorum grana confringere soleat. Circa Verbanum Lacum Fringilla Montana, Bellonio, à rostri magnitudine Grosbec dicitur. Putabat hanc esse Aristotelis Pardalum quiddam. Falso, ex collatione utriusque patebit. Pardalus enim colore toto cinereus est, magnitudine par Sturno. Coccythraustes autem est, si Bellonii descriptionem sequemur, sturno paulo minor, rostro duro, & magnitudine pro corporis proportionem insignis. Capite superiore mali aurantii colore,

Generatio

Brujer. l.  
15. de re  
cibar. c.

42.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 42.  
Volatus.

Gesner.  
in Ornith.

Ufus.  
Galen. l.  
6. de fanit.  
tat. tuenda.  
Alex. l.  
13. salub.  
c. 8.  
Æginera  
l. 28. c. 8.  
Cardan. l.  
3. de fanit.  
c. 21.

Descrip-  
tio.

Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 23.  
Bellon. de  
Avibus l.  
7. c. 30.



re, cum macula sub gutture nigra, collo cinereo, dorso fulvo, alarum extremitatibus ex viridi lutescentibus sicuti torques Palumbis, caudæ extremitate alba subtus fulva. Ventre, pectore & gutture ejusdem coloris. Gesnerus ei tribuit, Alaudæ aut Loxiæ magnitudinē. *Rostrum* durum, validum, breve, latum, quod inferius à pennis nigris ambitur. Colorem capitis, in foemina, charopum, vel ex flavo ruffum; in pectore & ventre ex cinereo rubicundum. Pennas alarum superius nigricantes, in medio albentes, in imo colore fere cærulei seu Indici. Collum pronum, & utrinque ad latera plumis cinereis vestitum. Dorsum ex fusco nigricans.

Locus.

Æstate in sylvis capitur, & tum in Italia in montibus agit. Sub Octobrem ad plana descendit. In Germanis æstato rarius, hyeme frequentius cernitur. *Nidificat* in arborum cavis. *Vicitat* nucleis cerasorum, quæ rostro confringit; nec non olivis, & aliis baccis. Non servat accrescente ætate

Victus.

colorem. Cavæ inclusa, non solum raro cantillat, sed ne institutionem quidem admittit.

*Indica* incolis capitis viridis apud quos reperitur, dicitur Fruso, Lusitanis Cardinalitius, quod galerum purpureum gestare videatur. Habet cirros in capite figura trigona coccineos, quo colore pariter collum, pectus & venter refulgent. Alarum extremitates dilute purpurascens. Caudam pro corporis proportionem, longiusculam, digitum auricularem latam, aliquantulum surrectam. Tibias breves & albicantes, ungues robustos & nonnihil recurvos. *Vicitat* panico, amygdalis, & alfine herba, & cibum è manibus accipit. *Voces* avium, lusciniæ maxime imitatur. Sæpe se aquæ immergit, unde temperiei calidissime esse putatur. Visa icone sua in speculo, mirabilibus modis sibilos edendo, cristam deponendo, caudam more Pavonum erigendo, alas motitando, gesticulatur, & speculum impetit.





# HISTORIÆ NATURALIS

## DE

# AVIBUS:

L I B E R I I I.

## De Avibus Insectivoris.

T I T U L U S I.

### De Insectivoris non Canoris.

#### C A P U T I.

De Picis Martiis.

Descri-  
ptio.



Icus Martius quod Marti sacer sit dictus, *δρυόκολαψ* Hesy-  
chio, *δενδροκολέτης*, *ξύλο-  
κόπος*, & *δρύκοπος* Ari-  
stoteli, *δρυτότομος* Ari-  
stophani, *καλάφος* Mi-  
letio, recentioribus Græcis *καρκυνίτης* voca-

A iñ. H. tur. Genera ipsorum tria Aristoteles recen-  
A. l. 9. c. 9. fet; nos de pluribus inferius dicemus. An  
vero vel illa quæ occidentalibus Indis Alca-  
tran teste Cardano dicitur, rostri & corporis  
magnitudine celebris, cinerea croceave plu-  
ma distincta, rostro duorum palmorum, in  
acutum tendente; vel Picurus dicta, cui ro-  
strum toto corpore majus, ubi capiti jungitur  
tribus digitis latum, aduncum, quo & ar-  
bores terebrat, & à parvis simiis se defen-  
dit, quæque linguam loco pennæ habere  
dicitur, ad Picos pertineat, penes eruditos  
sit judicium. *Formam* ipsorum si attenda-  
mus, habent omnes *rostrum* rectum, du-  
rum, rotundum, & ad pertundendas arbo-  
res per commodum. *Linguam* iis Aristoteles  
tribuit *πλατέον καὶ μέγαν*. Aldrovandus lon-  
gam quidem in omnibus & ad occiput us-  
que extendi, & super totum capitis verti-  
cem ceu in glomum convolvi, adeo ut  
cum exoritur, tanquam è multis involu-  
cris in longum admodum extendatur, ob-  
servavit; latam minime; quin est acutissi-  
ma, & in extremitate quodammodo carti-  
laginea. Anatomen vide apud Aldrovan-  
dum. *Crura* quoque omnibus sunt brevius-  
cula, at admodum robusta. Digiti pedum

ante bini, totidem retro, iique valde  
conjuncti, ut arborem quam scandunt fir-  
mius apprehendant. Cauda rigida, & du-  
riuscula, cujus pennæ in extremitatibus  
ferme nudæ, quibus haud aliter quam pe-  
dibus inter rependum innituntur.

*Locum* si spectes, in quibusvis reperiun-  
tur regionibus, raro in Belgio, in Taren-  
tino agro negari scribit Plinius; sed Aldro-  
vandus omnia genera in Italia ali, maximum  
si excipias, affirmat.

*Vicitant* vermibus, culicibus nempe for-  
micis, quas exprorecta lingua velut in veru  
infigunt, & latitantibus sub lignorum cor-  
ticibus, & medulla cossis. Ideò arbores tun-  
dunt, quarum percussi corticis sono pabu-  
lum subesse intelligunt, & tam vehemen-  
ter eas interdum excavant, ut ipsas ster-  
nant. Quidam apud Aristotelem amyg-  
dalum tertio ictu pertudit, & nucleum co-  
medit.

*Nidificant* in cavis arborum, olearum  
inprimis. Tanto artificio nidum exstruunt,  
& excavant, ut admoto circino rotundius  
reddi foramen à perfectissimo Geometra  
non posset; & ligna quibus inter se con-  
fertis constat, facilius manibus separen-  
tur, quam ferro dissecantur. *Pullos* septem  
vel octo educant, quos exire ex ovo à cau-  
da Hylas, referente Plinio, tradidit. Quo-  
niam pondere capitum perversa ova poste-  
riorem partem corporum fovendam matri  
applicant. Nunquam humi consistunt, vel  
in faxis confident, ne aciem unguium ob-  
tundant. Scandunt vero per arbores om-  
nibus annis *κατάπερ ὁ ἀσκαλαβάτης* tanquam stel-  
liones, seu ut Plinius vertit, feles, non  
modo sursum per arborem réptando, sed  
deorsum etiam & sub ipsis ramis, pedibus  
& ventre sursum, tergore deorsum terram  
ver-

*Locus.*

Plin. H.  
N. 1. 10.  
c. 29.  
Aldrov.  
Ornich.  
l. 12. c.  
30.  
*Vicetus.*

Plin. l. c.

Arist. H.  
A. l. 9. c.  
9.

*Genera-  
tio.*



versus converso; quod Aristoteli est *ὑπὸ τὸν καὶ ἀπὸ τὸν γαστέρα.*

*Vox.* Humano ipsos *sermoni* assuescere Scaliger author est: sed minus apte, & rariora & pauciora quam Picam reddere, addit. Albertus perfecte aliquando loqui scribit. Validius quam soleret stridens pluviam præfagire credebatur. Hinc ei pluviae avis apud veteres nomen.

*Ufus.* *Ufus* ipforum & in *cibo*; ideo tota fere hyeme & autumno Bononiæ in foro venduntur; & in *Medicina*. Nam cum sale torrefactum quidam ad internas ani eminentias applicant. Assatum vel elixum incantatione ligatos solvere; oculos, gestantibus visum acuere; rostrum è collo suspensum, dentium, uvulae & tonsillarum dolorem curare; Kiranidis sunt deliramenta. Idem ferentes ab apibus etiam si mella earum eximant, non feriri, Plinii. Clavum & cuneum arbori, in qua nidificant infixum, diu non hædere. Foramen vero nidi lapide vel ligno obstructum, herba apposita, seu illa linaria major, seu æthiopis, eundem aperire, pari fide affirmatur.

## C A P U T II.

*De Picis in specie.*

### A R T I C U L U S I.

*De Pico Maximo, Majore, Vario minore Viridi nostrate, Pico luteo Cyanopide, Viridi majore, & Murario.*

**P**ICUS MAXIMUS, est omnium longe maximus, cornicis interdum magnitudine, infra gallinam aliquid, & excepto capitis vertice *totus niger*. Plumæ tamen in vertice coccineo vel flammeo colore egregie micant, & velut cirrhum efficiunt. *Rostrum* habet longum, robustum, digitum parvum, longum, cujus superior pars, quæ juxta caput lata eminet, & duas strias, ut folium Cyperi, obtinet. *Linguam* oblongam duram & in extremitate asperam. *Digitos* binos ante & totidem retro. Ungues recurvos.

PICUM MAJOREM *πτερυξ* Aristoteles vocat. Magnitudine merulam vincit, scribente Aristotele. Is quem Aldrovandus depingit, *rostrum* habet canaliculatum, *linguam* longissimam, musculosam, extremo apice duro nervo aculeatam. *Caudam* robustam, & ob superiores reliquas cooperientes plenas duro calamo donatas & inflexu difficillimas, renitentem. In tota ave triplex color conspicitur. *Plumæ* medio vertice rubicundæ, & saturo cocci colore conspicuæ sunt, quæ in foemella mari aliquin per omnia simili desiderantur. In oculorum ambitu, ventre toto, & alis in-

ternis insigni macula albicat. In alis & cauda nigri aliquid conspicitur.

PICUS VARIUS MINOR majori per omnia similis est, & prorsus videtur idem. Nisi rubrae illæ maculae in vertice & Uropygio deessent. *Dorsum* ejus versus lumbos magis quam superioris varium. Et ex albo nigroque promiscue maculatum, lineis interim obscuris transversalibus quæ alarum notis respondere videntur, conspersum est.

PICUS VIRIDIS *καλὴς* est Aristotelis, inter Picos quidem eidem non recensitus, inter Picos tamen vel ob solam pedum & Caudæ dispositionem (duobus digitis ante & totidem retro insignitur, & caudam rigidam habet) numerandus. *Turturem* magnitudine equat. *Rostrum* habet nigrum, durum, robustum, acutum duos digitos longum. *Caput* crassiusculum in superiori parte ex maculis partim miniaceis, partim nigricantibus variegatum. *Oculos* alia quædam macula nigra ambit, sub qua rubrae illæ maculae superioribus correspondentes pallidiores sunt. *Dorsum* & *ala* virides cum luteo tamen intermixto. *Mentum*, pectus, venter, crura pallide virescunt, adeo ut ex albo & viridi permisceri videantur. Æstate eum silere ajunt. Ideo cum mense Aprili quidam clamitantem audivisset, hyemen adhuc metuentem prædixit. Altissimas arbores volatu trajicit.

Ossa ipsius tosta in pollinem redacta, & in vino epota validum sunt contra calculum remedium.

PICUS LUTEUS CYANOPUS ex Persia adfertur. Magnitudine à superiore nihil differt; caput tamen & collum crassius, & rostrum prolixius obtinet. Pennæ à medio vertice ad extremum *caudæ* usque aliquid ferruginei habent, *rostrum* vero omnino ferrugineum. *Pedes* subcærulei; *ungues* nigri, cætera lutea, nisi quod *alarum penna* omnes in extremo quodammodo ferrugineæ sint.

PICO VIRIDI MAJORI seu Maximo, *Rostrum*, quod in omni Picorum genere rectum est, incurvum, pedes ad similitudinem aliorum, varias maculas in alis, tribuit Bellonius.

PICUS MURARIUS muris turrium maxime adhæret, & vermiculos in eorum rimis inquit. Passere domestico paulo major est, sturni fere crassitie. *Rostrum* habet oblongum, tenue, nigrum. *Caput*, *collum*, *dorsum* cinerea. *Pectus* albicans. *Alas* partim cineras, partim rubeas. *Caudam* brevem. *Digitos* pedum longos, tres ante, unum pro calce. *Alas* in volatu semper motitat, nec uno loco insidere novit. In foraminibus parietum *nidulatur*. Suavem *vocem* edit.

Aldrovandus Ornithol. lib. 12. cap. 35.

Bellon. l. 6. de Avibus c. 15.



## ARTICULUS II.

*De Pico Cinereo seu Sitta, Pico nidum suspendente, Chlorione Indico & Picis congeneri.*

**PICUS CINEREUS** Aristoteli *σίππης* seu *σίππης*; aliis *ύλοτομῶσα* quasi materiem contundens, nomine omnibus communi; quibusdam *σαιοσπύγης* & *κιναιδός*, quod Vropygium motitet; modernis Græcis *καρκαίνης* dicitur. Annumeratur Picis, quia eorum more super arbores repit. Caput ei parvum; Oculi exigui; Rostrum longiusculum, nigrum, rotundum Collum, dorsum, alæ, nec non & cauda superius è plumbeo ad cinereum vergunt: sub collo verò & ventre è castaneo ad ruffum. Cervix ad latera lutescit. Qua parte inter rostri principium & retro oculos macula oblonga nigerrima insignitur. *Vivit* materiem contundens. In foraminibus arborum, quas terra & limo artificiosissime claudit, angusto aditu sibi relicto, *nidulatur*, & prolem numerosam progignit. Frangit Aquilæ ova. Res malefica ei tribuitur, quasi rerum cognitione calleat.

**PICUS NIDUM SUSPENDENS** cum Oriolo Alberti, Aristotelis Chloreo, & Plinii Chlorione, Galbula seu Galgulo, Ictero, & Bononiensium Regalbula idem esse ab Aldrovando creditur. Modernis Græcis *συκοφάγος* dicitur. Chlorionem Aristoteles & Plinius appellaverunt, ut luteum & viridem in ea reperiri colorem innuerent. Junior virescit; adultior aut saltem annua facta alitantum modo exceptis tota evadit lutea. Magnitudine est par Turturi; colore pro ratione ætatis variat. In juniore rostrum est subfuscum. Adulta inter rostrum & oculos maculam habet nigram. Junior minimè. Illa alas habet nigerrimas, quarum pennæ & remiges maxime in extremitatibus suis albescunt: junior superiores pallidas, inferiores nigricantes.

**Locus.** *Locum* si attendas Germaniæ esse peregrinam Gesnerus reliquit. Migratoria vero est. Plinius & Ælianus hyeme eam videri negant; æstivo tempore in conspectum venire, exortu arcturi syderis discedere, & pullis editis Italiam relinquere, adjiciunt. In Helvetia mense Majo apparere incipit, in quibusdam Galliæ locis Martio. Dependens pedibus somnum capit, quia se tutiorem sperat, si Plinio credimus.

**Vitæ.** Vermibus more picorum *vescitur*, sed & ficibus. Unde ipsi *συκοφάγος* nomen.

**Generatio.** Proprium ipsi *nidum* in arboribus suspendere. Constat ille ex musco & lanugine quandoque, ex fœno & culmis nonnunquam, ex cannabe & festucis interdum.

Forma ipsi corbis vel calathi ficarii è jun-  
cis intexti; vincula de quibus pendet sunt,  
culmi, junci, fila è lino, serico, setæ equi-  
næ & cætera. Iconem in Aldrovando vi-  
de.

Cum *cantillat* orio vel loriot sonat, im-  
minente pluvia fistulæ instar canit. Vox.

*Ufus* ipsius in cibo est & *Medicina*. Pin-  
guescit mirum in modum. Emoritur si ab  
ictérico conspicitur æger, ipsa evadit. Ad  
Germanos accedens, non amplius nasci-  
turas pruinas promittit. Ufus.  
Plin. H.  
N. l. 30.  
cap. 11.

**CHLORIO INDICUS** maxima sui parte,  
quin toto corpore luteus est; si coronam  
verticis & caudæ alarumque maculas cæ-  
ruleas, & rostrum pedesque quæ insigni-  
ter rubent excipias.

**PICIS CONGENEREM** Aldro-  
vandus Marchioni Fachineto debet. Erat,  
quantum ex pictura conjicere licebat, Coc-  
cothraustis magnitudine; rostro luteo, acu-  
to, Picorum haud absimili; vertice, cer-  
vice & toto dorso viridi, Vropygio albo,  
pennis alarum vestitricibus viridibus, re-  
migum superioribus albis, inferioribus, &  
cauda cæruleis. Prona pars à rostri initio  
ad anum usque coloris cinnaberis erat.

**NB.** *Picarum genera exotica vide in  
Mantissa. N. 5.*

## CAPUT III.

*De Iynge seu Torquilla, Iynge congeneri,  
& Certhia.*

**P**ropter rostri & linguæ constitutio-  
nem, Picis Jynx subjungitur, quam  
Galenus & Suidas *κιναιδόν*, Tzetzes *σαιοσπύγην*  
& Cinclida, Athi montis incolæ, teste  
Bellonio, Alcionem, Theocriti interpre-  
tes *σαιοσπύγην*, alii Turbinem, Gaza Torquil-  
lam vocat. Vincit magnitudine fringillam,  
Rostrum habet firmum ex plumbeo & ni-  
gro permixtum. *Lingua* aculeum tam acu-  
tum & validum, ut humanam cutim haud  
aliter ac acicula penetret. Ea infra arteriæ  
summum subit, & supra cranium reflexa,  
prope nares inseritur. Est autem gemina  
ubi ab occipitio reflecti incipit, & in syn-  
cipite rursus utræque partes conveniunt.  
*Digitos* pedum utrinque duos habet. *Digit-  
orum* utrobique longior alter, cum altero  
breviore conjungitur. Conspicitur in quâ-  
vis regione circa arbores.

*Vescitur* formicis; easque exerta lingua *Vitæ.*  
velocissime aculeo transfixas venari & de-  
vorare solet; nec unquam rostro attingit.  
Dicitur *πικίζειν*, id est stridere. Sed Æ-  
lianus obliquam tibiam voce sua æmulari  
ait.

*Nidulatur* in arborum foraminibus, vil-  
lis & domibus. Octo vel novem ova uno  
partu excludit. Ægerrime cicuratur. Si  
manu Genera-  
tio.



manu teneatur, caput in utramque partem circumagit. Apud Gesnerum enutrita, accessum hominis æger ferebat, collum in sublime erigebat, rostrum sine morfu modo extendebat, modo retrahebat. Plumæ capitis rigeabant. Caudam erigebat & dilatabat. Usus ipsius est in cibis.

Aldrov.  
lib. 12.  
Ornith.  
cap. 43.

**JYNGI CONGENER**, quem Aldrovandus describit, magnitudine erat par Jyngis; colore capitis, dorsi, alarum, & totius caudæ ferrugineo; maculis luteis transversalibus distincto, pectore & ventre albicantibus, & lineis luteis per longitudinem exornatis. Tibiis luteis; digitis picorum more oblongis.

**CERTHIA**, Aristoteli *κερθία*, vel ut Robertus Constantinus opinatur, ab astu *κερθίων* dicta, avicula est exigua, Regulo paulo minor. Rostrum habet arcuatum, in superiori parte longius & crassius. Guttur & pectus candicans; dorsum & alas fulvescentia, nigris maculis ubique distincta. Caudam brevem, rigidam, & in extremitate acutam. Ungues valde aduncos. *Viſitat* insectis minoribus. In cavis arborum *nidificat*, & viginti quandoque *ova* ponit. *Vocem* ipsi claram tribuit Aristoteles. Perpetuo fere nunc in hanc nunc in illam partem volitat. Toto anno eandem patriam incolit. Arborum ramis fringillaginis instar sese annectit, & Picorum more arbores perreptat. Sagax ipsi in vitæ officiis *ingenium* Aristoteles adscripsit.

Arist. H.  
A. lib. 9.  
cap. 17.

#### C A P U T IV.

##### De Merope.

**M**eropis nomen Albertus Pico viridi, Niphus Grallo suo, alii Paro majori, sed male imposuere. Convenit illi aviculæ, cujus vox multiplicem partitionem capit, ideo à *μερισμῶν* dicta est; quæque Cretenſibus *μελισσοφάγος*, seu Apiaster, Rasi Alkenius, vel Alkerius; Alberto Muscipula, aliis Riparia, Parra, & Gangrena teste Kiranidis interprete dicitur. Magnitudine sturnum superat, Merulis par est. Aristoteles hoc tantum de illa habet. Pennas ejus inferiores pallidas esse, superiores cæruleas, ut Halcyonis, postremas pinnulas rubras. Plinius Aristotelem secutus, pallido intus colore pennarum, superne Cyaneo, priori subrutilo esse dixit. Aldrovandus & maris & fœminæ descriptionem tradit. Mari rostrum est longum, durum, ad instar falcis messoriæ arcuatum, & quasi triangulum. Iris ita rubescit, ut aliam omnem rubedinem superet. *Fœminæ* color ubicunque minus intensus. Tergus quodammodo virescens. Linguam habet sublongam & gracilem: oris rictum tam amplum, referente Alberto, ut multas muscas in ore ejus humoris insiden-

Prob. in  
lib. 4.  
Georg.  
Bellon.  
lib. de  
Avibus  
c. 27.  
Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 13.  
Descri-  
ptio.  
Plin. H.  
N. lib. c.

tes capiat. Vesiculam fellis amplam humore viridi smaragdi instar refertam.

In Creta insula tam vulgaris est, ut nusquam non in ea conspiciatur: reperitur & in Italia. Græcis per continentem, incognitam scribit Bellonius.

Locus.

*Viſitat* apibus; ideo Virgilius Meropis nidum prope alvearia prohibet, & cicadis. Sed nec lamsanæ caucalidis, & raparum feminibus, vel tritico abstinet. *Nidificat* in cavernis, interdum ad sex pedem altitudinem, interdum ad quatuor cubitos, defossis. Et sex aut septem pullos parit.

*Viſus.*  
Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 40.  
Georg.  
lib. 8.  
Arist. H.  
A. l. 8.  
cap. 1.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 33.  
Arist. H.  
A. l. 9.  
c. 13.  
*Volatus.*

*Volat* gregatim; circa montes qui thymum ferunt frequenter; & cum reliquæ aves quasi sursum ad oculos versus volitent, illi retrorsum caudam versum eum exercet.

*Vocem* instar hominis quodammodo edit, qui ore in rotundum clauso sonet grul gruru, urubul, & longe auditur. *Ingenium* & *Mores* si spectes, migratoria est. Pullos ne facile capiantur de loco ad locum transfert, & author est Aristoteles esse qui confirmant, Meropes parentibus senescentibus vicem reddere; imo eosdem quam primum facultas datur, liberorum opera ali.

Vox.

*Usus* ejus in *Medicina* aliquis. Fel si cum gallis & oleo omphacino misceatur, firmam capillis nigredinem inducit. Frixæ in oleo manus ab apum punctiõibus immunes reddit, si credere fas est. Est & alius *Merops* quem Germani Hirundinem marinam vocant. Et superiore paulo longior, & crassior. Rostrum habet nigrum, longum, acutum, & proprius ad falcem messoriam, quam in illa accedens. A rostro maculam nigram, quæ per oculos retro ad colli initium usque defertur. Alarum pennæ, variis coloribus insigniuntur. Primæ cæruleæ sunt. Secundæ excæruleo & flavo mixtæ. Tertiæ omnino flavæ, remiges nigrae & in extremitatibus rubrae.

Usus.

#### C A P U T V.

##### De Regulo.

**R**egulus; Græcis Trochilus, Orchilus, Tyrannus, *σαλπιγρίς*, *βασιλίσκος*, *ῥοβίλος*, *πρίκος*, *κέρταλος*, *βασιλισκόν*, & Tettigon, in Creta imprimis, aliis Rex Senator, Parra, Bitricus, & Acalanthis dicitur, quæ omnia nomina Passeri Troglodyti communiter tribuuntur. Aristoteles ipsi corpus non amplius tribuit quam Locustæ, & cristam è pluma elatiuscula rutilam. Quem Aldrovandus describit, à capite ad extremitatem caudæ mensuratus, vix palmum ex superabat. *Cristam* in fronte erectam colore fere aureo gerebat, quæ in mortuis non conspicitur. Caput, collum, dorsum, &

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
3.

L medicæ



mediæ alæ ex viridilutescebant. Remiges nigricabant, & ad latera flavescebant. Prope earum exortum notabilis visebatur macula. Guttur & pectus ex albo flavescebant, venter candicabat. *Fæmelle* pallidioribus capitis sunt conspicuæ. Minores etiam ipsis crista pennulæ, quarum caput lineâ crassâ satis velut corona eleganter ambir. In alis duashabent albas maculas, parvam unam, longam alteram, cum mas hanc solam habeat.

*Locus.* Hyeme degunt in urbibus & foraminibus, reliquo tempore in sylvis, inter fruteta & juniperos.

*Victus.* *Vescuntur* vermiculis, quorum nomine muscæ, formicæ, colli, & similia insecta intelliguntur. Muscis adeo ingurgitari quidam dicunt, ut aliquando de vita periclitentur.

*Generatio.* Bis anno pariunt & ova septem aut sex pisorum ponunt magnitudine. Volant solitariae; & aliqui post migratices recedunt.

*Vox.* Vox ipsorum zinzulare, ut Authori Philomelæ placet. Magni & sicci in hyeme frigoris tempore, præcipue cantant. Parvitatem corporis ingenii solertiæ in ipsis natura pensavit. Ausu enim magno contra Aquilam pugnare conantur. Cum se proxime quasi manu capiendas obtulerint, casso hominis conatu profugiunt. Multi uno specu in hyeme conduntur, ut parvus in tam minimis corporibus calor, societate augeatur. Cum in veruculo igni apponuntur, tametsi nemo vertat, tamen per se convertuntur: scilicet, ubi ea pars, quæ igni obversa fuit, assata est; altera, quæ non est assata, quia gravior, descendit. Motu insolito & cantu quamvis suavigestientes, quia ariduli vaporosum aërem plausibiliter excipiunt, & adventantem humiditatem, qua refocillantur implorant, pluvias affuturas denotant. Eadem ingruunt, Arato teste, si cava terræ subierint. Unde floricomis hymenæis infestos dixit Avienus, quia isti sereno cœlo gaudent.

*Aratus in Phænom.*

Datur & alius REGULUS NON CRISTATUS, qui quandoque in agro Bononiensi capitur. Similis hic, cristam si excipias, superiori Regulo. Rostrum ei gracile, oblongiusculum, saturrimo atro colore resplendens, interna capacitate, & utraque mandibula, unâ cum linguis rubicundis. Vertex, collum, Dorsum colore bætico ad flavum nonnihil vergente. Oculi nigrescentes, quos plumæ cineræ ambiunt. Alæ & cauda exteriori superna superficie ex fusco ad spadiceum vergunt. Pectus, alæ internæ ac supremæ, caudæque inferioris initium sunt flava. Postici digiti unguiculus omnium est maximus; digitus à medio anticorum magnitudine secundus, duo cæteri antiqui minores & æquales inter

se sunt. Mascula alba, quam cristatus habet, in hoc non conspicitur.

## CAPUT VI.

*De Passere Troglodyte, & Asilo ave.*

**P**asser Troglodytes, quem Ætius *simulida* vocat, etsi multo minor Regulo, quod hic pluribus pennis vestiatur, appareat: duplo tamen plus carnis possidet. Rostrum habet longiusculum, acutum, superne fuscum, inferne albidum; *lingulam* admodum exilem, bifidam, continens. Ventrem, collum, ac dorsum ex fusco ad spadiceum inclinante vestitum. Pectus cinereum; Caudam semper subrectam & albo colore interpunctam. *Vicitat* vermiculis. *Nidum* sæpius in sylvis, aliquando in posticis ædibus, & stabulis stramine tectis, juxta parietes domuum, & sepes, ex musco foris, ex plumis intus construit. Ovis erecti, & in altero suo fine consistentis formam habet; in medio latere ostiolum. Per hoc ingreditur, & egreditur. Bis anno parit, & ova novem, uno tempore deponit. Volat solus, nonnunquam gregatim, semper breviter; & quoties aliam sui generis offendit, eam aggreditur. Mira ipsi *Cantus* inprimis si cicuratur, (cicuratur difficulter) suavitas; quem Majo præsertim, sæpe hyeme exercet. In festo trium Regum, cum omnibus, quos eo anno educavit pullis cantillare Galli fabulantur. Cinis in pulverem exusti, & ex vino bibiti, calculosis opitulatur. Cerebellum in Diasatyron recipitur.

Quem Bellonius pro *Passere Troglodyte* quemque Galli Favette ronse à colore fulvo vocant, ponit; Ruticillæ admodum est similis, paulo vero minor, corpore oblongiusculo, rostro gracili & oblongiusculo. Mas magis quam femina rubet. Vix plus carnis obtinet, quam digiti extremum. Vnus tantum in eo color, qualis in Luscinia cauda. Hyeme non videtur. Nidulatur, sæpe inter dumos hortorum, & in ramis cicutæ; aliquando retro parietis in urbibus & pagis. *Nidum* ingeniose intus ex fetis equinis construit. Quinque plærumque ova edit, eaque cinerei coloris, nigro maculati.

Bellonius  
l. 7. de  
Avibus  
cap. 4.

ASILUS seu *asilo* inter aviculas vermivoras ab Aristotele numeratur; quanquam hoc nomen & insecto volatili, quod Equos infestat, tribuatur. Si ea est, quam Bellonius ob parvitatem Philosopho ita vocari scribit, & depingit; habet cristam capitis flavam, rostrum nigrescens, sed in his extremitatibus aliquando luteum, longiusculum, & debile: Caudam, tergus, alarum plicas & extremitates, lutea: crura, pedes, & ungues nigra. *Degit* in umbrosis nemorum locis. *Vicitat* bestiolis vivis, & grana averfatur. Semper canit.

CA-



## C A P U T VII.

## De Hirundinibus in genere.

**H**irundo, seu à voce sua, ut Varro credit; seu ab hærendo, quod tectis ædium, vel trabibus, ubi nidificat, adhæreat, dicta, à Græcis *χελιδών, χελιδώ, κοτίλλη, κεκρόπις, κατίλλη, χελιδόρα, αδαίσις, κρέας, & ὀλοαυρόνα* vocatur. Vagam volucrem Ovidius, Dauidem avem Plutarchus, Bistonis alitem Seneca, Pandione natam alii dixere. De Generibus Hirundinum non conveniunt authores. Aristoteles, *Domesticas, Apodes, & Falcuas* agnoscit. Plinius, *Domesticas, Rusticas, Apodes, & Riparias*. Gesnerus, *Destimicas, Sylvestres & Riparias*. Scaliger, *vulgares nigras, Subfulvas*, simili forma in ripis nidificantes. Quater illis grandiores, toto corpore atras, fœdissima facie, cruribus brevissimis, crassissimis, hirtis; & *Euteonis* magnitudine, sed facie nullo modo ab his dissimili. Dantur & albæ, seu quod præ nimio frigore albescant; seu quod canescant ante tempus, ut alia quædam animalia, seu quod artificio tales evadant. Si quis albas, inquit Aldrovandus, desideret, ova earum dum cubant, oliva illinat.

*Descriptione* longa opus non est. Formæ est grææ; nigredinis decentissimæ, modicæ carnis, plumarum multarum. Albedo totum cingit ventrem; hinc *πικίλη* Aristophani. Color cæruleus, ad latera per caput alasque refulget, unde Cyanea Simonidi. Rubedo sub gutture potissimum & pectore emicat. Unde Ovidius.

— Neque adhuc de pectore cadis  
Excessere notæ, signataque sanguine pluma est.

*Oculi* eruti renascuntur, seu quod pulorum acu puncti visum recipiant, quod Ælianus de alba in Samo nascente ab Aristotele proditum ait; seu quod laceratis eorum oculis, alii subnascantur, ut nonnulli prodidere. *Cauda* est bifurcata, & longa. *Pedes* breves nigri & debiles. *Interna* si spectentur, *fel* alii ventri, aliis intestino adhæret. *Ventriculus* ipsis longior. In dissectis pullorum qui primo partu exclusi sunt, ventriculis luna crescente, lapilli, chelidonii dicti, magicis narrati artibus reperiuntur. De colore non constat. Nigrum & album Trallianus, candidum & rubenti colore Plinius, varium & parvum Dioscorides, prodidere. Aldrovandus, unum intus albicantem, extra melinum, alterum subrubentem habuit.

In nulla non regione inveniuntur. A Thebarum duntaxat, quod urbs illa sæpius capta sit, & Bizæ in Thracia, propter Theri scelera, abhorrent. In Ægypto perennant, nostræ hyeme mense Septem-

bre seu Octobré vel conduntur, vel in vicina tepidiora loca abeunt. Inventæ multæ in apricis montium recessibus nudæ atque deplumes. In quadam Germaniæ superioris sylva, incisa quercus putrida, plena Hirundinibus inventa est. In Septentrionalibus locis inter canas descensuræ, sese colligunt; & sæpiissime in modum conglomeratæ massæ, à piscatoribus extrahuntur, & in æstuaria deportatæ, caloris accessu resolutæ, volare incipiunt; sed exiguo tempore duranti. Redeunt sub veris initium: ideo à Rhodiis sub hyemis finem invitantur. Et Calpurnius illis visis oves ab hybernis stabulis educi jubet. Easdem redire indicio observatum. Migraturæ cum rubro filo pedi alligato dimissæ sunt, idem retulere reducēs.

*Vititans* insectis, ut cicadis, ideo eas in ædibus haberi vetabat Pythagoras; apibus, unde nidos earum alveis propinquos tolli, Aristoteles jubet; muscis, culicibus, papilionibus, & aliis. Carne vesci, credidit Aristoteles, an granis dubitatur.

De artificiosa *Nidorum* structura, in sequentibus dicemus. Quantum ad *coitum* cum cæteræ aves in eo à maribus conscendantur, Hirundines; contrario quam aliæ modo miscentur, aversæ nempe. Bis anno, quinque, semel ova, magnitudine olivæ, ferrugineis maculis conspersa pariunt, nec plura utero gerunt. Primi partus, injuria frigoris (prima namque parit) corumpuntur; posteriore pullos, sed cæcos proferunt. *Fætus* educatio summa peragitur à mare & foemina æquitate. Alterant cibum, & à primo natu, finitur in ultimo. Nil amplius, qui accepto cibo locum mutavit, accipit, donec in pristinum redierit. Hesiodus citante Æliano, dimidium tantummodo somnum perficere ait.

*Vox* ipsarum perfritinnire, thrinsare vel drinzare, zinzilulare, minurizare, à latinis; per *ψιτυρίζειν, τιτυρίζειν, & τιτίζειν* à Græcis, exprimitur. Canunt stantes; aliquando in volatu clamant breve & abruptum quiddam. Mane & tempore coitus magis strepunt.

Rarissime propter pedum debilitatem & brevitatem *incedunt*. Volucrum vero solis, flexuosi volatus, velox celeritas, quibus ex causis neque rapinæ cæterarum avium obnoxia sunt.

*Ingenium* & in eo qui quidem quod cicurari nequeant pullis Chelidonia amplicata, visum restituant, blattas ovis infestas apio fugent, & postquam pullos à serpente laniatos animadverterint, circa ejus maxillas se tamdiu, donec conficiantur, volunt; testantur; sed in Nidorum structura maxime. Hos luto construunt, stramento

Arist. H. A. 1. 8. c. 16.

Vossius de Idolol. l. 3. c. 82.

Vissus. Plut. l. 8. Sap. q. 7.

Arist. H. A. 1. 9. c. 40. Arist. H. A. 1. 8. c. 3.

Generatio. Æl. H. A. l. 2. c. 3.

Arist. H. A. lib. 6. cap. 5.

Plin. H. N. l. 10. c. 33. Æl. H. A. l. 3. c. 25. Oppian. in Cynege.

Vox.

Plin. H. N. l. 10. c. 33.

Ingenium.

Oppian. Halieut. l. 5. Plin. H. N. l. 10. c. 33.



mento roborant. Si quando inopia est luti, madefactis multa aqua pennis, pulverem spargunt. Ipsum vero nidum mollibus plumis floccisque consternunt, reperi faciendis ovis, simul ne durus sit infantibus pulis.

Præsa-  
gium.

Putantur pluvis præfagire, cum circa lacus ita proxime volitant, ut etiam ventre contingant; vel hac & illac volantes parietibus subinde hærent, vel usque adeo humiles feruntur, ut pedibus humum vertere videantur; seu quod tum muscas & alia animalia venentur; seu quod commotam sursum auram perhorrescentes deorsum pavitent.

Affectus.

Quantum ad Sympathiam vel Antipathiam, vix aliquos videntur, vel amicos vel hostes habere. Cum passeribus tamen, qui initio veris earum præoccupare nidos conantur, pugnant, & observatum Coloniae; Hirundinem cum Passerem ejicere non posset, stridore suo multas convocasse. Hæc cum impetu advolantes, luto, quod ore singulæ gerebant, nidi foramen obstruxere. Passer inclusus suffocatus est.

Ufus.

Ufus ipsarum pullorum in primis sylvestrium in Medicina maximus. Cor cum melle devoratum, quartanas pellit. Lapilli, croceo linteo involuti, linoque ad collum suspensi, easdem tollunt. Caput matutino pascenti præcisum, & luna plena lineo panno adalligatum; capitis medetur doloribus. Idem lapilli si manu singuli teneantur, faciunt, si Marcello credimus. Aqua hirundinum destillata Epilepticos sublevat. Lapilli ad brachia alligati, si Sexto credimus, eosdem sanant. Nec male fimus cum aceto & castoreo à quibusdam iisdem exhibetur. Stercus cum felle taurino inunctum capillos denigrat. Fel & sanguis mire caliginibus profunt. Idem, si tepidò applicetur, oculum ictu læsum restituit. Celebris nidorum in angina usus, sed & crematarum cinis eandem discutit.

## C A P U T VIII.

De Hirundinibus in specie.

### A R T I C U L U S I.

De Hirundine Agresti, & Riparia.

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 33.

**H**irundo agrestis, quam Plinius Rusticam vocat, in capite, collo & dorso, hirundinis domesticæ est colore. Sub rostro, gutture, & toto ventre ad caudam usque candicat. Pedes habet pennis obsitos. Sed & maculam prope caudam albam tantæ magnitudinis, ut dum volat, nihil in ea nigredinis, caudæ extremitates, caput, alas, & dorsum si excipias, appareat. His notis à domestica distinguitur. Caudam quidem etiam bifurcatam habet; sed longissimis

illis, quæ in domestica visuntur, distituitur. Raræ sunt in domibus. Diversos figura, sed eadem materia confingunt nidos. Totos supinos, faucibus porrectis in angustum, utero capaci; mirum qua peritia, & occultandis habiles pullis, & substernendis molles. In Ægypti Heracleotico ostio molem continuatione nidorum evaganti Nilo inexpugnabilem opponunt; stadii fere unius spacio, quod humano opere perfici non posset. In eadem juxta oppidum Coptom insula est sacra Isidi, quam ne laceret amnis idem, muniunt opere, incipientibus diebus vernis palea & stramento, rostrum ejus firmantes, continuatis per triduum noctibus, tanto labore, ut multas in opere emori constet. Ea militia illis cum anno redit semper.

Idem  
ibid.

**RIPARIA** Marcello Empirico Ripariola, Gazæ Falcula, Græcis Drepanis dicitur. Foemina prone præter pectus candicat, supine fusca est: mas vero magis nigricat, collo toto, præterquam sub rostro, ubi macula est, lutescens. Hoc tantum cum Hirundinibus omnibus commune habet, quod pedibus sit curtis, multum volet, & insecta in volatu capiat. Nidos non faciunt. Ripas excavant, atque ita internidificant. Aldrovandus illatis tantum plumis & stramentis nidulari audivit. Æstate tantum apparent, mense Augusto cum Solest in Leone, & cum imber incessit. Eo tempore pariunt, cumque pulli convaluerint, moriuntur. Plinius, migrare multis diebus antequam futurum est, ut amnis auctus attingat ejus nidum, author est. Huc refer Hirundinem MARINAM aucupibus Italis dictam, quæ corpore est major, pedibus longioribus, ventre toto ad pectus usque candicante, capite, alis, & dorso fuscescentibus. Rostrum robusto, nigro; Rictu maximo eoque coccineo. Cauda bifurcata, pedibus aterrimis. A rostro per oculos ad pectus fere usque notabilis linea atra defertur, & velut torquem prope pectus constituit.

NB. De Hirundine exocica vide Mantissam. Num. II.

### A R T I C U L U S II.

De Apode.

**A**Pos, aliis ἀψαρς, nonnullis Hirundo marina vocatur. Est toto corpore plumis egregie munita, unius coloris, qualis in murium pilis, conspicitur. Caput habet supra admodum latum; collum brevissimum, rictum adeo amplum, ut integros scarabeos deglutiat; rostrum exiguum, nigrum, alas longas, caudam bifurcatam, crura brevifcula, ad digitos usque pennis obsita, ad rependum potius quam insistendum facta. Digitos utrinque binos,



binos, ut in Picis Martiis, unguibus acutis armatos, quibus quod rapuit adeo constringit, ut id perfodiat.

*Viscitat* insectis per aëra volantibus, ea-que nisi volans capit & edit. *Oculorum* vero acie ita valet, ut permille passus muscam observet, & subito insequatur. *Volant* plurimum, & gregatim, arcus tenſi figura, sæpe alas non movendo. Hæ sunt quæ toto mari cernuntur, nec unquam tam longo naves tamque continuo cursu recedunt à terra, ut non circumvolitent eas Apodes. Cætera genera resident, & insistent: his quies nisi in nido nulla, aut pendent aut jacent. Nidificant in foraminibus turrium. Visæ & in speculis & abruptis fluminum littoribus. Fœtus earum Bononiæ magno vaneunt.

## CAPUT IX.

*De Upupa.*

**U**pupam avem, quæ Græcis communiter *ὑποψ*, Orus Cucupham, alii *σιήτην*, *ἀλεκτρυόνα*, *γέλασεν*, *κυκύφαν*. Phylincopteron, Agriopetinon, & *ἀγριοπέτινον* appellant. Magnitudine paululum Coturnicem excedit. Color in ea cinereus albus & nigricans, quem mutat autumnoinprimis. Unde apud Æschylum *δύο μορφῆς φάνειν* dicitur. *Rostrium* ei nigrum, rotundiusculum, falcatum, parumper à lateribus depressum. *Capiti* plicatilem cristam, *πτεροφάν* Græci dicunt, ex viginti sex plumis constantem, dedit natura, quæ per medium caput à rostro residet, & per capitis longitudinem proavis arbitrio, surrigitur & contrahitur. Hinc *μακροσίκραν*, & *κορυθαίολ* poëtis cognominatur. Fit id beneficio musculi, qui inter vericem capitis & rostri initium in quodam cavo locatus, totus continuus, à verticis extremo, & frontis carnosiore initio nascitur, & utrinque supra nares, infima parte carnosior, & rubicundus, extrema & suprema, cui cristæ plumulæ profunde implantantur, membranofus magis, ac cutaneus, desinit. *Lingua* ipsi parva, trigona, initio lata, extremo, instar æqualium laterum trianguli acuta, in profundo latitat. *Aspera arteria* initio diyaricationum, quibus in pulmones utrosque finitur, duo velut oscula, extrinsecus laryngis vicem suppleantia exhibet, quibus plicula tenuissima prætenditur. Annuli semicirculares in utrumque latus terminati, nequaquam interna parte coeunt, sed tota interior facies hiat, subtilissima membrana obtenta tantummodo cooperata, quæ aëre & spiritu & copioso, vocis efformandæ edendæ gratia, concepto, in amplum distendi potest.

Montes & sylvas incolere Aristoteles testatur. In sepulchris, & humano stercore

commorari Isidorus. Rarius arboribus insidere, sæpius in terra, maxime ubi immundities est, experientia. Plurimo anni tempore, in montium angustis, & arborum cavis locis latitat. Ideo verno tempore de plumis solet conspici.

*Vescitur* myrti baccis, vermibus, formicis, muscis. Vvis sæpe tam immodice, ut ebria evadat. De *Nido* non convenit inter Authores, nec sibi constat Aristoteles. Gesnerus sub stipitibus arborum. Olaus M. in paludum tuberibus nidificari tradit. Hic modo nidum luti vice stercore humano, seu ut intolerabili odoris foeditate homines ab eodem fuget; seu ne venenata ad eundem animalia accedunt, circumlinire; modo, stipites arborum subire, & sine ullo instrumento in cavis parere, scribit. *Terna ova* Perdicum similia, sed minora, duriora, aspectu deformiora, & odoratu graviora, parit.

*Lente admodum volat.*

Vox ipsi per æstatem alia, alia per hyemen, si Alberto credendum; si Polluci *ποπίζει* semper, si poëtis, *πῆ πῆ* semper clamat. Si gemit, pluviam indicat. Si clamat, vulpem in vepretis hærere innuit. Si ante vitium tempus canit, insignem vini copiam prænunciat.

*Ingenio* non destitui certum, si ex uvarum esu ebria adiantum herbam ori inferere; & circumambulando sibi mederi, gramen adversus *βασκανίαν* edere; clausum nidum, herba quadam, prodente Æliano aperire, verum est. Senescentes, inter pullos jam adultos plumas deponunt, & visum amittunt. Ab iisdem, donec vires recuperent, pascuntur. Visus admota herba, restituitur.

Invenit & in *Medicina usum*. Cor in lateris doloribus laudatur. Mira in somniis videbis, si sanguine tempora illeveris. Lingua obliuioſo suspensa prodest. Pennarum suffitus vermes expellit. Corium capiti impositum dolorem sedat. Ala dextra cum dente hominis ad caput dormientis suspensa, non expergisci, donec auferatur, fabulam esse credo.

## CAPUT X.

*De Paris in genere, & in specie.*

**P**arus, Ægithalus, Parix, & Parula dicitur. Tria ejus *Genera* agnoscit Aristoteles; plura adjiciunt alii. Omnibus juxta oculos maculæ albæ sunt. Vnguibus etiam omnes reptare, & facile, ubi volant, adhærere possunt; ita ut nucem è filo illis suspensam adhærescentes comedant.

Semper fere in arboribus degunt; raro terram petunt. Ad Belgas & Anglos quotannis sub initium Octobris accedunt.

*Vescuntur* muribus, cute tantum detracta.

*Visus.*  
*Generatio.*

Olaus M.  
l. 29. c.  
21. H. A.  
l. 9. c. 15.  
Ælian. l.  
6. de Animal.  
cap. 1.

Anglicus  
lib. 119.  
cap. 116.

*Volatus.*

Vox.  
Pollux. l.  
5. c. 13.

*Ingenium.*

Ælian. de  
Animal.  
lib. 1. 3. c.  
26.

*Uſus.*

*Locus.*

*Visus & Vox.*



Objectis, vermibus, apibus, nucibus, canabino semine, quod dum rostro perforant, sonum fabri malleum in asserem adigentis excitant. Sebum eis exhibetur, ut lentore fauces demulceantur, & suavius cantant.

*Generatio.* *Nidificant* in cavis arborum quidam, nonnullæ nidos de arborum ramis miro artificio suspendunt. *Ova* plurima edere scripsit Aristoteles. Gregatim & impetuose volant. Tinnire per noctem author Philomelæ scribit. Veniunt apud Helvetios in cibum, & regium morbum, patientis aspectu in se, si nonnullis credimus, recipiunt.

*Species* Parorum sunt, *Major*, *Palustris*, *Sylvaticus*, *Ater*, *Ceruleus*, *Caudatus*, & *Cristatus*.

*Aldrov.* *PARUS major* Aristoteli *διγιδυλος σιζιανος*,  
l. 17. Ornithol. c. 13. Turnero & Longolio Parus Carbonarius, Gazæ Fringillago vocatur. Coloribus quinque viridi, luteo, albo, nigro, & cæruleo elegantissime variat. *Caput* integit vitta, præ intenso nigrore instar corvi resplendens. Tempora & oculorum ambitus al-  
bent. *Lingua* extrema in duas partes fissa est, quarum utraque denuo in exigua quasi capillamenta subdividitur. *Cauda* est bifida, partim cinerea, partim nigra, cujus extre-  
mæ utrinque pennæ duæ, exteriori parte candent. Propter cantus suavitatem alitur, eumque per totum continuat. Pulveriza-  
tus colicos & nephriticos cruciatus tollit.

*PARUS INDICUS* tribus potissimum coloribus, oculos si excipias, cæruleo, albo, & nigro, constabat. Guttur, pectus, & totus venter candibat. Vertex capitis & collum coloris erant cærulei diluti; Pedes nigerrimi.

*PARUS PALUSTRIS* in agro Bononiensi Paronzino, Bellonio, quartum Pari genus, Turnero Schæniclos Aristotelis dicitur. Capite est prorsus nigro, ut à Gesnero describitur; pectore & ventre albicat. Dorso & cauda frigescit, crura sunt rosea.

*SYLVATICUS* macula per medium verticem rubente est conspicuus, partibus utrinque nigris, crurculis fuscis, alis nigricantibus, reliquo corpore viridis, ventre dilutius.

*ATER* qui & *Carbonarius*, albam maculam infra oculos habet, aliam in occipitio, caput nigrum, ventrem luteum, crura fusca.

*CÆRULEUS* ab Aristotele tertio loco, & absque nomine peculiari positus, quod solus cæruleo capite sit insignis, ita dicitur.

*CAUDATUS* Aristoteli *οφειδης*, Bellonio Monticola, aliis, sed male *αδανυμ* vocatur. Niger est, parte prona, albus supina, in mediis alis rubet, circa imum ventrem dilutius. Vertex ei albus, rostrum fuscum, cauda bifurcata, & tantæ longi-

tudinis, ut retro per tergus super caput posita, hoc longitudine sua vincat. In fœmina omnia sunt pallidiora, & color tergoris in mare castaneus, in hac ferme fuscescit.

*Incolit* montes & sylvas, & raro, nisi frigido tempore invenitur. *Vescitur* vermibus, araneis, & similibus animalculis. Sed & arborum germina principio veris amputat. Nidum struit inter frutices, duos fere palmos cum dimidio longum, ex musco & araneorum filis compositum, aditu semper angusto.

Species quæ Mourier Gallis audit, rotundum aditu gemino ad arboris alicujus truncum suspendit, & multa ova parit. Viscus ex lanugine illa, quæ in salice vetusta & populo, extra ex lino aut cannabe extractus. Quem Aldrovandus à Presbytero quodam Colonienfi descriptum exhibet, avicula est Wyntepfker, quasi vini promum Colonienfes dicunt.

*Volant* Pari caudati invicem, & modo hanc, modo illam petunt arborem. *Vox* ipsis non ita incondita, altum vero veris imprimis tempore clamant. *CRISTATO* magnitudo est Paro majore minor, montano par. Caput cum paucis punctis albis nigrum, crista retro extensa, corpus pronum fuscum, pectus album, crura cinerea. Degit circa abietes & Juniperos.

## CAPUT XI.

*De Motacillis, & Muscicapis.*

**M**otacilla, Hefychio *κίλλορος* & *οπισπιγυς*, Aldrov. Ornithol. 18. c. 22. à motitatione caudæ dicta, à quibusdam cauda tremula vocatur. Comune omnibus muscis vesci, & circa aquas & pecora, ideo versari: combustarum pulverem contra lapidem vesicæ vehementer laudari Faventinus & Massa reliquere. Species ipsarum sunt *Alba* & *Flava*, ad quas *Spipola*, *Spardæ*, & aliæ *Muscicapæ* referri possunt.

*ALBA*, quæ & communis Gazæ Albicula, Bellonio Aristotelis Cnipologus, sed forte male, avicula est oblonga, vertice, collo superiore & pectore nigris, dorso cinereo, rostro longiusculo, tenui, nigro, gula candida, ventre toto candido. Fœmella vertice est cinereo, gula lutescente, cætera mari similis. Versatur circa equas: sæpe & aratrum vermium causa sequitur.

*FLAVA* duplex est. *Alteri* caput proportionem parvum, fuscum: rostrum longiusculum, nigricans. Cranium mollissimum, alæ breves, venter cum paucissimo luteo albicans, qui color initio caudæ inferius intensior est. Pennæ in alis nigricantes, in medio per transversum albidæ, extremæ totæ nigræ, cauda bifurcata, reliquo corpore longior. Ab Accipitre persequente si evaserit, egregie cantare dicitur.

*Alteri*



*Alteri* rostrum gracile, atrum, in extremo parum recurvum, flavedo à gula ad podicem usque præcedente intensior. Caput & dorsum ferruginei ferme coloris, mentum albicante macula velut barba cana vestitum.

Ornith.  
l. 18. cap.  
26, 27.

**SPIPOLARUM**, ut aucupes Bononienses appellant, tres describit Aldrovandus species. *Una* habebat caput leucophæum, albam sub mento maculam, pectus rubicundum. Dorsum cinereum, ventrem ex rubicundo & albo varium. *Alter*a pectus maculis fuscis deorsum descendentibus interstinctum, ventrem albescentem, maculam retro ad oculos majusculam ad ferrugineum accedentem. *Tertia* cui & Boarinæ nomen, tota erat ex albo lutescens, rostro & pedibus fuscescentibus.

**STOPAROLAS** idem exhibet binas; unam pectore & ventre fere candido; Capite, quod maculis nigris in vertice, conspergitur, collo, tergore, cauda subfuscis: *alteram* rostro oblongo, recto, supra tamen parumper *declivi*, superius nigro, inferius corneo: collo, pectore, & ventre pallidis, oculis exiguis.

Ornith.  
lib. 18.  
cap. 28.

**MUSCICAPARUM**, quæ forte *Opiano*, quod circa boves volitent *βυστιναι*, plures exponuntur ab eodem species; ex quibus illa quam *Pigliamosche* aucupibus Italis vocari scribit, in collo maculam albam velut torquem habet, in medio alarum aliam: *Alter*a, Magnanima quasi munus fabri obiens dicitur, forte quod rostro sonore tundat, Muscas capit. *Tertia* quæ Gesnero Glarea, cruribus roseis, & ante hyemem avolat. *Quarta* quam Germani *Todtenvogel* vocant, forte quod imminente pestilentia sint frequentiores, solitaria est, & per arbores irrequieta volitat. *Quinta* Gallis Moucherolle dicta, quæ passeri adeo similis est, ut non nisi moribus dum vivit, & rostro cum mortua est, ab eo distinguitur. In sylvis & dumetis latitat; & crura habet rosacea. Quidam Linariis eas comparant. Gesnerus eandem cum sua *Prunella* esse conjicit.

## C A P U T XII.

*De Rabeira, Rubecula, Pyrrhula, & Phenicuro.*

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
3.  
Scalig. ad  
H. A. l. 8.

**Q**Uæ Aristoteli Græce *βυτις*, illam *Gaza* Latine **RUBETRAM**, Scaliger Rubicolam transtulit. Non convenit de ea inter Authores. Niphus Italorum Baradame esse opinatur. Germani quidam *Turdorum* minimum genus quod rubi fructu victitat: Longolius *Linariam* seu *Miliariam*; Turnerus Anglorum *Moretetteram*, aut *Stonchatteram*; Bellonius Gallorum *Traquetum*, quod continuo alas motitet. Si hunc sequimur, fringilla paulo

minor est. Capite supremo nigricat, unde *Melanocephalos* Cretensibus dicitur. *Cololum* & dorsum habet cinerea. *Mas* à foemina discrepat, quoniam ventre candicat, dorso, capite, & collo albicat, gerit & albam per alas lineam. In Græcia, Creta & Gallia continuo, migratoria enim non est, visitur, & semper dumetorum cacuminibus insidet. Unde fortu ei apud Græcos nomen, nec ad pagos vel vicos propius accedit. Solitudine gaudet, & gregatim duntaxat, dum soboli intenta est, volare conspicitur. *Nidum* tanta struit industria, ut difficulter quo intret vel exeat invenias.

**RUBECULA**, quæ Græcis *ἐρίταυρος*, *ἐριθιδε*, *ἐριθύνος*, *ἐριθία*, & *δάυδαλος*, *Gazæ* etiam *Sylvia*, pectore est aurantio ad ferrugineum accedente, lingua bifida, cauda duodecim pennis instructa, quam sæpe motitat, postquam submiserit absque tremore statim erigit, & sic ejus pulli à *Phenicuri*, seu *Ruticillæ* foemina, & pullis, quibus ita similes sunt, ut vix ab oculatissimo dignosci possint, quæ simul atque caudam moverit non cessant, donec ter aut quater simul moverint, dignoscuntur. *Æstate* cum prole ad desertissima quæque loca secedit, cum *Ruticilla* comparet. In fine Autumni perfectam in pectora rubedinem nacta, ad oppida & pagos confugit, quo tempore *Ruticilla* delitescit. Nunquam fere in eodem saltu nisi una reperitur; unde *Phavorino* *ὄρνις* *μυρρη* *ἡ μόνος*, & natum inde illud, una arbor non capit duos *Erithacos*. *Voce* homines imitari, prodidit *Porphyrius*. Si cava terræ subierit, pluviam prædicit. *Merulam* amore tanto prosequitur, ut noctu fere in proxima arbore prope eam quiescat. Dicitur & morbo comitiali esse obnoxia.

Hesych.  
& Phavorin.  
Lex.

**PYRRHULA** seu *Rubicilla*, Scaligero *Aldrov.* *Byrriola* passeris est magnitudine; gula, *Ornith.* pectore & ventre, miniaceis seu purpureis (foeminae pectus totum castaneo cinereo colore diluitur) rostro brevi ac lato, bituminis instar splendente, trigone ferme. Lingua pro corporis magnitudine latiore & crassiore; cujus pars extrema quæ palatum tangit, & sapes dijudicat carnea est & unda, reliquæ cornea pellicula obteguntur. Degit æstate in montibus & sylvis; sub hyemem ad plana descendit, & facillime capitur. Colorem per totum annum servat. *Vescitur* vermiculis; sed in primis femine cannabino, & primis illis arborum mali præsertim & pyri gemmis, quæ ante folia & flores erumpunt. Sed & nucibus ac acinis rubentibus sambuci aquatici, & solani perpetui, delectatur. *Nidulatur* in sepibus & quatuor ova excludit. *Voce* fistulam imitatur etiam foemina, & omnes cantus avium canendo & sibilando exprimit: forte & humanum sermonem.

Porphyr.  
l. 3. de ab-  
sin. ab a-  
nimal.

Aldrov.  
Ornith.  
l. 17. c.  
31, 32.  
Scalig. ad  
lib. 8.  
Arist. H.  
A.



Arist. H.  
A. lib. 9.  
cap. 49.

**PHOENICURI** seu Rutilillæ, quam Aristoteles & Plinius cum Erithaco confundunt, plura fortassis sunt genera. Turnerus enim caput scribit ei esse nigrum, Gesnerus macula alba insigne. Aldrovandus quatuor diversas observavit, binas iisdem ex Gesnero adjecit. Tota æstate nobiscum degit, hyeme advolat, aut se abscondit. *Vescitur* mulcis, nucleis juglandium concisis, ovis formicarum & araneis. *Nidulatur* in arborum, murorum, & posticarum ædium, ubi hominum minor frequentia, cavis. Bina aut terna *ova* parit. Cuculi pullum, qui aliquando in ejus repertus fuit nido, alit. In sublimi aliquo ædificio, primo inprimis diluculo, idque veris tempore, *canit*. Hyeme & pullis exclusis silet. Inter incubandum prætereunte aliquo clamat.

### CAPUT XIII.

*De Antho, Cannevarola Boniensium, Oenante, & Luscinia.*

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 42.  
& 74.

**ANTHI** avis, quem Florum Gaza vertit, facit mentionem Aristoteles, eidemque fringillæ magnitudinem, pedes fissos, pulchrum colorem, domicilium circa aquas & pecudes; victum ex herbis & vermiculis facilem, oculorum imbecillitatem, hinnitum equorum, quem herbæ pabulo, adventu ipsorum pulla imitatur, ad hunc modum se ulciscens, odium cum Spino & Ægitho tantum, ut sanguinem eorum credant non coire, multisque ob id beneficiis infament, tribuit. Quænam illa hodie sit avis, non convenit inter scriptores. Bellonius illamquæ Gallis Bruant dicitur, esse credit, illamque fringilla esse majorem, mares fere lutescere, cauda flavescere, cruribus & pedibus nonnihil rubescere; circa altas & proceras arbores procul à pratis dissitas versari, plerumque canabino semine vesci, ad minimum quinque pullos excludere, dum volat strepitum edere, scribit. Aldrovandus, qui modo descriptam avem Chloridem esse putat, spipolam esse judicat; cum & pulchra sit, & omnia fere ea, quæ Antho Aristoteles adscribit, admittat. Circa amnes, inquit, & prata uliginosa degit, & si ab equis ibi pascentibus pellatur, aufugit quodam cum garritu, quo, hinnitum equi quodammodo imitari videtur. Gesnerus denique illam Aviculam quam circa Argentoratum Gaulammer vocant, Aristotelis Anthum esse conjicit.

Aldrov.  
lib. 17.  
cap. 33.

**CANNEVAROLA** Bononiensium, quod in viridi crescenteque cannabe & niduletur, & degat sic dicta, Germanorum Crasmuscho; & Anglorum Tillingæ, si Aldrovando credimus, per omnia similis est. Lusciniam tam exacte corporis figura exprimit, ut nisi pau-

lo esset minor, nec tam rufesceret, prorsus eadem videretur. Tota parte prona, gula nempe, pectore, & ventre ex albo flavescit, supinè capite, collo, dorso, & alis ex luteo fufcescit. Rostrum habet lutescens longiusculum. Caput planum. Caudam breviusculam infra lutescentem, supra ad ferrugineum vergentem.

**OENANTHE** Aristoteli & Plinio memorata, Gazæ vitiflora seu vitifera, vel à colore simili uvis germinantibus; vel quod vini tempore appareat, vel quod uvis delectetur, ita dicitur. Abdit se sub caniculæ exortum, eadem occidente conspicitur. Vitat interdum frigus interdum æstus. Quænam sit avicula ambigitur. Bellonius illam esse credit, quæ Gallis, Cul blanc, Italis Culo blanco dicitur. Avis est Sittæ magnitudine; rostro, alis, cruribus, & caudæ extremitate nigris; dorso cinereo; lingua oblonga ac plana, pedibus parvis: cruribus oblongiusculis. Quia quicquid sub ventre, infra, & supra Uropygium, & anteriorem partem caudæ album est, Cul blanc vulgo vocatur. *Versatur* in parvis dumetis, neque in *volatu* perseverat. *Nidulatur* in foraminibus veteris maceriæ, quandoque etiam in lapidicinis, quin & in terra, ubi bos aut aliquod jumentum vestigium impressit. *Vescitur* crucis & vermibus terræ. Plures Couli blanci descriptiones apud Aldrovandum vide.

Arist. H.  
A. lib. 9.  
cap. 49.  
Plin. H.  
N. lib. 10.  
cap. 29.

Aldrov.  
Ornith.  
lib. 17.  
cap. 38.

Quam Bellonius **LUSCINIOLAM** appellat, avis non est obvia. Pectore, capite, dorso, & collo coloris est cinerei. Penæ alarum, & caudæ fuscæ; rostrum acutum, subnigrum, gracile, in extremo & intus aureum, celeriter per terram cursitat. Numerose quando æstus ingravescit, & potandi gratia in palustria sese conferunt, capiuntur. Huc refer illam, quam aucupes Itali *Giarolam* vocant, magnitudine alaudæ. Rostrum habet fragile, intus rubicundum. *Rictum* admodum amplum. Verticem, colulum, dorsum, & alas coloris varii. *Linguam* bifidam, *Caudam* adeo brevem, ut vix ulla appareat, illamque bifidam, variam, angustissimis plumulus compositam. In pedibus posticus digitus admodum longus, paris longitudinis unguem annexum habet, ita ut ambo pollicem expleant, isque primum rectus fere totus, extremo tantum, admodum exiguo unco modice inflexo, armatur.

### TITULUS II.

*De Insectivoris Canoris.*

### CAPUT I.

*De Luscinia.*

**I**Nter Insectivoras Canoras primum *Luscinia*, alterum *Hypolaidi*, tertium *Atricapillæ*

Nomen.



*capille* locum tradimus. Causa in voce patebit. Illa Græcis *Ἀνδῶν* & *Ἀνδῶ*: Latinis, seu quod in lucis canat, seu quod ante lucem, seu quod lugens Luscinia; sed & Acredula, volucris Attica, Ales Daulia, Pandionia &c. dicitur.

*Descriptio.* *Formam* non est quod describam, cum ubique sint obviæ. *Lingua* summo acumine caret, nec tenuitatem illam primam habet, quam cæteræ aves, atque hoc illi cum Atricapilla commune intercedit. *Mari* foemina corporis habitu similis, aliquando tamen ad cinereum vergens, quod & junioribus competit. Illa quam Schwenkfeldius majorem vocat, tota fere cinerea est, & parum rubedinis obtinet. *Sexum* male ex corporis colore, mole, oculo dextro, qui mari major dicitur, collegeris: *Mares* adulti vere capti, quod tum in venerem ruentibus genitalia turgeant sese produnt; extra id tempus, quæ frequentes, & modulatos edit cantus, qui continuo spiritu in longum trahuntur; quæ unico sæpe insistit pedi, & diu immobilis permanet, mas est, Curstat per caveam foemina, & cantum brevem concisum ac intermissum promittit.

*Locus.* *Locus* ipsis diversus. In sylvis quædam vitam agunt, quæ majores sunt forte, quia se in histiores à serpentibus credunt. in sepibus quædam, nonnullæ montana loca amant, palustria nonnullæ; plana aliæ. Hybernia iis caret si Botero credendum; Batavia si aliis; imo mori illatæ dicuntur. Athenis tanta ipsarum copia, ut Philomelam Atticam Poëtæ finxerint. Sunt & prope Arduennam sylvam plurimæ. Æstate adulta non diu apparent, & sub autumno usque ad dies vernos conduntur. Maximi vaneunt, quæ in caveis hyemem pertulere. *Cibus* eis vermiculi, sed imprimis formicæ, & illarum ova. In caveis duris ovis & mica panis vescuntur.

*Partus.* *Nidum* vere mense Majo, vel etiam prima æstate, quandoque humi sub sepibus, & arborum truncis, aliquando in ipsis fruticibus viridibus, & densis, ex foliis arborum, paleis, & musco oblongiusculum construunt. Cum plurimum sena ova pariunt; & dum incubant, à cantu, si Aristotelem sequimur, cessant; si Albertum & alios, Luscinia pervigil custos, cum ova quodam sinu corporis & gremio fovet, infomnem longæ noctis laborem (solam ex omnibus somnum negligere, & *δὲ δὲ τέλος ἀγρύπνειν* Hesiodus apud Ælianum author est) cantilenæ suavitate solatur, quo possit non minus dulcibus modulis quam fonu corporis, ova animare.

*Vox.* Cantum & vocem earum, quam *ἑυσεμῶν* Pollux vocat, Sidonius sibilare dicit, Plinii verbis explico. Luscinii inquit ille diebus ac noctibus continuis xv. garrulus sine

intermissu cantus. Denfante se frondium germine, non in novissimum digna miratu ave. Primum tanta vox tanto in corpuseculo, tam pertinax spiritus. Deinde in una perfecta Musicæ scientia modulatus editur sonus: & nunc continuo spiritu trahitur in longum, nunc variatur inflexo, nunc distinguitur conciso, copulatur intorto; promittitur revocato, infuscatur ex inopinato. Interdum & secum ipse murmurat: plenus, gravis, acutus, creber, extensus, ubi visum est vibrans, summus, medius, imus, breviterque omnia tam parvulis in faucibus, qui tot exquisitis tibiæ tormentis ars hominum excogitavit: ut non sit dubium hanc suavitatem præmonstratam efficcaci auspicio, cum in ore Stesichori cecinit infantis. Variant tamen. Nam in palustribus, relaxante instrumenta vocis humiditate nimia, tam sonoræ non sunt. In Hispaniola & Insula S. Johannis, Martyre teste, nunquam à cantu cessant. In Scotia non tam suaviter ac in Italia canunt; & circa Orphei sepulchrum, vocaliores à Thracibus credebantur.

*Amicitiam* & cum Phænicuris colunt, cum quibus etiam coire creduntur, & cum aviculis mollioris rostri, ad quas caveis inclusas advolitant. *Inimicitiam*, cum collusione qui visco implicatas capit; Accipitre qui eisdem insidiatur; & vipera, à cuius suppositæ oculorum fulgore in certissimam perniciem trahuntur, descendentes enim paulatim ex arbore in prædam ipsi cedunt, ut Merula scribit; quod tamen Cardanus negare videtur, exercent Inter *affectus* corporis præcipua pinguedo. Sæpe adipis mole obrutæ extinguuntur. Si aliquo alio liberos corripere contingat, formicarum ovis sibi ipsis medentur.

*Ingenium* singularis in herum cicuratarum fides; sæpe emissâ, (tale Alcon Donaci se dono dedisse canit)

*Scit rursum remeare domum tectumque subire Viminis, & caveam totis præponere sylvis;*

imo multæ venditæ vel dono datæ aliis prioris domini desiderio contabescentes commoriuntur; & obstinatus libertatis amor, (si adultæ cavæ includantur, cantus & cibi abstinentia, pro servitute venatorem teste Æliano, silentio ulciscuntur) testantur: Cantus maxime, & Docilitas. Simplex ille, si in solitudinibus degunt; varius & multo apparatu compositus, si in auditores inciderint. Non *φιλομῆσος* duntaxat, sed & *φιλοδόξος* cum Charmide Atheniensi agnoscas *τὸ κερὰν ἐλπίτης τὸ μέλθῃ*. Nec minor posteritatis cura. Meditantur aliæ juniores: versusque quos incitentur accipiunt. Audit discipula intentione magna & reddit, vicibusque reticent. Intelligitur emendatæ correctio, & in do-

Matty.  
in Histor.  
Occiden.  
Ind.  
Pausan. in  
in Beetic.

*Affectus.*

Merula  
in Mira-  
bil. Car-  
van. l. de  
bar. rer.

*Ingenium.*  
Apud  
Nemea-  
fin. Ec-  
loga. 2.

Ælian. in  
variis.



cente quædam reprehensio. *Docilitas* mira. Cæsares juvenes habuere Luscinias Græco atque Latino sermone dociles; præterea meditantes in diem & assidue noviloquentes, longiore etiam contentu. Visum jam sæpe jussas canere cœpisse, & cum Symphonia alternasse: sicut homines reperi-  
 Plin. H. N. l. 10. c. 42. tos, qui sonum earum, addita intransversas harundines aqua foramen inspirantes, linguæve parva aliqua opposita mora, indiscreta redderent similitudine. Fuere tres Ratisbonæ, Anno M.D.XLVI. quæ, intra noctis silentium, quicquid interdiu ab hospiti-  
 Gesner. in Ornithol. bus colloquentibus inaudierant, Germanico sermone ita promere solebant, ut ab audientibus optime intelligerentur.  
 Ufus. De ipsarum in *cibouso* non est quod multum dicam. Plumis nudata vox est prætereaque nihil, ut Lacon ille apud Plutarchum dixit. Appositam fuisse in centenaria illa Æsopi Tragici, cui quendam civem Romanum donatione unica x. aureorum dedisse legimus. Patina, vel exinde colligas, quod centum aviculis, quæ cantu aliquo excellenter, constaret. Arrii etiam filios magno cœmptas esitasse Horatius testes est. *Medicinam* si spectes. Cancrorum oculi cum Luscinia carnibus in Plin. H. N. l. 32. cervina pelle alligati vigiliam præstant fugato somno. Fel cum melle illitum visum  
 Horat. l. 2. Serm. Satyra. 3. Plin. H. N. l. 32. c. 10. Æl. H. A. l. 1. c. 43. perfecte acuit, ut vult Kiranides.

## CAPUT II.

## De Hypolaide &amp; Atricapilla.

**HYPOLAIDEM** seu Currucam Aristoteli debemus; qui quidem Cuculum in ejus nido parere scripsit; sed cum corporis formam non addiderit, par fere de ea ac Antho inter scriptores concertatio. Niphus cantu & magnitudine Philomelam imitari, & quod in oculi Equi mortui concavitate nidificet, Hypolaide vocari scribit. Bellonius Luscinia in cantu similem, Gallis Fanette brune, facit. Turnerus, Titlingam seu Lingettam Anglorum, quæ Luscinia minor est, colore subviride. Culices & vermiculos in ramis arborum sectatur; raro humi consistit; hyeme non cernitur, cuculi pullum pro suo educat, & sequitur, esse; & Germanis Passerem gramineum *Grasmsche* seu *Grasemucke* vocari lirequit. Gesnerus dictionem Germanicam *Grasmsche* per metatesin à Latinorum curruca factam esse conjicit, & quatuor ejus genera facit. *Majores* vel colore sunt fusco præ cæteris canoræ. Circa lacum Verbanum Piccasigas, id est, Ficedulas, vocant, vel pectore albo, capite cinereo. Ex Lino nidum struunt.

Atricapillis, maribus caput prima ætate rubet, deinde nigrescit, foeminis semper rubet. *Minores* ventrem album, oculos albicantes habent, inter sepes fere degunt, & hyeme discedunt. Eliota Anglus Passerem sepium esse putat, quem Turnerus Passerem Troglodytem interpretatur, Germanis *Zaunschlipffe*. Aldrovandus nullam observavit, cui proprie illud nomen convenire existimaret. Schwenkfeldius, *ἐπιλαΐδα*, Græcis, Andothiam Alberto dici opinatur, & supina parte totam cineream, prona albidam, partim dilute cinereo colore respersam, vertice punctulis nigris maculato, describit. Secundum eundem; *nidum* inter gramina rotundum suspendit. *Ova* Majo prærumque quinque, aliquando septem, subviridia, punctis minutissimis varia, parit; eaque si digitis tangantur, non amplius fovet, sed relinquit.

**ATRICAPILLA** *μελαγκέρυφος* & *μελανκέφαλος* Græcis, falso Gallinago ab Alberto Magno, ab aliis Guger Germanorum, qui capite quidem atro est, sed pectore rubet; à nonnullis avis Phœnicuro adeo similis, ut nisi cauda differrent, quæ illi rubea, huic cinerea est, vix dignosci possent, esse putatur. Quam vere Aristoteli & Plinio cum Sycalide, seu Ficedula, vel ut Scaligero placet Ficula. & Ficilla eadem sit, & ineunte quidem autumno Ficedula, ab autumno protinus Atricapilla evadat, putetur; cum Schwenkfeldius Atricapillam vere & Autumno deprehenderit, judicandum relinquo. Aliquot earum exhibet Aldrovandus icones. *Una* capite, dorso, cauda, & remigibus alarum pennis tota nigra erat. *Alterius* vertex colorem castaneum gerebat. *Tertia* notabili macula supra rostrum in fronte notabatur. *Quarta* tota ex albo & nigro variabat. Schwenkfeldius Passere paulo minorem, vertice nigerrimo, collo dilute cæruleo, ventre albicante, podice subflavo, pedibus glaucis, unguiculis fuscis, esse scribit, & summæ linguæ acumine carere addit. In Anglia non habentur, si Turnero credimus. *Nidificant* in caveis arborum, & plura quam viginti ova ponunt, sed numero semper impari. Non tantum vermiculis; sed & sorbi Alpinae bacculis, *vescuntur*; imo & uvis inhiant. Unde Ampelides vocantur. *Pullos* tanta sedulitate alunt, ut in nido etiam pinguiissimi existant. Optimæ sunt in cibo autumno, propter alimentum tum in iis abundans. Phavorini tempore negabant ullam avem præter ficedulam totam comedi oportere. Dioscorides frequenter in cibo sumptas, visum acuere testatur.

Arist. H. A. l. 9. c. 49. Plin. H. N. l. 10. c. 29. Scaliger ad Arist. H. A. l. 9. Schwëkfeld. in Aviar. Siles.

Gel. Noct. Attic. l. 15. c. 8.



# HISTORIÆ NATURALIS

DE

## AVIBUS

LIBER IV.

### De Avibus Aquaticis, Palmipedibus.

TITULUS I.

#### De Palmipedibus Piscivoris.

CAPUT I.

De Onocrotalo seu Pelicano, & Ave  
Diomedea.



Aldrov.  
Ornithol.  
l. 19.c.2.

Æl.H.A.  
l. 16.c.4.

Deseri-  
ptio.

**O**nocrotalus, qui nonnullis falso Avis Diomedea, Catharacta Jubæ, Butaurus seu Ardea stellaris, Porphyrio dicitur; quemque diversum à Pellicano Aristotelis Gesnerus facit. Alberto Osina, Kiranidi Ramphius. Verrio Flacco Truo, Isidoro Canopus Ægyptius, Aldrovando Pelecanus Aristotelis, & Oppiani Pelicinus vocatur; & nomen hoc quod collum mergens & spirans quasi rudium asini edat, sortitus est. Duo ipsius Genera Albertus facit, *sylvestre* nempe & *Aquaticum*; ex quibus hoc duntaxat doctissimi agnoscunt. Videntur tamen & in provincia Manzi in India Orientali esse toti albi, cum ossè supra caput, colore sanguineo, nisi nos Odoricus de Foro Julii fallit; imo & avis, quam Ælianus Indis Celam appellari scribit, quæ est magnitudine triplo major Otide, ore permagno, ingluvie maxima, longis cruribus, summis alis pallidis, cæteris pennis cinericiis, Onocrotalus Indicus dici potest.

Quantum ad *Magnitudinem* visus Rhodi paulo minor cygno, multo ansere; visus, cujus longitudo ab initio rostri ad pedes ultimos extensa, hominis proceritatem æquabat; ab Aldrovando emptus hominem justæ staturæ non adæquabat tantum, sed vincebat etiam: ideo quorundam pondus ad XXIV. libras duodecim unciarum accedit. *Corpus* habet album. *Rostrum* coloris fusci, rubrum interdum, ut in Machli-

nienfi Onocrotalo visebatur, validissimum ac plane osseum; cujus superior mandibula, ut Aldrovandus in Ferraria allato observavit, tres digitos lata, duas Spithamas longa. Inferior palmi longitudine superiorem excedit, cum ab interiori parte capitis ortum ducat; superior in curvum quendam hamum crocei fere coloris desinit; & intus plantaginis angustæ foliæ pentapleuri figuram exacte exprimit, extuberantibus per ejus longitudinem quinque lineis asperis, & ob longa tubercula referentibus. Sub hac insigne quoddam capacissimum membranofum, rugosum, & omni fibrarum genere præditum, coloris fere crocei percurrentibus ubique maculis nigris, & facile dilatatu, dependet ceu uter quidam, receptaculum. Ingentis staturæ hominem ocreatum pedem usque ad genu immittere in fauces & educere potuisse vidit Perottus; parvulum Æthiopem in eodem inventum scribit Sanctus. Crura ipsi Anserina, præ tanti corporis proportionem breviuscula. Capitis plumæ albæ, mollesque, in radicibus suis nigræ, in occipitio longiores. *Interiora*, si spectes, in eo, quem Aldrovandus describit, quam sceminam esse ova cicoris magnitudine ad septem conspecta ostendere; *lienerat* rotundus, nucis avellanæ magnitudine, aliquanto crassior. *Ventriculus* ex membranis crassioribus constabat, digitos decem longus, duos latus, materia chylosa lutea cum quibusdam quisquiliis & capillis, refertus (Gesnerus succum quendam viridem vermiculis scaudentem in suo invenit.) *Vesicula fellis* in concavo jecoris hærebat, & ab ea meatus velut canalus ad intestinum duodenum porrigebatur. *Intestina* sex ulnas longa appendices duorum digitorum longitudinis habebant. *Gula* erat longa, crassiuscula, carnosa, quæ subinde lator evadens, ubi ad ventriculum



pervenisset, comprimebatur. *Cor* maximum, *ossa* levia, alba, pellucida & sine medulla. *Ulnæ* alarum membrana quadam integebantur insigni, ex qua tendones viginti quatuor oriebantur, tam tenuiter in eas inserti, ut nullo pacto separari possent.

*Locus.* *Versatur* in aquis piscosis & diffusioribus. Visus in Ægypto à Septentrione versus meridiem tendere. Observatæ & circa Gazanum Ægypti civitatem greges, quæ versus mare volitabant. Mittitur & à Gallia Septentrionali; & Marcellus Onocrotalum Ravennatem cognominat. Reperitur etiam in Hetruriæ maritimis, circa Herodisportum, & Orbitelli stagnum. Circa Lufannam in lacu Lemano semel tantum anno apparere creditur. Gesnerus in lacu ad Tugium captum commemorat.

*Vitus.* *Gesner.* in Ornithol. *Victitat* inprimis piscibus, eosque dum venatur, non toto corpore mergitur, sed collum subinde demittit. Cicuri si libram (quinque librarum piscis haud magna ipsi esca est) exhibueris, ita invertit, ut rostro præmisso deglutiat. Devorat & cum testis conchas, easque calore interno intra ingluviem apertas, revomit, & hiantibus jam testis carnem ab ocreis feligit. Solum scilicet visceris habet ductum; qui ab introitu oris ad naturæ secreta pertingit. *Vitus* dimidiam endromedem, qua miles unus tegebatur, in se projectam absorpsisse integram, quæ ex gutturæ interfectæ sine iactura educta est.

*Generatio.* *Nidum* ex ramulis ad ripam fluminis alijus vel stagni ponit; ibique tot ova Anserinis similia, quot cygnus solet, edit, fœtusque enutrit.

*Volatus.* *Volant* nonnunquam soli, nonnunquam gregatim: & cum volant sonum alarum cient.

*Vox.* *Vox* ipsi ruditui Asini similis: sonum cum edit rostrum in aquam vel terræ lutum infigit, si Alberto credendum. Dicuntur (Bartholomæus Anglicus ex Isidoro author est) erecto ad cœlum rostro, Accipitrum metu, sed forte falso, dormire; & in Lycia ad flumen Xanthum, quotannis cum corvis, cornicibus, & aliis carnivoris prælium committere. Si vicerint, abundantiam frugum sibi promittunt incolæ; si vincantur, ovium, boum, & aliarum quadrupedum fœcundum proveniunt.

*Ufus.* Ingluvie ea parte qua capiti adhæsit colligata, ad quam ejiciendam, Ægyptii piscatores utuntur: qui humiditate corrumpi nequit, multo tempore utilis est.

**A V I S D I O M E D E A** ab insulis Diomedis sic dicta, de qua multa veteres fabulati sunt, Servio, Stephano Grammatico & Isidoro Ardeæ genus est: quibus Sal-

masius accedit. A Plinio & Solino cum Fulicis comparatur. Aldrovandus Arternam hodie nuncupari, & in insula Sanctæ Mariæ de Tremiti duntaxat inveniri, credit. Cui Dalechampius adstipulatur. Hoc an verum sit ex comparatione colligi poterit. *Magnitudine* ista est Gallinæ satis corpulentæ. Color ei fuscus seu cinereus obscurus. Tota fere prone candicat. *Rostrum* est luteum prædurum & aduncum. *Oculi* ignei. *Degit* in cavis ut lucem solis declinet; noctu circa scopulos non longe super aquam *volitat*. Piscibus *viſtitat*, quos noctu tantum venatur. In cavernis scopulorum & terra *nidulatur*, & vocem vagitui infantium similem promit. De Diomedeis vero ita Plinius: Nec Diomedes præteribo aves: Juba Catuructas vocat, eis esse dentes oculosque igneo colore, cætero candidis tradens. Duo semper iis duces: alterum ducere agmen; alterum cogere. Scrobes excavare rostro, inde crate consternere, & operire terra, quæ ante fuerit egesta. In his fœtificare. Fores binas omnium scrobibus. Orientem spectare quibus exeant in pascua. Occasum quibus redeant. Alvum exoneraturas subvolare semper, & contrario flatu. Uno hoc in loco totius orbis visuntur, in insula, quam diximus nobilem Diomedis tumulo atque delubro, contra Apuliæ oram, fulicarum similes. Advenas barbaros clangore infestant, Græcis tantum adulantur. Miro discrimine, veluti generi Diomedis hoc tributentes. Ædemque eam quotidie pleno gutture madentibus pennis perlucet atque purificant. Vnde origo fabulæ, Diomedis socios in earum effigies mutatos.

Aldrov. Ornith. l. 19. c. 3.

Salmas. ad Solin. cap. 2.

Plin. H. N. l. 10. c. 44. Solin. Polyhist. cap. 2.

## C A P U T II.

*De Laris in genere & in specie de Laro albo.*

**L**arus, quem Augustinus Fulicam, alii Mergum, Herodium, Suidas & alii apud Græcos *κέρπος*, quidam etiam Gaviam vocant; ab Aldrovando describitur, quod sit avis à rostri acie ad alarum fere finem duas spirhamas longa, capite maximo & crasso, ex albo & cinereo variegato; *pectore* ejusdem fere coloris, illoque amplo; *rostro*, crasso lutescente, in extremo nigricante & insigniter acuto; in cujus superiore parte narium sunt foramina oblonga, rictu amplissimo. *Oculi* iridem auri instar splendidam niger ambit circulus, hunc albus, album cinereus. *Alæ* ex albo cinereo, & ad castanearum colorem simul commistis tendente constant, & caudam palmi longitudine excedunt. *Cauda* cinerea tota. *Pedes* lutei; posterior digitus satis conspicuus, ungue etiam armatus. *Corpore* est levissimo,

Aldrov. Ornith. l. 19. c. 4.

Discr. ptio.



fimo, & multis ac densis plumis induitur.

Ælian. H. A. l. 3. c. 20. *Frequentes in locis maritimis stagnis & fluminibus, cum ingens aliqua tempestas coorta est, conspiciuntur.*

Locus. *Præter pisces lumbricis etiam, cochleis, quas sursum raptas, ad saxa demissas confringunt, Locustis & Phalangiis à quibus Tarentinos agros repurgant, vescuntur. Delphinos etiam in littora dejectos devorant. Olivis denique in Liguria perniciem adferunt.*

Generatio. Aristot. H. A. l. 5. c. 9. *Nidulantur in saxis maritimis, à quibus potabilis aqua manat, & bina ternave ova æstate pariunt. Volant præcipites & faciles leves quippe. Hinc Laro apud Homerum Mercurius confertur. Sed & pennæ per se aliarum avium leviores putantur. Has enim pelamydum piscatores, teste Æliano, ad hamum lineæ alligant, ut propter earum levitatem ab occurrente aqua sensim ac leviter agitetur.*

Affectus. *Amicitiam cum homine utilitatis gratia, quia piscibus vescuntur, & Monedula, ut Ælianus prodit, colunt. Malo punico interimuntur. Imminentibus ventis sublimes in aëre volitant, & vento sese obvertunt. Copiæ piscium capiendæ augurium, si ad piscatores retibus piscantes advolarent, facere creduntur.*

Ufus. *Cerebrum Lari ficcatum & concisum infantibus Epilepticis odorandum quidam commendant. Pennæ proprietate quadam occulta, simul atque mare intumescit, in pulvinaribus etiam eriguntur, & decumbentem sublevant.*

Inter species Larorum, est primus Larus ALBUS forte Gavia peralba Apuleii, quæ superfluctus marinos natat, demergit se prope ad Oceani fundum & gremium. Duo ipsius sunt genera prodente Bellonio, *Majus & Minus. Ille minor est cinereo, pulchritudine corporis ad columbam accedit, quanquam male hanc vincere videatur. Nivis instar candidus est. Rostrum habet teres, acutum, rubicundum, cujus coloris & cauda est. Recta cruribus insistit, posteriora corporis magis elevata gestans, ita ut inferiora in arcum quasi curvari videantur. Minor summitatem capitis nigram habet; statim atque frigora ingruere incipiunt, in mediterraneis locis supra flumina volitans apparet, & cæteris in volando diutius perseverat. Captus intrabiduum fere cicuratur; facileque nutritur, intestinis nempe, carne & piscibus. Adeo clamorosus est, ut aërem clamore suo percellat. Videtur esse Turneri & Gesneri Cephæus, qui ex illius descriptione, est avis marina, magnitudine Monedulæ, sed alis acutioribus, & longioribus, colore tota albo, excepto nigro quem in capite gerit cirro: rostro etiam & pedibus puniceis. Diuti-*

no clangore defatigata tandem keph profert. Schwenkfeld. Lari albi facit mentionem, cum capite rubeo.

Schwēka  
feld. in  
Aviario  
Silesiæ.

## CAPUT III.

*De Laris Cinereis, Piscatore, Nigro, Sterna & Fidipedibus.*

LARORUM CINEREORUM  
tria ponit inprimis Aldrovandus genera.

*Primum columbam magnitudine parum superat, colore undique est albo, in dorso tantum & alis cinereo. Caput supremum, macula nigra utrinque ad extremum oculi angulum insigne omnino candicat. Rostrum habet longiusculum, & aliquantulum velut armatum, introrsum ad instar thecæ ejus, in qua novacula reconditur cavum, colore corneo. Os interius totum, & linguam cujus extremitas bifida, rubentia. Ora extrema Palpebrarum rubra instar circuli oculos exornat. Crura interdum rubent, interdum fuscescunt. Digni membranis rubris sepiuntur. Posterior pedis digitus aciculæ caput non excedit. Credunt quidam pennas capitis à Martio mense per trimestre quo tempore soboli dant operam nigrescere. Reliquis novem mensibus candidas esse. Interiora si spectentur, Gula amplissima, ventriculo longiusculo, crassiusculo, cujus interior tunica crassa rubra est, præponitur. Hepar maximum flavicans bilobium, ventriculum infra amplexatur, supra cor mucrone recipit. Lien est longiusculis sanguinei coloris; Fel viride. Vesicula in hepate continetur, & intestino ramulo jungitur. Ad intestinum rectum appendiculæ binæ graciles, & tenues antrorsum reflexæ spectantur. Vescitur piscibus, insectis palustribus, muscis & conchulis. Nidulatur in densis piscinarum & lacuum arundinetis; Majo & Junio mensibus ova quinque columbinis paulo majora parit.*

Schwēka  
feld. in  
Aviario  
Silesiæ.

*Alteri quod vix spithamam excedit, dorsum & alæ sunt coloris leucophæi ad cæruleum quodammodo vergentis. Rostrum pro proportionem corporis exilius, arcuatum, nigrum, pedes, tibiæ membranaque digitos intersepiens coloris crocei.*

*Tertium est capite nigro, rostro recto, & in fine acuto, coloris miniaci; oculis & pedibus ejusdem coloris; costis alarum & remigibus albis, dorso & in reliqua parte cinereis.*

Larus PISCATOR, circa Argentinam privatim *Fischerlein* dictus, circa Oppenheimium Fel, minor est, Laro cinereo, vertice nigro, rostro & cruribus è fusco pal-



lidis, totus albicans. *Volatus* est celerissimi, & dum pisces captat, etiam in aquam se mergit.

Larus NIGER, à colore sic dicitur. Quamvis enim sit alis cinereis ultra caudam extensis, cruribus levi rubore notatis; oculis ex fusco purpurascens; rostro tamen, capite, collo, pectore, & ventre nigrescit. Schwëkfeldius ipsi crura & pedes latiusculos rubentes, nigricantibus transversim antè maculis adscribit: & nidum in arundinibus piscinarum suspendere, ac mense Majoparere, addit.

Quam Turnerus STERNAM appellat, marinis Laris ita similem esse, ut sola magnitudine & colore ab illis differre videatur, minorem duntaxat & paulo nigriorum adjicit. Tempore quo parturit improbe clamosa est. Apud Frisios dicitur esse vertice nigro, rostro & cruribus rubidis.

Lanorum FIDIPEDUM duo sunt generis. Unum alis longis, utpote quæ trium fere digitorum longitudine caudam exuperant. Cui oculi, caput, collum, rostrum sunt nigerrima: Pedum digiti insignibus mucronibus armantur. Alterum brevibus, cui magnitudo Merulæ, caput nigrum, Alarum costæ albescentes, Pennæ sub cauda candicantes, pedes rubescentes, digiti, membranulæ quodam rudimento interjecto, quatuor.

#### CAPUT IV.

*De Catharracta & Ceppho.*

CAtarracta, Aristotelis & Oppiani, ex eo quod cum impetu ad prædam capiendam decidat, ex hujus descriptione avis est instar Lari minoris, sed robustior, colore candido, & Accipitri Palumbario similis; ex Aristotele, Accipitre minor, gula ampla, & lata. Aldrovandus avem rostro acuto, crasso, supra non modice adunco, prone per alas, dorsum, betico, albo, & luteo mixtis variegatam, supine totam albam maculis beticis distinctam, tibiis, pedibus, & membrana eos intersepiente cinereis, ponit. In mari victitat; sed & scopulis, littoribus, & petris, quas charades vocant, supra aquam eminentibus insidet. Pisces captat exiguos. Ubi vero nantes conspexerit (perspicacissima enim est, & vel ad fundum usque maris) altius subvolat, & contractis omnibus pennis, quovis telo celerius delapsa, ad cubiti spacium immergitur, & piscem extrahit; nec diutius manet, quam jugeri spacium transierit. Mirus *incubandi* mos ovis, si Oppiano credimus. Fucum aut algam iis super petram insternunt, si ventris exposita relinquunt. Mas illa unde marem procreandum conjicit, foemina unde foeminam in sublime per aliquot dies sublata, in pel-

agus mittit; motu concalefactis ovis, pulli excluduntur. Pullis luce aspecta, nulla in nidis mora, parentes volatu sequi conantur: à parentibus suscepti, in mare demittuntur, mox extrahuntur. Acie oculorum in senio obtusa, dum ad prædam se ferri arbitrantur, præcipitiis illi intereunt.

CEPPHUS Aristotelis, Fulica est quibusdam, Aldrovando, avis, habens rostrum colore corneo, ad mandibularum latera ruffo, in extremo quod aduncum est, nigro, oculos exiguos rufos. Caput, collum; pectus, ventrem, coxas, ex albis & fuscis, intercurrente etiam betico & luteo, maculis variegata. Crura & tibiae viridescentes. Pedes & membranam digitos secantem fusca. An sit Cepphus veterum, ignoratur. Nam de hoc, si foramen corporis spectas, id duntaxat habemus, Laro esse similem, cum quo descripta parum habet similitudinis, plumis abundare, sed carnis esse exiguae, ideo facile vento impelli. De cætero, apud mare victitant, cujus & spumam vorant. Thunnos, propter pisciculos, quos dentibus suis diserpunt, sequitur. Ad tonitrua adeo perhorrescit, ut sonitu exaudito ex aëre in mare decidat. Spuma inspersa alliciuntur, capiuntur alleciti. Cum relicto mari gregatim in terram adverso vento revolant, imminentis venti indicium præbent. Carnem habent probe odoris, partem posteriorem, quæ sola limum olet, si excipias.

#### CAPUT V.

*De Anfere Bassano, Phalacrocorace, Corvo Sylvatico, Nycticorace Gesneri, & Graculo palmipede.*

ANFER BASSANUS seu Scoticus, incolis Solendguse dictus, avis est domestico Anfere longior, sed minus lata, Anserem tamen & forma & voce per omnia referens. Nullibi quam circa Castellum Bas, viribus humanis inexpugnabile, reperitur, ad quod incipiente vere appellant. Tres vel quatuor primo tanquam speculatores advolant; has aliquot post diebus reliqua multitudo insequitur, quod egregiorum virorum relationi debemus. *Nidulantur* in castri prædicti rupibus; & construendis nidis tantam lignorum copiam comportant, ut auferentibus, qui illic habitant, abunde in annum ex ea parte prospectum sit. Ova in rupibus deposita, superposito pede altero, unde forte nomen à solea acceperit, excludunt. Pullos delicatissimis piscibus nutricant. Quod si avolantes novum videre, illo abjecto, iterum se magno impetu immergunt. Tanta autem piscium ab ipsis evomitur copia, ut & præfidiariis arcis in cibum cedant.

Ha-

Schwëkfeld. in Aviar. Si-  
lesiae.

Aldrov.  
Ornith.  
lib. 19.  
cap. 12.

Oppia-  
nus.

Aratus in  
Phæ-  
nom.

Arist. H.  
A. l. 9. c.  
12.

Gesner. in  
Ornith.  
Hæst.  
Boëtius  
in de-  
script.  
Scotiae.



Habent intestinum quoddam parvum, oleo singularis virtutis refertum. Ischiadem & arthritim sanare creditur. Pulli capti & assi halecis nidorem emittunt. Caro est durior, & vinum exigens, quod aliquoties experti sumus cum Anno M.D.C. XXIII. in Scotia ageremus.

Ex adipe Uguentum sit, quod cum Comageno Plinii de bonitate certat.

*PHALACROCORA*X, quem cum corvo Aquatico Plinii eundem esse vel exinde conjici potest, quod calveat, quænam avis sit inter Historicos Naturales non convenit. Gesnerus an sit illa, quæ in Burgundia Crottescherot seu Corvus Piscator, cui unus pes est ad natandum palmipes, alter ad rapinam uncis unguibus armatur; sic cum piscem in aqua arripuit, nec facile propter pondus volare potest, piscem altero pede retinens, altero ad ripam navigat; dubitat. Alii Corvum aquaticum Plinii, Phalacrocoracem, Corvum Sylvaticum, & Graculum palmipedem, easdem esse opinantur. Bellonius quidem simillimam avem cum ea, cujus hic pro Phalacrocorace ex Aldrovando iconem dedimus, exhibet: sed corvum aquaticum, Cornicem marinam easdem Aristoteli aves esse, & Phalacrocoracem, innuit. Gallis dicitur Cormorant, quo nomine Angli avem insigniunt, quæ anguillas integras edit, per intestina elapsas rursus devorat, & vel novies aliquando unam absorbet, priusquam retinuerit. Aldrovandus Phalacrocoracem scribit esse capi *magnitudine*, rostro longo acuto & rubesciente. *Capite* fere plumis nudo & cute tecto, quæ carnem substantia & colore æmulatur. Ex collo velut jubæ dependent, quales in capis cernuntur. In pedibus plumas quasdam aureas gestat. Solus inter palmipedes Fibro excepto in arboribus sedet, in iisque nidulatur, æque in aqua marina atque dulci degit. Magnum stagnis damnum quod pisces devoret, adfert, interdum Anguillam mediocris magnitudinis ex aqua abrepta aërem defert, & antequam devoret, diu cum illa colluctatur.

*CORVUM SYLVATICUM* hisce adjicio, non quod sit vel palmipes, vel aquaticus, sed quod ab aliquibus cum Phalacrocorace confundatur. Magnitudo ipsi est Gallinæ; color toto corpore niger, si eminus videas; sin propius ad solem præsertim, cum viridi permixtus videtur. *Rostrum* rubicundum, oblongum, & angustis terræ vel arborum foraminibus inferi aptum. A capite crista retro tendit, haud scitur an in omnibus aut semper. *Pedes* habet, ut Gallinæ longiores; *crura* oblonga obscure rubentia. *Digitos* fissos. *Vescitur* piscibus, ranis, locustis, gryllis. In rupibus, turribus desertis & pylis, unde *Claustrapp* Germanis, *nidulatur*. Bina aut terna ova

parit. Altissime *volat*; & primis fere omnium, circa, initium Junii ni fallor, migrat. Pulli diebus aliquot antequam volare possunt, nidis exempti ita facile cicurantur, ut in agros evolent, & subinde revertantur. In Istria circa promontorium Polæ homine per funem demisso eximuntur, & inter mensarum delicias habentur. Aucupes in singulis nidis, singulos relinquere solent, ut anno sequente libentius redeant.

Huc pertinet & *NYCTICORAX* Gesneri quamvis palmipes non sit, qui juxta aquas & inter arundines versari dicitur. Vescitur pisciculis. *Nidulatur* in altis arboribus, ita vel quaterna ova parit. Inter arundineta absona voce vomiturientis instar clamat.

Sed nec *GRACULI PALMIPEDIS* Aristotelis, seu Corvi Aquatici minoris, hic obliviscendum, quem alii Phalacrocoracem, alii Corvum Sylvaticum vel Mergum magnum nigrum esse judicant. Colore in toto corpore est subnigro, collum si excipias, ubi nonnihil ruffi admisceri videtur. Rostrum aduncum acutum, prope frontem subalbicans, cætero subnigrum. Crura, pedes, & membranæ, fuscae sunt.

## C A P U T VI.

*De Mergis in genere.*

**M**ergum, quem Græci Poëtæ Dyp-  
*Aristoteli*pten, Poingam & Bungam dicunt, veterum esse, vel ex eo colligitur, quod omnes eandem avem esse tradiderint, & pleraque de Æthyia à Græcis tradita, Plinius de Mergo interpretatus sit. Bellonius tamen Æthyiam veterum quamdam *MERGI MARINI* speciem, quæ Cretensibus Vultamaria & Calicatzu dicitur, esse judicat.

Bellonius  
observ. l.  
I. c. II.

Magnitudine est Querquedula, albo ventre, capite & dorso nigro, itemque alis & cauda Pluma ei instar lanuginis, valide cuti inhærens. Rostrum marginibus acutis cavum & plane fere, lanuginosis plumis bona sui parte obducitur, nigrum superiore, album inferiore parte, vertice lato. Frons tuberositate quadam verrucatur, cui floccus plumarum niger innascitur. Digito pedum posteriore sola inter palmipedes caret. Utut sit, certe & Salmasium hic consentientem habemus; hoc solo dissentit, quod Mergum & Fulicam easdem esse contendat. *Formam* si spectes, de ea quidem Ovidius.

Descriptio.

*Fecit amor maciem, longa internodia crurum  
Longa manet cervix. Caput est à tergo longe:*

sed quis ille sit, unusquisque conjicere tentet. Nostri contra omne genus avium pedes habent in cauda, ita ut in terra stantes

Salmasius in  
Solin. c.  
2.  
Ovid.  
Metamorph.  
lib. 12.



tes instar hominis corpus erectum proferrant, ut Author de natura rerum scribit. Ab Anatibus dentibus & cruribus discrevit Gesnerus. Magis enim duri ac rigidi, utrinque tantum in marginibus, rostri; cæteris, quibus rostrum latum non est, sed in acutum desinit, nulli. Crura vel non æque absoluta habent, vel breviora, vel non eodem situ, vel posterius, quamobrem incommodè ingrediuntur.

*Locus.* Versantur prærumque in mari, fluminibus, stagnis & paludibus: amant tamen & aprica loca, ut siccescant. Diutissime in aquis, dum se immergunt, morantur, & summa ac ab Homero allata natandi polent peritia. Alam namque alteram sæpius ad ventum erigunt, & ejusdem tanquam veli adminiculo navigant, quod Pighius prodidit. Soli inter amphibias inter volandum piscantur.

*Vitus.* Congros, Anguillas, & alios lubricos pisces deglutiunt, ingestos, interdum etiam vivos, mox alvo, quod eis à ventre mox recto intestino cibi transeant, egerunt; quod Oppianus & Plinius observare. Schwenkfeldius in omnium quas secuit ventriculis, plumas avicularum copiosissimas, quasi cum pisciculis, & avena compactas invenit.

*Partus.* Nidificant à bruma ineunte vere. Sæpe in maritimis faxis, in arboribus interdum. Utrumque se juxta ostium Thinx fluvii, & in Nortfolcia observasse Anglus quidam scribit. Ova ut plurimum bina ternave ponunt. Pullos ab ovis exclusos si matrem perdiderint, adeo validos esse ajunt, ut ipsi cibum sibi comparent.

Nullam eas vocem emittere, arbitrati sunt quidam. Lucretius de iis.

— *Mergique marini*  
*Fluctibus in falso victum, vitamque petentes*  
*Longe alias alto jaciunt in tempore voces.*

*Ingenium.* Cicurari posse, tum ille qui Venetiis ab hero è cymba emissus, non sine spectatorum & voluptate & admiratione sub aquis sibi cibum capiebat, satur redibat ad herum, ostendit; tum illi in Oriente, qui ab hero, postquam eis guttur filo, ne pisces captos devorarent, ligasset, dimissi & pisces capiebant, & in cistas huic negotio destinatas injiciebant; Piscatione heri peracta, soluto gutture, sibi piscabantur, pasti ad herum redibant, testantur. Alii tempestatem præfagire, cum maria fuggiunt, & clamorem ad littora ferunt, dicunt; seu quod dimisso in profundum capite aurarum signa sub fluctibus colligant: seu quod vapores ab aquis ad imbriferam nubem erigendam sursum attolli sagaciter subodorentur; seu quod pisces pleræque per eum coeli statum, è mediis aquis ad littora enatare soleant. Alii cam in mare

frequentius sese immergunt, seu propter aliam aliquam causam, seu quod tranquillo mari metu belluarum progredi non audeant; in altum sub tempestatem regressis, audacter progrediuntur. Plinius pennas rostro purgantes ventum indicare alicubi innuit. Ælianus gestu alarum exultantes, idem facere tradit. Huic & Aratus accedit, dum eas *ἐν χερσὶν τετάραστοι καὶ πλερούσι*, in sicco alis plaudere ac ludere, scribit.

Æl. H. A.  
l. 7. c. 7.  
Aratus in  
Phænom.

*Ufus* illorum in cibo nullus: quantum ad *Medicinam*. Magi contra quartanus devorari jubent cor Mergi marini sine ferro exemptum, inveteratumque conteri, & in aqua calida bibi. Ventriculum in cibo sumptum stomacho mederi falsissimum comperit Galenus. Fel cum cedria inunctum evulsos palpebrarum pilos renasci non patitur. Jecur sale asservatum ex hydromelite duobus cochlearibus potum, secundinas pelleret cripit Dioscorides.

Galen. de  
simpl. l.  
II.

## CAPUT VII.

*De Variis Mergorum generibus.*

**M**ergorum varia sunt genera. Mergus RHENANUS, quibusdam Moenialis alba appellatus; qui omnium Mergorum Anatiformis maxime est, corpore undique albo atro colore distincto, prona colli & pectoris parte cum ventre candida, sed passim cinereis punctis aut maculis distincta. Frequens est apud Sueffiones & Bellovacos, MAJOR, qui rostrum denticulatum angustius, è fusco ad cæruleum dilutum vergens, extremitate deorsum incurvata; pectus, collum, & ventrem tota alba: in dorso supremo egregias quasdam plumas alternatim albas nigrasque, inde etiam ad latera versus pectustænias similiter discolores utrinque procedentes habet; & gobiis inprimis atque troctis vescitur.

Gesner in  
Ornith.

GLACIALIS, quod per summa frigora in aquis capiatur ita dictus, magnitudo Querquedula, collum digitos octonos longum. Dorsum undique nigrum, alæ nigræ sed albo distinctæ; crura breviora fusca, membranæ inter digitos nigris; quique per hyemen apud Helvetios, non minus quam Anas fera laudatur.

LONGIROSTRUS, cui rostrum nonnihil rotundum, digiti longitudine; caput cristatum, collum subrubrum, corpus præter alas totum nigrum. Pedes crocei, membranæ luteæ.

RAUCEDULUS, cui corpus & alæ cinereæ; gula & venter alba, pedes nigri.

RUBER cui pars superior capitis & colli rubescit. NIGER cui rostrum nigrum, collum spadiceo colore, corpus ut in Fuli-



Fuligula, alæ cum transversa linea alba nigra.

ALBUS, cui rostrum rufum, caput cum collo nigrum, viridibus aliquot punctis respersum. Crura rubicunda.

CIRRHATUS qui habet caput rufum vel testacei coloris cirrho retrorsum eminente. Dentes ferratos, duos, retrorsum flexos; Crura & digitos pedum, interjectis membranis ex ruffo fuscis, rubentes. Rostrum tres digitos longum, inferne rubicundum, superne nigricans. Duobus foraminibus odoratus causa pervium. Bellonius Fibrum seu Castorem vocat. Asperam arteriam ab aliis aquatilibus diversam habet. Nec enim est rotunda, sed compressa & inæqualis, modo crassior, modo angustior, & in medio duobus velut nodis extuberans. Cum ad ventriculi regionem pervenit, in cavitatem quandam ex membranis & osse grandiusculo inæquali constructam dilatatur. Semper in aquis manet, & in iis se diutissime omnium continet. Urinando ad quadraginta aut quinquaginta pedes procedit. Caput inter natandum sublime attollit; & inter arundines nidulatur.

MERGANSER denique ut Gesnerus vocat, cui caput cum tertia colliparte ex viridi nigricat. Collum reliquum cum aliquo pallore album est. Inferior colli pars nigrescit. Plumæ ventris & supinæ caudæ gilvæ sunt. Crura & pedes cum membranis inter digitos minii colorem habent. *Ventriculus* est corneus id est firmissimus. Pondere interdum ad libras duodecim accedit.

Huc pertinet *Mergus* ille, quem Bellonius Gallice HERLE vocat, anatem magis quam anserem referens, rostro longo, terete, & mucrone reflexo, colore subrubro.

Item GULO Germanis *Seesluder* / magnitudine Anseris, colore gilvo, gregaria, mensis lautioribus contempta.

Nec non SCHELDARACHUS Anate major, varius rostro lato, adunco, dentibus acutissimis pleno, ex gilvo subruffo.

MORFEX, denique tota nigra, rostro ferrato & valido, quæ sub aqua mergitur, & anguillas capit. Easdemque si se gravari senserit, evomit. Gregatim in arboribus juxta aquas nidificat. Volatura caudam diu in aqua trahit. Saturata ad solem ut siccet, expandit. Fimus siccatur arborum ramos in quos inciderit.

NB. De mergis exoticis vide *Mantissam*.

Num. II.

## CAPUT VIII.

De Colymbis in genere & in specie.

Vis quæ Græcis Colymbis, Colymbis, & Colymbas; Latinis Vrinatrix dicitur. Unum tantum illius genus Aristoteles commemorat; alii plura; Turnerus tria vidit. *Primum* totum nigrum, si cirrum quem in capite gerit, exceperis; Mergo, quo tamen triplo minus est, quoad corporis effigiem non dissimile. Angli Doukeram vocant. *Alterum* Turdo non majus, Anati colore & corporis effigie simile. Anglis media Vrinatrix dicitur. *Tertium* adeo nuper ab ovo exclusum refert. Anserculum, ut nisi Rostrum hujus paulo tenuius esset, ægre alterum ab altero discerneres. Non enim pennas, sed lanuginem quandam earum loco obtinet.

Gesnerus, Colymbos facit *Maximos*. *Majores* & *Minores*. *Maximus* qui in Acronio lacu raro capitur, ab inepto per aquæ superficiem motu Fluder dictus, Anseris major est. Rostro oblongo, angusto, acuto. Neque volare potest recte, neque ingredi commode, nisi simul pedibus alisque nitatur. Tam profunde urinari dicitur, ut orgiarum viginti spacio, quandoque reti aut mucrone ferreo sub aqua capiatur. *Major* duorum est generum. *Primus* Anseris paulo minor, collo est oblongo, dorso nigro, collo inferiore & ventre albo, plumis fere niveis. Digitos pedum habet ternos, adherentibus membranis latos, sed aliquo usque divisos. Ungues latiusculos præsertim medium, teretes & in mucronem attenuatos, Crura juxta anum fere retrorsum projecta, natationi potius quam ingressui apta, femora in ventre condita, inæqualem interdum tibiæ situm. *Alter* cristatus seu cornutus est, plumis circa verticem, & collum supremum eminentibus, superius nigris, ad latera ruffis. Aliquot ejus sunt descriptiones. *Minor* Germanis Succhelin, ut major Succhel, magnitudine est columbæ, digitis latis, adherentibus membranis fuscis, non continuis tamen sed trifariam dissectis. Inferiore rostri parte tota sanguineo colore rubente. In femore multa ossicula tenuia, circa articulum agglutinata; dimidia ossis femoris magnitudine, ab una tantum parte habet.

Bellonius etiam *Majorem* sub nomine Vriæ veterem describit, Anatis magnitudine, rostro longo, rubicundo, ac ferrato. Cristam habere videtur. Nam cum nigro sit vertice, plumæ oblongæ ab occipite pendunt, quas cum excandescit, aut exhilaratur, attollit aut demittit. Voce est horrida, sed ad sui tutelam utili. Idem nec *Minoris* obliviscitur, qui adeo aquæ familiaris est, ut ei per terram gradi posse, propter

N femo:

Genera.

Gesner. in Ornithol.



femora in ventre ita recondita, ut nullo modo appareant, & crura, quæ extrorsum protenduntur, ut omnino è lumbis censeripot sit, natura negasse videatur. Caudam habet nullam, nullumque Uropygium. Alas pro corporis proportionem exiguas. Plumas lanuginosas. Digitos ab invicem separatos, latos tamen. Rostrum rotundum exiguum, rubicundum. Crura parte posteriore ferræ instar crenatæ. Jecur tenellum; intestina à reliquarum avium intestinis diversa, gracilia & tenuia si in pauca aqua deprehendatur, vix se in aërem attollere potest. Prope terram in cespite aliquo palustri nidificat. Addit & Aldrovandus suas descriptiones, quas hic adferre non est necesse. Addidisse sufficiat. *Colymbos* Athenæo inter omnes Aquaticas aves minimos esse, atro & sordido colore tingi, & acuto rostro instrui; Oppiano *Colymbos* semper natare, & ne somni quidem vel cibi gratia in continentem exire, nisi partus tempore; eosdem adversis ventis natare; ne illorum vi aliquando inviti in terram extrudantur. Circa medium Augustum propter pennarum mutationem volare non possunt. Et tam celerrime merguntur, ut bombardæ etiam ictum effugiant. Referri ad *colymbos* potest, avis Anglis Coote dicta, forma & colore *Fulicæ* similis, paulo minor, incujus rostro parvum tuberculum rubeum eminet, quæ subinde ad fundum usque urinatur. Non piscibus tantum, sed alga, lineo, gramine, parvisque cochleis victitat. Et vulgo fertur, non posse diutius volare, quam pedis cavo arreptam aquam retineat.

Huc pertinet *URIA* Anata multo minor, rostro longiore ac tenui, colore sordido testaceo. Gesnerus colore tantum, & magnitudine à *Colymbis* differre putat.

## CAPUT IX.

*De Brentio, Phalaride, Avosetta Italarum & Trochilo.*

**B**RENTHUS quænam sit avis dubitatur. Niphus monticolam esse credit, generis unci. Plinius pro eo Anatem vertit, quod & Gaza secutus est. Albertus Merguli pisces venantis speciem interpretatur. Et forte est, quia piscibus vivere Aristoteles reliquit.

Nec magis notum, quænam sit *PHALARIS*; Bellonius pro ea Mergum varium majorem substituit. Gesnerus *Folægam* Italarum eam esse credit. Apud Athenæum habet rostrum angustum; corpus aspectu magis teres quam *Anas*, colorem in alvo & dorso cinereum.

*AVOSETTA* Italarum, quam Lucarni circa lacum Verbanum Spinzago de aqua

vocant, *Recurvirostram* vere dixeris, avis est magnitudine columbæ aut paulo gracilior, rostro nigro, sursum tendente, in extremo acuto, quinque digitorum fere longitudine. Corpore supino toto albo; capite & cervice superius ex fusco nigricante, pedibus coloris cyanei diluti, digitis membranis junctis. Cruribus longis, ac ideo posteriore digito, qui pro calce est, minuto.

Vox ejus est *Crex*. *Crex*.

*TROCHILUS* juxta ripas fluviorum oberrat, & tanta sæpius teleritate discurrit, ut cursus volatu ejus velocior sit. Obvia quæque depascitur, hirudines etiam quæ faucibus *Crocodili* inhærent, *Cladorynchos* seu potius *κλαδωρύχης* imprimis, legit. Mira de illis *Oppianus*, nimirum, mares à foeminis, foeminas à maribus pasci. Ineunte vere priores foeminas, sollicitare cantu vel stridore potius peculiari, masculos ad coitum. Foetu procreato separari, & ad sua pascua redire. Tunc mares omnem foeturæ & *Veneris* curam relinquere, foeminis laborem solum incumbere, eumque eas inter se partiri. Alias ova in nidis fovere, alias foventibus cibum congerere. Pullos adultos ad littus ubi mares versari solent perducere. Ibi foemellas cum suo sexu remanere, masculos ultro separari. Gesnerus esse putat generis *Gallinularum* *Aquaticarum*; *Aldrovandus* *Corriram* seu *Tabellariam* vulgo dictam. Avis hæc est varia, rostro recto, luteo, in fine nigro. Rictu magno. Oculis nigris albo circulo circumdatis, quem rursus alius spadiceus ambit. Cruribus longis, coxis brevibus, digitis membrana junctis. Si *Corrira* *Trochilus* non est, *Celeris* est.

Æl. H. A. l. 3. c. 11. & l. 8. c. 25. Arist. H. A. l. 9. cap. 6.

## TITULUS II.

*De Avibus Palmipedibus Herbivoris.*

## CAPUT I.

*De Cygno.*

**C**YGNUS, qui & *Olor* quasi *ὄλος ἰρατός*, totus candidus, Græcis modernis *Cyprinus*, veteribus *κύδης* & *κύκνης* seu *ἀπὸ τῆς κυκνῆς τῶν ἰδῶν*, quod cibi causa cœnum scrutetur, & turbet, seu quasi *κλύκος* quod sit clamor; seu quod teres collum habeat, dicitur. Totus est candidus. Horatius purpureum, & pulchrum & splendentem, poetica licentia nominasse creditur. Rostrum habet parvum turbinatum, in extremitate obtusum, ferratum & falcis instar dentatum, colore ruffo; in cujus summa parte quæ capiti committitur, tuberculum rotundum, nigerrimum, & rostrum in se inflectens visitur. Collum longissimum, viginti octo vertebra constans, unde *δραχμίδης* Homero &

Descriptio.

Homer. Iliad. 6. Euripid. in Iphig.

Oppianus Ixeutic. l. 2. cet. Aldrovando.

Athenæus Dipnos. lib. 9.

Arist. H. A. lib. 9. cap. 1.

Athenæus Dipnos. lib. 9.



Εὐριπίδι dicitur. Et Lineæ velut piscatoriæ usum in aqua porrectum præbet. *Pedes* nigris notis partim cæruleis partim rubicundis & albis distinctos. *Membranas* digitis interjectas squamulis minimis rotundis inæquales. *Digitos* vero veluti annuli quidam in latum interfecant; eorum medius omnium & crassissimus & maximus est, longus digitos decem, internus novem, externus septem. Uno pede pro remo, altero pro corporis sui gubernaculo utitur. *Linguam* mediam, quod superius ponendum erat, sulcus denticulis palatum medium secantibus respondens dividit, & ipse prope radicem scaber. *Interna* si spectes, *Intestina* omnia quatuor dodrantes, & palmum longa, multoque adipe, qui vicem emeriti obit intacta, in illo quem Aldrovandus secari curavit, erant; & cum simplici tantum in se media spira revolutione inflectantur, ne aliquid non plane distributi alimentis præterlaberetur, natura, cæca duo dodrantis spacio inter anum & ipsorum initium interjecto, recto intestino appendit. *Arteria aspera* admirandæ planæ est structuræ. Nam Oesophagum subiectum comitata, ad jugulum descendens cum pervenit, non recta, ut in cæteris animantibus, ad pulmones tendit, sed supra claviculas elevata, in costam ossis pectoris seu sterni, quæ ex duobus laterilibus ossibus, & tertio superno his pro operculo incumbente fabricata, vaginæ seu thecæ figuram & usum præbet. Ad hujus finem postquam pervenit arteria, infernè in se instar serpentis reflectitur, & S. literam exprimit; moxque sub priore jam dicta portione ipsi superposita, hanc capsulam denuo egreditur, & claviculis mediis conscensis, harum jugo tanquam fulcro innititur; atque ita sustentata, denuo in morem tubæ revolvitur, thoracisque cavum subiens, antequam ad pulmones fertur, prius quasi laryngem alteram efformat, transversim secta, officuloque quantum ipsa lata est longo, & quod tenui membrana obtenditur, hiulcam fistulam, seu syringem arganorum musicorum, quæ inferiore sui parte simili fissum patulæ sunt, figuram repræsentat. Sub hac larynge arteria in duas canales divaricatur; quorum singuli in medio ampliori capacitate protuberantes, recta in pulmones exiguos costis retro totos affixos abeuntes, distribuuntur. Talem structuram & cantus, de quo postea, & respiratio reposcebat. Ne enim, dum aliquando horæ dimidiæ spacio toto capite & collo pronis, vado alimo niam haustrus immergitur, periculum suffocationis incurrat; ex ea arteriæ, quæ pectoris dictæ vaginæ reclusa est, portione, spiritus quantum satis suppeditatur.

*Locus* si attendas, est avis amphibia

Maxime tamen aquis delectatur. *Ællanus* greges eorum in Pfro mari apparere prodidit. In fluviis Caystro, Istro, Tanai, Strymone, Mæandro, Eridano, Mintio, Tamesi & quidem magna copia degere, apud Ovidium, Senecam Tragœdum, Theocritum, Lucianum, Statium Papinium, Mantuanum, Polydorum Virgilium, & alios invenies. Innumeris in agro Engolismensi, Francisci primi opera, in fonte Tenario educatos Brujerinus testis est: sed stagna vehementer appetunt; seu quod quietiora nec natatum impediunt, quod *Æliano* visum, seu quod in illis major herbarum suppetat copia.

*Cibus* ipsi herbæ at segetum grana, ova piscium. Rostro cribrat cœnum, & algam inprimis quærit. In Scotiæ lacu Spina, herbæ cujusdam semine, quæ ab iisdem nomen sortita est, delectatur. Ea autem natura est, ut agris injecta nunquam putrescat.

Tempore *libidinis* blandientes inter se mas & foemina, alternatim capita cum suis collis inflectunt, velut amplexandi gratia; colla mares applicant foeminis, deinde mas foeminam conscendit. Ubi *coierint*, mas conscius læsam à se foeminam fugit, illa impatiens fugientem insequitur. At non diutina hæc est eis discordia, noxa cessante reconciliantur; & foemina maris persecutione relicta, post coitum frequenti caudæ motu, rostrum in aquis mergens, se purificat. Semel tantum anno initio veris *pariunt*. Quia plures & speciosos foetus producant *καλλιπαίδες* & *πολύπαίδες* dicuntur. *Aristoteles* *ευτίκνους* dicit. *Pariunt* ova tertio anno, illaque magna, oblonga, testa dura obtecta.

Probe natant, velociter sylvestres, tarde ob corporis pondus domesticæ *volant*. *Aristoteles* longius in pelagus efferri scripsit. Et *Hesiodus* *κύκνους ἀεισιπότας* nuncupat.

*Cantum* quod attinet, scinduntur in sententias Authores, *κύκνους τῶ ὀρνίθι μουσικῆς εἶναι δόξαν*, prodidit *Pausanias*, cum eo *Socrates* apud *Platonem*, *Aristoteles*, *Cicero*, & *Philosophus*, ex Poëtis *Callimachus*, *Æschylus*, *Theocritus*, *Antipater*, *Euripides*, *Lucretius*, *Virgilius*, *Seneca*, *Ovidius*, *Martialis*, sentiunt. Diluculo ante solis ortum tanquam in aëre vacuo per id tempus audiendi clarius, in maris littoribus, nisi tempestas dissuadeat canere; nec cantus in senecta mortis vicinus (remissioris tum) oblivisci. Favonium vel canendum observare, fati certos, ne à quoquam interpellentur secedere, apud *Oppianum* legitur. Fabulosum id; apud *Lucianum*, *Plinium*, *Alexandrum Myndium* & *Scaliger* invenies. *Ælianus* vacillat, & modo his adstipulari, modo in illos propendere

*Æl. H. A. l. 10. c. 36.*

*Ovid. Metam. l. 2. & 5. Seneca in Agamem. Theocrit. Eidyl. 19. Stat. l. 14. Theb. Polyd. l. 1. H. Anglor.*

*Æl. H. A. c. 17. c. 24. l. 15. de re cib. c. 61. Viçus.*

*Partus. Hest. Boëtius in descriptione Scot.*

*Volatus. Hesiod. in scuto Hercul.*

*Vox. Pausan. Arist. H. A. lib. 9. cap. 12. Cicero l. 3. de Orat. Ovid. l. 5. Trist. Eleg. 1. Seneca in Hyppol. Martial. in Xenii. Oppian. in Ixeutic. cit. Aldrov. Lucian. in Electro. Plin. H. N. l. 10. c. 23. Myndius apud Athen. l. 9. Scalig. Ex. 232.*



Plin. H. N. l. 10. cap. 23. Myndius apud Athen. l. 9. Scalig. Ex. 232. Ælian. H. A. lib. 10. c. 30. l. 11. c. 1. Idem var. lib. 1. videtur. An funeris sui cantator sit, quod & Brasavolus observasse dicitur, nescio. De Elephanto sane id proditum. Cantare, nullum fere dubium. Audivit in lacu Mantuano cantantes Pendasius. Prope Londinum in Tamesi festivis cantibus subeuntes classes excipiunt. Canorum quiddam lamentantium in morem quovis tempore obstrepere, observavit Aldrovandus. In hoc denique duplex ille flexus, qui ossis pectoris primum capsulæ inseritur, deinde altera revolutione in furculam inclinata recumbens, in pulmones decedit, factus videtur, ut vox in ipso revolutæ arteriæ angulo, percussio, majori cum clangore erumperet, ac veluti morulæ exiguæ in eo anfractu quiete recreata, vires acquireret eundo.

Plin. H. N. l. 10. cap. 23. Ingenium in volatu potissimum ostendunt. Liburnicarum more rostrato impetu feruntur, facilius ita findentes aëra, quam si recta fronte incederent. A tergo sensim dilatante se cuneo, porrigitur agmen; largeque impellenti præbetur auræ. Colla imponunt præcedentibus, fessos duces ad terga recipiunt.

Ætas. Arist. l. 9. H. A. c. 1. Ælian. H. A. l. 14. c. 13. Statius. Homerus Iliad. Quod de ætate apud Ælianum legitur ducentessimum nempe attingere annum incredibile videtur.

Præfatum. Inimicitias interdum tantas inter se alunt, ut alter alterum devoret, vel, ut Ælianus perimat. Nec pullis, vel ovis parcitur. Ab Aquila sibi metuant. Attacti, non iniquo Marte repugnant: sed nec cum fulgure, serpentibus & draconibus ipsis convenit. Cicuta interiisse non mirum, cum & proci illius esu periisse visi sint.

Pluvias expectabis, si rorem aquæ inspergunt; si profundos eidem immergunt humeros, serenitatem. Apud Helvetios ingen frigus metuitur, si hyeme in quodam lacu apparuerint.

Ufus. Ufus in cibis laudatus apud veteres. Alexandrines inter aves lautas numerat, & Dipnosophistis apponuntur; nec minore quam Anseres habitos, precio ex Plutarcho potest colligi. Recentiores nigram, & duram, forte quia annosi adferuntur, carnem aculant. Moscovitarum tamen Duces, quoties carne vescuntur, assos hospitibus apponunt. In Medicina, faciem purgat, & erugat adeps. Ova ad ignem sacrum celebrantur. Pellis ventriculo apposita, concoctionem vi peculiari juvare creditur.

## CAPUT II.

### De Anser.

#### ARTICULUS I.

##### De Anser Domestico.

Plin. H. N. l. 10. cap. 22. Anser, Plinio alicubi Ganza, Græcis veteribus *χίς*, *χίνα* modernis, avis est

vulgo tam nota, ut descriptione non indigeat. Inferum & domesticum distinguitur, quorum ille minor Aristoteli, varius esse à Columella manifesto errore proditur, cum apud nos varii candidos numero exsuperent. In regno Senegæ colore & penis multi jugis variantur. In Hispania nova capite rubeo, olores candicis superant.

Visus cum duobus capitibus, totidemque linguis, collo unico, quatuor pedibus, quorum unum par alarum locum occupabat, alterum circa podicem. Alæ duæ circa collum pandebantur. Proditus ab Alberto & alter, dupli collo, quaternis pedibus, & totidem alis, dorso uno, adeo ut duæ aves, altera alteram ferens, viderentur. Frequentissima scilicet in illis ob humorem & stoliditatem monstrantur. Interiora si spectes, testes sub diaphragmate lumbis annectuntur, hisce duo ex vena cava rami insident. Duo vasa ex infima utriusque parte emersa, & deorsum per lumborum regionem recto delata, prope os sacrum, coeunt, & canalem teretem, qui in plures orbes circumvolvitur, & cujus pars superior, tota carnea, inferior intus cartilaginea conspicitur, efformant. Penis loco extremam portionem datam, quæ in coitu arrigatur, haud male conjeceris.

Locus ipsis fere ubique, eam Arabiæ partem quæ Austrum versus assurgit, si excipias. In Bœsia agro aquarum fere experte greges copiosi spectantur, magnumque ex his plumæ pretium. De victu non est quod dicam. Tenella arborum geminæ absumit, viridariorem herbas penitus depascitur, & vitium pampinos rodit. Trifolio, fœnugræco, lactuca, & aliis delectatur.

Quantum ad Generationem in aqua coeunt; nec humi insistentes; à coitu aquis sese ingurgitant. Singulis maribus tres olim destinabantur fœminæ; sex hodie. Tempus admittendi aptissimum à bruma, pariunt & juvenes absque coitu, sed hypenemia. Coitus expertæ si absque eo posuerint, plura quidem, sed sterilia, minora, & minus jucunda, quam fœcunda saporis erunt. De numero & partus & ovorum inter scriptores non convenit. Ter parere scribit Columella si fœtus non excludunt. Bis Plinius, si primum fœtum gallinæ excludant. Ova plurima sedecim, paucissima septem, huic pariunt. Si quis furripiat, pariunt, dum rumpantur. Illi singulis fœtibus pariunt, primo quina, sequenti quaterna, novissimo terna. Quintilius ad duodecim, & ultra procedere ait. Carolus Stephanus, si non incubent duodecim, & singulis fœtationibus plura. Recentiorum quidam ad centum & ducenta ascendunt. Tempus pariendi aliis à Calend. Martiis ad solstitium: si bruma coiverint, Plinio post solstitium XL. prope diebus pariunt.



riunt. Si appropinquant partus, digito tanguntur ova, quæ sunt prima parte locorum genitalium. Incubatus à fœmina duntaxat absolvitur, nec recedit, donec pullos excusserit. Commodissime à Calendis Martiis ad solstitium exercetur secundum Palladium; à principio Novembris ad Decembrem exactum secundum recentiores. Pulli intra triginta dierum spacium excluduntur, intra viginti quinque, si dies tepidiores sunt.

Arist. H. A. l. 6. c. 6.

Plin. H. N. l. 10. cap. 59. *Vox.* Vocem si atendas, παπαζειν & πλαταζειν Græcis; Aratus κλαγγὸν adverbio de eadem usus est. Gratitare, gignire, strepere, clangere, Latinis dicuntur.

*Volatus.* Raro *volatum* domesticæ exercent, sed pedibus valent. Mirum in hoc alite, inquit Plinius, à Morinis usque Romam pedibus venire. Fessi proferuntur ad primos, ita cæteri stipatione naturali eos propellunt.

Plin. H. N. l. 10. cap. 22.

*Affectus.* De *Affectibus corporis* pauca occurrunt. Solus ex pedestribus à cane rabido morsus, rabie non corripitur, si Nipho credendum. Laborat pituita & phtiriasi; illam pimpinella quæ in pratis nascitur avertit. Huic frequenti ablutione & sideritides usu occurrit. Pullis eorum urtica contacta mortifera; nec minus aviditas, nunc satietate nimia, nunc suamet vi; quando apprehensa radice, morsu sæpe conantes evellere, ante colla sua abrumpunt. Discordia cum Aquila, ne morte quidem interrumpitur pennæ commixtæ certent, & Anserinæ ubi Aquilinis absumentur.

Plin. H. N. l. 10. cap. 59.

*Ætas.* Ælian. H. A. l. 5. cap. 29. *Ætas* sexaginta annos attingit, si Alberto credendum. Non dedisset fidem Cardanus, nisi carduelem tredecim annis in cavea educatam scivisset, & sylvestris anseris tam duram carnem, ut ne triduum quidem cocta emolliri posset.

Ingenium. Mizald. de Anim. lib. 5. cap. 29.

Quod folia lauri ne in extrema quidem fame attingunt; rhododaphnes ne coacti quidem edunt; quod humanum longe præsentiant odorem, & auditu cum apro certant; quod se ab Anseredejectum Falconem vidisse Scaliger scribit; vigil, cura Capitolio testata defenso, per id tempus canum silentio proditis rebus, & fama amoris, Agris dilecta forma pueri nomine Oleni & Glaucis Ptolemæo Regi cithara canentis, quam eodem tempore & aries adamasse creditur, ingenio debetur. Potest & sapientiæ videri intectus iis esse. Ita comes perpetuo adhæsisse Lacydi Philosopho dicitur, nusquam ab eo non in publico, non in balneis, non noctu non interdiu digressus. Quod semper vociferatur, improbum dixit Virgilius. Si dum adpastum festinant, jugi clamore obstrepunt, tempestas imminere dicenda est.

Theophrast. de signis Tempest. Usus.

Reperere olim in *cibis* æstimium: Regum Ægypti mentis solus cum vitulo ap-

ponebatur. Alexander Severus festis tantum diebus ad convivium recipiebat. Ab Annibale Numidicis Gallinis præferebantur. Quod si jecur respicias, Romani eos ejusdem bonitate novere inquit Plinius. Fartilibus in magnam amplitudinem crescit: exemptum quoque lacte mulso augeatur. Nec sine causa in quæstione est, quis primus tantum bonum invenerit, Scipio Metellus vir Consularis, an M. Sestius eadem ætate Eques Romanus. Hodie in Gallia non minoris fit Anseraltis, quam Romæ olim Lupus scarus, aut Mulus. Est & Judæis ubique terrarum in diliciis. Nec damnosi interdum, hyeme & juniores in cibum cedant. Aliorum excrementitia & concoctu difficilis caro est. Tenerescunt tamen, si collo per triduum suspendantur, gravi lapide pedibus aligato. Septentrionales sale conditis, & vento siccatis, tum coctis, post æstivale solstitium vescuntur. Messalinus Cotta, quod constat, Messalæ Oratoris F. palmas pedum ex his torrere, atque patinis cum gallinaceorum cristis condire reperit.

Plin. H. A. l. 10. cap. 27.

Quantum ad *Medicinam*, Plumæ ex ventre tritæ & inspersæ, sanguinem sistunt. Lingua peculiariter ad vesicæ vitia & involuntariam mictionem facit. Sanguis utilissime inter Antitoda miscetur. Fel confusis oculis prodest, si hyssopo postea & melle inungantur. De Adipis usu vide multa in Aldrovando. Puerperæ in Bohemia butyro in cibis præparant, si aqua aurem intraverit, præcipuum est remedium. Cum iridis nostratis pulvere permixtus, & umbilico in testanucis juglandis inditus, alvum infantibus solvit. Aliud reperit Syriæ pars quæ Comagena vocatur; adipem eorum in vase æreo cum cinnamomo nive multa obrutum ac rigore gelido maceratum, ad usum præclari medicaminis, quod ab gente dicitur Comagenum. Dioscorides Commagenes non meminit. De plumarum olim usu ita Plinius. Candidorum alterum vectigal in pluma. Velluntur quibusdam locis bis anno. Rursus plumigeri vestiuntur, molliorque quæ corpori quam proxima, & è Germania laudatissima. Pretium plumæ eorum in libras denarii quini. Et inde crimina plærumque auxiliorum præfectis, à vigili statione ad hæc aucupia dimissis cohortibus totis. Eoque deliciæ processere, ut sine hoc instrumento durare, jam ne virorum quidem cervices possint.

Schwēkfeld. in Therioph. Siles.

## ARTICULUS II.

De *Anseri Fero* in genere, de *Vulpanseri*, & *Bornicla ave.*

**A**Nseris sylvestris plures sunt differentia. Plinius *Chenolopes*, & quibus lautiores



Descri-  
ptio.

tiores epulas Britannia non novit, *Chenerotes* ponit. Apud Albertum *cinereos*, qui propter corporis levitatem altius volant. *Grandinosos*, seu ob candorem niveos. Qui præter extremas quinque remiges pennas albi sunt. Æstate nuspiam conspiciuntur; hyeme ingruente sublimi volatu gregatim migrant: *Arborum* qui ex arboribus nasci creduntur, quibus color capitis ut Pavoni, absque crista tamen, invenies. Schwénkfeldius eos in arborum cavis, cornicum & ciconiarum nidis, ova tredecim vel quatuordecim, illaque flaventia parere scribit. Apud Oppianum *Linurgi* & *Cenchritæ* reperiuntur. Gesnerus *Anseris stellati*, quem Itali *Cicum* vel *Ocam* Sternam vocant, cui magnitudo inter Anatem & Anserem, pondus leve, pectus maculis aspersum, dorsum & alæ cinerea, meminit. Scaliger in Oceano *Brasilæ marinos*, à colore atro, qui nunquam evolent, esse prodit. De *Bassano* seu Scotico superius egimus. Descriptionem non morabimur. *Caput* fere Anatinum magis quam Anserinum. Utraque *mandibula* intus oras ferrat, loco dentium obtinet. *Palatum* quibusdam denticulis acutis instar limæ est scabrum & asperrimum. *Membrana* quæ digitos connectunt in extremo ferræ instar denticulatæ videntur.

Locus.

*Locus* ipsis maxime circa paludes. In Æthiopia adeo frequentibus agminibus grassantur, ut tum morfu tum stercorebus omnia demoliantur. In Septentrione cubationis tempore, quo à meridionalibus plagis redeunt, copiosissime visuntur, circa Aprilis initium. In Bataviam, Hannoniæ, Artesiam migrationis tempore copiosissimi confluunt. Novam Hispaniam mense Decembri prætervolant. In *India* pulcherrimi conspiciuntur. Totum ipsis corpus, præter pectus & ventrem, nigrum. Oculos circulus coralli æmulus ambit. Ex minore oculorum *Cantha* linea ejusdem substantiæ & coloris extuberat, versusque collum deducitur. Inde sex septemve ramuli exigui utrinque ad medium colliisque descendentes, devaricantur.

Partus.

*Coire* post hyemale solstitium incipiunt, initio veris ova ad summum sedecim ponunt. Steriles evadunt, si mites reddita fuerint.

Volatus.

Migratoriæ sunt aves. Migraturæ vociferantur alte volando, forte ne quæ earum remaneat. Meridiem petunt cum Septentrio propellit; istum cum Auster, nec cessant, nisi esurie coacti. Ordo ut Gruum cum silentio literatus; nec clangunt nisi rupto ordine. Vide quæ de domesticis ex Plinio diximus. Oppianus nec Ducibus, nec somni tempore custodibus destitui scribit. Taurum montem superaturi Aquilarum metu lapillos rostris ad coercen-

Author  
de Natu-  
ra rerum.

Oppia-  
nus IX.  
eut. l. 2.  
c. Aldro-  
vand.

dam linguam ferunt. Cilicibus id quidem tantum attribuit Plutarchus: sed feris adscribi apud Ælianum & Marcellinum legimus. Tardius adveniunt quam Grues. Vidit aliquando Gesnerus sexto Octobris permultas avolantium turbas, quæ ab Oriente in Galliam & Occidentem versus per turmas triangulas volabant.

Quantum ad *usum*, caro propter exercitationem minus est excrementitia. Cruda adhuc suaviter olet. Linguae assæ bene à calculosis in cibo sumuntur.

Æl. H.  
A. l. 5. c.  
29.

Ufus.

#### ARTICULUS IV.

*De Vulpansere, Capricalca, & Bernicla ave.*

AD Feros Anseres referri debet *Vulpanser, Capricalca, & Branta*.

*VULPANSER* seu *Chenalopex* quibusdam, est avis pectore rufescens, aquatica, in cuniculorum foveis, interdum & rupium cavernis nidificans, quam Angli *Bergandram* vocant. Gesnerus an *Anser Stellatus* sit *Chenalopex* considerandum reliquit. Aldrovandus nihil certi proferre potest. Inter palmipedes quæ circa aquas versantur, ab Aristotele numeratur. Ova hypenemia quandoque parit. In pullis tuis eandem quam perdix operam collocat. Et ab Aquilæ, felis & cæterorum hostium injuriis sese defendit. In Cupediis olim apud Britannos fuisse ex Plinio superius diximus.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
3.  
Æl. H.  
A. l. 5. c.  
30. l. 19.  
c. 16. l.  
11. c. 38.

De *CAPRICALCA* occurrit. Corvo paulo majorem esse ac in deliciis haberi. Tæniis transversis fuscis per colum pectus & ventrem distingui, caudam nullam habere. *BRANTA* seu *Bernicla* & *Bernichia*, Scotis *Clakguse*, Gallis *Crauant*, & Oye *Nonnete*, Isidoro *Barliata*, Alberto *Barbates*, Hollandis *Kotgansen* dicitur. Bellonius *Chenalopex* veterum esse putat. Minor est fero Anser, *Monacharum* ornatui, quæ colorem album atro superimponunt, similis. Alis & dorso coloris plumbei, cauda brevi & nigra. Anserum ferarum more volat, strepit, paludes frequentat, & segetem depopulatur. De ortu magna est inter doctos controversia. Quidam coire volunt: alii ex putridis navium ruderibus; nonnulli ex pomis cujusdam arboris in insula *Pomoniam* nascentibus corruptis; alii ex fructu foliis conglomeratis simili, qui cum opportuno tempore decidit in subjectam aquam, reviviscit; convertiturque in vivam, oriri existimant. Isidorus, Alexander ab Alexandro, Olaus Magnas, Hector Boëthius; Scaliger, Mejerus, Gesnerus, & alii, communi famæ adstipulantur.

Bara-



Batavi ex propria inspectione in Grônlandia Barniclas, quæ ovis incubarent, pullosque educarent sese invenisse affirmant.

## C A P U T III.

*De Anate.*

## A R T I C U L U S I.

*De Anate in genere.*

**A**Nas, Græcis antiquis *νάνα* vel *νάνα*, recentioribus *χάνα*, vel *πατίτζα*, vel Pappos, avis est apud nos notissima. Dorsum ipsi & rostrum lata, pedes cartilagineis membranis intersepientibus, amplius, crura brevia crassa, & retroversus disposita, ut in natatione valentius instantes; aquas propellere possent. Gulam habent amplam; linguam plæræque interius asperiusculis utrinque eminentiis dentatam & quasi plumatam: Musculos circa corporis superficiem separatos, interiores albos: quod si exteriores liveant, quod vi frigoris fieri videtur, bonam secuturam ætatem ruslici apud Helvetios conjiciunt.

*Aquis* tum ut earum frigiditate congenitam intemperiem, quæ calida est, contemperent; tum ut pabulum quoque naturæ suæ & palato conveniens, illic quærissent, gaudent, inque iis maximam temporis partem versantur.

In *cibo* herbarum aquaticarum radicibus & feminibus, vermibus, & animalium aquaticorum ovis, lenticula imprimis palustri, quam Crescentiensis Anatinam, alii Pavarinam vocant, delectantur. Sunt qui pisciculis & limo vesci, nec à venenatis abstinere, quod Scaligero placet, volunt.

Quantum ad *Generationem* tantæ sunt, Authori de natura rerum, salacitatis, ut plures mares solam foeminam certatim coëundo, occidant. Mense Martio & in sequente concumbunt. *Pariunt* juxta aquas & rigua; pulli exclusi statim recondita quadam natura aquam prosequuntur; & mox ut ovum exeunt, tanta agilitate vigent, ut etiamsi matrem mori vel alienari contigerit, sine nutrice vivant. Super omnia autem est earum ovis subditis Gallinæ atque exclusis admiratio; primo non plane agnoscens foetum, mox incertos incubitus sollicitè convocantis; postremo lamenta circa piscinæ stagna, mergentibus se pullis natura duce.

*Vocem* Anatum Author philomelæ per tetrinire exprimit. Scaliger quiritatricem appellat. Foeminæ crassior est, maris acutior.

Lente ob crurum brevitatem *incedunt*, ad natandum potius apti.

*Ingenium* ipsis cum Anseribus fere commune. Aquilarum quomodo declinare soleant ictus Ælianus describit. Merguntur dum involant, & sub aquis natando, ex alio loco extra aquam eminent. Cum sese aquis mergunt, plumas; cum pennas rostro purgant, diuque & multum alas excutunt, ventos spondere Theophrastus, Ælianus, & Plinius tradunt. Ventræ & intestinarum in bubus dolorem, visu natantium Anatum levare, easdem majore profectu mulos & equinum genus conspectu suo sanare, Columellæ & Vegetio placet.

*Ufus in cibis* notus est. Cato Censorinus ægrotis etiam teste Plutarcho præscribi jussit; duram, concoctu difficilem, nec laudati succi esse, apud Hippocratem, Galenum, & alios legere est. Alii Anserinæ præferunt. Alexander Benedictus in peste damnavit. Fracastorius lue venerea laborantibus prohibuit. Pectus & cervicem laudat Martialis, cætera danda coquo.

Usum in *Medicina* superius etiam attigimus. Mithridates Ponti Rex solitus earum sanguinem miscere medicamentis quæ digerendis venenis valent; ipse talium medelarum usu ab intestinis epularum insidiis cavebat. Idem, sanguinem à cerebro defluentem infusus sistit. Adeps per Clysterem injectus dolorem sedat colicum, & emplastro ad pleuritidem apud Myrepsum immiscetur. Fimum, Villanovanus utiliter moribus venenatis imponi scribit. Chineses adeo numerosa agmina alunt, ut sæpe xxm. excedant, his in evellendis noxiis oryzae herbis utuntur. Quæ Campofulgus, de Anate cum tredecim pullis, mense Decembri, festo Nicolai, in Gallia prope urbem Redonensem, templum tempore Missæ ingrediente, & aram circumeunte, ac unum pullum ibidem relinquire (nescitur quo is se recipiat,) scribit, an fidem mereantur, penes Lectorem judicium esto.

## A R T I C U L U S II.

*De Anate Domestica, Indica, Lybica, & Cairina.*

**A**NAS DOMESTICA Græcis *νάνα* *δαικρά*, Arato *ματίδιος*, interdum alba, aliquando cinerea, sæpe compositi ex utrisque coloris invenitur. Inter marem & foeminam hoc est discriminis, quod ille plumas in Uropygio versus caput surrectas habeat. Quod tam acutam & magnam vocem edit, & tam diu caput sub aqua tenet, asperæ arteriæ debetur, qua bifariam in pulmones devaricatur, vesicam quandam duram & con-

*Ingenium.*

*Æl.H.A. l. 5.c.33.*

*Theoph. de signis ventor.*

*Æl.H.A. l. 7.c.7. Plin. H. N. l. 18. cap. 25. Columella R.R. l. 6.c.7.*

*Ufus.*

*Plutarch. in Cato-ne.*

*Gel. Noct. Atticar. lib. 17.c.16.*

*Plin. H. N. l. 10. cap. 6.*

*Descriptio.*

*Locus.*

*Victus.*

*Scaliger in Theophrast. de caus. plantar. l. 2. Paris.*

*Plin. H. N. l. 10. cap. 55.*

*Vox.*

*Incessus.*



concavam, quæ ubi major apparet, dextrorsum vergit, habet. Famis aliquando & pestis prælagæ domesticæ, mansuetudinis oblitæ, Sylvas cum Gallinis, Anseribus, & Pavonibus petiisse dicuntur.

ANATIS INDICÆ tres descriptiones habentur. *Primæ* caput quod auctum plumis, in summitate cristam plumeam candidam per totam colli longitudinem, quam cum excandescit, erigit, gerit, sanguinis instar rubescit. Totum *collum*, callosa & incisuris distincta caro est. *Rostrum* totum cæruleum. Collum, qua corpori jungitur, circulo plumeo nigro, rara pluma alba, maculosa, per ima angustiore, per summa latiore, nitescit: Extremæ alæ atque cauda cum splendore ut in Cantharidibus vilescunt. Fœmina non ita variegatur, marialioquin similis. *Alterius* caput albicabat. Rostrum, crurac auda, & alarum longissimæ pennæ atrii coloris erant. Collum supremum angusta linea nigra ambiebat. In *Tertia* nihil singulare apparet, tuberculum rubrum rotundum si exceperis, quod posteriori rostri parti & cruribus infidet. Id ipsi cum Anate maritima Ronderetii; cujus rostrum & crura rosæ sylvestris colore rubent, caput non sine viridibus maculis, nigricat; commune est.

NB. De anatibus Indicis vide etiam Mantissam. Num. 10.

LYBICA ut à Bellonio describitur, media est inter Anatem & Anserem magnitudine. *Rostrum* habet breve, latum, & in extremo aduncum. In capite inter duonasi foramina *tuberculum* cerasi instar rubidum. Tempora sine plumis, cute corium rubrum præ se ferente. Genitale sanguinis instar rubrum, tam magnum, ut digitu unius crassitiem, quatuor vel quinque longitudinem æquet. Vocem interruptam tanquam male affectos pulmones haberet. Quam Aldrovandus describit, rostrum denticulatum habebat, toto corpore nigrescens, pectore duntaxat paulo albicante. Scaliger Indicam vocat; & nullam emittere vocem; ova, quæ unicoloria, fusca, rotunda pene sunt, si ad solem despicias, eandem in summo nigredinem, quæ in earum rostris est, habere, adjicit. Si duas nostrates singulis maribus destinaveris, magnum numerum ovorum pariunt. Sed pulligeniti nullam sobolem procreabunt, si Augustino Gallo credibus.

Anatem CAIRINAM & marem & fœminam descripsit Aldrovandus. Mas qui fœmellæ major, habet rostrum qua capiti conjungitur valde crassum & tuberosum, in hamum tandem acutum & curvum desinens, nigricans fere, sed prope finem rubidum; caput atrum & cirratum; guttur

sub rostro punctulis subcandidis interstinctum. Corpus totum fere atrum. Crura breviora sed robustiora. Fœminæ rostrum minus tuberosum, qua capite connectitur, linea partim alba, partim rubra fatislata distinctum. Macula illa, quæ in maris rostro rubra, cinerei coloris erat, cui nonnihil rubri admixtum, &c.

### ARTICULUS III.

De Anatibus feris in genere, & in specie de Querquedula.

**A**Natum Ferarum multæ sunt differentiæ. Nam ut de illis taceam, de quibus acturi sumus, sunt in Insula S. Johannis in America albissimæ, capite rubeo. In Ancyra aliæ quæ voce cornuum sonitum imitantur, libertatis ita amantes, ut per totum etiam triennium in corte nutritæ, si occasio detur, erumpant. Cæterum latirostris omnibus corneus quasi in extremitate *unguis* est, quo cibos apprehendunt; *dentium* loco striæ circa rostrum asperiusculæ, *membrana* pedum in extremo serratæ.

Videbis ipsas passim; in septentrionalibus tanta copia, ut fere cunctas aquas operire videantur: in iis tamen inprimis, quibus subterraneæ venæ calidam exhalationem subministrant, quas apertas circulari & obliquo natatu servare conantur; si vehementia frigoris vincantur, vastum mare pro statione petunt. Migratorias esse, & ad Xanthum fluvium adversus corvos pugnare, quidam credunt. Hyemis tempore aut in ripis fluviorum aut piscinarum aggeribus, aut paludum frutetis latere, aut sylvarum propinqua, hortorumque præsidia petere, verisimilius esse existimo. Sane omni alicubi tempore conspiciuntur. Que in Tugurino lacu versantur, sæpe ad vicinum fluvium Silum, transvolant. Quia minus ibidem à lupis & vulpibus læduntur.

Si frequentes & conglobatas ferri animadverteris, quanquam cœlo sereno, imminuentem expectabis pluviam; si alas in continente concutiunt, ventum instare existimes.

Præcipuæ ex illis sunt QUERQUEDULÆ, quæ *Roscades* & *Phascades* dicuntur, quæque in Minores & Majores dividuntur. MINORES quæ Querquedula proprie dicuntur, Anatibus sunt minores, rostro, pedibus, & cætera similes. Gula ipsis alba atris notata punctis; venter candidus, alæ in cæsis viridantes; pedes cum membranis nigris cinerei. Vivis ventre deplumato in colica malum ad se trahere Abdomini appositas, experientia docuit. Species plures apud Aldrovandum invenies, ex quibus *Japonica* priores quæ ad scapulam sunt

Martyr.  
de ut. Oceanil. I.

Locus.  
Olaus Magnus  
H. Sept.  
l. 19. c. 6.

Præfatum.

Schwëkf.  
feld. in  
Avenario  
Siles.



sunt pennæ, rosei obsoleti coloris, sed maculis semilunaribus nigris notatæ erant. Sequentes partim albæ partim virides conspiciebantur; omnium longissimæ cæruleo vegetissimo decorabantur colore.

Ad has *ANAS circia*, *Kernell* circa Argentoratum dicta, *Querquedula cristata*, referuntur. *Circia* mergulo paulo major est, corpore fusco, rostro latiusculo. Calculis & seminibus herbarum aquaticarum victitat. *Kernell*, habet Rostrum Indici coloris, caput rufum, punctis albis respersum, verticem nigrum, gulam albam, alas cinereas transversis duabus lineis albis distinctas. Pectus rufum, crura fusca. *Cristata* quam Bellonius Colymbim vocat, corpus est rotundum viriditate gemans; occiput Onocrotali insiar cristatum, oculi ære polito splendidiore; sub quibus juxta rictum lata utrinque visitur macula. Crura brevia, pedes lati, pectus cum capite & collo nigrum, venter plumbeus.

*BOSCADES MAJORES* sunt aspectu cinereæ: Mas in collo radiantes quasi Pavonis pennas colore ex viridi & cæruleo composito habet, torquem circa collum album, & in alis versus ventrem colore splendente sunt, vel *Minores*, quibus caput viride, rostrum subflavum, venter ex albo cinereus & varie maculosus, crura rubentia, Aristophani forte *περιεξοσμένη* dictæ: vel *Majores*, quæ coloribus cum illis magna ex parte conveniunt, & Stertentem quod rostro fundum fodientes victum perscrutantur, dicuntur. Amant glandes & avenam. Congeneres ipsis *Anates* à victu *Graminea* seu Junceæ, Schmitentem dictæ, rostro & pedibus nigris, corporis colore dilutior. Quam Bellonius *Anatem Torquatam* esse credit, & *περιεξοσμένη* Aristophanis, mediæ est inter Anserem & Anatem magnitudinis, moribus Anserinis, sed voce magis obscura, quæ ex ovis à rusticis inventis & Gallinæ subjectis prodidit, dicit, illam Gesnerus Picam marinam esse, pedibus palmatis rubescentibus, & ad posteriora magis positis quam cæteris palmipedibus; rostro, renuiore magis latitudine se demittente, quam longiore processu se extendente, quatuor incisuris rubis à summa, duabus ab ima parte sulcata, in colore pallentis ochræ, esse asserit.

#### ARTICULUS IV.

*De aliis Anatum ferarum speciebus.*

**P**Ræter Boscades, sunt & inter Anatum ferarum genera, *Glaucius*, *Anas fusca*, *Muscaria*, *Platyrynchos*, *Fistularis*, *Candacuta*, *Nigra*, *Herle Tadorne*, *Puffinus* & *Pe-*

*nelope avis*, de iis quorum Aldrovandus lib. xix. cap. 45. mentionem facit, taceo.

Pro *GLAUCIO*, quem Athenæus ab oculorum colore ita dici, & Anate minorem esse scribit, Morillanem nobis Gallicum Bellonius obtrudit. Cujus rostrum in margine ferræ instar incisum est. Collum circulus quidam coloris albicantis cingit. Caput totum ad mediam colli regionem ferrugineo saturato ornatur. Linguam habet adeo carnosam, ut prope radicem gemina videatur. Nullum fel, jecur in duos distinctum lobos, quorum unus ventriculo incumbit, intestinis alter. *Victitat* feminibus herbarum, quæ in ripis nascuntur, astacis tenellis, limacibus, mellepedibus aquaticis & aliis. Congenerem ipsi eam, quæ Gallis un Tiers, dicit, medio inter Morillonem & Anatem marem colore.

*FUSCA* à colore dicitur. A media magnitudine, quidam *MEDIAM* dixere. Gesnerus eandem cum Rothalsa, unde Erythrocephali quoque nomen meruit, & veterum Penelope, quod similiter *πελοπέ*, & *παικίλοει* sit, hoc est collo puniceo & vario, facit. Triplicem ejus descriptionem apud Aldrovandum invenies. Fœminæ caput non rubet, sed maculas aliquas flavas habet.

*MUSCARIARUM* (dicuntur ita quod muscas capiant) tria sunt genera. *Unum* quod laminam rostri superiorem habet plane croceam, dentes utrinque ferratos, membranaceos flexiles, eminentes. Colorem plumarum per totum corpus varium. Helvetiis Muggrate. *Alterum* corpore magno, coloris elegantissimi in lacu Podamico circa Constantiam visitur. Murente & Mossente à palustri cœno vocantur. *Tertium* Miscenis Pillente dicitur, rostro longo, molli & cinereo. Musci fuscis suspensio gradu ingrediens insidiatur, & vocem noctulæ lamentati similem edit.

*PLATYRYNCHI* seu Latæ rostræ in plura genera disperguntur. Sunt qui rostrum clypeorum instar convexum & longum nigricans habent. Et quia inter volandum alis suis ita perstrepunt, ut sonus crepitaculorum repræsentetur, *Schelenen* dicuntur. Quibusdam qui *Taschemaul* Helvetis, inferiorem rostri laminam superiorem ita ut tota intra eam includatur, subire, dentes ab utraque rostri parte molles, flexiles, rectos, & omnium longissimos esse, adjicit Gesnerus, sunt quibus idem duplo fere quam in cæteris latius habetur: idque in mare nigrum, in fœmella modo flavescens modo maculis varium visitur. Dantur & *platyrynchi pedibus rubris*: & alii *rostro nigro & plano*, quorum descriptiones apud Aldrovandum habentur. Pertinet ad eos, *Clangula* cujus mas secundum oculos, qui pulchri sunt, utrinque maculam

Bellon 4.  
pud Aldrov.  
Ornith.  
l. 19. c.  
38.

Gesner in  
Ornith.



albam, caput magnum, & in nigro viridans habet; foemina & virore & macula destituitur. *Fuligula* à fuligineo totius corporis colore ita dicta, cujus rostrum breviusculum latumque, linea alba, alas prope finem transversim secat. *Cirrhata*, Volente à corpulentia, gallinæ magnitudine, cujus mas apicem in vertice gerit nigris pennarum cirrhis conditum, prope quem pennæ utrinque ex nigro virent.

*FISTULARIS*, à sono acutiore quem fistulæ modo emittit denominata, rostrum habet colore isatidis, circa unguem ductus quasi fila nigros, collum nigro rubroque varium, tergum partim plumbeum, partim rubris nigrisque pennis temperatum. In Foemellis nihil tale cernitur.

*CAUDACUTÆ* rostrum superne nigrum, à lateribus isatidis dilutæ imitatur colorem. In foemella cum maculis nigris cinereum. in alis pennæ infimæ transversim albæ; mediæ in nigro gemmantes, viridi, & damasceno, extremæ nonnullæ flavicantes, quæ foemellæ denegata sunt.

*NIGRA* à corporis colore ita dicitur. Linea alba per ejus alarum longitudinem excurrit. Rostrum nigro luteo & rubro distinguitur. Pedes rubeſcunt.

*HERLE*, ut Galli vocant, rostrum habet rotundum & in extremo recurvum, rubrum, utrinque striatum, colorem mali aurantii, Linguam ferratam, alas candidas, pedes rubeos. Gesnerus eum inter Mergos relegat.

*LA TARDONE* corpus totum esset candidum, nisi alæ superius nigrescerent, ubi & linea rubra utrinque conspicitur. Rostrum habet breve, in superna parte rubicundum, à lateribus utrinque versus narium foramina macula nigra notatum, extremitate in aliam unguis instar desinens. Crura paulo altiora. Torquem, qui pectus ambit rubrum, cum tota ventriculi regio candicet.

*PUFFINUS* avis est marina, colore fusca; pennis caret, sed plumis tantum ceu lanugine quadam vestitur. Itaque subvolare non potest. Si quando ocyus locus mutare instituit; alarum, pedumque extremitate nixus, aquas celeriter quasi prorepens præterlegit. Alga & cochleis victitat. Sale conditur & tempore quadragesimæ editur in Anglia.

*PENELOPEN* avem Anati similem, magnitudine columbæ, scholiastes Aristophanis facit. Jon φοινικέλευρον, id est, phoeniceis coloris collum habentem ponit. Gesnerus illam esse putat, quam Germani *Kotthals*; Bellonius Canne à la teste rousse vocat. Capite est rubro, gutture & pectore

nigro, reliquo corporis colore plumbeo; rostro, cruribus & pedibus fuscis. Martem descripsit Aldrovandus exacte, quem vide.

## CAPUT IV.

*De Fulica, Cotta, & Rallo Italarum.*

**FULICA**, quam quidam Phænen, quæ ossifraga est, esse credunt; quidam ex veteribus, ut Cicero, Erodion, nonnulli Cepphum Aristotelis; alii nec forte male *ἀδύται*, cum à fuligine ita dicatur, putant, quæque Kiranidi Phalaris, Alberto Mergus niger, & pullus quaticus dicitur, avis est magnitudine Gallinæ; colore per totum corpus nigro, in collo & capite nigerrimo, collo oblongo, syncipite glabro figura ovali, alba pellicula, figura cristæ gallinacæ respondente, intacto, specie calvitii. Digitis pedum membranæ nigræ latæ, sed divulsæ adhærent, & utrinque aut ab altera saltem parte secantur. Internodia membranarum semicirculos fere constituunt. Recta pedibus incedit, velociterque currit. Lingua quam Gallinæ mollior, ungues grandiusculi ac nigri. Alæ ad reliqui corporis convexum incurvatæ. Ventriculo *lien* adhæret, una ex parte gracilis & tenuis, altera vero in extremo crassior, atque soleæ equi instar inflexus, dimidiæ juglandis latitudine. Lobo *hepatis* dextro folliculus fellis auricularis digiti magnitudine annectitur. *Pulmones* costis adhærent. *Intestinum* rectum appendicibus utrinque singulis palmi longitudine, extremo sursum reflexo, instructum invenies, si illud in superna parte aspexeris. Ova intus formata & lumbis annexa jam inde ab hyeme etiam obtinent. Nullum *sexus* discrimen, ut in cæteris avibus agnoscitur. Sunt tamen aliæ aliis interdum in ventre colore magis spadiceo.

*Locis* palustribus & stagnantibus delectatur. Maro marinas appellavit. Herbis & quovis seminum genere vescitur.

Nidulatur humi, & ova magnitudine ovorum Gallinaceorum æstate ponit. Cum per serenitatem relictis paludibus in sicco ludunt, vapores ab aquis ad imbriferam nubem erigendam, sursum attolli sagaciter odorantur, & ventos præfagiunt, ut apud Virgilium legimus. Procellas voce testari, Cicero author est. Obscurus quidam, dum alas quatiant, aquam; dum se submergunt, simulque alas quatiant, ventem prædicare tradidit.

Genus illud quod *Marcol* Frisiis audit, cadaveribus pascitur. Ova inter arundines parit; quibus ab incolis, uno relicto, ablati,

De la Cerda super Virgil. Georgic. l. i. Descriptio.

Bellon. apud Aldrov. l. 19. c. 13.

Locus & Viſus.

Partus.

Arat. in Phænom. Virgil. Georg. l. i. Cicero in Progn.



tis, & nido perforato, reversa alia & alia, fraudes nescia ponit, donec effæta exhaustiatur.

Quam parisienses *Diabolum marinum* vocant, colore est tam exquisitè nigro, ut penicillo inductus esse videatur, albam capitis maculam latiore quam Fulica habet, crura ad se attrahit.

COTTA Anglorum avis est. Fulica paulo minor, forma & colore similis. Rostrum tuberculo quodam rubeo ipsignitur, crura rubent, nulla syncipitis conspicitur macula. Urinando ad maris usque fundum, alga, limo, gramine, parvisque

cochleis nutritur: piscibus abstinet. Neque eam diutius posse volare, quam pedis cavo hausta, priusquam volet, aqua, retineatur.

RALLUS Italorum in eo à Fulica differt, quod rostrum habeat nigrum, plus albi in alis & circa oculos coloris, crura subviridia, calvitium nullum, membranas inter digitos non ita dissectas. Mœstris rure non procul Venetiis distante magnis capitur expensis. A famulis, qui venaticorum canum vice cothurnis induti per aquas errant, fustibus exturbantur. Hinc præda Falconum insidiis fiunt.





# HISTORIÆ NATURALIS

## DE

# AVIBUS:

L I B E R V.

## De Avibus Aquaticis, Fissipedibus.

T I T U L U S I.

### De Aquaticis Fissipedibus Carnivoris.

#### CAPUT I.

De Ciconia.

Descri-  
tio.



Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 23.

Aldro.  
Ornith.  
l. 20. c. 1.  
Locus.

Campo-  
ful. Me-  
morab. l.  
1.

Iconia Græcis *πελαργός*, & *πελαργός* quibusdam *νίκυς*, & *κικίς*, avis est apud nos notissima, pennis albis & nigris, cruribus albis, rostro Gruino subrubro & crasso. Tempore Plinii affirmabatur linguam non habere, habere, illamque subrubram & brevissimam notum est. Degebant quoque olim in Italia, nunc nullas esse opinatur Aldrovandus.

In Fiderate agro, nec nidum fecisse apud Plinium legimus; qui pariter easdem amoenum arbusculo locum in Transpadana Italia non permeare; sicuti nec octavum citra lapidem ab eo, refert. Sed & in Britannia ignotas esse audivimus, creditumque vulgo non nisi in liberis regnis versari. Migratoriam esse avem certum est, sed quonam è loco venirent, aut quo se referrent, in compertum antiquiserat. Ex longinquo venire non dubium, eodem quo Grues modo, illas hyemis, has æstatis advenas. Extractus ex quodam prope Metim in Lotharingia lacu junctarum globus; quæ thermis excalescentibus revixerunt, si Campopulgofo credimus. Sed & ex Lario lacu eductus (simul rostra in ano inserta habebant) & rite eodem restitutas modo, Gaudentius Merula author est. Bello-nius in Ægyptum in Æthiopiam avolare scribit. Septembrique & Octobri mensē totam Ægypti planiciem occupare, oculatus testis affirmat. (Cum circa Abydum, inquit, essem, vicesimo quarto die

Augusti, ingentem ciconiarum vim conspexi, quæ ad tria vel quatuor millia accedere videbantur. Volabant illæ à Russia & Tartaria, & Hellespontum agmine decussato transversum trajiciebant. Et cum supra Tenedum insulam essent. Longo per anfractus tractu se convertebant, donec in circulum omnes collegerentur. Inde priusquam longius à faucibus Propontidis pergerent, in minores aliquot turmas supra viginti se distribuebant, & se invicem versus meridiem sequebantur.) Abituræ congregantur in loco certo, comitatæque sic, ut nulla sui generis relinquatur, nisi captiva aut serva, ceu lege, prædicta die recedunt. Nemo vidit agmen discedentium, cum discessurum appareat: nec venire, sed venisse. (De incolis ubi moraturæ sunt, intellige) utrumque nocturnis fit temporibus. Et quamvis ultra citrave provolent, nunquam tamen advenisse usquam nisi noctu existimantur. Pythomes comen vocant in Asia patentibus campis, ubi congregatæ inter se commurmurant: eam quæ novissimo advenit lacerant, atque ita abeunt. Notatum post Idus Augusti non temere visas ibi.

*Vesuntur* ranis, anguibus & piscibus, bis in ejus ventriculo dissecto aviculæ ossa reperit Schwenkfeldius. Bufonem non nisi summa fame gustant. Hinc nocere iis, omnibus quidem locis nefas ducunt, sed in Thessalia vel maxime, ubi serpentium immanis copia est, quos dum escandi gratia insectantur, regionibus Thessalibus plurimum mali detrahunt. Capitale itaque occidisse, eademque legibus pœna quæ in homicidam.

*Nidulari* in agro Varro innuit. In summis urbium tectis, ipsis etiam fumariis, certum

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 23.

Solin. in  
Polyhist.

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 22.

Partus.



certum est, nec dubium aridarum aliquando arborum summitates sectari. Primo adventu veteres nidos repetunt, salvos à foribus repurgant, tempestate læsos instaurant & constabiliunt. In iis duntaxat Veneri indulgent. *Ova*, triginta non amplius diebus, foeminam quatuor Anserinorum tum magnitudine tum colore similes ponere, eaque quamprimum variatis utrumque plumis Fovere Encomiastes author est. Incubatus spatio mensis tempestate benigna absolvitur, & tam impense nidos fovet, ut incubitus assiduitate plumas exuant. Tam flagranti amore foetus prosequuntur, ut in incendio Delfensi, cum subtrahere non possent, cum iisdem alis contactis interire, quam deferere maluerint.

*Vox* earum est apud quosdam *glotterare*. Quia sonus ille ex duabus rostri partibus ad instar crotali vel crepitaculi, quod ex duplici ærea lamina, vel duobus ossiculis se invicem collidentibus inter se colisis fit, Crotalistria à P. Syro vocatur.

*Volatus*. Nunquam Austro flante volant, dum feruntur, pedibus cursum moderantur, porrectisque in caudam que brevior illis contigit pedibus, per aëra contendunt. *Dormientes* uni tantum pedi innituntur, & caput humero alteri imponunt.

*Affectus & Ingenium*. Cum Cornicibus, Aquilis, Mergis & Vespertilionibus inimicitias gerere proditum à quibusdam. Præfagam esse avem docuere exempla. Pressa obsidione ab Attila Aquileja, urbem cum pullis deseruit. Inde augurium ab oppugnante sumptum est, & urbs in potestatem redacta. Cum tempestas imminet, utroque pede innixa, pennas tristior infundit, rostrum in pectus condit, & vultum eo unde tempestas ingruit obvertit. Ex earum cum carnivoris in Lycia conflictu de proventu judicatur annuo. Si penes has victoria, pecora feliciter succedunt. Si illæ palmam abstulere, frugum fertilitas præfagitur. Quod vulnera origano sanant, & Platoni foliis vespertilionis à nidis arcent; quod rostro cum alvus non dedit, excrementa ejiciunt; quod denique lapidem lychniten, serpentum averruncam nido imponunt, ut apud Philostratum legimus; ingenio debetur. Lapis in mulieris Tarentinæ sinum coniectus, quod ex Æliano & Oppiano habemus; & recens Zingiberis radix Vesaliensi hospiti allata, in gratitudinis exempla ibunt. Ciconiam foeminam adulterii, postquam hospes prohibuisset aquam, compertam, à maritis aliis discerptam: Alcinoën in Cranone Thessaliæ foeminam, quæ thorum Domini absentis polluerat, excecata, tanquam castitatis testimonia legimus. Ciconiarum legum apud Aristophanem nomen, inde originem traxit, quod in senectute parentes & alunt, & humeris gestant.

*Edubantur* ante Plinii ævum; id Semporius Ruffus, quem Horatius tangit, instituisse creditur. Nemo jam attigisse velit, seu quod venenatis vescatur, seu quod flavam, duram, & mali succi carnem habeat.

*Usum in Medicina* si attendas, Assam si semel anno edatur ab arthritide præservare nugatur Kiranides. Nec capras, nec oves peste infici quidam scribunt, si ex ventriculo aqua intrito singulis cochleare unum infuderis. Fimum ex aqua haustum nonnullorum fide comitialibus prodesse prodidit Dioscorides, refutavit Galenus, cum adipe suillo in Emplastri formam mixtam inveteratam podagram tollere, apud Aëtium & Myrepsum invenies.

Datur & Ciconia, quæ quod dorsum totum nigrum si eminus spectetur, habeat, NIGRA dicitur. Reperitur in montanis & sylvis Helvetiæ locis. Forma & magnitudine à Ciconiis proprie dictis non differt, qua parte alæ junguntur corpori, oblonga cavitas retrorsum extensa cernitur. Intestina sunt involuta. In femore dissecto nervi quatuordecim magnitudine differentes, quorum duo latissimi in genu partem cartilagineam se inferebant utrinque. Vescitur scarabeis & locustis. Nidulatur in abietibus. In cibo ferinum & piscosum præ se fert odorem. In festatur pediculis.

## C A P U T II.

### De Ibide & Phœnicoptero.

**I**BIS in multis cum ciconia convenit, *Describe* *pro*. In duplici autem sunt apud Ægyptios differentia. *Candida*, quæ ad Pelusium tantum non sunt, cum in tota habeantur Ægypto; & *Nigra*, quas Pelusium duntaxat alit, tota Ægyptus abhorret. Capite ista est corvi aquatici, rostro mucronato, incurvo, fornicato, rubente, & qua capiti jungitur, pollicis crassitiem superante. Abdito in pennas quæ sub pectore, capite & collo, cordis signaturam exprimit. Simulacra nata est, duas æque drachmas ponderat, ut Plutarchus prodidit. Majus pro corporis proportionem cor habere, Gaudentius Merula author est. *Intestinum* Nonaginta sex cubitorum, ex aliena fide apud Ælianum legimus. Comprimitur id defectione lunæ, donec aucto rursus splendore fulgeat.

Ægypto est peculiaris, mortem sibi fame exportata consciscit. Nullum non Alexandria trivium iis plenum est. Dicuntur tamen & circa Licham in extrema Africa, ubi lacus quidem dulcis est conspici. Quam se in Alpibus vidisse referente Plinio. M. Egnatius Calvinus prodidit, Nigram fuisse suspicamur.



*Victus.*  
Cicero.  
l. 1. de  
Nat.  
Deorum.  
Æl. l. 10.  
cap. 29.  
Ammian.  
Marcel-  
lin. Me-  
la in de-  
script.  
orb. Jo-  
seph.  
Antiq. 1.  
2. c. 10.  
Arist. de  
Gener. 1.  
3. c. 6.  
*Partus.*

*Vescuntur* serpentibus, bruchis, locustis. Illos volucres ex vastitate Lybiæ ven-  
to Aphrico insectas interficiunt atque  
consumunt. Nec hoc intra Ægypti fines  
tantum. Sagacitate enim excitatæ, ven-  
turis in procinctum eunt universæ, & pri-  
usquam terminos proprios æternum ma-  
lum vastet, in aëre occurrant catervis pesti-  
lentibus. Ibi agmen devorant universum.  
Moses in Æthiopas per loca serpentibus  
infesta iturus, papyraceis inclusas secum  
tulit.

Quantum ad *Generationem*, Ægyptii ore  
coire & parere nugabantur. Nidificant in  
palmis metu felium. Ex ovo Basiliscus nas-  
ci putatur, translato ex venenatis cibis in  
illud seminio. Vita ipsis longissima adeo  
ut Hermopolis sacerdotes immortalem ja-  
ctaverint. Penna, Crocodilus, scribente  
Æliano, & Ovo immobilis redditur; sed  
omne serpentum genus ad ejus contactum  
rigere, Philes tradidit. More lautarum  
mulierum tardo & molli gradu ingreditur;  
cubile petitura se purgat. Rostri adunci-  
tate per eam partem se prodiit (falsugine  
autem utitur) qua reddi ciborum onera  
maxime salubre est.

*PHÆNICOPTERUM* qui à calore  
ita dicitur, Lingulacæ seu Gloridem  
Aristotelis esse credit Bellonius, si Scaligeri  
descriptionem sequimur. Rostrum neque  
rectum planæ, sed neque aduncum habet.  
Scythici arcus potius partem imitatur. Ci-  
nereum colorem nobilitant alarum puni-  
cæ pennæ; à quibus & nomen. Earum  
quoque nonnihil ad caudam, quam hujus  
generis longi cruris levibus brevissimam  
habet, ac veluti præcisam. Sub rostri ini-  
tium ad colli commissuram sinus turgidus  
est qualis in Ardeola. Crura pedesque alis  
habet concolores, sed adeo breves, ut  
cum in homine Galenus agnoverit lon-  
gissimos, huic omnium quæ nota sunt nô-  
bis animalium, brevissimos attribuere po-  
tuerit. Magnitudo ei Ardeæ, Flammant no-  
men in Provincia. Habet & alterius icô-  
nem Aldrovandus, qui ex cinereo phæni-  
cco & albo mistis coloribus spectabatur.  
Superior mandibula, in medio notabili  
extuberantia insignis, inferiore longior  
erat, & in acutissimam aciem desinebat.

De loco nihil fere certi. Nil avem diser-  
tissime facit Heliodorus; ex Flandria hye-  
me ad Narbonensis Galliæ provinciam vo-  
lare scribit Gesnerus; in mediis stagnis  
marinis degere; piscibus & cochleis vesci,  
reliquit Rondeletius.

*Ufus.* Apitium linguam Phœnicopteri præci-  
pui esse saporis pronunciasse, Plinius Au-  
thor est. Heliogabalum vero palatinis suis  
ingentes dapes extis & cerebellis illorum  
refertas exhibuisse, tradidit Lampridius.

Lamprid.  
in Helio-  
gab.

## CAPUT III.

*De Ardeis in genere.*

Quam Latini Ardeam seu ab arden-  
do, quod finis ejus exurat, seu quasi  
arduam propter arduos volatus vo-  
cant, illam Græci *ἐραδίου*, seu quod *ἐκ ἰδρος*,  
id est sanguinem coitu exudet; seu  
quasi *ἐραδίου* avem Amori & Veneri pro-  
priam, dixere.

*Genera* ipsarum tria Aristoteles & Plinius  
faciunt, *Leucum*, *Pellum*, & *Asteriam*; Sca-  
liger album, nigrum & subfulvum, quod  
Pigrum Vasconia vocat. Aldrovandus in  
numera observavit. Corpus ipsius leve, exi-  
le, macilentum. Collum longum. Rostrum  
longum, crassiusculum, robustum, intus  
cavum, in extremo acutum. Digni pedum  
terni longi, membranis modice juncti.  
Quartus retro pro calce similiter longus  
est.

*Degunt* numerosæ circa paludes & stagna  
in Bononiensi, Farrariensi, Mantuano, &  
Ravennate agro; reperiuntur & in Angliæ  
quod ibi capitale sit eas occidere. In Gal-  
lia Ardearia instituta habentur. Pulli vo-  
landi compotes ultra citroque comitant,  
deinde domicilia repetunt. In Insulis no-  
vi orbis quæ Ardearum dicuntur, tantam  
ovorum Hispani invenerunt copiam, ut  
multos iis currus onerarent. Ab Agricola  
inter eas aves numerantur, quæ calidiora  
loca quærunt. Confecta hyeme ad solita  
revertuntur.

*Vescuntur* piscibus & ostreis. Illos dum  
capiunt, solis radios ita excipiunt, ut visa  
ipsum umbra refugiant. Hos cum testis  
devorant, quas à colore interno apertas,  
revomunt. Anguillas quoque integras de-  
glutiant. Ad pedem tanquam ad illicium  
concurrere pisces creduntur. Si oleo ex  
ipsis per descensum distillato inungantur  
manus, pisces ita advolabunt, ut sponte  
capi possint. Piscatores Hirschbergenfes il-  
licium ex farina hordei, carnis cancrorum  
ex chelis & caudis, placenta lini expresso  
oleo parte una, vitellis ovorum tribus, pin-  
guedine Ardeæ & olei laurini ana unc. 11.  
cum petrolei & Camphoræ ana drachmis  
duabus conficiunt. Mirifice pisces illi-  
ciuntur.

In coitu angi, mares etiam cum vocife-  
ratu sanguinem ex oculis profundere, nec  
minus ægre parere gravidas, Aristoteles,  
sed falso prodidit. Vidit sæpe cocuntes  
Albertus, cruribus super dorsum foeminæ  
flexis, ita ut pedes maris ad caput foeminæ  
sint, & genua versus excrementi sedem su-  
per dorsum. Motu alarum se sustinent &  
semen infundunt. *Nidificant* in sylvis, lo-  
cis paludosis, alnis & salicibus consitis.  
ac fere inaccessis gregatim. Sic & ab aucu-  
pibus

*Genera.*  
Arist. H.  
A. lib. 9.  
cap. 18.  
lib. 10. c.  
60.  
Scalig.  
Exercit.  
233.

*Locus.*

*Victus.*

Schwëk-  
feld. in  
Aviar.  
Silef.

*Partus.*



cupibus, & à rapacibus immunes se putant. Cancros ceu fascinationis amuletum nidis suis imponunt, si Æliano credimus. Carvo adversus infestinantia nidos suos animantia se munire, prodidere nonnulli.

Ælia. H.  
A. l. 8. c.  
35.

Volans.  
Arist. l.  
de incesu  
Animal.

*Volant* extensis retro pedibus. Ideo illis Uropygium inutile; collo contracto; tam alte, ut supra nubes transcendant, maxime cum jam futuræ imminent pluvix.

Affectus  
Ælia. H.  
A. l. 5. c.  
35.

*Inimicitias* cum Alauda, ovorum suorum hoste, vulpibus, cochleis & Rapacibus exercent. Sæpe cochlex è nativis egresfæ testis, in magna securitate pascuntur; Ardeæ in vacuas involant. A Falcone depressa, rostro sub alis condito ac fursum elato, irruentem excipit. Sæpe ambæ elisis interaneis humi affliguntur enectæ. Accipitrem excrementis suis, quæ pennas ejus & pedes inficiunt, & exurunt, repellunt. Fertur Falcones, quod Crescentius prodidit, si sanguinem Ardeæ gustaverint, omne desiderium capiendi Grues amittere; si carnem absque sanguine, videri non teneri.

Crescent.  
de Agri-  
cul. l. 10.  
c. 15.

Præsa-  
gium.  
Oppian.  
in Ixeu-  
tic. Ara-  
tus in  
Phœ-  
nom.  
Plin. H.  
N. l. 18.  
c. 31.  
Ælia. H.  
A. l. 7. c.  
7.  
Usus.

De *Præsaigiis* hoc sufficiat. Ventum vel pluvias innuere, vel cum caput pectori imponit; vel cum notas paludes deserit, & supra nubes attollitur; vel cum terra relicta multo cum clangore adfestinat; vel cum obstrepero clangore à mari ad terram avolat; vel cum in mediis arenis tristis residet.

Mensis in Gallia expetuntur. Sed cum caro illarum pisculentum quiddam redolet, & fibrosa sit, salubris esse non potest. Quæ de rostri seu in pelle asinina fronti alligati ad somnum conciliandum, seu cum cancri felle in eadem ad vigilantis collum suspensi, ad vigilias inducendas Plinius vel Kiranides prodire, inter fabulosa reputo.

Plin. H.  
N. l. 130.  
c. 15.

## C A P U T IV.

*De Ardeis in specie.*

### A R T I C U L U S I.

*De Ardea Cinerea.*

Ardeæ cinereæ tria sunt genera, *Major*, nempe, *Minor*, & *Congener*.

ARDEA CINEREA MAJOR quæ Aristoteli Pella, seu pulla & fusca, cui superius dicta omnia fere congruunt; Rostrium habet longum, prope frontem crassum, quod ita tenue pedetentim evadit, ut tandem velut in acum aliquam magnam designat. Capiti cinereus, cirrhus ex tenerioribus pennis insidet, qui à syncipite incipiens fursum supra oculos per verticem erigitur. Digitus posticus longiusculus est, & fere anticis longitudine æqualis.

*Nidulantur* in excelsis arboribus non procul à fluminibus, tam apud Anglos quam Gallos. Quia piscibus pullos nutriunt, & multi, cum ori inferuntur, in terram decidunt, idem cum pluvia à multis decidisse putantur. Franciscus I. Rex Gallorum tam cicures reddidit, ut à pastu redeuntes ad Ardearia sese reciperent.

MINOR prout à Bellonio describitur, rostrum habet nigrum, concavum; Lineam in fronte ab uno oculo ad alterum candidam. In capite & dorso pennas coloratas. Alas cinereas inter pennas verticis nigras exoriuntur candidæ exiles, aspectu jucundissimæ. Nidificat in rupibus.

CONGENER, Ardea, rostrum habet pollicis crassitudine, digiti minimi juxta nares latitudine, intus canaliculatum, inferne corneum & roseum. Plumæ capitis, colli, dorsi, & superiorum alarum ex cinereo fuscescentes, extremas omnes macula ruffa notatas. Ventrem fere ex cinereo album. Crura subviridia, & pedes in digitos fissos, quos tamen divaricationis initio breviuscula membra conjungit. Ad hanc refert; quam Gesnerus describit, cui rostrum est subflavi coloris, marginibus acutis, & parte anteriore leviter dentium loco exasperatis, ferratisve. Caput & collum candida. Crista capitis è plumis nigris retrorsum tendit. Dorsum & alas cinereas. Unguem medii digiti ab altera parte denticulatum.

### A R T I C U L U S II.

*De Ardea Alba.*

ARDEA alba, Græcis λευκορόδιος. Ciceroni Platelea, Plinio Platea, Alberto Cochlearia dicitur. Corpus habet instar cygni candidum. Rostrium nigrum pauculis notis ferrugineis superiori parte respersum, substantiæ coriaceæ duræ, cochlear referens. In quibusdam ad carneum colorem proxime accedit. Fœminæ superius maculis rubéis conspergitur. In maris vero rostri medio, linea quædam qualis etiam in circumferentia conspicitur, à fronte ad rostri apicem usque conspicua est; prope oculos macula cærulea, quæ in fœmina lutea est, visitur. Quædam maculis in collo & dorso pulcherrimis, colore coccineo consperguntur. Interiora si spectes in dissecta apud Aldrovandum fœmella, Lien erat exiguum, nigricans, rotundus, dextra parte, prope folliculum bilis non procul à ventriculo. Intestina sinuosa, uniformia, novem spithamas longa. Cor nullo pericardio vestitum. Ventriculus lævis, intus & simplex. Ingluviei loco pars ventriculi superiori orificio imminens, ampla capacitas. Aspera arteria cygneæ valde similis, licet contrario modo sita. Nam quemadmodum

Descri-  
tio.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 40.  
Cic. l. 2.  
de Nat.  
Deor.

in



in Cygno ad sternum ascendens post descendit; ita hæc ad pulmones recta percurrentes, suos flexus agit invicem oppositos. *Ossa* tibiæ aperta, medulla rubra erant plena. *Reperitur* in Gallia, Anglia, Bohemia, non tantum marinis locis, sed & palustribus. In Holandia non longe à Lugduno infinitos earum nidos vidimus.

Victus.

*Vescuntur* piscibus, ranis & serpentibus, ut quidam produnt. nec vel herbas aquaticas virides, & ramenta radicum geniculata arundinum, vel intestina Gallinarum aspernantur. Facile *coëunt*, in arboribus nidulantur, & pariunt, ad quatuor foetus alunt, qui à ferini saporis cultoribus commendantur. Gesnerus sibi gustanti Anseri non dissimilem visam ait; & apud Anglos in deliciis habetur.

Huc plurimæ aliæ Ardeæ referuntur.

Arist. H.  
A. l. 9. c.  
18.

Gesner. in  
Ornith.

I. GARLETTA Italarum, ut Gesnerus vocat, avis cum Ardea per omnia, colore excepto, congruens. Quam Gesnerus Ferrariæ vidit, *rostrum* habebat longum acutum; in crista capitis dorsum versus pennæ oblongæ ad duos cum dimidio dodrantes, circiter sex nascebantur, quæ aliquando magno vendebantur precio. *Pedes* nigricabant: inferius tamen subito in medio cruris, niger color desinebat, & viridis è glauculo suberat ad extremos usque ungues. *Minimus pedis* digitus binis articulis constabat; proximus ab eo ternis, medius quaternis, ultimis quinis. Cum hac eandem illam Aldrovandus facit, quæ habebat rostrum supra nigrum, infra cæruleum, oblongum; caudam brevem, rariores aliquot in dorso illasque oblongas pennas, quibus pileos & galeas proceres exornant, tres in capite pinnas, breviores & coloris albi, quæ cristam efficiebant.

Aldrov.  
Ornith.  
l. 20. c.  
14.

II. EGRETTE Gallorum, quæ & Hæmatopus, Phœnicopus, & Cirris Virgilii. ut Scaligeri pater & filius adstruunt, dicitur. Omnibus fere Ardeis minor est, tota fere ex croceo, ad colorem castaneæ vergens, prone intensius, supine & super alis remissius. *Collo* brevi; *rostro* robusto, longo, acuto, bicolore; qua caput tangit viridi, vel ex viridi ad cæruleum inclinante; *cruribus* & pedibus, rubri saturati coloris; *cauda* tam exigua, ut ea prorsus carere videatur.

III. SQUAIOTTA Italarum. *Cauda* brevi, *pedibus* viridibus, *rostro* luteo in extremo nigricante. *Apex capitis* triginta plumis constat, quarum mediæ albæ sunt, extremæ nigræ, in tergore pinnae elegantes coloris rubicundi in suis radicibus albæ.

*Congener* ipsi & ista *rostro* maxime arcuato, colore prorsus leucophæo. Avis est aspectu non invenusta. Prone ad col-

lum & pectus, quod nigris maculis, ut in Ardea deorsum descendentibus conspersum cernitur, albicat. Cætera tota est leucophæi coloris, prone remissioris, supine intensioris. *Femora* in ea, contra ac in reliquis pennis vestiuntur.

Ex Ardeis quoque albis sunt, tum ea, quæ *Garzetta bianca* dicitur, *rostro* longo gracili; acutissimo, *digitis* postico omnium minimo, anteriorum medio longissimo, inter oculos & rostrum maculata, tum ea quæ vertice est croceo, pedibus pro portione corporis longissimis, fuscis, albicantibus annulis circumdatis. *Ungue* medii *digiti* cæteris longiore, ferrato.

### ARTICULUS III.

*De Ardea Asteria sive stellari.*

Ardeæ stellairs triplex genus est, *Minus*, *Majus* & *cristatum*. *Minus* *invis* *ptio*. Aristoteli, Taurus, Plinio, Botaurus, Butorius & Buttora aliis, dicitur, & quibusdam Ornocrotalus esse putatur. *Collo* est longo & mire plumoso. *Capite* nigro, corpore reliquo fusco & pallido maculis nigris densissime asperso. *Pedes* habet longissimos & inter extremos ungues medii *digiti* *pedis* unius & calcis ejusdem, *spithamæ* longitudo intercedit; *ungues* longissimos; & ille qui calcis vicem in avibus gerit longitudine sesquiunciam superat. *Medius* *digitus* utriusque *pedis* qui cæteris longior dentatus & ferratus est. *Cauda* illi brevissima; *Stomachus*, quo ingluviei loco utitur, capacissimus, canino similis. *Arteria aspera* in eo tota continua est, *larynx* nulla, nec quod huic analogia quadam respondeat. *Damnum* hoc compensare voluisse Natura videtur; *canalium duorum* hinc inde in pulmones utrosque abeuntium structura. Ita enim fabricati sunt, ut annuli cartilaginei minime totum absolvant circulum, sed exteriori duntaxat parte medium; interiori, ubi aliis avibus hi circuli fissura tantummodo in longum diffecantur, membrana quædam tenuissima, alteram canalis devaticati exacte medietatem absolvens, plana & æquabilis obtenditur; quin & hemicycli *latus* exteriorius componentes rari admodum, interjectis subtilissimis membranis sive tunicis, ad faciliorem & majorem distentionem facti sunt, quo nempe largissimus, & hoc facili tumescere meatu conceptus aer, *rostro* in aquam inserto aliquandiu retentus, tandem per apertum & extractum, qua data porta, maximo impetu erumperet. Prolobo caret, at ejus loco amplissimum oesophagum habet.

*Vitit* ranis & piscibus, inprimis anguillis. *Victus*.

*Nidum*



Partus.

*Nidum* ex arundinibus intertextum cum *ovis* duodecim in lacu quodam se vidisse, ipsamque avem colore ita ad arundinem accedere, ut inter arundines sedens vix deprehendatur, reliquit Gesnerus. At eundem ex furculis in celsarum arborum ramis struere, & ita aut quatuor ova excludere, reliquit Bellonius.

Vox.  
Aristot.  
in Pro-  
blem. f. 10.

De *Voce* diximus, cui similes illi soni dicuntur, quos *βρυγμῆς* Aristoteles appellavit. Dicitur in *Ægypto* mansuescere, & adeò præclare humanam vocem intelligere, ut si quis eam servum appellaverit, vel pigrum (nugantur olim è servo in avem transisse) indignetur. Non facile hominem refugit; eo proximo, aut arundinibus se abdit, aut aquæ immergitur.

Volatus.

Non citius *evolat*, quam prius salierit. Ubi pisces frequentes novit, adeò quieta consistit; ut planè videatur mortua: & ne colli longitudine se prodatur, breve id incurvando facit. Capta stat immobilis, & venatorem apprehensurum incautum vulnerat.

MAJOR ex Pella & Stellari prognata esse creditur. Illam enim capite, pectoris maculis, alarum colore, ipsa denique magnitudine refert. Reliquarum partium colore Stellarum minorem, maculas si excipias, quæ in ea non sunt: imò pedibus adeò eandem exprimit, ut simul positas vix peritissimus etiam auceps discernat. Apicem quoque in vertice habet, ex quo duæ longiusculæ pennæ exorientes, totum caput velut galeam, colore nigro exornant. Gesnerus *Elaphin* Oppiani esse conjicit, quæ pennas in dorso varias & maculosas hinnulorum instar habet, & linguam longissimam, qua in aquam protensa, sensim ad fauces, pisces ad conspectum adnantes solet attrahere. Hanc Aldrovandus & CRISTATAM seu Cirrhatam esse opinatur.

Congener est hisce, quam idem *Ardeam Nigram* vocat, colore per totum, collo excepto, quod albo torque circumdatur, & rostro quod luteum est, nigricante, collo longo, longis *cruribus*, digitis pedum longissimis, unguibus acutis, & cauda brevi.

## CAPUT V.

De quibusdam Avibus ad *Ardeas* relatis.

AD *Ardeas* refero *Falcinellum* sive *Falcatam*, & *Pugnaces*, quas Belgæ *Kemperkens* vocant. FALCINELLUS avis est magnitudine, & tota corporis specie *Ardeam* referens, eleganti colore, viridi fere, alicubi puniceo admixto, capite & collo fusco. Superior pars colli antè albicat, maculis nigris intercurrentibus. Ro-

strum ei oblongum tenue & antè falcatum. *Crura* oblonga, pedes fissi. Nulla magis ad ibidem accedit. PUGNACES quotannis immenso numero, ex Septentrione in Belgium, verno tempore sub Majum advolant, plures mares quam foeminae. Hinc inter mares tanta contentio, ut sese mutuo occidant, donec cum foeminis numero pares evaserint. Exclusis educatisque foetibus, una cum his unde venerant, revolant.

Octo ipsorum genera, seu formas potius descripsit, & depingi curavit Aldrovandus.

Prima *Perdicis* instar toto corpore maculis respergitur. Caput *Galeritæ* velut apice insigne est. Rostrum exile, in extremo nonnihil recurvum. Lingua longa, acuta, subatra. Caput, cervix, dorsum, alæ, venter, & femora ex luteo ad castaneæ fere colorem tendunt, & maculis, quæ in capite adeo exiguae sunt, ut exigua punctula potius videantur, resperguntur. Altera cristam quoque in vertice gerit. Ventre nigricat, candicat pectore. Mentum macula nigricans ceu barba quædam exornat. In fronte albicat, in occipite, & in reliquis partibus ex albo ad fuscum vergit.

Tertia tota fere est ruffa, nigris maculis lunam æmulantibus undique excepta cer vice inspersa, apice caret. Femora & infernum *Uropygium* colore sunt bætico. Alarum pennæ majores nigrae, in fine, & ad latera fere croceæ.

Quarta colore fere cum ista convenit, nisi quod venter sit fuscus, podex albicans, alas subalbicantes maculae multæ, magnæ, transversales, tortuosæ transcurrunt. Caput nigrum magnæ pennæ velut galeam eleganter exornant, quas proculdubio dimicatura erigit.

Quinta ejusdem fere est coloris, sed pennas eas, quas erigit dimicatura majores, candidas, & in extremitatibus suis nigras habet.

Sexta pennæ illæ sunt candidæ, color plurimum diversus. Toto enim corpore fusca est exceptis femoribus & cauda, quæ sunt colore bætico. Ante albas illas in collo surrectas, alias habet in vertice quæ minores sunt, & nigrae. Caput ex cinereo flavescit.

Septima pennis omnibus variat, viridibus, albis, rubris, amethystinis, luteis, & quod observatu dignum est, nulla earum alterius colore permiscetur.

Octavam auritam Natura fecit. Rostro est gracili & oblongo, à capite per collum pennæ undiquaque pendent; magnitudine æquales, sed in quibus varios cernere est colores; qui velut varios torques formant, modo ferrugineos, modo rubros, modo albos. Collum habet longum, valde

P  
graci-



gracile, tenue, ad latera candicans, cætera lutescens, lineolis longis undiquaque conspersum. Caput ad latera maculam miniatam magnam habet, in qua oculi siti sunt. Aures asininis non dissimiles, crura duplo quam præcedentibus breviora. Digitum posticum admodum brevem.

## CAPUT VI.

De Porphyryone, & Horione.

Dipnos.  
lib. 9.  
Descri-  
prio.

**P**orphyryon, à colore ita dicta, quam Calimachus apud Athænum à Porphyride diversam facit, quæque in agro Patavino Telamon vocatur, avis est secundum Athenæum Galli magnitudine, colore cæruleo, rostro ad caput vehementius obstricto, phœniceo, longis cruribus, fissis pedibus, in quibus quinque digitos habet, & maximum illum, qui medius est. Oppianus ei cristam in capite qualem sagittarii Persæ gestant, tribuit. Isidorus pedem unum latum ad natandum, alterum fissum ad ambulandum addit. Apud Aldrovandum duplex ejus exhibetur Icon. Prior habet rostrum crassum, acutum, purpureum, à fronte ad verticem fere usque macula ejusdem colloris extenditur. Pars capitis quæ hujusmodi maculæ subjacet, & collum primum virescunt. Ex remigibus alarum pennæ, quædam in extremo albicant, quædam sunt fuscæ. Reliquum totum corpus, cæruleo vergeto colore insignitur. Cauda fere caret. Digitis tantum quatuor ex purpureo subalbescens insitit. Alter rostro, cruribus, pedibus, & oculis descripto est similis, nisi quod ungues habet fuscis, & macula in fronte purpurea ornatur, & quod in illius capite & collo viride erat, in hac cæruleum apparet. Cæruleæ pariter sunt alæ. Reliquum caput, cervix, dorsum, pedes, vertex, & femora nigricabant. Laudatissimi sunt in Comagene. Nobiliorem vero Baleares insulæ mittunt. Fert eas & ultima Syria, ut Diodorus prodidit. Athenæus avem Lybicam, Diis ejus regionis sacram indigitat.

Vescitur piscibus, & in occulto quidem, ne à quoquam videatur. Non prius autem cibum capit, quam se lavaverit; nec prius se vel in pulverem vel in lavationem dat, quam in ambulationem veniens certa spacia confecerit. Solu hæc mersu bibit, ex proprio genere omnem cibum aqua subinde tingens, deinde pede ad rostrum veluti manu afferens. Polemon apud Athenæum de cibo quem apprehendit, paucas buccellas decerpere, scribit, si τὰ μικρὰ ὅσα ita sumendum est. Alvi excrementum, ut & reliquæ aves longi augustique colli, humidius, quam cæteræ solent, rejicere, Aristoteles autor est.

Ad volatum dirigendum loco Uropygii, quod parum latum habet, pedes protendit; & quia spectaculo saltationis adeo delectatur, ut & ipsa ad saltandum membra componat, haud difficulter eo modo capitur, si Oppiano credimus.

Incredibilia fere de ejus castitate Authores. Nunquam in conspectu hominum conjugii misceri, & ne virum quidem uxori concumbentem videri posse, retulit Oppianus. Tantum sensum obtinere stupri, ut si id deprehenderit, vitam seu laqueo seu inedia finiat, apud Ælianum, Athenæum, & Tzetzem legimus. Quædam cum Gallo tantam societatem contraxerat, ut cum iste occideretur, convictore privata, inedia sibi mortem conscisceret.

Nunquam cibi gratia apposita esse videtur. Magnificis ædibus, ut Ælianus habet, pro ludicra est delectatione.

Cognata est ipsi HORION, avis amatorio affectu flagrans, magnitudine Herodii, cruribus rubris, oculis cæruleis, sic à Musica instructa, ut naturæ munere suavissime canat.

## CAPUT VII.

De Helorio, Limosa Venetorum. Barge Gallorum, & Hamatopode Bellonii.

**H**ELORIUS Creci, de quo postea, similis esse traditur. Clearchus eum apud Athenæum cum Trochilo & Carulo inter τὰ περὶ θάλασσαν, seu aves, quæ cælo sereno in littore pasci solent, meminit.

LIMOSA Venetorum, quæ ad lacum Verbanum Giraldel, circa Neapolim Leverina, Germanis, ein Meerhuhn dicitur, Arquatæ majori, de qua in sequentibus, per dorsum est similis, maculis varia, tota parte prona, capite & collo præsertim.

BARGE Gallorum, quam Ægocephalum Bellonius facit, minor est Helorio, colore vero non absimilis, rostro breviori, recto. Liene omnino caret. Fel jecori simul & ventri adhærere conspectum est, quod de Ægocéphalo Aristoteles scripsit. Vitulum in saluginosis paludibus frequenter, rarius in remotis à mari, ubique noctu, quaritat. Vocem hircorum & caprarum edit. Hominis accessum non fert. Et apud Gallos in deliciis habetur.

HAMATORUS Bellonii, rara est in Gallicis littoribus avis. Corpore Ardeolæ, alis Lati, capite, collo, & cauda extrema nigris. Interiore alarum parte & ventre albis. Gula magna admodum ampla & robusta. Binos habet digitos simul cohærentes, interior vero ab aliis sejunctus est. Calcar in pedis calce, ut reliquæ aquaticæ aves, non habet.

Volatus.

Oppian.  
in Ixenic.  
tic.  
Affectus.

Æl.H.A.  
l. 5. c. 28.  
Athen.  
Dipnos.  
l. 9. Tzetz.  
Chil. 9.

Usus.

Æl.H.A.  
l. 17. c. 22.

Plin. H.  
N. l. 10.  
c. 47.

Athen.  
Dipnos.  
l. 9.  
Vetus.

Athen.  
Dipnos.  
lib. 9.  
Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 46.  
Aristot.  
H. A.  
l. 8. c. 6.

Arist. H.  
A. l. 2.  
cap. 15.

Bellon.  
in obs. l.  
1. cap. 11.



bet. *Pedes* sunt molles & delicatuli. *Digiti* breves, unguæ ut in Tardis fornicatæ.

## C A P U T VIII.

*De Alcyone.*

**H** Alcyon & Alcedo *παρά τὸ ἐν ἀλῇ κύνει* sic dicta, Avis Possideonis nonnullis, Ceycis quibusdam, modernis Græcis *φασίδου*; mas, *μάς*, *κέρλινος*, & *κέρης* dicitur. Paucissimis, inter mediterraneos imprimis, nota est. Omnium rarissimum est, inquit Aristoteles, vidisse Alcyonem, & fere circa Virgiliarum occasum, brumamque apparet, & ubi primum per portum non plus quam navem circumvolat, statim abit, & nusquam præterea visitur. Duo hujus Avis genera, *Mutum*, & *Vocale*, ex Aristotele quidam faciunt, sed falso. *Χελιδόνες* enim apud eum sunt intelligendæ. Turnerus & illam inter Alcyones reposuit, quæ Sturno paulo minor, corpus totum nigrum habet, ventrem album, caudam breviusculam, rostrum alcedone paulo brevius; quæque ante volatum, Alcedonis more nutat, in volatu gemit. *Alcatraces* quoque, quæ in Peruvia marinis lupis, carabis, piscibusque insidiantur; & quia cadaveribus delectantur, adeo sunt lethales, ut ad earum usum necessitate redacti, non secus quam aconito toxicove victi intereant, inter earundem referuntur genera.

*Forma.* *Formam* si attendas, non multo amplior est Passere, colore cæruleo & luteo, & subpurpureo mixto insignis. Tale corpus totum & alæ. Tum *colli* partes non seorsum positæ coloribus. *Rostrum* subluteum, longum, tenue. Mari adeo delectatur, ut petus aquis aspergat, cauda in terra sicca imposita: non spernit tamen & aquas dulces.

*Vicius.* *Vicitat* piscibus, quos ex alto se in mare recta immittens capit.

*Partus.* *Quantum ad Generationem* senes in coitu extingui creduntur. Aliæ, ut apud Plinium legimus, foetificant bruma, pariunt ova quinque, qui dies Alcyonides vocantur, placido mari per eos & navigabili. Siculo maxime: (hinc Siculi maris cives Scaliger vocavit) In reliquis partibus est quidem mitius pelagus, Siculum utique tractabile. Faciunt autem septem ante brumam diebus, totidemque postea sternitur mare Halcyonum foeturæ, unde nomen hi dies traxere. Nec tamen de tempore omnes assentiuntur. Columella enim in octavum Calendas Martii, quibus in Atlantico mari summa notatur tranquillitas eos conjicit. Sed & in numero dierum dissentitur. Quinque statuit Simonides & Aristoteles; septem Samius Demagoras, novem Philochorus, quatuordecim alii. De maris tum temporis tranquillitate, & ventorum

quiete molliore cælo, apud Theocritum, Ovidium, Plautum, Plutarchum, Ælianum; & alios passim invenies. *Nidi* locum Ambrosius arenam; alii littus; quidam undas ipsas, hinc Statio, domus fluctivaga; Silio Italico nidus natans dicitur, ponunt. Saxo cuidam proxime aquam, ita ut aquæ *ἐπὶ χεῖρας* videatur, agglutinari, credibilius est. Rostro autem suo nec alio nidum fingit Halcedo, imo navis instar fabricat, opus everti mergique fluctibus nescium. Componit devincitque confrens invicem acus pisciculi spinas, ac reſtis aliis ceu stamini transversas alias veluti subtegmen implicat; mox confertim recurvat, & in orbem reducit; sic cooptat denique, ut opus navigii specie turbatum, ac qualo propemodum piscatorio simile evadat. Perfectum littori, quo fluctus extremi pertingunt, applicat. Hic unda molliter feriens, nondum firma satis hiantiaque, procellarum verbere deprehensa, sarcire docet. Solide vero & jam coherentia constringit, figitque, adeo, ut nec saxo, nec ferro dissolvi diffringive facile queant. Magna cum primis admiratione ostiolum dignum est, sic modificatum figuratumque, ut hanc unam subeuntem recipiat, cæcum cæteris & abditum, & aliud prorsus nihil admittens, ne undarum quidem quicquam.

Mores ejus exinde metiare, quod maritum adeo diligit, ut non uno aliquo stato tempore, sed per totum annum consuetudine ejus utatur; senem & ad sectandum tardum, gestat & nutrit, nunquam relinquens solum. Cum ad tepidum solem penas in littore expendunt, pluviam denotare dicuntur. Virgilius hoc inter cætera serenitatis signa numerat.

Plut. de  
seleert. ani.  
mal.

Mores.  
Plut. l. c.

Mizald.  
Ephem. l.  
3.  
Virgil.  
Georg. l.  
5.

## C A P U T IX.

*De Ispida, & Rousserolle Gallorum.*

**I** Spida, quam nonnulli Alcyonem veterum vel simpliciter vel fluviatilem esse putant, Genuæ Martinus piscator, à nonnullis aliis Italis Avis Paradyfi, sed & Piscator Regis dicitur. *Rostrum* ei est nigrum, rectum, in summo acutum, tres digitos longum. *Caput* pronum cum cervice viridis coloris transversis lineis ex albo cæruleis distinctum. Virent & *alæ*, sed interior pars plumarum ad purpureum ferè violaceo dilutum colorem tendit; asperguntur lucidis aliquot punctis. Per medium dorsum à principio usque ad finem caudæ, plumæ sunt cærulei coloris diluti, & ad album inclinantis adeò splendidæ, ut oculos etiam visu immorantes offendant. *Pedes* breves, rubicundi, in quibus duo longiores digiti ad mediam usque partem connexi,

Descri.  
ptio.



postea finduntur. *Lingua* perbrevis est latiuscula ac subrubens. *Oesophagus* valde oblongus. *Ventriculus* in imo corpore juxta anum. *Adeps* ruffa.

Est & aliud *Ispidæ* genus, quod ex India adfertur. Regulum magnitudine vix superans. Rostro oblongo, tenui, nigro, reliquo corpore ad caudam caeruleo, viridi & nigro. Cauda pro corporis proportionem longiuscula tota fere nigra. Pedum constitutione cum superiore eadem. Solitaria est, & in agro Bononiensi, Helvetia, & alibi media hyeme circa ripas glacie concretas reperitur.

Locus & Parius.

In arena vel scopulo aliquo juxta aquam nidificat. Nidum forma rotundum, eminente in angulum foramine exiguo, ex floribus arundinum, mollem construere ajunt. Pullos interdum novem in nido uno reperiri.

Usus.

Pellis ejus cum pennis asservata peculiari vi adversus *tineas* pollere creditur. Non tangi fulgure domum, in qua ejus nidus suspensus fuerit, nugantur quidam. Moschi instar cum pullis suis suaviter olere, *Tragus* prodidit. Suspensam pennas quotannis tanquam in vivo corpore mutare, falsum comperit Aldrovandus.

ROUSSEROLLE seu Roucherole Gallorum, *Alcyone* vocalis est Bellonio. Rostrium habet ferratum *Picæ* Græcæ seu *Colurioni* simile. Plumæ capitis longiores cristæ quondam speciem præ se ferunt. *Nidum* si quis inversum aspiciat adarcen primo intuitu referre videtur. Sena ut plurimum ova parit, & quinque sexve excludit pullos. *Cantu* adeo valet, ut omnibus canorus à Bellonio præferatur, tamque in eo indefessa, ut dies & noctes absumat; tam seria, ut vacillet, totoque corpore tremat. Inter reliquas voces has imprimis proferre videtur Toro tret, fuis, huy, tret. *Aristophanes* ejus cantum expressisse creditur.

## TITULUS II.

De Aquaticis fissipedibus Insectivoris.

### CAPUT I.

De Arquata, Crece & Totano.

**A** *Arquatum* ab arcuato rostro si dictam, Numenium veterum, qui forte à Neomenia, quod rostri figura arcum lunæ recens à novilunio crescentis in cornua representet, ita dicitur, esse Gesnerus credit; Bellonius Elorium Aristotelis conjicit. Rostrium habet circiter octo digitos longum, post tres digitos flecti deorsum incipiens, nigrum. Pennas coloris fusci varias & maculosas, ex quibus maxime fulgent instar serici villosi, quæ inter alas & dor-

sum sunt, in medio nigræ, in circuitu per interstitia subruffæ. *Digit*i sunt fissi, sed aliquatenus membrana conjuncti; quæ etiam utrinque juxta digitos descendit, & inferiorem digitorum partem dilatat. *Lingua* pro tanta rostri longitudine brevissima est, & sagittæ effigiem repræsentat. *Famina* est aliquanto minor, & maculæ illæ, quibus totum fere corpus respergitur, in hac magis fuscescent. Omnium vermium genere vescitur, eosque in plantis quibusque quærit. Turmatim volant, voa pariunt quanta Gallinæ, quaterna, pallidâ, mense Aprili. Carnem habent siccam, solidam, leporinæ similem. In Gallia in deliciis habentur.

C R E X, quæ & κρεξ, quænam sit avis, vix à recentioribus observatum est. Athenæus Helorio similem esse dicit; Aristoteles vero crura alba habere, & posteriorem digitum qui pro calce est minutum asserit. Herodotus ei *Ibidis* nigræ magnitudinem; Scholiastes Aristophanis rostrum acutum & ferratum assignat. Bellonius avem circa Nilum visam, cruribus longis, rostro longo & nigro, nigris quoque tibiis & toto capite: collo tergore & pectore candidis, quæ è terra victum petit, & in muscas debacchatur; & cum volat magnum edit strepitum, Crecem veterem esse opinatur. Pugnat cum *Galgulo*, & *Merula*, *Vireone*, eorumque pullis nocet. *Βραδυπόδες* esse *Philes* annotavit.

Arist. lib. 9. C. I.

T O T A N U S avis est aquatica, capite nigricante, præsertim anteriori; posterius enim & magis anteriori parte ruffum est. Vertex cinereus, ut & reliqua pars prona. Alarum ima pars alba, extima nigra est, reliquæ plumæ in ambitu variæ ( *σιντα* ) sunt & albicantes. Cauda palmi longitudine transversis lineis albis, nigrisque depicta, ut etiam limosæ. Pennæ super caudam ad medium dorsum usque albicant. Pars omnis supina alba est: in collo tamen, & superiore alarum ambitu nigricantes maculæ visuntur. Totius avis longitudo ab extremo (rostro) ad pedis extremum extensæ, dodrantem cum duobus palmis æquat. Rostri longitudo circiter tres digitos; colli totidem. *Hidipes* est, verum duo majores digiti pedis aliquousque membrana junguntur ut & limosæ. Pedes duos palmos longi ex pallido rubent, unguiculis muniti nigris. Corpus avisea fere crassitie est, qua *Mergulus* noster rostri acuti.

### CAPUT II.

De Calidri Bellonii, Nigra, & Himantopode Plinii.

**C** *Alidris* Bellonii avicula est columbæ magnitudine, cruribus proceris adeo, ut



ut equo insidere videatur, unde Chevalier, id est, equitem nominarunt. Plumis optime instructa est, ideoque longe minus carnis obtinet, quam appareat. *Rostrum* & crura rubra, longa, manifesto sane argumento aquaticam esse volucrem. Superior rostri pars nigricat, venter albus est: *caput*, collum, & pennæ sub alis, & uropygio cinereæ: quare Aristoteli Calidrim dici arbitramur, cujus meminit his verbis: Quin etiam *Calidris*, cui cinereus color distinctus varie. Radices plumarum sicut in Bistarda, & la Cane petiere (Tetracem interpretatur) rubent, sic in hac nigræ sunt. In temporibus utrinque maculæ sunt binæ, nigræ, quæ ceu umbram præbent superciliis, quæ & ipsa alba macula insignia sunt. Priores digitos membrana conjungit, ut in pica marina, (Pie de mer) Digitus posticus admodum exiguus. Alæ, ut in pluvialium corpori junguntur, magnitudine corpori respondent. Tam parva itaque ales proceris cruribus insitens, alacriter, hilariterque incedit, prata stagnaque & ripas frequentat, & plerumque aquam ingreditur ad femora usque. Caro nihil ferinum redolet, sed delicatum quid, & aromaticum. In sui generis avibus, in deliciis habetur.

NIGRAM à rubra differre certum est. Nigræ enim ab ipso ortu crura & rostrum atra sunt, excepta superiori rostri parte, quæ subrubra est. Color item huic nigrior: quin amputatis capite, cruribus, atque alis, reliquis corporis partibus Palumbis colorem inter cinereum, & nigrum videbitur referre. Sin sermo sit de Calidribus, quæ jam pennas mutarunt, distinguendusque color ab iis, quæ prioribus etiamnum vestiuntur, asseremus nos Pluvialem aliquando observasse in autumno nigram, adeo ut post mutationem plumarum eum non agnosceremus: nihilominus tam huic, quam alteri pedes nigri sunt. Foetus earum mense Aprilis prostant, maculis undique Ortygometræ instar (d'un Ras le) conspersi, cum alioqui hyeme tantum appareant. Ad hanc reducit Aldrovandus *Gambettam* Italici dictam: Quæ est capite, collo & pectore cinereis & maculis fuscis plurimis, undiquaque respersa. Alarum pennæ rectrices nigricant, corporis cinereæ sunt, in dorso & alis ad rufum vergentes, venter candidus est. Rostrum nigrum: oculorum iridem ex luteo subviridem niger circulus ambit. Pedes exluteto rutili, quo colore potissimum à nigra Calidri Bellonii discrepat. HIMANTOPUS à flexitate crurum ita dicta, quam alii Hæmotopoda, à rubedine pedum vocant, à Gesnero ita describitur. *Rostrum* digitos fere quatuor longum est, *caput* parvum, *collum* digitorum quinque, reliquum corpus,

quod leve, & gracile est, instar avium palustrium fere, quas Gallinulas aquaticas vocamus, digitorum sex, cauda quatuor, crura quindecim. Color rostri nigricat, in capite, & collo prono fuscus: dorso, & alis niger, paucio subviridi admixto, si diligentius intuearis, cauda cinerea. Partes prone omnes, & latera quoque albi coloris sunt. Crura sanguinea digitis duntaxat renis, sicut in Bistarda, Oenade Rondeletii, Morinello Gaii, Struthiocamelo, Pluviali, & Cane Petiere Bellonii, ejusdemque Pica marina: quorum medius longiusculus, brevissimus interior: jungitur autem medius cum exteriori brevissima membranula, tanquam palmipedum. Poplitum cavitas insignis est, articulo tam flexili, ut in sceletto etiam tibia ab femur tota reflectatur. Videtur sane non cursu tantum valere, sed etiam volatu hæc avis: quoniam oblongæ ejus alæ sunt, ita ut longissimæ earum pennæ caudam, seu uropygium, duobus, aut amplius digitis excedant. Oppianus hoc novum in eis, quod maxilla inferiore fixa, superior solum in ipsis moveatur notavit, sed in descriptio, nihil ab aliarum avium natura variat.

## CAPUT III.

De Gallinulis Aquaticis in genere & in specie, de quibusdam.

GALLINULÆ aquaticæ hoc commune habent, quod eis sit corpus gracile & adductum. *Caput* parvum, pennæ variæ *Rostrum* longum, modice inflexum, nigricans. *Ventrem* & supinam eam capitis partem, quæ inter rostrum & collum est candida. Crura oblonga, *digitum*, qui pro calce est admodum brevem; quædam etiam eo carent. *Plumas* ad media tantum crura descendentes. Vermiculis potius quam piscibus vescuntur; quamvis & ex his minimos comedant. Circa initia autumnii in Helvetiam adveniunt; hyemis exitu denuo avolant. *Aucupium* earum mane ante solis exortum, fit; aut vespere, quo incipiente tam sublimi volatu evehuntur, ut non amplius appareant. Ob carnem suavem & teneram, in deliciis mensarum habentur. *Species* ipsarum sunt *Chloropus*, *Erythropus*, *Ralla Anglorum*, *Rhodopus*, *Phæopus*, *Ochropus*, *Æelampus*, *Poliopus*, *Erythra*, *Ochra*, *Hypoleucus*, *Gallinula serica*, & *Scolopax*.

CHLOROPUS est triplex, Major, quarum altera Fulicam & magnitudine & corporis figura refert, tota rostro longiusculo, sursum parumper elevato; altera Italici, *porzana* dicta, collo & capite nigricantibus, Dorso cum superiore alarum parte castaneo; inferiore ventre toto albido, femoribus plumis cinereis usque ad genua co-



pertis. *Tertia* Gesneri, quam Glottidem Aristotelis esse credit, colore est fusco, cruribus viridibus. Vocem instar fistulæ argutam edit. Germanis *Glutt* dicitur. Prælongam exierit linguam unde ei nomen. Hanc initio blandita peregrinatione (cum Coturnicibus) avide profectam, poenitentia in volatu cum labore scilicet subit. Reverti inconcitata piget, & sequi; nec unquam plus uno die pergit, in proximo hospitio deserit.

*ERYTHROPUS* vel est *Major*, vel *Minor*, de utraque nihil singulare occurrit. *RALLAM* Anglorum aquaticam intellige, cujus rostrum & crura sunt rubra; plumæ undique magis cinereæ, quamque male volare, sed egregie pugnacem esse, Bellonius prodidit. *Montana* & sylvestris in Ericeto degere solet. Ortygemetram esse credidit Bellonius; Perdicem rusticam Gesnerus.

*RHODOPUS* nihil habet singulare. Sed ne de aliis præter descriptionem, quam apud Aldrovandum & Gesnerum invenies, quicquam. In Ochropode *major* septem distincti colores apparent, nec digitus posterior pedis visitur. Mediolingua in oblongum mucronem desinit. *Minori* collum est quam cæteris altius.

*ERYTHRA*, quam Germani *Mattkerka* vocant, vocem & clamorem edit, quo sonus fullonum lanas ferientium repræsentatur.

*OCHRA* à totius fere corporis colore subviridi, sed sordido & obscuro si dicta est.

De *HYPOLEUCO*, quam Germani *Spsterlin* appellant, nihil habeo quod dicam.

*SERICA* ideo dicitur, quod color ater in ea holoserici instar splendeat.

#### CAPUT IV.

*De Scolopace seu Perdice rustica, Rusticula sylvatica, Scolopace seu Gallinagine minori.*

*SCOLOPAX* avis, à rostri figura, quod instar pali longum & rectum habet ita dicta (palum Græce *σκόλα* dicunt) Volaterrano Aristotelis Alektoris, sed falso; vulgo Græcorum *ἐυλόρις*, Herodiano Sylvestris Perdix, Martiali Perdix rustica, nonnullis Rusticula major, Alberto quod suavis & pinguis sit Ficedula, plærisque populis Beccassa, Germanis *Schnepf* & *Kietschnepf* dicitur. Similes ipsi quasdam in Frisia aves facit Gesnerus. Ea, quæ Vulp nominatur vulgo, rostro & pennis colore illi confertur, sed magnitudine vincit. Item Grutte dicta rostro. Magnitudine est. Gallinæ, colore Attagenis, ut Aristoteles

prodidit. *Rostrum*, quod longum, antè asperiusculum, pars superior ultra inferiorem extenditur. *Linguam* habet gracilem, oblongam, nervosam. *Crura* fere rosei coloris. *Felle* carere vulgo creditur, quod apud Bellonium legimus.

Nullibi non *invenitur*, in Gallia, Suecia, Helvetia. Non ubique tamen iisdem in locis, nec semper *Æstate* in altis Pyrenæi, Helvetiæ, Sabaudia & Arvernæ montium jugis degit. Hyeme cibi gratia ad campos & sylvas cæduas descendit. Circa Brixiam principio Autumni, in Helvetia mense Octobri capitur. A Germania inferiore æstate recedit, in fine Autumni redit. Aquas imprimis tepidas, loca pulverulenta & humida, sepes, & hortos amat. *Cibus* ipsi vermes. Spiritu in cava immisso, unde sonus etiam procul audiatur, eos extrahere, proditum à nonnullis. Visi, qui ex farina fagotritici cum aridis ficibus pascebantur. *Volatus* debilitatem cursus velocitate natura compensant. Cum proximam sibi aucupes existimant, longe recessisse inveniunt. *Oculis* est obtusioribus, quamvis grandes habeat; *odoratu* potius cibum quærere creditur. Homine delectari ab Aristotele relictum.

Habetur inter ciborum delicias, sed postponitur Perdici. Aliqui deplumatum exenteratumque in furno torrent & cremant, remedio calculosis futurum.

*RUSTICULA SYLVATICA*, Rusticula palustri *major*, *major* est. Gallinam enim fere æquat. Colore saturiore, rostro minus longo, ventre albicante, cruribus cinereis. Tendiculis seu laqueis capitur.

*SCOLOPAX* seu Gallinago minor, & Scolopax minor, Molliceps Aristotelis quibusdam, dorsum habet ejusdem fere cum Alauda coloris. *Rostrum* canaliculatum, maculosum, in extremo nigrum, quatuor digitos æquat longitudine. Alæ extensæ maculam albam in extremitatibus ostendunt. Quæ ab Aldrovando exhibetur, *rostrum* habebat palmi longitudine canaliculatum, latiusculum, nigrum, tuberculis quibusdam asperum, in extremo acutum, cujus superior pars inferiorem aliquantulum longitudine excedebat. *Lingua* longitudine rostro fere par erat canaliculata, in extremo cuspide acus instar acuminata.

Frequentem in locis mediterraneis Gallia videt, nec Batavi eadem carent. In Germaniam circa æquinoctium vernum venit, si Longolio credimus. Nec à marginibus stagnorum & lacuum recedere idem affirmat. *Migratoriam* inde colligas. In dissectæ ventriculo initio Decembris, scarabæos, & vermes albicantes, tenues, oblongos,



longos, quales farinarios appellant, invenit Gesnerus. Neque incaveis, neque in aviaro vivere dignatur. *Vocem* auditam (hæc talis est, ut si quis cultrum per sertam ducat) pluviae prognosticon quidam faciunt.

## C A P U T V.

*De Gallinula terrestri, & alia Chloropode.*

**H**Uc & *Gallinulam terrestrem* & aliam *Chloropodem*. Fulicæ similem Bellonii refero. Illa circa Verbanum lacum Polle, à Germanis aucupibus *Hoggeschar* / quod turmatim juxta sepes decurrant, dicitur. Gesnerus Rallum terrenum, seu Thochilum terrestrem dicit. *Corpore* est brevi, crasso. *Digitis* pro sua magnitudine longissimis. Postremus ad anteriores circiter dimidiam longitudinem obtine. *Vocem* ejus dicunt asperam ger, ger, ger serpentum instar, Capta sciuri vocem, si fides referentibus imitatur. Angli ceu lautissimam inter segetes capiunt.

De *GALLINULA CHLOROPODE* alia, ita Bellonius. Necessario plane Gallinulam aquaticam (la Poulette d'au) à Fulica, & Fulica majori (de la Porle, & Macroule) separavimus: quoniam aquæ non innatat, nec palmipes est. Pullettæ autem aquaticæ, sive Gallinulæ nomen à similitudine cum jam dicta impositum est, etsi multo minor sit major tamen Ralla, adeo ut de utraque hac particeps esse videatur. Aucupes, quibus ostendimus, cum Fulicæ similem esse cernerent, magnitudine tantum differre aiebant hancque ad perfectam necdum ætatem pervenisse. Unde nos diligentius peculiare aliquas notas discriminantes investigavimus. In quibus ea præcipue fere est, quod hæc Gallinula pedibus sit viridibus, & non ab- similibus Botauri, neque etiam ita planis, nec denique lata membrana conjunctis, ut in Fulica. Cauda etiam Gallinulæ longior est. Mucula frontis item minor. Colore Rallo similis quidem, sed ad Fulicæ colorem tendit: quare ex primo aspectu Rallum esse putabam, sed cum diligentius inspicere, animadverti, palpebras oculorum candidas esse, quod Rallo non convenit, sed neque Fulicæ. *Caudæ* binæ pennæ albæ sunt, utrinque nempe una. Sub pectore nonnihil ad cyaneum, sive cæruleum vergit. *Dorsum* colore est castaneæ intenso. Aliæ item aliis nigriores sunt, & alarum plicas albas habent, & aliam insuper albam lineam in minori ala, quam primæ plumæ ejus per calami longitudinem constituunt. Idem cibus reperitur in ejus ventriculo, qui in Rallo, & Fulica. *Os sterni* &

ischion, sive os coxendicis ab aliis avibus habet diversa, etiam à Fulica. Caro Gallinulæ coctu facilis, ac tenera est, ossa fractu facilia, ingluvies ampla, jecur quoque fragile, cæterum intestina, & relique partes internæ, ut in Fulica. Assa ejusdem cum Fulica saporis est. Nidificat, & pullos alit, & educat, ut Rallus.

Huc pertinet illa quam *CORRIRAM* vocant, avis rostro pro corporis proportionem crasso, pectore, & alis supernis albicantibus, cætera nigra.

Nec *PORZANA MINOR*, quæ Mediolani Girardina à Gallinularum aquaticarum censu eximenda est. Rostrum habet breve, qua caput tangi flavum, & in extremitate nigrum, pedes atros; ventrem album, pectus, dorsum, alas, colore fumido, albis maculis consperso, alarum pennas majores nigras, &c.

## C A P U T VI.

*De Trynga.*

**D**E Trynga, Juncone, & Cinclø hoc duntaxat Aristoteles prodidit, quod caudam motitent, lacus & flumina petant. *Trynga* Turdo æquiparetur, Cinclø & Junco minores sint. Hinc factum, ut diversæ Aves pro iis ab Authoribus obtrudantur, haud paucae tanquam congêneres referantur ad easdem. Turnerus eam totam pul- lam, ea parte, quæ podicem tegit, quæque candida est, excepta, facit. Breves volatus facere, in stagnis quæ nobilium ædes obducunt, & in piscinis apud Anglos plærunque degere, si quando periclitatur, ad arundineta densiora confugere, adjicit. Germani quidam Tryngam nigram totam, fidi pedem, candido vertice ad rostrum usque demisso, pedibus altis & nigris, caudam continue motitantem, & loca aquosa incolentem ponunt, ad eandem Gesnerus avem quæ Claronæ *Wasser Crostla* / id est, Turdus aquaticus nominatur, rostro brevi, cruribus altis, fidi pedem, refert. Aldrovandus aliquot ad Tryngam reducit, quas alii ad Cinclum retulere.

*Prima* ei ex illis quas *Giarolos* & *Giaroncellos* in Italia vocant, Turdo magnitudine par. Rostro duos digitos longo, nigro, in extremo nonnihil recurvo. Lingua acuta paris fere longitudinis. Capite superno, collo, dorso, & alis fuscis ad colorem castaneæ nonnihil vergentibus, oculorum ambitu, mento, pectore, ventre & Uropygio albicantibus. Digitis tribus anterioribus ad medium fere palmum exsertis, posteriore brevissimo. Inter anticorum extimum & medium membranula est divaricationis initio, quæ inter alios desideratur.

*Alteræ*



*Alter* Pinarolo dicta, huic fere per omnia similis, nisi quod rostrum habeat nigrius, aliquando brevius, cujus superna pars infernam longitudine nonnihil excedit.

*Tertiam* Bellonius ad Gallinaginem minorem refert, Gesnerus Samethünle esse putat, uterque Cinclum Aristotelis esse opinatur. Corpulentia est fere eadem cum Scolopace minore simpliciter dicto: plumarum tamen colore differunt, & rostro, quod utrinque quidem tenue, longum & acutum est; præcedentis tamen in extremo maculatum est, & crassiusculum. Maculis albis in capite & universo collo maculatur. Pectus vero, totusque venter, femora & plumæ sub cauda nivem candore æquant. Ripas potissimum & loca, quæ bono aliquo odore recreant, & moschum redolent, frequentat.

*Quartum* inter cinclos reposuit Turnerus. Alauda est major, colore in tergo nigro, ventre albo, tibiis longis. Vere circa fluminum ripas *clamosa* est. Breves & crebros facit volatus. Anglis Hirundo Aquatica dicitur.

*Quinta* ex Motacillis credita, *Piltwendingen* / & *Piltwegichen* Germanis in Misnia vocatur. Palmipes quidem non est, sed rostrum longum, molle, cinereum: crura alta habet. Duo ipsius sunt genera, *Majus* & *Minus*. Hoc magnitudine Merulæ, tergo cinereo, ventre albo.

*Locus.* Flumina colit, & in ripis vagatur. In arenis nidificat & incubat, interdum inter faxa ova ponit. Supra octo pullos uno tempore non excludit.

*Victus.* Muscis, vermibus, & pisciculis vescitur. *Ingressus.* Domi, pane & malorum vescitur putaminibus. Singularem in muscis capiendis arte pollet. Lento enim suspensoque gradu accedens, rostro elevato primum designat, tum captam prædam deglutit. Mansuefacta conclavia ab araneis purgat.

*Vox.* Vocem noctu lacrymantis instar edit.

*Quarta* congenerem Merulam aquaticam Gesnerus facit, quam Germani *Bachamsel* / Lucarni & circa Verbanum lacum Folot vel Folum d'acqua nominant: nec non cornicem aquaticam, Sturno paulo minorem, quam in Alcyone describit.

## CAPUT VII.

### De Iuncione & Cinclis.

**J**UNCO *χοϊνικὸς* & *χοϊνικῶς*, quod in juncis libenter degat, quæ Græci *χοϊνικὸς* nominant; ita dicitur. Aristoteles Tryngam minorem, Alaudæ amicam facit. Addit, fluvios & lacus petere, ac caudam motitare, Bellonius pro ea quandam ostendit, quæ Gallis Alouette de mer, seu Alauda ma-

rina dicitur. Est quidem hæc ejusdem cum Alauda magnitudinis, *rostro* oblongiusculo; *cruribus* nigris gracilibus & oblongiusculis, *lingua* nigra universum rostrum longitudine æquante; linea alba sub alis insignitur, & dum volat ejusdem fere est cum Galerita coloris: sed quia maritima est, nescio an pro Iuncione sumi vel possit, vel debeat. Aldrovandus aviculam, quæ Passere d'acqua vocatur pro Iuncione ponit. Passeris est magnitudine, rostro nigro candiculato, satis duro & in extremo aduncò. Lingua candiculata, & qua desinit bifida & duriuscula. Cauda tres digitos longa denis pennis constante. *Mas* à fœmina hoc solum differt, quod in hac colores sint magis obsoleti; in illo magis vegeti.

*Congenerem* facit eam, cui eadem species, rostri pedumque conformatio, & colore tantum variat. Collum pronum, & pectus albicant, sed venter totus ex cinereo ad fuscum vergit. Cætera fusca est. Turnerus dum Parum sylvestrem pro Iuncione obtrudit, vehementer fallitur.

**CINCEUS** Græcis *κίρκος*, Suidæ, nisi loca sint corrupta, *κίρκος* & *κίρκος* *βυκολίην* Hesychio & Varino, quod armenta sequatur, tertia est ex illis avibus, quæ caudam motitant, & circa stagna & flumina versantur. Caudam motitare præter Aristotelem, Aristophanes in Tympanistis prodidit. Volaterranus palmipedem esse scripsit, sed falso. Suidas gracilem & nullo ferme corpore scribit. Gesnerus cum rostro recto nigro & longiusculo, ventre albo, pectore cinereo, cauda brevi ita ut eadem alarum longitudo sit, alis, dorsoque fuscis, cruribus ex ruffo fere luteis facit. Bellonius secundam Gallinaginis minoris speciem Cinclum Aristotelis esse putat. Idem Gallinaginem minimum genus, Cinclum minorem appellat. *Tertia* inquit Gallinaginis minoris species primo generi magis quam secundo similis est. Rostrum enim sicut Scolopax major, crassiusculum habet, & in extremo maculatum. Dorsum Sturno simile. Aliquibus Deux pour un appellatur. Duæ enim hujus generis, precio unius majoris vaneunt. Aldrovandus de ea quam exhibet, an apud mare etiam degat dubitat. Magnitudine inquit Motacillam aliquanto superat. Color totius fere corporis inter fuscum & cinereum ambigit, sed alarum pennæ majores subnigricant. Venter & femora albicant. Rostrum nigrum tenue, & longiusculum. Crura nigra, breviora & exilia.

*Congeneres* ipsi duas alias facit, quarum quoque Icones exhibet. Prior sub Cincli minoris nomine describitur. Altera iisdem quidem est coloribus, sed caudam albam & li-



& lineis nigris transversim secantibus ornata habet. Rostrum quoque qua capiti jungitur crassiusculum, & sensim deinde magis magisque attenuatum. Quia posteriore sui parte debilis est, suapte & per se *nidum* non construit, sed in alienis parit. Apud homines vivere non dedignatur. Captam maxime mitescere tradit Philosophus. Videtur in Coryis Thracum Regis convivio apud Athenæum apposita, *κίχνη* quidem ibi extat, seu *κίχνη* legendum osse censetur.

## C A P U T VIII.

*De Vannello & Cercione Ave Indica.*

**V**ANNELLUS seu quod alis instar vanni aut ventilabri commotis strepitum excitet, seu aliam ob causam ita dictus, Fulica quibusdam, Stymphalis veterum aliis, sed falso; quibusdam à voce, *Αἰξ*, sive Capella, Bellonio Parrus, Parus, vel Parcus de quo apud Plinium, dicitur. Alcyoni congenerem. Gelenius facit, Pluviali Gesnerus. Candidos reperiri audivit idem, nisi Lari fuerint. Sine crista, iique aliquando colore fusco, & maculis variis observati alibi. An Tremulus avis in provincia Salernitana dicta, quæ minor est Gallina, coloris fusci, alte clamans, & velocissime volans, quæque prope mare teste Villanovano versatur, & cum super terra incedit, cauda tremit, unde ipsi nomen, sit ejusdem generis, disquirendum cum Gesnero relinquo. Exactissime à Bellonio *describitur*. Magnitudine inquit Plaridem vix excedit. Densus admodum *plumis* contegitur, quæ in radicibus suis quæ corpus attingunt, omnino nigricant. Color enim alius est in parte exteriori. Avis inversa, supinaque collocata, & alis ejus extensis magna plumarum pars in ventre; & in femoribus nivei sunt candoris. *Alæ* in superiori quoque parte niveæ, in inferiori nigricant, &c. *Hepar* habet magnum, in duas partes utrinque divisum. *Fel* in ea reperire Bellonius non potuit. *Intestinum* appendices habet.

Circa lacus & amnes versatur: aquas tamen non ingreditur, sed in planis & erica consitis, ut plurimum degit.

Vermibus, muscis, cicadis, bruchis, scarabæis & aliis *vescitur*. Albos lapillos deglutire, certum est. Æstate sola *volat*, hyeme gregatim, & tam frequenti numero, ut prata etiam si amplissima vix totum agmen capiunt. Alis est obtusioribus, & inter volandum magnum strepitum edit.

*Vocem* videntur Germani & Galli per nomen ipsi inditum expresisse. Illi *Kütz* hi Dixhuit vocant.

Dum *pullos* fovet, ad hominem à quo nidum inquire suspicatur proxime accedit, &

velut deditionem simulat, donec à nido abduxerit, sæpe multæ unum hominem ita persequuntur, ut eo facilius à nidis abducant.

Habetur in ciborum in Gallia deliciis, *Ufus*. & eodem quo lepus precio venditur. Adeo pinguescit, ut saginata videatur. Gesnerus boni saporis & probi, sed levis & tenuis alimenti esse comperit.

De CERCIONE quam Capellæ seu Vannello præmittere debuit, caudam enim motitat ita Ælianus. In India avis ad Sturni magnitudinem accedens, variis coloribus picta nascitur, quæ & humanam vocem effingit, & Psittacis vocalior, & majore est docilitate ac ingenio: non tamen humanum victum æquo animo sustinet, sed libertatis desiderio famem potius quam servitutem deliciis ciborum referam amplectitur. Urbes, quas Alexander in India excitavit, & Macedonibus incolendas dedit, ut Bucephalacum adjacente agro, & Cyropolis, aliæque ideo Cercionem appellant, quod similiter caudam, atque Cinclus movet.

## C A P U T IX.

*De Pluviali & Charadrio.*

**P**LUVIALIS, Rhintace forte Plutarchi, quia nihil in ejus intestinis excrementi reperitur, in agro Bononiensi Pivier, Gallis Pluvier, Germanis *Pulvert* & *Pulross* audit. Quomodo antiquis vocetur, ignorare se fatetur Bellonius.

Duo ejus *genera*, *flavesceus* unum, *cine- Genera.* *reum* alterum, quod Itali montanum vocant. *Pulli* Guillemot privatim vocantur. *Illud* Palumbi est magnitudine. Rostrum brevi, rotundo, nigro, acuto, & in extremo non nihil adunco, *lingua* triquetra, totam inferioris rostri canalem implente, prona parte fere cornea retusa. Pennæ superne fusco albo luteoque colore ita distinguuntur, ut ferratæ appareant; cauda quoque lineis fuscis luteis interfecatur. Bostico digito caret. Inter anticos tres membranula interjicitur, major inter medium & extremum, minor inter eundem & internum. Bellonius plumas ejus lutescere scribit; seu maculis luteis respersi.

Frequens est in Gallia, in Helvetia rarissima. Bononiæ non raro in foro venditur. *Locus.*

Rore *visitare* prodidere quidam, quod *visus.* in ventribus earum nihil inveniatur. Nihil falsius. Ex humidis campis vermes eruit. Scarabæos in dissecta. Invenit Bellonius. Lumbricos edere asserit idem, quia solum *intestinum jejunum* habet. Ideo in eo nihil invenitur. *Migratoria* est. Æstate nulla in Gallia cernitur, vere paucæ. Non minore numero, quam quinquagenario volant. *Volaturæ* ventum sequuntur, raro

Q

raro

Bellon. de Avib. l. 4. c. 17. Plin. H. N. l. 11. cap. 37.

Visus.

Vox.

Parrus.



raro adverso tendunt, ut Bellonius prodidit.

Vox.

Vox ipsis huit, huit sibilo qui porrectis labiis edi solet similis. Noctu solæ degunt, summo mane diversis in locis spargæ conspiciuntur, quartamque aut dimidiam milliarii partem occupant. Imminente die, ut simul convenient, sibilum, sese mutuo vocantes emittunt. Uni in toto grege tanquam Regi obeditur. Huic vox maxime sonora. Adauditum undique confluitur. Aucupes *Appellatorem* vocant. Inter Cupedias in Gallia ponuntur. Ita ut in hominem delicati cibi nimium appetentem, ne Pluviali quidem opposita contentum fore, alicubi tanquam proverbio dicatur. Apparanda non exenteratur.

Aldrov.  
Ornith. l.  
20. c. 65.

*Pluvialem Cineream* Aristotelis Pardalum esse credit Aldrovandus, tum quod tota fere sit cinerea, quod de Pardalo prodidit Aristoteles; tum quod maculata, unde Pardalo nomen. Pluviali simpliciter dicta est aliquanto major. Rostro paulo crassiori & longiori, postico digito admodum exiguo. Tota fere cinerei est coloris, & multis undique respergitur maculis, quæ inter cinereum, & castaneæ colorem ambigunt. Alæ caudam quæ brevis est, excidunt. Magna ex parte gregatim volat, nec singularem videris, quod apud Aristotelem legimus. Vocem frequentem nec gravem emittit.

Huc refer illam, quæ *Pluvialis Major*, Aldrovando. Rostro est procero, supina parte per pectus, ventremque candicat. Majores alarum pennæ nigricant, pedes sunt longi, & ad cæruleum vergunt. Digito posteriore fere caret.

Arist. H.  
A. l. 9.  
cap. 11.

*CHARADRIUS* Gazæ Hiaticula, quod circa fluminum alveum & rivorum hiatus versetur, qualis Aristoteli avis sit, ignoratur. Nam colore & voce pravum esse, noctu apparere, interdiu aufugere, quod de suo Philosophus reliquit, multis avibus competit. Et cum Aristoteles Icterus Chloreum seu Galgulum vocet, haud verisimile videtur, eam avem Charadrium esse, quam in Perside & raro quidem reperiri; atriis regum requiri, quod multiei propter auxilium quod ictericis præstare creditur, Albertus ex Heliodoro, Æliano & aliis asserit. Aldrovandus pro Charadrio aviculam exhibet corpore toto ex cinereo fuscâ, Rostro brevi, sicum aquaticis, longo, si cum aliis conferas. Capite toto nigra vitta cinctam, cruribus oblongis & gracilibus, colore ad rutilum accedente, fronte & collo candicantibus, pedore nigrescente. Quia interdiu latet, noctu progreditur, dedit proverbio locum. *χαράδριον μυσμένον*, qui rem utilem occultat, dicitur. Ictericos solo aspectu sanare multi produnt. Philes Rubetam spectantem icte-

Helidor.  
l. 3. Hist.  
Æthiop.

ricia affici, rursus Charadriion, liberari nugatur.

### TITULUS III.

*De Avibus Fissipedibus Herbivoris.*

### CAPUT UNICUM.

*De Grue.*

**A** Vis quam Gruem Latini à gruendo, *Poëtæ* Palamedis avem, quod is Trojano bello, quatuor literas φ ξ χ & θ, ordinem aciei, & tesseras à Gruibus didicisse dicatur, vocant, Græcis communiter *γέρωνος*, quod colore cinereo & quasi cano tanquam *γέρων* appareat; Tyrrenis Tiris, & *συρμένης*, Polyrhænis *σέρπυς* appellatur. *Genera* ipsarum apud Tartaros plura Venetus observavit. Sunt quædam alis *nigris*: aliæ *candidæ*, pennas oculis aurei coloris plenas habentes. Nonnullæ parvæ, pennis longis rubro nigroque colore perunctis instructæ; quædam denique magnæ, grisei cinerei coloris, oculos rubros & nigros habentes. In Cuba duplo nostris sunt grandiores. In alia Americæ parte rubras colore coccineo Columbus observavit.

Martialis.

Vener.  
Rerum  
Orient.  
l. 1. c. 64.

De *descriptione* non est quod simus solliciti. Collum ipsi duos dodrantes longum, quod Philoxenus seu os Eurixidis. F. seu Cytherius, gulæ circa pisces mancipium, sibi optabat. Anterior ejus pars ad latera nigricat, prona albet. Vertex cum macula rubente niger. Omnia reliqua cinerea præter majores alarum pennas. In alis retro versus caudam pulvæ & crispæ sunt, quas auro & argento ornatas juvenes pilis affigere solent. *Arteria* aspera penitus in carnem ad os sternon inferitur. Ideo non mirum ex tam longinquo audiri.

Descriptio.

Athen.  
Dipnos.  
lib. 1.

Nulla non in orbis parte visuntur, universum enim fere, caloris amicæ, peragunt. Circa Hebrum, Strymonem & Cnistrum magna ipsarum copia. Ex Thracia, ubi æstate vivunt, hyeme ingruente trajiunt in Lybiam: ibi in Ægypto & in Æthiopia hyemen transigere Ælianus prodidit. De Tartaria superius diximus, quæ vero de Pygmæis Plinius habet, fabulosa sunt. *Cibus* ipsis fruges, & herbæ.

Locus.

Æl. H. A.  
l. 3. c. 13.  
Plin. H.  
N. l. 4.  
cap. 11.

Illud & Suidas innuit, cum dicit, *γέρωνος κατένεμον τὸ χάραν ὑπαρμένον, νεώτερον πύλινον σίτα* Grues agricolæ depascebantur agrum noviter tritico satum; & Mantuanus cum scribit.

Vitus.

*Strymonia de more Gruis, quæ semina campi laeta legens aquæ tepido sub sydere libra.*

Mantuan.  
l. 1. de colun.  
temp.

Hoc apud Claudianum legitur.

*E Nilo Pygmæa Grues post bella remenso  
Ore legunt rubri germina cura maris:*

Putantur tamen & serpentibus interdum vesci.

Mo-



Partus.  
Æl.H.A.  
l. 5. c. 2.

Moventur in Venerem cum obvio vento ad occidentem fugiunt. Fœmina stante ut Passeres, non sedente ut Gallinæ, coeunt. Ova bina, inter quæ lapidem fortuito etiam inventum deponere solitas; Albertus Colonix per annos aliquot observavit, nec plura pariunt. Quomodo excludant, à nemine quantum sciam. hætenus proditum est.

Vox.  
Virgil.  
Æneid.  
l. 10.  
Lucret.  
l. 4.  
Aristoph.  
in Avib.

Vocem ipsarum Græci per κλαγγεῖν vel κλάζειν; Latini per clangere & clamare exprimunt, quod intenso & magno cum impetu prolata vociferentur. Aristophanes νήραν κλάζειν nuncupat. Q. Calaber πανορθόγυς, id est longum & protensum sonum edentes dicit.

Ætas.

Ætatem earum diversi diversimode definiunt. Honorius anno octavo senescere tradit. Leonicus Tomæus quadraginta continuis annis unam domi aluit. Aristoteles pennas Gruum in senectute nigrescere tradit. Seu quod pennarum earum natura albicet, plusque humoris senescentibus iis constituitur, quam ut facile putredini pateant: seu quod terrestris humidi ipsarum natura à calore imminente non satis concoquatur. Solinus fulvas reddi scribit. Ingrediendo pedes ante se jaciunt, & implumes tam celeriter aliquando currunt, ut cursu hominem vincant.

Volatus.

Nec minor Volatus velocitas. Cyrus per intervalla locorum suos tabellarios ita disposuisse legitur, ut fatigatis recentes & nocturni diurnis succederent; sic volantes Grues superarentur.

Plutar. in  
Arist.  
Æl.H.A.  
l. 1. c. 1.  
Tzetzes.

De Migratione mira ab Autoribus produntur. Ex Græcia Mæmaeterione in quem Æquinoctium incidit, discedere notavit Plutarchus; ex Helvetia XI. Septembr. audivit Gesnerus. Thraciam relictam ad Hebrum fluvium conveniunt, & in turmas disponuntur. Maxima nata lustrato ter exercitu, corrui; sepulta ad iter in Ægyptum accinguntur. Volant alte, seu ad prospiciendum, quod Plinio & Isidoro placuit, seu ut, conspectis in tempestatem nubibus in terram sese referant. Exacte secundum ventem servant, raro contra impetum nisi fugiendo nituntur. Et in tergo præter volantium colla & capita reponunt. In volatu trianguli formam efficere animadvertum ab Aristotele. Ejus autem summo angulo aer ab iis adversus pellitur: deinde sensim ab utroque latere, tanquam remis ita pennis cursus avium levatur. Basii trianguli tanquam à puppi ventis adjuvantur. Tempestate mota, vel in triquetram figuram conducto agmine cuspide ejus circumfluum aëre scindunt, vel immixtæ glomerantur in orbes, vel contentæ in sinum falcataque feruntur. Literam ypsilon quibusdam exprimere; A vel α aliis creduntur. Unam sequi ordine litterato, & pen-

Plut. de  
folert.  
Animam.

Cicer. 4.  
de Nat.  
Deor. l. 2.  
Plutarch.  
lib. cap.  
Lucan. 1.  
5.

narum notis inscribi aëra, certum est. Duce quem sequantur ex robustis & senioribus eligunt. Ubi cum defatigatio, quia non habet, ubi nitatur, coeperit, proximam iis quæ acquievere substituunt; eaque vicissitudo in omni cursu servatur. In extremo agmine per vices qui acclament, dispositos habent, & qui gregem voce contineat. Excubias habent nocturnis temporibus, lapillum pede sustinentes; qui laxatus somno & decidens indiligentiam coarguit. Cæteræ dormiunt capite subter alam condito, alternis pedibus insistentes, Dux cum aliis erecto providet collo ac prædicit. Lapidem decessuras deglutire auri indicem postquam deciderit utilem, seu ut ita facilius ventorum turbini pondere resistatur, quod Ælianus voluit; seu ut de via fessæ, & quietem parantes, jactu terram & aquas explorent, quod Aristophanes Byzantius credidit, prodidere quidam. Rostro eum suscipere, ne in volatu navis instar fluitent, Maximus Tyrius scripsit; ut vocem Taurum montem Aquilis plenum cohibeant, alii: Falsum id Aristoteles reliquit: lapides pedibus complecti, cum digitis iis incurvantur ex Alberto habemus. Certum est, inquit Plinius, Pontum transvolaturas, primum omnium angustias petere, inter duo promontoria Criu metopon & Carambim; mox saburra (sed non ut alantur, quod Ælianus fabulatur) stabiliri. Cum medium transierint, abjici lapillos è pedibus, cum attigerint continentem è gutture & arenam. Cum ab Ægypto in Europam avolant. Duces non adhibent.

Arist. H.  
A. l. 9. c.  
10.

Plin. H.  
N. l. 10.  
cap. 23.  
Solin.  
Polyhist.  
cap. 10.

De Antipathia hoc dantaxat occurrit, ab Aquila infestinari. Ita inter se interdum ira exardescere, ut dimicantes capiantur. Visus aliquando mas fœminæ ad interfectionem usque undecim vulnera inflixisse, quod pullos quo minus se sequerentur, abstraxisset, si Alberto fides est. Quæ de Pygmaeorum cum Gruibus pugna ab Aristotele, Philostrato, Menele & aliis produntur, fabulosa esse ex Strabone cognosces. Adventus earum, Arationis tempus indicat. Si vel vociferantur, vel per apertum sponte trepidant; nec sese audacius æthræ committunt vel vespere, & ad multum tempus volant, tempestatem minantur: Si mane & gregatim volent, serenitatem promittunt.

Affectus.

Arist. H.  
A. l. 8.  
cap. 12.  
Strabo l.  
1. Georg.  
Hesiod.  
in Die.  
Theophr.  
l. de signis tempest.

Ufus earum olim in cibis expetitus. Indiovis vescebantur, ut Strabo habet. Varro Grues Melicas apud Gellium inter idiomata reposuit. Grues oculis confutis in tenebris faginos Plutarchus testis est. De suis temporibus Plinius. Cornelius Nepos qui Divi Augusti principatu obiit, cum scriberet turdos paulo ante faginari captos, addidit, ciconias magis placere, quam

Ufus.

Strab. l.  
15.  
Gellius.  
l. 7. c. 16.  
Plut. l. de esu Carnivor.



Plin. l. c. grues: cum hæc ales inter primas expetatur: illam nemo velit attigisse. Sed & hodie hybernos apud Gallos cibos nobilitat.

Brujer. l. 1. Inassant caryophyllis per fossas & pipere. 15. de re Tenescunt, si ex ficu suspendantur. Galen. c. 59. lenus, Ægineta, & alii carnem earum inter fibrosas & duras reposuere. Anaxandrides, cum Iphicratis nuptiarum cum Thraciæ Regis filia convivium ridet, Gruem ibi fuisse, quæ frontem distenderet, hiantem podice, discissis lateribus, dicit.

Athen. lib. 12.

Quantum *ad Medicinam*, Torminosus in cibo profunt. Jus vocem clarificat, & sperma auget. *Caput*, oculi, ventriculus exusta in pulverem fistulis & varicosis ulceribus insperguntur. *Adeps* omnes duritias cum Anserino dissolvit. Pulmonis vulturini dextræ partes venerem excitant viris adalligatæ gruis pelle. Penna serpentes stupidos reddit.

Plin. H. Et hæc de Grue in genere sufficiant. *Speciem* quod attinet, quia *BALEARICAM* Plinius Cirrhos in capite more Pavonis gerere scribit, Aldrovandus eam substituit,

quam Bellonius cuidam Ardeæ generi adscribit. Vulgaris est Gruis magnitudine, & eodem plane corporis habitu, rostro è cinereo fusco, vertice nigro, in quo cirrhus erectus nascitur, plurimis tenuibus & subtilibus aurei coloris pennis. Vtrinque in temporibus maculam habet oblongam, candidam, ex cujus inferna parte utrinque oriuntur palearia rosei carneive coloris. Collum, pectus, venter, cruraque tota ex cinereo fusca sunt. Circa caput viride invenitur. Alas erigit, & quandoque velocissime currit. *Vescitur* herbis viridibus, quandoque furfuribus & hordeo. Sub noctem altos parietes aut arbores more Pavonum quærit.

De *JAPONENSI* nihil singulare occurrit. Tota fere candicat, rostro, collo inferiori, pedibus & alis internis exceptis. Vertex capitis insigniter rubet, ac nigris maculis respergitur. Media pars colli inferior nigricat. Sub alis pennæ dependent satis magnæ, multis insignitæ appendicibus, nigræ; cætera tota avis nigricat.





# HISTORIÆ NATURALIS

## DE

# AVIBUS:

LIBER VI.


## De Avibus Exoticis, Americanis inprimis.

TITULUS I.

### De Avibus Exoticis Terrestribus.

#### CAPUT I.

*De Manucodiatis in genere & in specie.*



Oterant & istæ superioribus inferi, nisi accuratam, plerumque descriptionem Authores nobis invidissent. Hac quia destituimur, dicendum promiscue de illis erit, ne aliquid in historia Avium scitu dignum omisisse videamur. Si quid occurreret, quod superioribus annecti possit, Additamentis Deo volente inferetur. Incipiemus à MANUCODIATIS sive avibus Dei, ut Moluccani vocant. Hæ aliis interdum Apodes Indicæ: interdum Aves Paradysi, seu ob corporis speciem, seu quod ubi locorum nascantur, unde veniant, quo sese recipiant, ignoretur, vocantur; quamvis & ad Phylonem fluvium quædam observatæ sint, quibus idem, ob miram corporis speciem, & plurimam colorum diversitatem, nomen inditum erat, & in Ægypto fuscæ & subrutilæ Monedulis minores, sub eodem nomine videantur. Magnitudo certa non potest illis adscribi, quædam hirundine paulo majores visæ sunt. In Java columbarum magnitudine observari, à se Pica maxima non minorem visam, Scaliger reliquit. Omnibus peculiare est, ut pedibus careant (quamvis Aristoteles nullam absque pedibus avem dari asserit, & Pigafetta pedes illis palmum unum longos assignet) & in cauda veluti fila quædam vel nervos obtineant. Caput ipsis non rotundum, sed pressum, nucis juglandis ferme magnitudine. Rostrum non omnibus æque magnum, neque ejusdem etiam coloris. Alæ

& cauda expansæ, Accipitrinis Milvinisque magnitudine respondent. Pennæ sunt tenuissimæ, & præter tenuitatem pennis Pavonum foeminarum ex toto persimiles. Alæ in arctum contrahi, vel in latum diffundi pro animantis lubitu nequeunt, sed naturaliter uno tantum eodemque modo perpetuo consistunt. Dorsò fila gemina annectuntur, tres & amplius palmos longa, neque exacte rotunda, neque perfecta angulata, sed figura inter quadratum & rotundum media. Intus continuata ac perpetua, pinguedine totæ expletæ sunt. Falso perpetuum volatum exercere, quod non nisi mortuæ in terra vel mari inveniantur, traduntur; nec verius affirmatur rore duntaxat pasci, & ova in masculorum dorsi cavitate incubari & excludi. Sane quiete necessario indigent, & filis illis in cauda facile ramis arborum annectuntur, nulla hætenus in visarum dorsi observata cavitas; & cum tum alte volent, tum animalia sunt perfecta, quomodo rore, qui prope terram nascitur, nec solidum alimentum suppeditat, illas ali dixeris? Magni à Moluccarum Regulis sunt, qui se, si illarum pennas portent, in prælio vulnerari non posse, etiam si in prima acie collocati fuerint, credunt.

*Species* ipsarum quinque describit Aldrovandus. *Prima* hirundinem magnitudine, & forma, si corpus spectes, pene æquat. Pennarum ambitus discolor est, sed admodum venustus, & visu undique jucundissimus. Caput quale Hirundinis, & pro corporis parvitate majusculum: cujus plumæ, quæ superiorem partem à prima cervicis vertebra ad rostri usque initium exoriant, breves sunt, crassæ, duræ, spissæ, colore luteo egregie micantes, & ad instar purissimi auri, radiorumque solarium more respondentes: reliquæ, quæ mentum contegunt, molliores, tenuiores, & ex cyaneo



mire virides, ut in Anatum masculorum capitibus, dum lucidissimo sideri obvertuntur, conspiciamus. *Rostrum* quam Hirundini prolixius. Alarum pennæ forma Ardearum similes sunt, tenuiorestantum, ac longiores; fuscæ, inter nigrum, & rufum fulgentes: quæ una cum cauda in orbem expansæ, rotæ similitudinem exhibent. Etenim plane immobiles sunt, & veluti infixæ quædam spicula cuti adhærent. Cæterum minores quoque aliæ pennulæ, cæque profecto haud paucae juxta singulas majorum pennarum, quæ alas constituunt, origines, exoriuntur, quæ supra majorum principia extensæ, ea obtegunt, dimidio quisquiliatæ, ruffæ, coccineæve, cætera crocæ, & fulvo auri colore splendidæ, multum mehercule gratiæ ac venustatis aviculæ ob eximiam illam & singularem colorum disparitatem conciliant. Corporis reliqua moles tota pennis fulvis in rufum vergentibus obducitur, ita tamen ut aliquid adhuc inter eas discriminis advertas. Nam quæ in pectore & ventre collocantur, & frequentissimæ sunt, & pariter latissimæ duorum triumve digitorum amplitudine fulvo sunt colore, & eo quidem nitidissimo, haud sane alio quam jecur ipsum splendentes. Quæ vero dorso infiguntur, rariores, neque ita frequentes sunt, atque insuper amplis divisuris pennarum omnino Ardearum tergo adhærentium similitudine hiant: neque etiam ad tam insignem latitudinem accedunt: aut præstantem illum hepatis colorem ædequant, quinimo puniceo potius colore, carni æmulo, obscurione etiamnum relucet. Fila illa gemina quæ dorso annectuntur, quodammodo nigra sunt.

*Alter* caput habebat album fere, maculis luteis, aureisque perfusum; oculos pariter luteos, cilia rubicunda, rostrum inter luteum, & viride medium, duos digitos longum, in supina parte quodammodo recurvum; *linguam* rubicundam, longiusculam, acutam, Picorum haud plane dissimilem, ad lacinanda animalcula perquam idoneam. In pectore aliquo pacto rubescebat. Venter, dorsum, & alæ candicabant, hæc tamen superius ubique, & in fine erant ferruginæ. Dorsum primo ad flavum quodammodo tendere videbatur; posteaquam vero uropygium attingit, ad rubicundum, seu ferrugineum colorem vergebat. Alarum longitudine, utpote, quæ quinos palmos adæquant, primam speciem superabat. Caudæ pennæ, ubi dorso inferuntur, candicabant: cætera ferruginæ erant. Ejus duæ pennæ reliquas duorum palmorum longitudine vincebant, & reliquæ etiam quam in prima longiores aderant. Carebat hæc avis geminis illis filis, quæ omnibus è dorso enasci supra dixi:

quare vel itineris longitudine, vel temporis vetustate decidisse ea judicandum est, non autem fœminam ideo dicendam, ut perperam vulgus hætenus sibi persuasit. Duarum vero longissimarum illarum pennarum fortassis ad velociorem motum usus fuerit.

*Tertiam* ob corporis longitudinem *Hippomanucodiatam*, quoniam longiorem videre mihi nunquam contigit, appellare placuit, quæ videlicet à principio rostri ad caudæ, & alarum extremitatem tres do-drantes longa erat; & ad duos palmos, cum alæ complicatæ sunt, lata. Rostrum erat satis aduncum, in supina maxima parte, tres digitos longum, inferna vero paulo brevius. Tota vero avis erat alba præter nempe collum, & ventrem, quorum color est castaneus. Superior capitis pars ferruginea, quem colorem flavus excipit, ut hunc viridis. Prope dorsum pennæ admodum prominebant longitudine duorum, vel trium digitorum. Erat præterea unicum duntaxat Avi filum, idque asperiusculum, & admodum flexibile, quare alterum casu quodam amissum fuisse existimare debemus.

*Quarta* à rostri principio ad alarum extremitatem usque commensurata duos do-drantes explebat. Rostrum pro corporis exiguitate longissimum, nigrum & quodammodo aduncum. Capitis, colli, & alarum pennæ nigrescebant, ubi tamen rostro adnectebantur, flavescebant. Cirrhum prope cervicem tres propemodum digitos altum habebat, rigidum, coloris flavi, quique ex setis potius, quam pennis constare videbatur, atque eo maxime à subsequenti Manucodiata differebat.

*Ultima* magnitudine est Turdelæ, miræ levitatis, alis oblongis prædita, teneris & visui perviis, & pennis (si pennæ dici possunt potius quam setæ: deplumes enim sunt) duarum longis, angustis, nigris, duritie cornea; pedes nulli, perpetuo volat, nec usquam quiescit, nisi in arbore aliqua, longis illis setis ramo implicata pendens. Nulla navis tam celeriter pergit, & tam procul à continente, quam non circumvolet.

Huc RYNTACE crescæ pertinere videtur, quæ ovi magnitudine, gallinacei forte, in Persis nascitur. Hesychio & Phavorino avis est quam ἡλικὸν περιστέρα id est columbæ magnitudine. Nonnullis Pluvialis avis dicitur, nec solido cibo vescitur.

## CAPUT II.

*De Avibus Daje, Guitguit, Maja, Xochitencatl, Et Iajauhquitototl, &c.*

**A**mericanis nominibus utimur, quia de Exoticis nos aucturos recipimus. Pos-



Possent & Latina imponi; quod Nierembergius fecit; sed metumimus, ne Lectoris iudicium turbetur. Unicuique ad sua genera unamquemque revocare licebit. Avis *DAIE* columbam non excebit. Nidum quatuor spithamas altum, locis fabulosis, cauda ac pedibus excavat. In eo ova perimbres anserinis majora, & pugnū fere lata, quinquagena plurave, citra ullum albumen, crassæ & pinguis substantiæ, ponit. Excluduntur hæc citra incubantis parentis opem atque teporem. Exclusi pulli statim evolvant. Avis est commode edulis. Ova assa coctaque boni & pinguis sunt alimenti; frixa mali & concoctu difficilis.

*GUIT GUIT* minima est avicula, Regulo similis, viridi colore, & suavi nutrimento. Ea est naturæ rerum vis, ut hæc tanta avis ac fere nulla, audeat persequi corvorum examina, eosque cogat ubilibet latitare, & se adversus illam arundinetis tueri. Corripetam Nierembergius dixit.

*MAJÆ* colore fulvus est, & in colli postica parte caput (dictū admirandum, & nulli alii animali concessum) ventriculus, primumque nutrimenti receptaculum, si Authoribus credendum. Gregatim in Cuba volant, & *Oryzæ* cuius maximus apud eas gentes proventus, fata devastant. Cedunt mensis, & grati multique nutrimenti esse dicuntur.

*XOCHITENACATL* columbæ est par, rostro crasso acuminato & nigro, *Oculis* nigris, iride lutea, alis caudaque albo & nigro colore variatis, tænia nigra à rostro ad dextrum usque pectoris procedente, alis vero circa priores partes etiam luteis, ac universim reliquo corpore pallenti, si demas pedes & crura quæ fusca sunt, & ungues ipsos, qui ex albo nonnihil pallefcunt, *Vivit* juxta arbores floridas, quarum melligine *viſſitat*. Educat sobolem, habeturque à Tototepocensibus apud quos est frequens, maximi.

*JAJAUQUITOTOTL* corpusculo sturnum æquat. Viridi, cyaneo, fulvo & cinereo variegatur. Dum illi ab extrema cauda pennæ prodeunt reliquis longiores, priori parte depiles, in extremitate cyaneis ac nigris ornatae pilis. Videtur ad Passeres Indicos referri posse.

## CAPUT III.

*De Avibus Tuputa, Tentzon tototl, Tritono, & Hoactzin.*

*INSOLENS* in *TUPUTA* natura. Viva tota vermibus farcitur. Hos pro carne habet, his singula membra imbuta: præter hos & pellem nihil carneum. Cutem non perforant densis exornatam pennis. In carectosis & herbosis locis versatur, ad

proceras arbores nauscat. Hæc ab Hernando habemus, si eximiæ fidei is author est.

*QUAPACHTOTOTL* octo nucas longa est, ac totidem cauda; Rostrium è cyaneo nigrum, longiusculum incurvumque, oculi nigri, iris alba; pectus cinereum, ac inde ad caudam usque venter niger, cauda ex nigro fulvescens, alæ vero collum atque caput fulva. Risus humani est æmula, hinc Ridibunda quibusdam. Et propterea inauspicati ominis infamia Indis erat infensa.

*TENTZON TOTOTL* appellatur avicula Passere minor, colore fusca, pilis quibusdam ad rostri radicem circumcirca propendentibus, barbæ instar. Inde nomen usurpavit.

*TRITONUS* pulcherrima, & mirifico colorum ornatu variegata proditur, Patria ipsi Hispaniola. Tribus vocibus canit. Scilicet pæne indivisibilibus modulis variat cantum, ab avia voco in alias subito dilapsa, ut videatur una omnes edere, unoque spiritu multos formare tonos, tanquam si à tribus gutturibus fabricarentur.

*HOACTZIN* Gallinæ Indicæ fere est magnitudine, rostro incurvo, pectore candido in luteum inclinante, alis caudaque maculatis per intervalla pollicis, colore candido & pallenti, dorso ac suprema parte colli fulvis, sed utrisque in fuscum colorem inclinantibus, præterea etiam & temporibus usque ad rostrum & oculos. Unguibus nigris, ac fuscis cruribus. Gestat cristam è plumis è candido in pallidum colorem vergentibus, sed dorso earum nigro. *Vescitur* anguibus. *Vivit* in calidis regionibus, qualis est Yautepecensis, magna ex parte arboribus juxta flumina consitis insidet. Apparet Autumno. *Vox* ei magna; & ululatum quendam repræsentans. Inauspicata ab incolis habetur. *Usus* in *Medicina* invenit. Ossâ dolorem cujusvis particulæ humani corporis lancinatione sedant. Suffitus quoque plumarum, mentem restituit his è morbo aliquo ea parum constantes evasere. Pennarum cinis intra corpus sumptus, morbo Gallico affectis opera mirabili medetur.

## CAPUT IV.

*De Ave Emeu.*

*AVEM* Emeu seu Eme Clusii potius verbis, qui eam accuratissime descripsit, quam meis depingere malo. Hæc, inquit iste, dum surrecto capite incedebat, quatuor pedum, & aliquod unciarum altitudinem excedebat: nam collum à summo capite ad dorſi initium tredecim pæne uncias erat longum, ipsum corpus binos pedes latum, femora cum cruribus usque ad

Nie-remb.  
Naturæ  
Exot.lib.  
10. c. 6.  
Nie-remb.  
l. 10. H.  
N.E. cap.  
34.

Nie-remb.  
Naturæ  
Exot.lib.  
10. c. 6.

Idem lib.  
cap. 7.

Idem l. c.  
cap. 10.

Nie-remb.  
Hist. Nat.  
Exot. l.  
10. c. 14.



ad pedum inflexionem decem & septem uncias longa; corporis autem ipsius longitudo è pectore ad Uropygium trium pedum ferme erat: *Penna* seu verius plumæ totum avis corpus cum infima parte colli, dorso & pectori proxima, atque femora tegentes, perpetuo erant geminæ, ex eodem parvo brevique tubulo prodeuntes, & sibi invicem incumbentes; superna quidem paullo crassior, inferna vero tenuior, & delicatior, illæque variæ longitudinis, ut in similis avis exuvio, quod Christianus Porretus Leydenſis pharmacopæus diligentissimus, habebat, observabam. Quæ enim in infima colli parte breviores erant, quæ in medio corpore & lateribus longiores, sex videlicet aut septem unciarum, quæ autem in extremo corpore circa oropygium (nam cauda carebat) novem uncias longæ & reliquis duriores. Quanquam omnes duræ aut rigidæ, attamen non latæ, sed angustæ, & rarioribus lateralibus pilis ex adverso sitis præditæ, nigri coloris, quæ tamen circum femora ad cinereum fere tendentis, nigro permanente nervo, ut in reliquis: eam vero formam, & situm habebant illæ plumæ, ut à procul aspicientibus non plumis sed villis duntaxat tectum ejus avis corium existimari possit, quale urſinum est, & alis carere, tametsi alas haberet, sed sub plumis latera tegentibus latentes, & quatuor majoribus pennis nigris præditas, ut in exuvio observabam, tametsi illæ abruptæ essent, nec de illarum longitudine ceati aliquid ponuntiare possim; caules tamen conflati satis crassi, durique & solidi erant, atque in extimam alæ partem alte penetrabant. *Alæ* vero pars superior corpori contigua pennas sive plumas vestitricas, illis similes, quæ adhuc in pectore retinebat; adhuc enim patas hujusmodi alas censendum, ut currentem adjuvent, quia hanc avem non esse volucrem, nec à terra tolli posse arbitror. *Crura* in ambitu quinque unciarum crassitudinem superabant, crebrisque corticibus seu squamis latis tecta erant, præsertim supra pedis inflexionem. *Pedes* habebat crassos, duos, tribus crassis digitis præditos, prona parte velut squamis tectos, supina prorsus callosos: quorum medius, qui reliquis longior, tribus articulis constabat, interior uno, exterior binis. Omnium *ungues* valde magni, binas pæne uncias longi, crassi, duri & cornicei: Ejus *caput* exiguum pro avis magnitudine & fere glabrum, coloris ex atro cærulei cum colli suprema parte, in quo apparebant rari pili nigri: oculi paullo supra rostri fissuram magni, ardentes & truces, leonis oculis pæne similes, quos cingebant niger pili, quemadmodum & meatus illos aurium parvos & detectos, quos pæne oculos habebat. *Rostri* prona pars

quemadmodum arcuata erat, paulloque supra mucronem binis foraminibus, narium usum præbentibus, prædita: à cujus medio ad capitis usque verticem porrectum diadema assurgebat corneæ substantiæ, tres fere uncias altum, coloris ex flavo fusci, quod cum plumario defluvio cadere, & cum plumæ renascuntur, novum crescere intelligebam. Supina rostri pars, ab ejus scissura ad extremum mucronem quinas uncias longa. Anterior colli pars quatuor pæne uncias infra rostrum, bina velut membranacea palearia, seu barbulas, propenduntia habebat duas uncias longa, coloris rubri miniati. Postea similiter colli pars depumis, à capite secundum longitudinem rubri miniati coloris erat; deinde infirma ejus pars aliquot rubris plumulis, quibus nigræ intermixtæ tecta. Caterum tametsi hæc avis aliquas notas habere videatur cum struthiocamelo communes, velut exiguum caput, natura pæne calvum, quodque sine delectu vorat quidquid obijcitur. *Pedes* tamen bisulcos non habet, sed tribus digitis præstitos, ut ante diximus, sine calcari, otidis sive tardæ pedum modo: ideoque adeo firmos & robustos, ut in illustrissimi Comitum orto, (quem cum ipso Comite ingressus eram ut avem conspicerem) arborem humani femoris crassitudinem æquantum prorsus contusam viderim; & ejus corticem sublatum ab hujus avis, comite, id asserente, pedibus & unguibus: etenim non rostro antrorsum, sed oblique se convertens, aversis retrorsum pedibus, eos, cum quibus pugnabat, impetere solebat.

Licet vero quæcumque obijciebantur *Videtur.* voraret, ut aurantia mala integra, & similia: ordinarius tamen ejus *cibus* erat similagineus, sive primarius panis, quem in magna crassaque fragmenta divisum, objectum vorabat, maxime enim recentibus gallinarum ovis delectari intelligebam, quæ integra cum ipsa testa glutiebat, si autem parum firma esset valetudine, illa ipsa integra per anum rejiciebat, deinde rursus ea vorans retinebat & concoquebat. Mihi autem affirmabant, hanc avem fuisse marem, & ex postica parte penem, cameli instar, interdum exerere esse conspectum. Audio porro, illas naves quæ anno à Christi nativitate millesimo sexcentesimo tertio ex Molluccis in Hollandiam redibant, binos simul aves quidem attulisse, sed in itinere mortuas projecisse; tametsi earum exuvie sive coria, obraritatem, censervari potius sent: illius avis aliquot ova nihilominus relata certa terna aut quaterna eodem anno Amstelredami conspiciebam à mercatoribus redempta, & paullo etiam ante unum Leydæ apud Porretum videram, omnium, mea opinione, maximum & pulcherri-



num: dimensi enim per longitudinem ambitus, quindecim unciarum erat; per transversum autem, duodecim, aut paullo amplior, ut propter amplitudinem pro quodam vase non minus haberi posset, quam struthiocameli ova, quibus, teste Plinio, veteres nonnunquam utebantur, & adhuc nostra ætas ejus rei gratia usurpat; nam non semel videri memini struthiocameli ova argento excepta & inclusa, poculorum vicem præbere. Hujus tamen avis *ovi* testa non erat valde densa, nec alba veluti ovorum struthiocameli, sed extrema parte virescentis ex cinericio coloris, & perpetuis, saltem creberrimis, quasi tuberculis satura viriditate præditis ornata: illorum autem quæ Amstelredami conspiciebam, unum ejusdem pæne erat cum illo magnitudinis, formæ & coloris, quædam vero magis orbiculata, aliqua minora, nonnullorum etiam color dilutior, & minus elegans. Porro mihi relatum, hujusmodi aves Moluccarum insularum non esse peculiares, sed etiam in Sumatra sive Taprobana, vicinoque illis insulis continente reperiri.

## CAPUT V.

*De Avibus, Xochitotl, & Auris.*

**X**OCHITOTOTL, forma æmulatur passerem nostrum, multicolor est penna, pallet, nigrescit, candet: partim quoque est fusca. Vbique incola. Vermiculis & exiguis feminibus vescitur. Ex arborum ramis nidum construit pendulum. Ibi incubat ovis.

AURA aliis Gallinassa aut Gallinasso; in maritimis locis Zamuro, Peruanis Suguntus, Mexicanis Tropilotl, dicitur. Corvinum est genus, & ad magnitudinem Aquilæ accedit, quibus vix Gallinas superat. Color illi niger, Rostrum Psittaci instar. Frons depilis plicatili cute obtegitur, circumstant pili rari & nigri similes Æthiopum. Crus hobet fuscum. Aduncum unguem & atrum. Hornandes incertæ originis esse credit, nec sciri ubi nidificent & educent prolem. Frequentissimas omnibus Hispaniæ nova angulis hodie scimus. *Pernoctant* in arboribus & rupibus, mane advolant ad urbes, & ab editioribus locis plateas speculantur.

Quicquid immundum est aut exanime devorant, nec à stercore humano abstinere, foede ingluvie famosæ.

Pullos Acoffa albos esse scribit; adolescentes in corvinam nigredinem degenerant.

Gregatim volant, & sublimipetæ sunt. Nec clamant, nec canunt raro murmure contentæ. Ingratus ab eis odor. Si quis insequatur, exonerant se ut leviores vola-

tui sint, pari festinatione evomendo quicquid glutierunt.

Usus invenere in Medicina. Caro si edatur, Gallicum morbum juvat. Pennæ exustæ cinis vetat pilos nasci, æque ac stercois formicarum; vulnera quoque medicatur. Stercus drachmæ unius mensura potatum prodest melancholicis. Cor sole exsiccatum impense odorum est. In aliquibus Provinciis lege lata poena infligitur occidenti has aves. Reginam Aurarum.

COZQUAUKITL Indi vocant. Accedit magnitudine gressus Aquilis; alii gallinæ Ægyptiæ parem faciunt. Corpus universum præter collum & eas partes quæ juxta pectus sunt, ex nigro purpureo, fulvum est ac pullum. Alæ circa exortum nigrae, cætera cinerea; desuper vero mixtim fulvæ nigrae, & nonnihil in purpureum vergentes. Rostrum extremum (quæ Psittaci esse judices, tam est indistincta similitudo) alba sunt. Cætera sanguineo colore tincta. Amplum est narium foramen; oculi nigri, iris fulva; rubra palpebræ, frons sanguineo colore perfusa, ac plicatilibus rugis torva, quas tamen nonnunquam explicat, qua in se vocatos Gallo-pavos æmulari videtur, & pilis quibusdam veluti retorridis rarisque. Æthiopum pilis haud absimilibus. Cauda est Aquilæ, inferne cinerea, foris vero nigra. Crura rubra, ungues unci.

Indignea est Mexicanæ provinciæ. Anguibus, muribus, lacertis, sed morticinis maxime & humano stercore *vicitur*. Sublime volat & nimium extensis panisque alis, vix volatum intermittens. Vix incredibili obstitit ventis, contra nititurque adversantibus, eisdem sedibus perstans immobilis. Unde ipsi apud Mexicanos nomen.

Caro est inutilis, nutrimento, quantum compertum est; à nomine, nisi Medicina gratia degustato. Audio, inquit Author noster, hujus avis plumis ad motis mederi Indos ulceribus, carnibusque elixis durante affectu devoratis, quas etiam ajunt morbo Gallico præsentaneo quodam remedio mederi.

## CAPUT VI.

*De Avibus Garagay, & Quetzaltotl.*

**G**ARAGAY quæ dicitur, avis est rapax, Milvi magnitudinis, capite ex extremitate alarum albo. Crocodilorum & testudinum ovis infensa est. Odoratur illa sub arena in ripis fluminum condita, eruit & vorat. Solivaga est, nisi quod Auræ aves eam sequantur, ut potiantur furto, auro enim scalpere terram nesciunt, ut effodiant ova.

QUETZALTOTOTL, cristata est picæ columbæve magnitudinis, pavoninis magna ex parte plumis ornata, rostro incur-

R

VO

Usus.

De Laet. l. 5. Ind. Oc. cid. c. 4.

Nie. remb. H. Exot. bel. 10 c. 56.

Locus & Vicius. Volatus.

Usus.

Nie. remb. H. Exot. l. 10. c. 57.

Nie. remb. l. 10. c. 41. Herrera Decade 3. l. 3. c. 9. Historia Novi orbis.

Vicius.

Partus.

Volatus.



Descri-  
ptio.

vo & luteo, & pedibus nonnihil luteis, cauda tzanatli plumis prælongis vestita, atque virentibus nitidisque pavonini coloris, iridis foliis forma similibus, opertisque, alis superne nigricantibus, inferne vero, & qua parte pavoninas attingunt, quæ in medio sunt, inclinantibus in virorem, quasi cavente natura meliorum pulchritudini. Crista constat plumis splendentibus pulcherrimis, pectus collumque inferne rubris & micantibus, ac pavoninis superne, quilibus etiam tegitur dorsum, nec non eæ partes quæ subter alas sunt, interque crura, sed dilutis exilibus, & mollibus. Plumæ alarum prælongæ sunt, virore tinctæ diluto, & in acumen desinentes. Pennæ regentes humeros virescunt, sed subter sunt nigræ, quæ vero alas interstant, nonnihil incurvæ ac unguium colore.

Locus.  
Hernan-  
des in Pa-  
ralipom.

*Vivunt* in provincia Tecolotlan: ultra Quauhtemalan versus Honduras: Loca aprica amant, nec compertum cicurari vel ali in domibus voluisse.

Victus.

*Vescuntur* vermiculis, pineisque quibusdam sylvestribus, ex his quas Mexicani matzatli vocare consueverunt. Arboresex cavare, & in earum cavitatibus sobolem educare dicuntur. *Sonitum* proferunt Psittacis non admodum dissimilem: verum sibilata edunt alacris, ter de die, mane, meridie, & sub occasum Solis cecinisse observatum est.

Volatus.

Agminatim *volant*, & visco hærentes ne plumis detrimento sint, non contorquentur, quasi naturæ duæ divitiarum suarum cognitionem haberent.

Ufus.

Et sane maximi plumæ apud indigenas habentur, & aurum precio superant. Longiores ad cristas & cætera corporis ornamenta, cæteræ ad textilia opera usurpantur. Plumis captas exuere, undas dimittere dominis, quibus loco prædiorum sunt, & ad hæredes transeunt, licet, ne quisquam occidat, cavetur. Vere Reginam plumarum dixeris.

## CAPUT VII.

*De Avibus Tzinitzian, Totoquestal, Avemontana, & Longa.*

Nie-  
remb.  
H. Exot.  
l. 10. c.  
65.

**T**ZINITZIAN parva est avis, columbæ pæne par. Rostrum habet breve incurvum & pallidum. Columbinum caput & collum, sed quæ plumis virentibus ac nitidis vestiuntur, pectus & ventrem rubeæ, præter partem caudæ proximam, quæ cyaneo candentique colore promiscue tingitur. Caudam superne virentem, inferne nigram Alas partim albas partim sub nigro-atras. Crura ac pedes cinereos. Vivit in calidis juxta Oceanum Australem, vescitur fructibus. Alitur in caveis.

Ex plumis miræ subtilitatis imagines intexunt indigenæ.

**TOTOQUESTAL** columbina magnitudine minor est, viridis omnino. Caudæ pennæ longissimæ sunt, magno pretio habitæ & receptæ in commerciis. Depilata dimittebatur. Capitis reus erat qui occidebat.

**AVIS MONTANA** Indis Tepetototl, & Tecnecholi, Hispanis Phasianus, anseris est magnitudine, colore nigro splendenti, plumis tamen nonnullis inferne candentibus, circa caudam in postremis alis, cruribus pedibusque cinereis. Rostro incurvo partim cinereo partim luteo, ac circum radicem velut tumentis, plicatili cristâ, oculis nigris, sed iride pallenti.

Alitur frumentaceis frugibus aliisque similibus. Mite animal. Nam apprehenso domesticorum pallio cibum exigit, & clausam januam ubi aliquo intrare opus sit, pulsât. Horum si liberum sequitur, reducem cum applausu excipit.

Eduis est ac pinguis caro, nec dissimilis illi chortalium Indicarum.

**AVEM LONGAM** Indi Hoitlallotl dicunt. A rostri acumine ad caudæ usque exitum, quæ spithamam quoque longa est, dodrantem prolixa conspicitur. Rostrum desuper nigrum, subter vero cinereum, quadrantem longum ac mediocriter crassum. Cauda virescens sed pavonino splendore. Plumæ totius corporis ex albo fulvescunt, fulvescuntque prope caudam è nigro: sed quæ corporis vestiunt superiora, nigræ sunt maculis candicantibus conspersæ. Calidis regionibus vivit. Humipeta est, ac modici volatus, sed adeo pernici cursu, ut equorum velocissimorum agilitatem longe excedat.

## CAPUT VIII.

*De Cygno Cucullato Clusii, seu Dodone Lusitanorum.*

**C**YGNUM Cucullatum, seu Gallum galinaceum peregrinum Clusii. (Hollandi *Walgh-vogel* seu nauseam moventem avem vocant) Mauritii insulæ, quam Lusitani Ilha de Cirne dixerunt, debemus. Magnitudine cygnum superat aut æquat. Caput habet magnum, membrana cucullum referente tectum. Rostrum crassum, oblongum, parte capiti proxima subflavum, extremo mucrone nigrum. Prona pars adunca est & curva, in supina quæ subcærulea, macula mediam partem inter flavam & nigram occupat. Raris & brevibus pennis tegitur. Alarum loco quaternas & quinas duntaxat longiusculas nigras pennas habet, posteriore corporis parte, quæ præpinguis & valde crassa, pro cauda quaternæ

De Laet.  
Ind. Oc-  
cid. l. 2.  
cap. 4.

Clusius  
Exot.



ternæ aut quinquæ crispæ convolutæque pennulæ cineracei coloris conspiciuntur. Crurum quæ crassa potius quam longa, superna pars genu tenuis nigris pennulis tegitur, inferior cum pedibus subflavi est coloris. Pedes in quatuor digitos dividuntur. Terni longiores antrorsum spectant, quartus brevior retrorsum conversus est. Omnes instruuntur unguibus. De Crure ejus genu tenuis rescisso, ita Clusius. Erat, inquit, non valde longum, sed à genu usque ad pedis inflexionem paulo plus quam quatuor uncias superabat: ejus vero crassitudo magna, ut cujus ambitus fere quatuor uncias æquabat, crebrisque corticibus seu squammis tectum erat, prona quidem parte latioribus & flavescentibus, vero supina minoribus & fuscis. Pedis etiam digitorum prona pars singularibus iisque latis squammis prædita, supina autem tota callosa. Digniti satis breves pro tam crasso crure. Nam maximi sive medii ad unguem usque longitudo uncias binas non admodum superabat, aliorum duorum illi proximorum vix binas uncias æquabat, posterioris fescunciam: omnium vero ungues crassi, duri, nigri, minus uncia longi, sed posterioris digiti longior reliquis, & unciam superans. In unius ventriculo lapilli inventi sunt, unus planus & orbicularis uncialis magnitudinis, alter inæqualis & angulosus, in maris littore lectos & devoratos verisimile est. Herbertus cum Lusitanis Dodonem vocat, & unam capitis medietatem ferruginei coloris plumis tegi, alteram nudam esse, addit.

## CAPUT IX.

*De Avibus Ceoan, Cenotzqui & Fauxi.*

**C**eoan seu avis nivea turdo viscivoro paullo major est. Circa pectus ventrem atque alarum exortum fulvescit, permixtis ad caudam cinereis plumis. Alarum extrema caudaque ipsa cinerea sunt, superne vero universum corpus è fusco nigrescit. Rostrum quod parvum est atque exile, cruraque fulvescunt. Mentum candet, insertis tamen aliquot nigris pennis. Sermonem humanum æmulatur, veluti irridens transeuntes, quos tamen ubi licet, insequitur.

Avi CENOTZQUI seu evocatrici nivium dictæ color illustris variegatione. Pectore fulvus, crure pallidus, ungue niger, ventre notis candidis & atris permixtus, sub finem albis notis conspersus, cauda subtus niger & candidus, super fulvo nigrore maculatus. Caput nigrum est fascia cinctum cinerea. Rostrum parvum cinereum superne atque inferne, sed superne juxta exortum linea ambitur lutea. Quovis coelo gaudet, montana colit, & roris tempore

subolem educat. Antequam ningat clamat, postea silet. Ita convolvit huc & illuc caput, contorto in varias partes collo, ut eodem situ immota persans, cuncta circumspiciat.

PLAUXI gallinacetum æquat aut superat. Nigra est, maculis nonnullis albis & nigris perspersa, collo nonnihil provento, capite amplo, quod aliis cristatum, aliis proplumea crista lapis aut globus insurgit, (lapidem vocant, licet non nimis durus) ovo similis aut major, ferruccineo colore. Hernandus tumorem quondam radici rostri affigi, qua parte est tenuior, pici firma, lapidis duritia, & cæruleo colore, scribit. Alitur frumentaceis seminibus & libenter mansuescit.

Huc pertinet alia Avis Ciconiæ magnitudine, colore cinereo. Cristam gestat uncias octo longam, è multis subjectis aggregatam plumis ejusdem coloris, & in amplitudinem orbicularem, præcipue circa summum dilatatis atque excrecentibus. Vism in horto Hispaniarum Regis descripsit Hernandus.

## CAPUT X.

*De Avibus Picicilli, Polyglotta, & Chichuatli.*

**P**icicilli avis est parva. Cinerea tota nisi capite & collo, quorum utrumque nigrum, solum oculos nigros candens ambit macula. Est ignobilitate quadem originis nobilis. Nesciunt adhuc Tetzcoques ubi fatiscet. Muta est. Educat domi, brevi perit. Palato & stomacho est acceptabilis.

POLYGLOTTA quam Indi Concontlatolli seu quadringentas linguas vocant, sturnum non superat. Subtus albescit, superiore parte fusca, pullis & candentibus intermixtis pennis, maxime ad caudam & caput, quod imagine quadam coronæ argenteæ redimitur. In caveis ad blanditias auditus, ad ostentum naturæ servatur. Vincit omnes aves suavitate & arbitrio gutturis, nullius non imitatur, nullius non superat. Calidas regiones amat, temperatas tolerat. Contenta est quovis cibo. Similis ei est Tzanpan. Aliqui suspicantur foeminam esse ejusdem speciei, paribus magnitudine, cantu, forma, nisi quod plumæ inferne albæ sint, cinereæ & nigrae: superne, pullæ, nigrae, albæ.

CHICHUATLI nostratem rusticulam exæquat. Rostro est longo, tenui, & pullo, ac tæniis juxta utrumque oculum luteis & incurvis. Inferiora corporis pallida sunt, nigris quibusdam plumis circa colulum intersertis. Iris lutea, ac nigri oculi. Cætera ex fulvo, fusca, & cinereo per-



mixta. In montibus versatur. Calidis frigidisque regionibus capitur. Pane & vermiculis alitur. Humipeta est, & in vimineum alteriusve materiae conjecta carcerem, haud vulgariter garrit. Pingue & non omnino aspernandum præbet alimentum.

## CAPUT XI.

De Avicula Tominejo.

Gomara  
Hist. general. Indiar. c. 194.  
Oviedus  
Hist. general. l. 14. c. 4.  
Augustin. C. rat. Hist. Peruanæ l. 1. c. 5.  
Lerius in Historia Brasiliæ.  
Thevet. singul. Franc. Antar. c. 48.  
Joseph. Acolta  
Hist. Natur. & Mor. Ind. l. 4. cap. 37.

**M**ira sunt, quæ de Avicula, quam Hispani Tominejum, Indi Hoitzitzil-tototl, ut Hernandes scribit, Huitzitzil ut Ximenes, Viciilin ut Gomara, Quenti ut de Laet, Brasilienses Guonambuah, ut Lerius & Thevetus testantur. Oviedus Passerem mosquitum vocant, produntur. Tam parva est, ut quidam ei magnitudinem crabronis, alii cicadæ, nonnulli extremi pollicis articuli, & evulsis pennis vix dimidiæ ejus partis, alii scarabei Lucani assignent. Oviedus in monetario trutina quæ aurum appendi solet cum nidulo suo positam, bina tantum pondera. Acolta unum duntaxat dicit, Hispanis Tominos dicta, id est XXIV. grana, unde Tomineii nomen, pependisse vidit. *Capitis* & colli plumæ miram elegantissimorum colorum quocunque obvertas varietatem repræsentant. *Pectus* igneum quendam auro splendidiorem inprimis. Reliquum corpus subcinericium est. Oviedus nigerrimum colorem tribuit. *Rostrum* habet oblongum, illudque acus qua vestes farciuntur, exilitate. *Linguam* rostro duplo longiorem. *Pedum* & *unguium* exilitate, cum illarum avicularum pictura, quæ ornatus gratia in librorum marginibus interdum adjici solet, comparari potest.

Locus.

Invenitur in Peruanis montibus & Brasilia. Melle, rore, & florum succo alitur. Rosæ tamen non insistit, at in præalto milio quod Auati ab incolis dicitur, & aliis similis magnitudinis plantis insidet.

Origo.

Duplex earum proditur origo. Nam aliæ quidem ex ovis excluduntur uti reliquæ volucres. (Construunt autem ex xyli floccis nidos) aliæ, quod haud dubio fabulosum, ex muscis transformari vulgo creduntur. Sunt qui dicunt visam esse partim muscam partim avem: primum ejus colorem nigrum, mox cineraceum, deinde roseum, tandem rubentem. Nullus Hispanorum cantus mentionem facit. Soli Levius & Theretus Galli valde canoram esse, & in cantu adeo assiduum ut nemo qui non audiret & conspiceret, ex tantillo corpusculo tam suavem & sublimem cantum prodire posse sibi persuaderet.

Volatus.

Volat celerrime, editque inter volandum quendam instar apiculæ strepitum, ut apes magis quam avis videatur. Non diu-

tius, quod maxime virum, *vivit*, quam flores herbarum durant superstitēs, postquam marcuere, ad pinus aliasve arbores, quadam naturæ providentia sese confert, eique se rostro affixo servat appensam, donec sex plus minus quam transactis mensibus, ac decidentibus jum pluviis, vernantibus agris, denuo revirescat, similes vices plures subitura. Gomara exspirare mense Octobri, pedibus ex aliquo ramo appensam aprico loco; renasci autem Aprili scribit. Hinc *Renati* nomen. Servata est sæpius avis affixa stipiti intra cubiculum, & cum sex menses exanimis jacuisset, quo tempore natura sibi comparatum est, revixit, ac dimissa in agros volitarit.

Quam Clusius describit, & Urusiam ac Tominejum vocat, an eadem cum jam descripta sit, ignoro. Erat, inquit, hæc avicula, ut expectura observabam, à rostri mucrone ad pennarum caudæ extremitatem tres uncias longa. Caput vero cum integro rostro uncialis cum semisse erant longitudinis: alæ ad extremam fere caudam porrectæ, parem habebant longitudinem: dorsum vix unciam latum erat, ejus & alarum color ex cineraceo fuscus, ventris cineraceus. Pennæ quæ in cauda obscure rubescentes, earum extrema pars nigra. Capitis, colli gutturis plumæ elegantissimi coloris ex auro rubro & flavo mixti, quæ Soli expositæ, admirabilem varietatem, prout obvertebatur caput, ostendebant: rostellum nigrum tenuissimum & maxime acutum, pedes valde exiles, nigri, quatuor digitis ut reliquarum avicularum præditi, quorum tres in anteriorem partem porrecti, quartus in posteriorem, &c. Videtur tamen esse existis. Diversæ enim speciei sunt istæ parvulæ aviculæ, & promiscua nomina communicantur invicem. Urusia Solis radium significat.

Ajunt pulverem ejus intra corpus sumptum epilepsiæ mederi. Pennæ præsertim quæ in collo & pectore nascuntur, aureis staminibus à phrygionibus intexuntur.

Usus.

## CAPUT XII.

De Avibus Cuntur, & aliis quibusdam Insulæ Maragnanæ.

**C**untur avis est mole vasta. Visæ quæ expansis alis XV. aut XVI. pedes occuparent. Pedes habet gallinis similes, caret aduncis unguibus. Rostro tam valido instruitur, ut eo vaccinum tergus perforet. Plumis albis nigrisque mixtis ornatur. Cristam parilem instar novaculæ, & non servatam instar gallinacei. Inter Carnivoras censerī debent. Duæ illarum vaccam occidere & comedere valent, nec ab hominibus abstinent. Non modo ovem dila-

Johan. de Laet. Indiar. Occid. lib. 10. c. 5.

Ætas.



dilaniant, sed & juvencam. Pauciores sunt. Plures si reperirentur, pecus universum in Peruvia destruerent. In Insula Maragnana quatuor inprimis occurrunt.

De Laet. Ind. Occid. l. 16. c. 13. *Prima* quam *Ouyra Ovaßon* (observa, barbaros Toupinambautios universas aves uno & communi nomine appellare *Oura* sive *Ouyra*) vocant. Aquila est pæne duplo major. Plumis vestitos elegantissimis, Rostro valido, Unguibus inprimis acutis. Visa penna ex alis hujus avis extracta, quæ ulnam nostratam longe superabat, elegantissimo colore, & rotundis maculis distincta, instar Gallinarum quæ ex Africa advehuntur. Tanti est roboris, ut ovem integram abripiat atque dilaniet, homines facile prosternat, & nec à cervis abstinere.

Lerius in Hist. Bras. fil. *Altera* est *Moyton* seu *Mouton* pavonis nostratis magnitudine aut paullo major, præ alta crista spectabilis, & per universum fere corpus nigris albisque plumis eleganter variegata. Carnes illarum cibo sunt opportunæ, & multæ ejus visuntur species.

Huic *Toucan* accedat; palumbi magnitudine; rostro oblongo atque lato, ingluvie sub pectore tres quatuorve digitos transversos lata, crocei coloris elegantissimi & miniatis plumis circa oras distincta, pectore candido, dorso exquisite rubente; alis atque cauda nigris; pulchra aspectu & carne palato admodum grata. Hujus & alia species appellatur à barbaris *Ovaycho*, cui rostrum est paulo diversum & è rubro flavescebat.

*Quartum*, locum avi *Ouru* dictæ damus, perdicis quidem magnitudine, sed galli gallinacei in modum cristata; plumis rubris, nigris atque candidis insigni varietate. Sunt ibidem & plures ejusmodi rapaces aves Aquilis aut majores aut paullo minores, singularis adhæc formæ, & plumis variorum colorum eleganter distinctæ.

Sunt & quædam Perdicum forma, sed majores paulo, cæruleis plumis ornata, & cærulea ova ponentes. Tata *Ouyra Ovaßon*, & Tata *Ouyra* miri, itemque *Aroumara* singula sunt columbarum nostrarum magnitudine, sed singulari plumarum varietate & elegantia.

*Iandou* struthiocamelorum est species. Proceritate staturam humanam superans. *Salian* denique Turcici Galli magnitudine, rostro & cruribus ciconiæ, licet volare nesciat: tamen tam pertinaciter currit, ut venaticos canes effugiat.

### C A P U T XIII.

*De quibusdam Brasiliæ Avibus.*

**I**Nter cæteras Brasiliæ aves, quarum alibi mentio facta & adhuc fiet, censentur

*Guranha-engera, Tangara, Quereiva, Tucana, Guirapanga, Macucagua, & Mutu.*

De Laet. Indiæ Occid. l. 15. c. 7.

*GURANHÆ-ENGERA* magnitudine est Fringillæ, tergo & alis cæruleis, pectore & ventre flavo; diademate supra caput flavo. Cæterarum fere omnium cantum imitatur, & mille modis vocem flectit & mutat. Variæ ejus reperiuntur species, quæ omnes aviariis inclusæ summopere delectant.

*TANGARA* Passeris est magnitudine, colore nigro, capite subflavo, non canit. Epilepsiæ quia obnoxia creditur, ideo illius carnibus abstinent barbari. Narrant iidem aviculas hæc inter se choreas ducere, & una mortuæ instar humi procumbente, inconditum murmur & strepitum edere. Hac consurgente, & eundem strepitum edente, omnes una avolare.

*QUEREIVÆ* totum pectus, pulcherri-  
mo colore rubro tectum est, alæ nigro, reliquum corpus cyaneo. Propter exquisitam plumarum elegantiam maximi fit à barbaris.

*TUCANA*, quam Lerius & Thevetus vocant *Toucan*, picæ magnitudine, flavo pectore, reliquo corpore nigro. Rostro ingenti & minimum palmum longo, extus flavo, intus læte rubente. Cicuratur ita ut sub tecto pullos suos excludat.

*QUIRAPANGA* est tota alba, & cum modicæ sit magnitudinis, stentoream habet vocem, & quæ instar tintinnabuli, ad dimidiam pæne leucam exaudiatur.

*MACUCAGUA* phasianæ avi non dissimilis, Gallinas Europæas magnitudine superat, & triplici cute munita est. Ova quotannis bis tredecim aut quindecim ponit. Graditur quidem humi, sed petit ad conspectum hominum arbores. Largam delicatamque carnem habet. Multæ illius species reperiuntur, quæ capiuntur facile.

*MUTU* Gallinæ est species admodum domestica. Cristam istar galli, nigri atque albis punctulis interstinctam gerit. Ova illius sunt grandia, alba, & ita dura, ut inter se collisa instat ferri tinniant. Quare barbari Maracas suas ex illis conficiunt. Ossa illarum canibus sunt lethalia, hominibus nihil nocent. An eadem sit cum Moutone de qua superiore capite actum est, ex comparatione liquebit.

Huc pertinet *quedam ex rapacibus* magnæ molis & tam clamosa, ut ad dimidiam leucam audiatur, tota nigra, pulchris oculis, rostro galli gallinacei, cui cornu impositum palmi pæne longitudine, quod iis qui linguæ vitio laborant, ad collum appensum occulta, quadam naturæ vi mæderi, experientia comprobatur volunt. Coronidis loco hisce *Bambiayæ* in *Cuba* insula frequentes accedunt. Paullum

De Laet. Indiæ Occid. l. 1. cap. 9.



supra solum feruntur magis quam volant, ita ut incolæ ferarum instar illas venentur. Carnes coctæ jus croceo colore inficiunt, saporis alioquin pergrati, & phasianarum avium æmuli.

## TITULUS II.

*De Avibus Exoticis Aquaticis.*

## CAPUT I.

*De Passere stulto, & Anser Magellánico.*

Nie-  
remb.  
Hist.  
Exot. l.  
10. c. 4.

**P**asser stultis nomen ex eo accepit, quod manus apprehendentium nec fugiat nec timeat, admiratur solum aut stupet. Præter frontis partem rostro adjacentem, quæ cinerea est, palmipes, rostro tres uncias longo, tenui, obrotundo rectoque, sed prope extrema nonnihil incurvo, pedibus quoque qui cæterorum palmipedum sunt, & cruribus nigris, pupilla etiam nigra, & membrana oculos tegente in ambitu cinerea.

Vescitur pisciculis. Voce imitatur graculum. Magnitudine picam, forma Larum. Nobilis est avium insulæ Mauritii mansuetudo. Appellentibus nautis perinde insident ac arboribus. Eadem securitas venatus est. Accedunt ac subeunt manus.

**ANSER MAGELLANICUS** à loco ita dicitur. Batavi forte à pinguedine Penguinem vocant. Describam eum verbis Clusii. Marina est hæc avis, inquit, & ex Anserum genere, tamen rostro dissimilis. In mari victitat: pinguis oppido est, prægrandis anseris magnitudine; nam adultiores in eo genere tredecim, quatuordecim etiam, sedecim interdum, juniores vero octo, decem & duodecim libras pendere observantur. Prona parte, nigris pennis tectæ erant. Supina & in ventre albis. Collum, quod crassum & breve habebant nonnullæ, albis pennis tamquam torque cinctum. Earum cutis crassa & densa inter suillæ. Alarum erant expertes, sed earum loco binas parvas coriaceas pinnas habebant, & latera tanquam parva brachia propendentes; prona parte brevibus, angustis & rigidis pennis confertim tectas, supina autem minoribus & rigidioribus, iisque albis, quibus nonnullis locis intermixtæ nigræ; minime quidem aptas ad volandum, sed quarum adminiculo velociter natarent. Maxima enim ex parte in aqua versari intelligebam, & terram duntaxat petere fortificationis vel pullationis tempore, & plerunque quaternas aut quinque in una scrobe latere. Rostrum corvino majus habent, non adeo tamen elatum, & valde brevem caudam, pedes nigros, planos adferinorum pedum forma, non

adeo tamen latos. Erecta & sublimi capite incedunt, demissis in latera pinnis, tanquam brachiis, sic ut procul intuentibus homunculi aut pygmæi appareant. Piscibus duntaxat vesci, referebant Diaræ; non ingrati tamen saporis esse illarum carnem, nec piscem sapere: scrobes vero valde profundas in litore fodere, cuniculorum instar, totum solum adeo cavum interdum efficientes, ut per illud gradientes nautæ, sæpiusculum genutenus in eas scrobes inciderent. Hi sunt fortasse anseres, quos Gomara ait sine pluma esse, nunquam è pelago prodire, plumæque loco villo longo protegi.

## CAPUT II.

*De Avibus Tochualcuachili, Xochitenacatl, & Tlanquechul.*

**A**vis quam Chillenses Tochualcuachili seu caput nocturnum appellant admirandi est opificii. Assurgit illi à rostri exitu corona quædam, aut orbis in tres divisus cuspides, superiori parte mediocriter crassus, & è luteo rubescens: ab anteriori alarum bini aculei contorti exeruntur. His armis avicula imbellis adversus fortiores defenditur. Nullius vitam natura contempsit. Avis est littoris Oceani Septentrionalis alumna, salforumve lacuum, è quibus victum sumit. Inventa apud flumen Tupspe, vix æquat sturni nostratis magnitudinem, sed collo constat tenui & longo, capite parvo, & in longum producto, prolixo rostro luteoque, prolixisque cruribus, & pedum digitis atque unguibus: ungues autem lutei sunt, digiti & crura cinerea cum inferiorum femorum parte, nam superior fulva est cum anteriori alarum parte, quarum posterior cyanea est. Reliquum corpus nigrum, quibusdam tamen fulvis circa ventrem permixtis pennis.

**XOCHITENACATL** est columbæ magnitudine, rostro præ corpore mole maximè, superiori parte luteo, inferiori vero subnigro, & in purpureum colorem vergente, oculis nigris, sed iride rubesciente ex luteo, ac reliquo corpore caruleo cinereoque. Vivit circa litora Oceani Australis; piscibus, quos rapit, vesci solet.

**TLANQUECHUL** dicitur avis peregrinæ gulæ: vivis duntaxat piscibus vescitur, mortuos non attingit; raptu gaudet, specie similis est plateæ aut pellicano, sed coccineo pulcherrimoque universi fere corporis colore, aut ex albo rubescenti, lato atque obrotundo circa finem rostro, cinereoque pupilla nigra, iride rubra rugosa, fronte galli pavonis, auræve, depili

Nieremb.  
Hist.  
Exot. l.  
10. c. 16.

Nieremb.  
l. 10. c.  
9.

Clus.  
Exo.



depili pæne capite, candentique cum universo fere collo, & parte pectoris, & fascia nigra latiuscula, capet à collo distinguente. Circa littora maris aut fluminum vivit.

## C A P U T III.

*De Avibus Acolin, Quachiltone, & Acacalotl.*

**A** *Colin*, Coturnicis est magnitudine fusca, prolixo rostro & curvo in inferiora, pedibus longis: juxta aquarum summitatem cursitat celerrime, nunquam fere volat. Versatur in lacu Mexicano. Vescitur pisciculis & ipsa esca vulgo. Bene Coturnicem aquaticam dixeris.

**Q**UACHILTONEM, seu *Avem siliquastrini capitis*, aliqui Jacacintli vocant. Color illi purpureus, ex nigro interfertis pennis. Rostrum initio pallet. Adolescentibus rubet calvities juxta rostri exortum. Fulicam imitatur. Lutea crura invirorum assurgunt, in quatuor desinentia digitos pallidos, citra ullam membranam. Oculi nigri, iris fulva.

Lacustris avis est. Piscibus vescitur, ipsaque non ingrata palato. Intempesta nocte, & sub primo mane gallinaceorum ritu canit.

**A**CACALOTL mas seu corvus aquaticus à cauda extrema ad rostri usque acumen quatuor fere spithamas longa, & mediocris amplitudinis; crura sesqui spithamea, rostrum arcus instar incurvum, duos palmos longum, ac mediocre tenue: pedes in quaternos finduntur digitos nigerimis munitos unguibus: crura minus nigrescunt digitis, rostrum cyaneum est, ac caput exiguum. Plumæ infernæ fuscæ insertis rubris, superiores vero promiscue purpureæ, subnigræ, virides atque splendentes: *cervix* est septem digitos longa. Caput collumque pennis fuscis, albis & viridibus reguntur ac paulisper fulvescentibus. Oculi sunt nigri, iris vero sanguineo tegitur colore. Cæterum ab externis oculorum angulis usque ad rostrum, uncia unius intervallo deplumis & glabra est, pellis rubescensque in albo. Alæ viridi splendentique subtus pellucet colore, & qui pro variis solis percussibus evariet atque mutetur; supernæ vero prope exortum passæ sunt, deinde vero viridi atque pavonino spectabiles colores. *Indigena* Mexicanæ plagæ avis est: versatur circa lacus, ac piscibus victitat. Masculus fortassis est ejus avis, quam recentiores vocant Arcuatam, aut illi saltem congener. *Educat* filios veris tempore juxta lacustria loca.

Bonum præstatalimentum, nec valde injucundum, crassum tamen, atque (ut lacustres aves decet) piscosi odoris.

## C A P U T IV.

*De Avibus Xomotl, Acototloquichitl, & Acacacahoatli.*

**X** *Omotl* palmipes est, dorso & alis desuper nigris, pectore fusco. Cristatam iracundia facit. Pennas intexebant Indis suis vestibus.

**A**COTOTLOQUICHITL seu *Passer aquaticus mas*, passerem similitudine & forma simulat. Rostrum tamen nigrum, crura & pedes fulvi, inferiora corporis plerumque candida. Cætera fulva, candore aliquo & nigrore variegata. *Reperitur* in Mexicanis plagis. Juncetis & caretis insidet, ibique *nidificat*. Non minus occinit quam Sol pergit. Ab ejus exortu ad occasum contumaci garrit sonitu mures imitante.

**A**CACAHOTLI seu *Avis aquatica raucum sonans*. Halcyonum species illa est inquit Nierembergius, quam nostri marinetum Piscatorem vocare solent, circa aquarum fluentia victus gratia à congenita quadam versantem natura. Anate fera paullo minor est, colloque & rostro spithameo: hoc tres digitos latos prominet, medio, cum sortitur crassitudinem, in aciem definit, ac morsui est peropportunum. Superne vero nigrum est, inferne album, & pallescens circa latera. Oculi nigri sunt, iris rubra prope pupillam, deinde pallida, ac demum candens. Ab oculis ad rostri usque exortum fascia procedit viridi pallescens. Crura pedesque in digitos fissi virescunt extrinsecus, intrinsecus vero inclinant ad pallorem, color totius corporis magna ex parte albus est, fulvis pennis insertis, verum superna magis fusca sunt, inferna vero candida. Alæ infernæ cinereæ, ac desuper circa extrema nigræ, mox è fulvo rubescentes, deinde pallescentes ex fulvo, ac demum fulvescentes ex fulvo, ac demum fulvescentes circa dorsum. Piscibus victitat: mitescit minimo negotio, nec est cantu insuavis, indulgenter tamen ac blande vermiculis & aliis animalibus exiguis, quæ in paludibus gignuntur, ex alenda. Carne etiam vescitur, & aliis non paucis, ubi fieri aliter non possit. Crassi est nutrimenti, neque dissimile ei, quod anates feræ præsentare solent. *Indigena* est Mexicanæ plagæ, & vere educat inter juncta sobolem. Mirum est, cum sit cervix pro ratione reliqui coloris longissima, in quam brevitate illam. Cum libet contrahit, quod frequentius facere solet. Cauda pusilla est, nigraque, & nihil præ se ferens splendoris, quæ in majorem procedit amplitudinem. Patrio nomine appellant *tolcomotli*. Similis omnino esset hæc avis compari, nisi rostrum

Nieremb.  
l. 10 c.  
41. 35.  
36.

Nieremb.  
Hist. E-  
xot. l. 10.  
c. 22. 28.  
24.



strum desuper nigricaret, subtus rubesceret, velut pedes & crura, nec per universum corpus fulvum, nigrumque promiscue cerneretur.

## CAPUT V.

*De Avibus Iacacintli, Xlepapantotl, & Hoaçtli.*

Nie-  
remb.  
H. Exor.  
l. 10. cap.  
43. 44.  
45.

**I**acacintli seu rostrum spica mayzii, tres pæne spithamas est longa, virentibus cruribus, capite ventrequè cyaneis, sed in purpureum vergentibus, alis promiscue fulvis nigrisque, luscis oculis ac rostro, sed in coccineum prope exortum vergente, quod tres pæne digitos latas longum est, anteriori parte capitis depili & calva. Piscibus juxta lacus & flumina vivit. Edulis est ejus caro, sed nec bono, nec grato alimento.

XLEPAPANTOTL Anatis fere species est, importuna Mexicanæ paludi, rostrum tamen in acutum finit: nullus illi negatus color. Pulchritudinem varietas dedit, pulchritudo nomen.

Nec contemnendi spectuaculi est HOACTLI, sive TOBACTLI, id est, avis sicca, lacus Mexicani alumna, ternas spithamas à rostri ipsius acumine ad caudam postremam longa, ac gallinæ nostræ magnitudine. Crura prolixa, pedem, rostrum cum uncia trientem, crassitudine vero pollicem æquans. Superne id nigrum est, lateribus autem pallens, ac inferne nigrum & subfuscum. Oculi sunt magni, iris lutea, & palpebræ rubæ: vertex plumis nigris tegitur, itemque crista insigni, similiter nigra: collum, venter, corpusque universum candet: sed cauda cinerea est, velut & desuper alæ, nam infernæ sunt albidiores, superiores alarum partes virore quodam splendent. Dorsum, etsi candidis tegatur plumis, pennis tamen nigris in virentem splendorem inclinantibus vestiri solet. Pedes qui in digitos fissi sunt, & crura quoque, pallefcunt. Alba fascia circumcingitur caput, à rostri exortu ad oculos usque procedente. Lacus Mexicani advena est, vocaturque ab Hispanis indigenis, velut & quædam aliæ aves, martinete piscador, ob piscium quibus alitur capturam. Arundinetis educat sobolem, gravem infert morsum, ac gravem similiter vocem edit.

## CAPUT VI.

*De Avibus Heatototl, Achalalaçtli, & Amalozque.*

Nie-  
remb.  
H. E. l.  
10. cap.  
47. 48.

**I**Doneum quoque conspectum HEATOTOTL, seu avis ventis exhibet. Magna crista exornatur, orbiculari, ac coronæ

modo eminenti, & paulisper candida. *Pectus* è fusco vergit in cinereum: venter albus est, ac pedes plani: crura fulva, & pennæ circa ea ortæ: *cauda* orbicularis, & variata inferne candido, pulloque colore, superne vero fusca. *Alæ* subdus candentes, cinereæ ac pullæ sunt, desuper nigræ, candidis tamen quibusdam insertis pennis; reliqua verò eadem quæ aquaticis est natura.

Similis alteri HEATOTOTL, quæ anate domestica paulo minor est, rostro atro, tenui, obrotundo; ac prope extrema contorto, plumis inferne candidis, superne verò juxta femora fulvis, lineis tamen nigris intercurrentibus; circa residuum vero, & caudam fulvis. *Alæ* sunt subtus cinereæ; supernæ verò fuscæ, nigræ atque albæ. *Caput* est nigrum cristatumque, sed ab occipitio teniæ albæ utrimque procedunt ad oculos, qui atrii sunt, & lutea constant iride, cum cætera sint similes avibus incolentibus paludes.

Suus quoque torques argenteus honestat ACHALALAÇTLI, seu avem piscium vibratoricem. Alii vocant Michalaçti. Columbina est magnitudine, & forma, rostro nigro acuminato, tres digitos longo, & pro corporis proportionem crasso; caput crista ornatur è colore cyaneo in nigrum tendente, longaque. *Venter* candidis tegitur plumis, & collum torque candenti insignitur: *Alæ* inferne albescunt, sed postremis partibus videntur fuscæ, & candicantibus maculis interstinctæ, superne vero sicut reliquum corpus sunt cyaneæ, extremis partibus nigræ, & albis undique respersæ maculis. *Cauda* partim nigra, partim cyanea est, sed maculis albis per intervalla quoque variata. *Crura* rubea sunt, *pedes* diversi in digitos, in atros ungues desinentes; oculi nigri, & iris candescens. Advena avis est huic Mexicanæ regioni, versaturque juxta fontes & flumina, pisciculis & aliis aquatilibus victitans edulis, sed reliquarum avium palustrium sapore atque nutrimento.

Neque exiguus decore est AMALOSQUE, seu avi rubescentis colli. Palustris ea est, nostrati turturi magnitudine par, cruribus pedibusque in digitos fissis, atque ex albo rubescentibus nigris unguibus, rostro medio circiter longo, exili & nigro, atris oculis, & iride rubra, pectoris & ventris, & alarum inferna albæ sunt; sed cauda, quæ mediocrem magnitudinem nanciscitur, fulvo & nigro colore est inspersa: at collum pectusque torques bini, minimi fere digiti distantes intervallo, nigrique cingunt, quorum anterior undiquaque circuit, posterior superna deficit ac disparet parte. Ex utroque latere maculæ binæ candentes, pari amplitudine, supra oculos versus collum, illud fere attingentes, discurrunt. Superna



perna corporis, adeoque ipsa cauda, albo, nigro, fulvoque sunt colore; alæ vero de super fulvo & fusco. Indigena est avis, lacus Mexicani alumna, ac veris tempore educans sobolem. *Estur* caro, quæ eodem quo cæterarum aquaricarum est nutrimento. *Vescitur* ipsa culicibus, pisciculisque & vermibus lacustribus: vehementius *perstre-pit* quam pro corporis ratione, nectamen potest garrulis avibus adnumerari.

## C A P U T VII.

*De Avibus Farrensisbus.*

**I**Nsulæ Farræ à plumarum copia nomen adeptæ videntur. Cum enim avium sint foetura felices, nod mirum & plumarum abundare copia. Cæterum aves quæ ibidem reperiuntur, in aliquot distinxit classes Hojerus.

In prima CLASSE *Lindam*, *Alkam*, & *Lomwiam* invenies. Illa mole corporis Anate est inferior, rostro rubente & latiusculo, pectus candida, tempus & alas nigra, pedes rubra. Revertitur primo vere. In præcipitibus celsarum rupium cavernis nidificat. Ova gallinaceis tum colore tum magnitudine paria edit. Quo sub autumnum abeat ignotum.

*Alka* illa aliquanto major est, rostro lato & nigro, itemque corpore, nisi quod sub pectore & extremis alis albicat. Pedes nigri, caput denique fuscum, nisi linea alba ab utroque oculo ad rostri partem proximam duceretur. Nidificat in editissimis scopulis. Ova ex albo & nigro maculata ponit.

*Lomwia* quæ illa major, corpus totum est nigrum excepto pectore quod albet. Pedes nigri, rostrum nigrum acutum, oblongumque. Ova in editioribus scopulorum marginibus excludit, cyanei quidem coloris, sed lineamentis undique diversorum colorum mire variegata ac velut picta.

In altera CLASSE, duas diversas species ponit, quæ quod pedes ad incedendum inutiles habeant, nunquam terram ingrediuntur, & mole corporis minorem æquant Anserem. Prior *Ildbrimel* vocatur. Caput ejus fuscum, sub collo circulus albus, pectus candidum. Tergum & alæ nigricant, maculata passim punctis albis; pedes nigri. Forte est mergus Farrensis maximus Clusii. Creditur in undis marinis Alcyonis more foetum producere.

Altera est *Goisfugel* rostro admodum lato & incurvo. Capite oblongo atque nigro. Alis exiguis, pedibus nigris ad incedendum ineptis. Oculorum margines candido circulo tinguntur. Rarissime & nonnisi aliquibus annis visitur, nec ubi foetura operam det, ignotum.

Tertiam CLASSEM tres species for-

ma discrepantur, tempestatum prænuncie, & quæ in alto tantum Oceano versantur, constituunt. Primo est *Hafflert* seu Equus marinus, ut inconvenienter appellant, quæ magnitudine gallinam mediocrem, forma falconem utcunque æquat. Cinericio est colore, maculis albis passim interstincta, rostro incurvo velut falconis sed brevior. Ad ejus conspectum exhorrescere & littora legere piscatores solent. Certi tempestatem in propinquo esse noxiam.

Altera dicitur *Stormfinck* passere paulo major. Tota est grisea, sive maculis, rostro admodum exili. Pesagum præ superiore rectius dixeris. Siquidem super ipsos fluctus incredibili pedum velocitate transcurrere, ac nimbi instar ferri solet. Videtur illi cognata quam Oviedus *Pátines* à Nautis vocari reliquit. Catervatim si navigantibus appropinquet, deponenda esse subito vela innuit.

Tertiæ nomen est *Barnsfard*. Magnitudine hæc Passeri par, sub pectore candicans, collo dorsoque nigricans, rostro nigro & nonnihil latiore, pedibus rubris. Tam velocem se natando præstat, quam *Stormfincka* currendo.

In quarta CLASSE duæ diversæ Anserum species censentur. Prior *Helsingegans* capite & collo nigro, circulo albo cincto, pectore albo, alis gryseis, tergo cyanei coloris, pedibus rubris, magnitudine Anati respondens dicitur.

Altera *Erangans* anseris sylvestri pæne minor, capite & pectore griseis, collo rubro circulo cincto, alis, collo, pedibus rubris. Rarissime in Farris conspiciuntur, neque ibi fætificant. Unde veniant, & quo migrent, nemini cognitum. Mutationem magistratus ubi apparuerunt imminere, superstitione ex longa experientia credidit.

Ultimum locum sibi *Skua* vendicat, avis aquilino generi & corporis mole & rapacitate respondens. Rostrum habet curvum. Sed non admodum latum, pennas corpus regentes griseas, sola alarum extremitate albicante, pedes griseos. Pisce vescitur, sed & in omne genus avium grassatur. Foetum negligenter ex ovis griseis, grandioribus, anatinis similibus, quæ exilibus nigris maculis notata sunt, in apertis campis producit. Aliter eam describit Clusius, & eandem fere cum vulture aquatico Oviedi existimat.

## C A P U T VIII.

*De Avibus Lomsbay, Vulturibus aquaticis, Flamencos dictis, & aliis quibusdam.*

**A**VES LOMSBAY ab Hollandis dictæ, corpore sunt magno, alis parvis, ut mirum sit, tam gravia corpora attollere posse,

Ovied.  
Hist. Ind.  
l. 14. c. 1.

Clusius  
Exoticor.

Navigat.  
Holland.

Hojerus  
in Epist.  
ad Clu-  
sium.

Clus.  
Exo. l. 5.  
c. 5.



posse. Frequentes circa portum Lomsbay in insula Aurangia, volant, unde & nomen invenere. *Nidulantur* in præruptis montium locis. Unicum duntaxat ovum pariunt. Ab hominibus nihil metuunt, etiam si in suis nidis comprehendantur.

Nie-  
remb.  
H. Exot.  
l. 10. c.  
82.

**VULTURES AQUATICOS** facit **O-**viedus mole tam grandus quam magnus Larus est. *Rostrum* habent Larorum, sed magis mucronatum. *Pedes* diversi generis, sinistrum anatum & anserum instar planum, dextrum curvis unguibus instructum. *Vescuntur* piscibus & avibus, iidemque cum illis qui *Astures* aquatiles ab Hispanis vocantur, de quibus Hernandez in Paralipomenis agit, esse putantur. Frequentes sunt in Hispaniola & insula quæ à Divo Johanne nomen accepit.

De Laet.  
Indiæ  
Occid. l.  
I. c. II.

Avis quam Hispani **FLAMENCO** vocant, grui est forma non absimilis. Juniores habent plumas candidas, ubi adoleverunt, mira elegantissimorum colorum varietate distinguuntur. Gregatim volant, sed haud alte. Juxta littora insulæ Cubæ atque in ipsis marinis fluctibus *viçtum* quarunt, falsis undis ita assuetæ, ut quum ab Indis domi aluntur, (nam & cicurantur) sal potui earum necessario admisceatur.

Idem. l.  
I. c. 20.

Habent & insulæ *Bermudæ maritimas*, quæ in subterraneis cavernis cuniculorum instar, nidulantur & ova sua ponunt, magnitudine & colore gallinarum ovis paria, ipsæ carne sunt obesa, & grati nutrimenti.

Idem. l.  
IO. c. 5.

*Colophonem* isti de Exoticis Avibus promiscuæ historiæ imponant illæ in Peruano ciconiis majores. Plumis sine ulla mixtura candidissimis, cruribus altis Ratiores sunt. Binæ ut plurimum incedunt. Et piscibus victitant. De reliquis quæ ad sua genera referri poterant, vide Notas.

### TITULUS III.

DE

## AVIBUS

### BRASILIANIS:

Ex Georgii Marcgravii Historia  
Naturali Brasiliæ.

*De Avibus Brasilianis in genere notetur: Vix ullibi elegantiores Aves reperiri quam in Brasilia, si varietatem plumarum & colorum spectes; verum nulla fere suave canit, ita ut cantu longe à nostratibus superentur.*

### CAPUT I.

*Nhandugvacu. Iacana, varia ejus species.*  
*Curicaca.*

**N**HANDUGVACU Brasiliensibus, **EMA** Lusitanis; Struthio avis. Ingentes hic reperiuntur, minores tamen a-

liquanto Africanis. Longa illi *crura*, inferiora sesquipedem, superiora pedem circiter longa. Tres habent in pedibus digitos antèrversos, unguibus nigris, crassiss, haud acutis præditos; posterius unum digitum, sed rotundum, grossum, unde difficulter in area levi aut tabulato possunt incedere, sed facile labuntur. *Collum* gestant incurvatum, ut Cygnus vel Ciconia; Longitudine circiter duorum pedum: *Caput* anserinum, *oculos* nigros habent pulchros; *rostrum* compressum, non admodum latum, duos & semis digitos longum. *Alas* habent parvas, & ad volandum ineptas, quarum tamen unam instar veli erigentes citissime cursum promovent, ut vix, ac ne vix quidem à cane venatico superari possint. Plumæ habet gryscas per totum corpus, ut grus, in dorso longiores & elegantiores, & corpus plumis tectum fere rotundum apparet. *Caudam* non habet ejusmodi cristis præditam, ut vulgo pingitur, sed plumæ sunt per dorsum expansæ ad anum usque.

*Tesseræ* lusorias, aliaque ferramenta lubenter deglutit, sed non concoquit, at integra per anum reddit: *Vescitur* fructibus & carne.

Frequens in Capitaniæ Serigippo campis, itemque in Capitania Rio Grande. In Pernambuco non visitur. *Caro* illius bona ad comedendum.

**JACANA** Brasiliensibus, gallina aquatica, *Waterhun*/diversæ reperiuntur illius species, colore differentes. Hæc elegantissima, magnitudine Columbæ, sed cruribus multo longioribus, flavi coloris, cui viriditas immixta. *Crura* inferiora plus quam duos digitos longa, superiora (maximam partem nuda ut aquaticis) paulo minus: quatuor habet in pedibus digitos, quorum medius è tribus antrosum versis, duos digitos longus, reliqui duo paulo breviores, quartus retrorsum versus, pedem, aut etiam amplius longo: omnes autem unguibus semidigitum longis & flavis armantur. *Cauda* brevis ut gallinæ sylvestris; *pennæ* in dorso, alis & ventre ex viridi & nigro mixtæ, sub cauda albæ; versus collum, & in toto collo & pectore ejusdem coloris cum plumis quæ in collo pavonum aut columbarum quorundam visuntur. *Caput* habet parvum, ut gallina sylvestris, quod tegitur membranaceo quodam tegumento rotundo, coloris ut gemma Turcois. *Rostrum* rectum gallinaceum, plus uno digito longum; ab initio ad medietatem egregii miniati coloris reliqua parseximii flavi, cui aliquid viriditatis admixtum. Frequentissima in palustribus Brasiliæ locis ubique. *Caro* illarum edulis, sed haud magni pretii, sunt enim plerumque macræ. Alia species appellatur à Brasiliensibus

*Agua*



*Agua pecaca*, priori figura & magnitudine par; verum colore diversa & inferior. *Pennæ* illius sunt ut in dorso prioris, *alæ* magis brunefcentes: Carent autem mitella, at in qualibet ala interius habent corniculum directum, quibus se defendunt.

*Tertia* species prioribus figura & magnitudine equalis, colore autem differens, totum *caput*, *collum*, *dorsum*, *cauda*, nigri sunt coloris, initium alarum brunni: reliqua viridis; extremitates remigum brunni: *pectus* & infimus *venter* itidem brunni coloris, & uti crurum superiorum medietas superior. *Rostrum* rectum, croceicoloris, cum cuticula ruffa in exortu illius & parte capitis anteriori. *Crura* nuda, *pedes* cinerei. In qualibet *ala*, antica parte habet corniculum simile flavum.

*Quarta* species itidem figuræ est ut reliquæ. *Rostrum* illi flavum, mitella cutacea in initio capitis prope rostri exortum rubens, processus habens ad latera extensos more gallinarum Numidicarum. Totum *caput*, *collum*, *pectus* & infimus *venter* plumis vestiuntur nigri coloris, *dorsum*, *cauda*, & initium alarum ruffum, seu dilute brunnum; remiges alarum pennæ thalassici coloris cum extremitatibus nigris. Sed hæ remiges teguntur ruffis illis in exortu alarum, nec videri possunt nisi cum avis volat. *Crura* longa, *digiti* pedum longi, quilibet quatuor internodiis, cinerei coloris. Quælibet *ala* in anteriori parte habet corniculum acutissimum coloris crocei.

*CURICACA* Brasiliensibus à clamore dicta, *Masarino* Lusitanis, avis Numero, iudicio Clusii, similis: magnitudo illi mediocris Anseris: *capitis* autem magnitudo ut Anatis: *collum* sex digitos longum, tres crassum, aut paulo plus: *Rostrum* sex digitos longum, incurvum plane ut ensis Hungaricus, coloris ex igneo fusci. *Corporis* longitudo à collo ad podicem undecim digitorum, *caudæ* novem, desinentis cum fine alarum. *Crura* octo digitos longa, *pedes* duos & semis; rubri instar anatis sed non plani, quatuor digitis & unguibus nigris, tribus antierius, uno posterius verso. *Caput* & *collum* habet plumas albas flavo mixtas, & in superiore parte paulum oblongas: *Oculi* illi sunt nigri, circulo ruffo. Circa oculos & sub origine gutturis cutis nigra. Totum corpus nigris pennis vestitum, excepto dorso, capite & ventre, ubi cinereæ obscuræ, & in medio alarum albæ, cano mixtæ, ut in ciconiis. Reliquæ pennæ corporis, initii & finis alarum, & totius *caudæ* nigræ. *Tibiæ* superiores ad medietatem usque carent pennis, nam aquatica est avis.

*Carnem* bonam habet; quam sæpe comedi coctam & frixam butyro.

*Alia* species reperitur huic similis, sed

multo minor, & magnitudine fere gallinæ, quæ vocatur *matui tui*.

Frequens est ad Flumen S. Francisci, in Itapuama & alibi.

## C A P U T II.

*Tjiepiranga. Iacapu. Iambu. Gallina Africana.*

*Guiratangeima. Iupujuba, Sayacu. Ani.*

*Guira guainumbi.*

**T**JIEPIRANGA Brasiliensibus, Avis alaudæ magnitudinem paululum superat, & cantum passeris nostratis æmularur. Totum *corpus*, *collum* & *caput* egregie rubicundi seu sanguinei est coloris: *alæ* vero & *cauda* splendide nigri; præterquam in initio alarum, ubi aliquid rubicundi admixtum est. *Crura* nigra inferiora quidem nuda, superiora autem nigris penis vestita. *Rostrum* instar passeris, superiori parti nigrum, inferiori versus acumen nigrum, reliqua versus caput album. *Pennæ* in capite breviores, quas crispere interdum solet more Passerum. Omnes pennæ totius corporis interius sunt nigræ, exterius rubræ, ita tamen complicatæ, ut exterius totæ rubræ appareant. *Cauda* longitudine ferme tres digitos æquat. *Digiti* pedum quatuor & ut in plerisque avibus disporiri.

*Alia* hujus species reperitur passeris magnitudine; quæ pennis per totum corpus vestitur ex cinereo cærulescentibus; alæ tamen quodammodo ad thalassinum colorem accedunt. In ventre & inferiori parte colli seu gutture albicat, vel potius argenteo colore nitet. *Crura* cinerei coloris, ut & *rostrum*, quod ipsi simile Fringillæ. *Digiti* pedum quatuor secundum communem avium modum.

*JACAPU*, Brasiliensibus; Avis magnitudine Alaudæ, *cauda* extensa, alis brevioribus: cruribus brevibus & nigris; unguibus acutis ad quatuor digitos: *rostro* paulum incurvato & nigro, semidigitum longo. Totum *corpus* vestitur pennis nigris splendentibus; sub gutture tamen nigredini illi maculæ coloris cinnabarii sunt admixtæ.

*JAMBU* Brasiliensibus dicta avis est perdix, nostratibus quidem, magnitudine par, uti & figura. *Pennæ* autem per totum corpus obscure flavescentes, verum fusco mixtæ atque maculatæ.

*GALLINA* Africana ex Insula do Majo, magnitudine nostratium gallinarum, figura corporis fere ut perdix: *collum* item coronatum portans, & *caudam* perdicis habens inferius dimissam: *pedes* gallinæcos: *rostrum* flavum: & in capite mitellam cutaceam fuscam: ad latera porro capitis alba, ut & ad quodlibet latus prope *rostrum* cri-



flam rubram ad latus protensam. Totum *corpus* vestitur pennis nigris, quæ elegantissimis maculis albis variegatæ sunt, in alis quidem oblongis, in reliquis autem partibus rotundis; suntque in dorso minores, quam in reliquis partibus. Huic similes vidi è Sierra Lyona advectas, sed eorum collum circumligatum seu circumvolutum, quasi linteamine membranaceo coloris cinerei cærulescentis. *Caput* tegit crista obrotunda, multiplex, constans pennis eleganter nigris. Punctula albicantia per totius corporis ambitum, quasi umbra thalassina variegantur.

Congensibus hæc avis dicitur *Quetele*.

**QUIRATANGEIMA** Brasiliensibus; Avis paulo major Alauda, Picæ variæ æqualis. *Corpus* habet circiter tres digitos longum, *collum* sesquidigitum: *Caput* parvum, *rostrum* rectum, acutum, digitum longum, crura pedesque, ut reliquæ aves communiter: *Caudam* longam, rectam, quatuor digitos longam: Color *rostri* niger, excepta inferiori parte, ubi inseritur quæ aliquid fusci habet: *Caput* nigerrimum & collum usque ad initium pectoris. Colli superior pars à capite fere ad initium dorsi uranica est: per initium dorsi transversam habet maculam nigram usque ad alas extensam: *ale* autem sunt nigerrimi coloris, verum in medio secundum longitudinem habent maculam albam sesquidigitum longam: *Cauda* quoque tota nigra: reliquum corpus coloris uranici: *crura* subcærulea. *Oculorum* pupilla subnigra, albo subflavo.

Nidificat in altis arboribus *Acaya*, idque libenter prope ædes. Nidos egregios exstruunt hæc aves, cylindraceæ figuræ, & appendunt magno numero extremitatibus ramorum; qui constant è virgultis. Clamant fere ut picæ variæ nostrates.

**JUPUJUBA** seu **JABU** Brasiliensibus, ejusdem formæ cum præcedenti, & eodem modo in eadem arbore nidificans (una est fœmina, alter mas) cauda paulum breviori. *Corpus* habet totum nigerimis pennis vestitum: in utriusque alæ medio maculam flavam digitum longam; in extremitate dorsi, & prope anum tota est flava (vidi quoque totaliter nigras, dorso sanguinei coloris) cauda inferior ab exortu ad medietatem flava, reliqua medietas nigra, superius nigra in totum, solum in ea ad latera utraque usque ad medium pennam habens flavam. *Crura* nigra & pedes. *Rostrum* sulphurei coloris: *oculi* Sapphyrini, pupilla nigra: *linguam* cæruleam habet antè fissam seu duplicatam.

Prope ædes domini Ingenii *Tupucuraj* arbor *Uti* sita, in qua plusquam quadringenti nidi harum avium pendent, maxi-

moque numero sunt hæc aves, quæter quottannis ibi pullos excludunt: nidus autem quilibet ex arido gramine, & pilis equinis aut fuillis mixtis est compositus, coloris fusci, figura cucurbitæ angustæ cum suo alembico, longus in totum sesquipedem circiter, & ab infimo ad unum pedem altus, cavus ut bursa, reliquem superius ad semipedem simplum est, & sua extremitate pendet à ramulo extremo: omnes autem nidi ex ramulis minimis extremis arborum dependent.

**SAYACU** Brasiliensibus, Avis Fringillæ magnitudine: totum *corpus* vestitur pennis, coloris è cinereo & thalassino mixti, in alis autem & dorso thalassinum admiscetur, ita ut Sole illustratæ egregie splendeant; *rostrillum* nigrum, *oculi* quoque nigri in totum.

**ANI** Brasiliensibus; Avis Turdelæ magnitudine, totaliter nigra, pennis, rostro, oculis, pedibus *Caudam* longam erectam habet, sex digitos longam: *Rostrum* altum, latum, digitum aut paulo plus longum: inferior pars directa fere, superior alta, lata, semilunaris figuræ, & compressæ, ita ut acumen fere superius habeat. *Crura* & *pedes* fatis exiles, & in iis quatuor digiti, duo antè, duo posterius versi, more psittacorum. Clamat elata voce *yiiiyy* uno tono, in medio elevationi.

Frequentes sunt in sylvis omnibus, verum cibo inutiles.

**GUIRA GUAINUMBI** Brasiliensibus *Tupinambis*; avis magnitudine Columbæ ad visum, quia plurimas plumas habet, sed revera corpus non superat magnitudinem Turdelæ. *Caput* paulo majus habet quam Turdela: *rostrum* nigrum, duos circiter digitos longum, cujus superior pars paulo longior inferiore. Est autem *rostrum* superius & inferius in latera ferratum instar ferræ, inservitque dentium loco. *Crura* habet breviora, haud multum digitum excedentia, nigra; quatuor in pedibus digitos, quorum unus retrorsum vergit, tres antrorsum, sed primus versus interiorem pedis partem brevior, medius longissimus, & tertius iterum brevis, sed non æqualis cum reliquis exortus: primi enim exortus est ad pedem, secundi itidem, tertii vero prope tertium articulum medii, habetque primus tres, secundus quatuor, tertius ibidem tres articulationes, qui retrorsum vergit duas. *Ungues* nigri deorsum incurvati. *Cauda* longissima, directa pennis paudis rectis, digitum circiter lata, sed decem longa: & quidem duæ tantum pennæ extremam caudam constituunt, quæ ad duos digitos plumis carent, in extremitatibus autem rursus plumas habent ad duos digitos. *Corpus* totum sex circiter digitos longum



gum est. *Pennae* elegantissimæ: nimirum in capite quasi mitram gerit ex pennis Sapphyrinis, quæ prope exortum rostri Turcoidis colorem referunt: in medio autem hujus mitræ macula visitur nigra magnitudine grossi Misnici. Infra oculos (qui flavi sunt, pupilla nigra) etiam nigras pennas habet Sapphyrinis mixtas: *guttur* inferius, totum pectus & totus venter obscure luteum habet colorem; superior colli pars, totum dorsum, alæ & cauda viridis seu graminei est coloris, sed cui (præsertim in alis & cauda) thalassinus admixtus, ut in collis anatum & pavonum; à genibus ad ventrem crura superiora pennis virentibus sunt prædita. In medio collo inferius quasi pro insigni gerit tres vel quatuor pennulas nigras, & circum eas Sapphyrinas, quæ maculam quandam seu notam constituunt.

## CAPUT III.

*Iaguacati guacu. Mitu. Mituporanga. Ibijau.*

**I** A G U A C A T I G U A C U Brasiliensibus, *Papa Feixe* Lusitanis, nam piscibus victitat. Avis Turdelæ magnitudinem æquat; figura corporis ut Picus major. *Rostrum* habet nigrum, rectum, & in extremitate acutum, tres ferme digitos longum: *Oculos* nigros & *crura* brevissima nigra: superiora crura ex parte carent plumis; in pedibus digitos quatuor, (unum retrorsum) inæqualis longitudinis, duo enim versus exteriora pedis breves sunt, tertius interior longe brevissimus & remotior. *Ungues* nigri. *Cauda* duos digitos longa, excedens alarum fines. *Penna* totius corporis superiores, nimirum in capite, collo, alis, cauda sunt ferruginei coloris & splendentis: Circa collum transversim, annulum habet ex albissimis plumis; *guttur*, inferius collum, pectus, & totus venter pennis vestiuntur albis, prope utrumque oculum etiam maculam habet ex albis pennis: in cauda autem albæ pennæ interferuntur guttatim, ut & in alis, sed quæ vix videntur, nisi cum alas explicant & volant.

**MITU** vel **MITU** Brasiliensibus dicta avis ex Phasianorum est genere, major gallo gallinaceo. *Corporis* longitudo à collo ad exortum caudæ est decem digitorum: colli longitudo sex digitorum, totaliter nigris pennis est vestita, excepto ventre & sub ano, ubi brunni coloris est, fere ut perdix. Tenuiores sunt pennæ ad collum, caput, & in pectore, & holosericum illosum nigrum pulchritudine æquant. In summo capite habet pennas nigras complicatas in planissimam quasi mitellam, ut

nesciens vix possit agnoscere, quas irascens, aut etiam alias in cristam erigit. *Rostrum* habet insigne, non crassum, incurvatum, sesquidigitum fere longum; inferior parsejus parva, superior ferme quadruplo major. *Rostrum* autem coloris est egregii incarnati, versus acumen tamen albicat. *Crura* habet gallinacea decem digitos longa, nimirum quatuor à pedibus ad genua, & sex superius, atque hæc vestita pennis nigris: digitos item quatuor gallinaceos, qui in exortu usque ad primam juncturam cuticula sibi invicem annectuntur, ut in aliis quibusdam avibus. *Caudam* habet pedem longam, instar gallo-pavi, quam semper in latum movet, *Kit, Kit*, clamando, ut illi. *Caput* bene formatum, anserini magnitudine: *Collum* sex circiter digitos longum: *Oculos* habet magnos, egregios, nigros, & pone aures maculam cutaceam albescentem ut gallinæ. Mansuescit facile. Lubenter in alto sedet ut gallo-pavi, scanditque arbores, ut illi. *Carnem* denique habet admodum bonam. *Reperitur* & alia ejusdem species, quam *Mituporanga* vocant Brasilienses, solo rostro & pennis capitis differens; hæc *rostrum* habet haud longum, satis crassum non tamen ita altum ut *Mitu*, neque sic lunatum: ejus extremitas utrobique nigra, reliquum totum crocea cute vestitum, qualem & circa oculos habet. *Oculi* nigri egredi: collum & caput nigerrimas habet plumas instar holoserici, & in summitate capitis crispas atque cochleatim tortas habet pennas usque ad initium colli; has erigere in cristam crispam potest. Reliquum totius avis nigrum, cui nigredini hinc inde aliquid viridis transplendet. Circa anum albas obtinet pennas: *Crura* cinerea, figura ut *Mitu*. *Cauda* nigra, sed extremitates illius pennarum albæ. Et hæc quoque avis optime mansuescit.

**IBIJAU** Brasiliensibus, *Noitibo* Lusitanis: Avicula Hirundinis magnitudine: *Caput* habet latum & compressum: *oculos* magnos, elegantes, nigricantes, pupilla atra splendente ellipticæ figuræ, exterius autem oculos ambit circulus ex albo flavescens. *Rostrillum* minimum habet, quod non excedit crassitiem dentis aranei, nec tam est longum: nares tamen patent in rostro: *Os* amplissimum, quod clausum non potest videri; at quando *rostrillum* aperit, os ad oculos diducere potest, ita ut digitum fere sit amplum; *Linguam* habet minimam. *Crura* albæ, & secundum corporis molem parvula, vix semidigitum longa; quatuor in pedibus digitos, tres antérieurs, quartum retrorsum versum; unguibus incurvaris nigricantibus. Secundum longitudinem in unguiculo digiti medii cujuslibet pedis versus interiora habet pinnam quasi



multipliciter sectam, seu dentatam, videturque unguiculus quasi plumatus versus interiora, sed non sunt plumæ, verum cutacea materia & aspera. *Caudam* habet elegantem, quam in latum potest explicare, duos digitos longam, cum ejus extremitate etiam alæ definunt. *Pennas* in toto inferiori corpore habet ex albis & nigris mixtas, ut Nisus: In capite, dorso, alis & cauda nigricant, & albedo inspersa grata varietate: nonnihil quoque flavedinis albedini admixtum: uno verbo, nigra est & punctulata subtiliter hinc inde.

*Reperitur* & species hujus magnitudine Noctuæ, ejusdem coloris & conformationis. *Os* quando aperit, pugnum humanum facile admittit.

## CAPUT VI.

### *Guainumbi varia species.*

**G**UAINUMBI quæ & *Guinambi*, item *Aratica* & *Aratarataguacu* vocatur à Brasiliensibus, à Lusitanis *Pegafrol*, à nostratibus potest appellari *Bloemen Specht*. Hujus autem multæ hic reperiuntur species.

*Prima*: Totius corporis aviculæ longitudo ab initio capitis (ubi rostrum est insertum) ad exortum caudæ duorum digitorum. *Capitis* magnitudo una cum pennis magnitudinem cerasi dulcis mediocris æquat. *Colli* longitudo tres quartas partes digiti, corporis longitudo unius digiti est & quadrantis. Magnitudo autem corporis cum pennis olivam grandem vix æquat, *Rostellum* habet sesquidigitum longum, subrotundum, æquale, tenue, & valde acuminatum, rectum palulum tamen versus extremitatem dorsum versus; color hujus niger, excepta inferiori parte prope exortum, ubi rufescit. *Linguam* habet duplicatam, seu bisectam, tenuissimam instar serici fili tenuissima, albam, longam, ita ut illam longe extra rostellum possit exserere: *Ocellos* parvos nigros. *Crura* & *pedes* minimos brevesque, nigri coloris, in pedibus quatuor digitos, tres antérieurs, unum posterius versus, longis, simularibus, acutissimisque unguiculis nigris præditos. *Caudam* habet directam, digitum longam, quatuor ut plurimum pennis constantem. *Alæ* autem quæ duorum digitorum longitudinem habent, ad extremitatem caudæ fere pertingunt, pennæ singulari arte à natura sunt compositæ. Ab exortu enim alarum ad tres quartas partes digiti circiter duplex ordo pennarum est, unus longior altero, & superpositæ sunt sibi invicem pennæ, quasi alæ breves super longas. Hinc post has pennas, alæ pennæ (quarum circiter decem sunt) sequens interior semper longior sit antecedente exteriori, ita ut intima sit omnium longissima

finem alæ definiens. His alis expansis volare diu potest, ac in aëre quasi pendula manere; inter volandum strepitum edit instar *bruchi*, seu rectius *hur, hur, hur*, instar rotæ linteariorum quæ circumvolvitur: admodumque tenues apparent & transparentes pennæ alarum expansarum. *Color* plumarum aviculæ per totum caput, collum superius & ad latera, per dorsum totum & initio alarum est resplendens mirifice, nec à pictore bene exprimi potest; nam viriditati, qualis in Pavonum & Anatum collo, aureus, igneus, flavus mire admixtus est, ita ut Sole illustrante mirifice splendeant. In gutture, inferiori collo, pectore & toto infimo ventre, cruribusque superioribus albæ sunt pennæ, quibus in collo inferiori eximii coloris simul sparsim admixtæ, in ventre albis subjacent nigræ.

*Alarum* initium miro colore constare dixi, reliqua pars tota brunna est, seu spadicei coloris splendentis. *Cauda* pennis constat coloris instar chalybis politæ cærulescentis. *Vicitat* floribus solum, ideo capta viva detineri non potest, sed moritur. Frequentes autem in floribus arboris, quæ Mense Januario potissimum floret, & potest aliquis vel sexaginta uno die sclopeto figere. Inveniuntur & super aliis arboribus variis. Toto autem anno, magno numero in silvis inveniuntur, & præsertim matutino tempore ingentem strepitum excitant: Non autem canunt, sed clamant, *Screp, Screp, Screp*, uno sono & continenter, fere ut passeris. *Volantes* velociter alas movent, & cum vix videantur, & per longum temporis spatium in aëre velut quietæ, vel se moventes hæere possunt alarum ope. *Flores* rostellis carpunt inter volandum. *Nidum* faciunt in ramis arborum solidi Hollandici magnitudine. *Ova* ponunt albißima testa, duo ut plurimum, ovalis figuræ, pisco haud majora.

*Secunda*: Pulchrior priori, ejusdem magnitudinis & figuræ. *Rostellum* tamen brevius, nimirum duas tertias partes digiti longum, ejusdem figuræ & coloris cum prioribus; *Lingua* eadem, ut & ocelli, crura, pedes, cauda & alarum figura. Plumarum color in capite, collo superiori, dorso, alis, cauda similis priori; at in gutture, seu collo inferiore, toto pectore & infimo ventre usque ad extremum corporis, tam elegantis & splendente viriditate cum aureo colore transplendente sunt plumæ, & mire resplendeant. Prope anum macula est satis magna (respectu aviculæ) constans plumis candidissimis.

*Tertia*, minor reliquis omnibus. Ab initio capitis, seu exortu rostri ad exortum caudæ duos & semis digitos longa. *Collum* unum fere digitum longum: *Caput* haud magnum. *Corpus* sesquidigitum longum.

*Rostel-*



*Rostellum* paulo plus digito longum, nigrum, subrotundum, acutum ac fere rectum. *Crura* & pedes, ut reliquarum. *Pennarum* corporis & alarum etiam eadem dispositio, sed color diversus. *Caudam* longiorem habet reliquis omnibus, paulo plus tribus digitis longam, pennis constantem, quarum ea quæ exortui ejus vicinior, brevior, secunda semper longior; estque cauda furcata, & avicula volans eam in duo amplissima cornua expandit, ita ut extremitates cornuum sesquidigitum à se invicem distent. Totum *Caput* & collum hujus aviculæ ex nigro serico colore elegantissime cæruleum transplendet, ut in collo Anatæ. Totum *dorsum* & pectus viride, aureum, & thalassino transplendens, ut in secunda specie, atque etiam prope anum talis macula est è plumulis albis. *Alarum* color epaticus est. *Cauda* ex nigricante cœrulenti instar polito ferri cœruleo imbuti.

*Quarta*, paulo minor tertia: Corporis figura & plumarum dispositio eadem, sed alio colore, nec non differens rostro, & crurum colore. *Rostellum* sesquidigitum longum, deorsum incurvatum instar ensis Polonici, subrotundum, ubique æqualis crassitie, & in extremitate acuminatum. Superior ejus pars nigra est, inferior flava, excepta extremitate quæ etiam nigricat. *Caput* superius, collum superiori parte, ut & alæ, colore sunt, ut prima species, guttur, collum inferius, totum pectus & infimus venter ex albo rufescentis sunt colores. *Caudam* habet plus digito longam, desinentem cum fine alarum, constatque pennis ex nigricante virescentibus, quæ in Extremitatibus albæ. *Crura* eodem modo disposita habet, ut cæteræ species, sed haud nigra, verum alba seu flavescens, similibus digitis, & unguiculis semilunaribus, acutis, & nigris.

*Quinta*, magnitudine par tertiæ speciei: *Rostello* nigro, paulo plus quam digito longo, & paulum deorsum incurvato, ocellis nigris, uti & cruribus & pedibus. *Guttur*, collum inferius, & totus venter nigris holosericeis vestiuntur pennis, cui nigredini quasi paulum cœrulei transplendet. Prope anum macula est albis plumulis. Extremitates autem nigri, nimirum ad latera colli, pectoris & ventris mire thalassino, aureo & viridi mixti resplendent. Totum *caput* superius, collum superius, & totum *dorsum* ornantur pennis, aureo, igneo & viridi mixtis, ut & initium alarum. Reliquum alarum ferreum est, seu fuscum. *Cauda* paulo plus digito longa, eleganter brunnis, cui cœruleus transplendet, pennis constat, circa oras autem pennæ illæ habent colorem, qualem chalybs politus cœrulescens.

*Sexta*, quintæ magnitudine par. *Rosfel-*

*lum* habet paulum curvatum, digitum longum, inferius album, superius nigrum. Totum *caput*, collum, dorsum & venter, ac initium alarum insignis coloris resplendentis pennis vestiuntur, nimirum plurimo aureo, dimidio fere igneo, & minimo viridi mixto. In summa, splendet ut Sol. In ventre pennæ albæ paucae mixtæ. *Crura* nigra sunt. *Alæ* nigricantes. *Cauda* sesquidigitum ferme longa, elegans & lata, constans pennis quibusdam insignis illius coloris, quo reliquum corpus, quædam ex viridi & aureo mixti coloris, & per oras albæ, quædam in uno latere, seu medietate albæ altero virides, cui transplendet aureus.

*Septima*, paulo minor quinta & sexta specie. *Rostellum* habet non omnino digitum longum, coloris per totum corpus cinerei fere, ut passer, cui hinc inde mire resplendens rubrum instar Rubini perlucet.

*Octava*: omnium elegantissima. *Rostellum* rectum, nigrum habet, semidigitum longum; *Linguam* longam duplicatam: magnitudo & conformatio est ut secundæ speciei. Totum *caput* superius & collum superius miro rubini colore fulgent, ac si rubinus radiis solis illustraretur. *Guttur* autem & collum inferius merum aurum Hungaricum politum, & radiis solis illustratum exhibent, ita ut impossibile sit perfecte similitudinem horum colorum reddere, multo minus à pictore repræsentari. Initium *dorsi* holosericea nigredine tectum est, reliquum fuscis pennis, quibus tamen aliquid obscuræ viriditatis admixtum. Totus infimus *venter* ejusdem cum dorso coloris pennis vestitur; *Alæ* fusco ut in reliquis speciebus: prope anum maculam habet albam. *Crura* exilia nigra. *Cauda* digitum, & paulo plus longa, pennis constat brunnis rufescentibus (*feulemort*) quæ in extremitatibus per oras fuscescunt. *Cauda* lata, quam inter volandum egregie explicat. *Alarum* extremitas cum cauda desinit.

*Nona*, figura & magnitudine, ut prima. *Rostellum* superius nigrum, subtus rufum. Totum *corpus*, exceptis alis, insigni illa splendet viriditate cum aureo transplendente, quali secunda species in ventre. *Alæ* fuscæ, *Cauda* digitum longa, latiuscula, pennis constans coloris, ut ferrum politum cœrulescens.

Sortitur autem avis hæc varia apud Brasilienses nomina, præter generale *Guainumbi*, ut *Guaracyaba*, id est, radius Solis, & *Guaracigaba*, id est, capillus Solis. Fr. Ximenes scribit à Mexicanis appellari *Huitzitzil*. Avicula est, inquit, quæ habet plumas pictas variis coloribus, è quibus mixtis & compositis cum artificio, & admirabili industria faciunt Barbari imagines Sanctorum & aliarum rerum, atque ita conjungunt, ut optime similitudinem repræsentent.



tent. Hujus aviculæ ea natura est & proprietas, quod non diutius vivat, quam flores plantarum durant, cujus melle victitat, quibus decidentibus, rostello suo se affigit arborum truncis, & sex mensibus ita immota manet, donec flores renascantur: quod tam multis testimoniis confirmatur, ut de eo dubitari non debeat. Ajunt pulverem hujus aviculæ haustum, curare arthritidem coralloidem. Hæc ille. Vidimus plures ejusmodi icones artificiose ex hujus aviculæ plumis concinnatas ita dextre, ut coloribus picta viderentur; si autem Soli obvertas, mirabiliter splendet.

## CAPUT V.

*Iacupema. Iacacaii. Iacurutu. Scoco.  
Matuitui.*

**J**ACUPEMA Brasiliensibus, Phasiani est species; paulo major gallino minore domestica nostrate. *Caput* illi gallina-ceum haud magnum; *Rostrum* gallina-ceum: *Oculi* nigrescentes, *collum* septem circiter digitos longum; *corporis* autem longitudo ab exortu colli, ad exortum caudæ novem circiter digitorum. *Caudam* habet longam & latam, longam nimirum pedem. *Crura* longa, superiora plumis vestita & quinque digitos longa, inferiora tres, aut paulo plus. In pedibus quatuor digitos gallina-ceos, quorum medius è tribus anterioribus duos digitos longus. *Plumis* tota avis vestitur nigris, quibus brunni aliquid mixtum. Ac capitis quidem plumas in cristam erigere potest. Cingunturque illæ nigræ aliis albis in ambitu. *Guttur* sub capite, & ad sesquidigiti longitudinem, in collo plumis nudum est, & rubra cute tectum. *Collum* totum inferius plumulis albis in nigris dispersi est variegatum, ut & totus infimus *venter*, ac alarum medietas posterior: superiora crura & cauda solis nigris constant, cui aliquid brunni mixtum. *Crura* inferiora & *pedes* elegantis rubri coloris. Cicurantur. *Carnem* habet bonam. Hæc avis à clamore suo nomen accepit, clamat enim *Iacu, Iacu, Iacu*.

**JAMACAII**, Brasiliensibus. Avicula Alaudæ magnitudine. *Corpus* tres digitos longum, *collum* plus digito, *crura* duos digitos, *cauda* fere quatuor. *Caput* habet parvum: *Rostrum* digitum longum, directum, paulum deorsum inclinatum, acutum, nigrum quidem, at inferius prope exortum paululum cœrulescens. *Caput* nigris vestitur pennis, uti & *collum* inferius, superius luteis: totum *dorsum*, *pectus*, & infimus *venter* luteis, *ale* nigris, in quorum medietate albæ insertæ, quæ maculas albas faciunt, in qualibet ala unam: ad exortum alarum transversim per dorsum tendit nigra

macula: *Cauda* etiam nigra. *Crura* & *pedes* fusci. Elegans est avis.

**JACURUTU** Brasiliensibus. *Bufo* Lusitanis. Noctua est, magnitudine æquat Anseres: *Caput* habet rotundum instar felis. *Rostrum* aduncum, nigrum, superiori parte longius. *Oculos* magnos, elatos, rotundos, & splendentes instar CrySTALLI; in quibus interius circulus flavus versus extrema apparet. Latitudo oculorum aliquanto major grosso Misnico. Prope aurium foramina plumas habet duos digitos longas, quæ instar aurium in acutum desinunt & attolluntur. *Cauda* lata est; neque alæ pertingunt ad illius extremitatem. *Crura* pennis vestita usque ad pedes: in quibus quatuor digiti, tres antè, unus postè versus, atque in quolibet unguis incurvatus niger, plus quam digitum longus, & acutissimus. *Penna* totius corporis variegata è flavo, albo & nigricante pereleganter.

**SOCO** Brasiliensibus, avis Aquatica, cujus multæ hic observari possent species; hæc cujus Iconem addimus, magnitudinem habebat Ardeæ minoris. *Rostrum* obtinet rectum, nigrum, & in extremitate acutum, duos & senis digitos crassum, ubi crassissimum. *Caput* illi instar Ardeæ, uti & *collum* pedem longum. *Oculi* nigri circulo aureo. *Alæ* & *cauda* simul desinunt: *Cauda* enim brevis, nec supra quinque digitos longa. *Crura* satis longa, superiora quippe quatuor, & inferiora totidem digitos: in pedibus porro quatuor digitos, videlicet tres antè, unum postè versus. *Crura* autem superiora ad medietatem sunt nuda pennis: cætera fusca cute tecta. *Caput* & *collum* brunnis quidem pennis, sed quæ punctulis nigris variegatæ sunt, vestiuntur. Per totum collum inferius ad pectus usque tendit linea plumis albis, nigris & brunnis mixta. *Dorsum* & *alæ* nigris quidem, sed quæ minutissimis punctulis flavescentibus variegatæ sunt, vestiuntur; *Venter* quoque ad eundem modum: sub alis denique nigræ, & albo maculatæ sunt pennæ.

**MATUITUI** Brasiliensibus, Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* habet rectum, nigrum quidem, at in exortu inferius croceum. *Oculos* elegantes nigros. Totum *Caput* superius, *collum*, *dorsum*, *alæ* & *cauda* superius coloris sunt obscure grysei, & remiges alarum nigricantes. *Caput* inferius, *guttur*, *pectus*, & infimus *venter* albicant; ut & *crura* superiora, quæ mediam partem pennis vestita, more avium aquaticarum. Supra exortum rostri in fronte maculam habet albam, & anulum album circa collum, & inferius semiannulum obscure gryseum, huic contiguum: nam guttur totum album est, collum superius totum



tum obscuru gryseum. *Crura* sunt subluteola; *digiti* autem *pedum* aliquid fusci admixtum habent. Tres solummodo *digitos* habet in *pedibus*, omnes antèrius verios, qui in exortu cute ex parte junguntur: *Unguiculi* nigri.

Avis hæc ad littora maris & ripas salforum fluminum discurret.

## CAPUT VI.

*Iabiru. Iabiruguacu. Manucodiata.*

**I**A B I R U Brasiliensibus, Belgis vulgo Negro. Avis hæc magnitudine superat cygnum. *Corpus* illius quatuordecim *digitos* longum: *Collum* totidem, & brachii humani habens crassitiem. *Caput* satis magnum, *Oculi* nigri, *Rostrum* nigrum directe extensum; & superius versus extremitatem paulum incurvatum; undecim *digitos* longum, duos & semis latum; versus exteriora acuminatum; estque superior *rostri* pars paulo altior, & major inferiori. Caret lingua, & sub gutture ingluviem habet mediocris magnitudinis. *Crura* longissima, duos nimirum *pedes*: superiora enim unum *pedem* & *digitum* longa, & mediam partem pennæ nuda; inferiora undecim *digitos*. Sunt autem *crura* recta, nigricantia, & quasi squamata; *digitum* medium crassa. In *pedibus* *digiti* quatuor, tres antèrius, unus postèrius versus; quorum medius quatuor *digitos* longus, cæteri paulo breviores. Tota avis vestitur albis pennæ instar cygni aut anseris. *Collum* fere totum, nimirum octo *digitorum*, longitudine à capite numerando, caret pennæ; ac hujus medietas cum capite tegitur nigra cute, reliqua alba cute. Sed puto in cute hæsisse pinnulas albas, & fuisse abreptas. *Cauda* lata definit cum extremitate alarum.

**J**A B I R U G U A C U Petiguaribus, *Nhandu opoa* Tupinambis: Belgis *Deurvogel*. *Rostrum* habet magnum, septem & semis *digitos* longum, in extremitate teres & inferius incurvatum; caret lingua, & *rostrum* inferius canum est. In summitate capitis mitram osseam coloris albi, & cinerei mixti gerit. *Oculi* nigri, & pone eos aurium foramina ampla. *Collum* decem *digitos* longum, cujus medietas, uti & caput, plumis, ac cute squammosa cinerea est tecta, cujus squamæ albicant. *Corpore* æquat Ciconiam; *Caudam* habet brevem & nigram, cum qua alæ definunt. *Crura* superiora ex parte albis vestita pennæ, cætera tota cinerea, & quidem superiora *crura* longa sunt *digitos* octo, inferiora sex, aut paulo plus: *digiti* *pedum* quatuor, ut in priore. Totum *corpus* & *collum* albis vestitur pennæ, & à collo longiusculæ pennæ propendent & circum. *Alæ* albæ, remiges illarum pennæ

nigræ, rubini colore transplendente in nigro. *Pellis* detrahitur huic avi, ac caro ejus cocta comeditur; pinguis est & sicca, boni saporis, præsertim si cocta butyro frixetur. Comedit sæpissime.

**M**A N U C O D I A T A, & quidem Rex creditus; ad aspectum Columbam, sed revera hirundinem æquabat. *Caput* habet parvum, *Oculos* parvos, *rostrum* rectum, satis crassum, acuminatum, sesquidigitum longum: *Collum* *digitum* longum; *Corporis* autem longitudo à collo ad caudæ exortum vix trium *digitorum* & semis. *Alæ* supra septem longæ; *Cauda* lata & sex *digitos* longa. *Crura* duo habet, quodlibet inferius duos *digitos* longum; quatuor *digitos* in *pedibus*, tres antèrsum, unum retrorsum versus, more communi; medius anteriorum paulo longior cæteris; postèrior etiam satis longus; quilibet ungue lunato, seu adunco accipitrino forti præditus. Suntque *crura* & *pedes* satis crassi, ac ad rapinam comparati. *Ala* & *cauda* pennas habent latas & fortes *digiti* latitudine. Totum *dorsum*, infimus *venter*, alæ, *cauda* elegantis sunt brunni coloris; superius ad *rostrum* pennulas habet holosericum leve referentes, viridi & fusco mixtas; inferius ad *rostrum* similes nigri coloris. *Collum* superius flavi, seu aurei est coloris, inferius viridis cum aureo transplendente. *Pectus* saturate brunnum; sub alis in lateribus inter alas & *crura*, exoriuntur multæ pennæ, *pedem* plus, vel minus longæ, elegantis structuræ, quæ supra *caudam* longe extenduntur: sunt autem prope exortum flavi, seu aurei coloris, reliqua ex albo flavescentes, brunno umbratæ, seu dilute intermixtæ: inter has pennas duo quasi fila extenduntur; quodlibet longum duos *pedes* & amplius, ac versus extremum incurvata, obscure brunni coloris. *Crura* fusca sunt, unguibus magis albicantibus. *Rostrum* coloris est ex viridi & cœruleo mixti, versus acumen tamen albicans.

Hæc est illa avis, quam alii Paradiseam vocant: cujus aliquod reperiuntur species.

## CAPUT VII.

*Guirapunga utraque. Guiraquerea. Iacamaciri. Cariama.*

**G**U I R A P A N G A Brasiliensibus; Avis cujus sonus longe auditur; Turdellæ majoris magnitudinem superat, & columbæ fere æquat. *Rostrum* habet *digitum* longum & latum, antèrius acutum, cujus superior pars paulum prominet super inferiorem, ac deorsum est incurvatum, nigrum, naribus patentibus. *Os* illi amplum, quod aperire potest usque sub



oculos, ita ut oris apertura cum rostro triangulum formet. *Linguam* habet brevem. *Oculos* è nigro cœruleoscentes. Sub gutture autem, quod latum habet, & in collo inferiori, multas digitum longas propendentes particulas carneas nigras habet, figura spiculi hastæ, vel quasi ligulæ. *Caput* obscure brunnis pennis vestitur. Totum *collum*, pectus, venter, dorsum & crura superiora leucophæis teguntur pennis, (quibus potissimum in dorso) nigricantes admixte, ac versus caudam etiam virescentes. *Caudam* habet tres digitos longam, leucophæis ac nigricantibus pennis pauca viriditate admixta. *Alæ* (non multum post exortum caudæ desinentes) in initio sunt nigræ, reliquam partem nigricantes, quibus obscure virescentes pennæ admiscuntur. *Crura* inferiora nigricant, suntque plus digito longa; digitos quatuor habet cum cæteris communes, nigris unguibus: *Pectus* bifidum est, seu convallem habet per medium secundum longitudinem; tracheam amplam, unde etiam fortem clamorem potest edere. Duplicem autem sonum edit promiscue, una vice quasi quis securi percuteret cuneum ferreum, in silva (*cock, cick*) altera autem quasi quis campanam fissam tangeret *Kur, Kur, Kur*, &c. Clamat autem solum media ætate, Decembris & Januarii initio per quinque aut sex septimanas, reliquis mensibus non auditur; unde Lusitanis *Ave de Verano* vocatur.

**GUIRA PUNGA**, foemina; Turdelæ nostræ majoris magnitudine est & figura, & eodem modo carnosa. *Caput* habet latiusculum, *rostrum* quoque latum, haud longum, *oris* hiatus amplus quando aperitur. *Rostrum* nigrum. *Oculi* satis magni. *Cauda* tres digitos aut paulo plus longa, nec alæ ad illius finem pertingunt. Tota avis vestitur pennis nigricantibus, quibus fuscæ & dilute virentes sunt mixtæ: magis tamen fuscus est in dorso color, in gutture, pectore, & ventre magis dilute virens, & mixtus ut nostræ turdelæ. Avis est pinguis & copiosæ carnis. *Crura* & pedes nigricant, cætera nihil differunt à communi norma.

**QUIRAQUERA** Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine, sed quia longas alas, & caudam habet multo longiorem, videtur major. *Caput* latum, compressum, ac satis mangum habet. *Oculos* magnos & nigricantes; *rostellum* parvum, triangulare, compressum, & superiore parte aduncum. *Os* amplum, longe amplius rostro, quod apertum triangulum efformat. Ad utramque autem extremitatem rostri superioris ad latera digiti fere longitudine, in quolibet decem, aut duodecim circiter setas crassas suillas habet pro-

tenfas antèrius & ad latus. *Corpus* haud longum, sed rotundum fere est. *Pedes* quatuor digitis more communi constant, quorum medius longior reliquis; & unguiculo suo (quos omnes habet nigros) pectine corneo subtiliter ferrato dotatus est. *Alas* longas habet, nimirum semipedem. *Cauda* octo digitos longa, constans in extremitate duabus pennis longioribus reliquis. Tota avis ex fusco cinerei coloris cum maculis obscure flavis aut albicantibus mixtis, more Nisi. Circa totum collum autem pone caput annulum habet obscure aureum. *Crura* cinerea seu fusca. *Digit*i exigua pellicula connectuntur, non ita lata, ut in anatibus, nam non est avis aquatica.

**JACAMACIRI** Brasiliensibus, Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* rectum, acutum, nigrum habet, duos digitos fere longum. *Linguam* brevem. *Oculos* cœruleos. *Alas* breves, quæ paulo post exortum caudæ desinunt. *Cauda* autem tres & semis digitos fere longa, recta, septem aut octo pennis constans. *Crura* superiora pennis vestita, inferiora nuda, cute flava & viridi mixta. *Pedes* itidem. In quolibet pede quatuor habet digitos, duos antèrius, duos posterius versos; estque uterque interior, tam antèrius, quam posterius, dimidiam tantum partem longus præ exterioribus. *Unguiculi* nigri.

Totum caput, collum superius, totum dorsum, alæ, cauda superius coloris sunt viridis cum aureo & igneo mixti, ita ut mirifice resplendeat; ejusdem coloris annulus etiam circumdat collum. Sub gutture autem, in pectore & infimo ventre, & sub cauda obscure flavi coloris est, ut cera vetusta.

**CARIAMA** Brasiliensibus, Avis Ardeæ majoris magnitudine; ex aquaticarum est genere: In capite super exortu rostri cristam plumatam gerit nigram cinereo mixtam, erectam. *Rostrum* breve, superius paulo aduncum, ex obscuro flavo fuscum. *Oculos* habet elegantes aureos, pupilla nigra, longis superciliis nigris. *Alæ* desinunt paulo post exortum caudæ. *Crura* habet longa, superius mediam partem pennis vestita, cætera nuda & obscure flava: *digitos* tres in pedibus, medium longissimum anteriorem brevior, posteriorem adhuc brevior. Suntque digiti ad partem cute connexi. In postica parte pedis digitorum parvum habet, altiori loco positum, & calcaneum rotundum, more Struthionis. *Ungues* digitorum breviusculi, lunati, fusci. Totum *corpus* pennis vestitur gryseis, seu cinereis fusco undatis, ut in falconibus, & obscure flavo mixto: extremitas alarum & caudæ fusca est, obscure flavo, & gryseo undata: in pectore & inferiore ventre plus habet grysei. *Caudam* demissam, collum ere-



rectum gerit. *Clamor* ejus instar gallo-pavi  
foeminæ, & longe auditur. *Carne* est valde  
probata.

## C A P U T VIII.

*Guara. Urutaurana. Maguari. Guaranna. Aja-  
ja. Picui pinima. Pica Cureba. Tuidara.  
Guacaguacu. Tapera.*

**G**UARA Brasiliensibus (in Marahoon  
frequentissima, & Rio pe Ieneiro)  
avis est aquatica & terrestris, Albardcolæ  
magnitudine. *Rostrum* habet ensis Poloni-  
ci figura, longum, ex albo subcinerescens.  
*Oculos* nigros. *Collum* & *corpus* instar Albard-  
colæ. *Alæ* desinunt cum cauda, quæ bre-  
vis & demissa. *Crura* longa, quorum supe-  
rior medietas pennis vestita, reliqua nuda.  
*Digit*i pedum quatuor communi modo  
longiusculi, brevibus unguibus, prope ex-  
ortum cute inter se connexi: crura autem  
nuda cum pedibus coloris ex albo grysei,  
uti & rostrum.

Tota avis vestitur pennis elegantis co-  
loris coccinei; remiges tantum alarum ni-  
gras habent extremitates. Hæc avis pri-  
mum exclusa coloris est nigricantis, hinc  
evadit cinerei, deinceps albi, sensim au-  
tem rubescere incipit, & secundo ætatis  
anno coloris est in totum, quem *Columbin*  
vocant, quoque magis senescit, elegantissi-  
mum illum colorem coccineum acquirit.  
*Vivitat* piscibus, carne, adjuncta semper  
aqua.

Brasiliiani è plumis hujus avis varia com-  
ponunt corporis ornamenta.

URUTAUANA Brasiliensibus: &  
*Urutau cuquichu Caririri*, Avis Aquilæ ma-  
gnitudine. *Rostrum* habet nigrum, cujus su-  
perior pars adunca, prope exortum tamen  
flavum; *Oculos* eleganter aureos, pupilla  
nigra, quos cuticula cinerea obducere po-  
test, licet palpebras non claudat. *Caput*  
aquilinum quidem sed superius compres-  
sum, seu planum, in cujus summitate duas  
habent pennas nigras, duos circiter di-  
gitos longas, cum duabus parvulis ad latus  
quod libet: illas autem quando vult, in al-  
tum surrigit, atque iterum componit, *Alæ*  
paulo post exortum caudæ desinunt. *Cau-  
da* ei lata instar Aquilæ. *Caput* superius fu-  
scis tegitur pennis, quarum oræ subfla-  
vescunt. Totum *collum* superius, & ad la-  
tera brunnis (ut perdix:) totum *guttur*  
cum collo inferiori est album, ita tamen, ut  
albedo ad latera pennis nigris sit variegata.  
Totum *pectus* & infimus *venter*, crura supe-  
riora & inferiora usque ad pedes pennis  
vestiuntur albis, quibus nigræ squama-  
tim admixtæ sunt. *Alæ* & *cauda* fusci sunt  
coloris cum umbra mixti, atque oras ha-  
bent subtiles albicantes. Remiges alarum

pennæ sunt fuscæ & nigris undis variegatæ.  
In pedibus digitos habet quatuor flavos,  
unguibus lunatis fuscis. Clamat *Geh*, *Geb*,  
ut pullus gallinaceus qui matrem perdi-  
dit. Rapax avis, crudam comedens carnem  
Projectam sibi avem, sive vivam, sive mor-  
tuam, unguibus arripit, & rostro egregie  
deplumat, dein dilacerat, & carnem ossa-  
que deglutit; unam harum diu vivam alui  
in munimento Mauritii ad Flumen S.  
Francisci.

ANNO TATIO. Icon hujus avis haud  
male convenit cum Icone Nycticoracis  
Gesneri; non tamen Nycticoracis veterum,  
sed vulgo sic dicti circa Argentinam, & ali-  
bi circa Rhenum, avis piscatoriæ) nisi  
quod in Capite tres pennas habeat.

MAGUARI Brasiliensibus; Avis Cico-  
niæ similis figura & magnitudine, atque  
etiam ex parte colore. *Collum* habet pedem  
longum. *Rostrum* rectum, acutum, no-  
vem digitos longum. *Crura* longa & nuda,  
ut ciconia. *Caudam* brevem, cum qua alæ  
desinunt. *Rostrum* in exortu ad medietate-  
m usque ex viridi flavescens, reliqua me-  
dietas extrema ex cœruleo cinerea. *Oculos*  
habet parvos, argenteos, pupilla ni-  
gra, & circa eos cutem cinnabriam, ac  
similem etiam inferius prope exortum ro-  
stri, seu inter rostrum, & guttur: quam mo-  
re *Senembi*, irascens dependere sinit sub  
guttore.

Totum *Caput*, collum, & totum *corpus*  
albissimis vestitur plumis; ac inferiori par-  
te colli pennæ albæ illæ sunt longiusculæ.  
*Cauda* autem quoque alba, at superius ni-  
gris aliquot pennis tegitur. *Alæ* in exor-  
tu albis teguntur pennis, sed prope dor-  
sum nigris: nigredini autem persplendet vi-  
riditas. *Crura* sunt rubra, ut & pedes, quos  
cum Ciconia communes habet. Rostro cre-  
pitat, ut ciconia nostras. *Caro* illius edulis.

GUARAUNA Brasiliensibus, Rusticola  
aquatica, magnitudine *Iacu*. *Rostrum* habet  
teres, paulo deorsum inclinatum, flavum  
at in extremitate fuscum, quatuor & se-  
mis digitos longum; *corporis* autem illius  
longitudo est totidem. *Crura* superiora  
mediam partem pennis vestita, sex digitos  
longa: *Digit*i pedum quatuor ita dispositi,  
ut communiter; quorum medius tres digi-  
tos longus, cæteri breviores.

Tota avis vestitur pennis fuscis, multa  
umbra mixtis. *Caput* autem & collum to-  
tum ejusdem coloris, & præterea albo  
punctulatum, ut in *Iacu*.

*Carnem* habet satis bonam, quam sæpius  
comedi.

AJAJA Brasiliensibus, *Colherado* Lusit-  
anis, Belgis *Uepelar*. Avis figura conve-  
niens cum Europæis, solo colore differens.  
Anserius magnitudine. *Rostrum* instar cochlea-  
ris lato, albo: *Collo* longo, pedibus latis.



Tota alba est, sed in dorso & alis dilute incarnati coloris persplendentis. *Caro* illius edulis, & sæpe comedi. Frequens est ad Flumen Sancti Francisci, & alibi passim in locis palustribus.

**PICUI PINIMA** Brasiliensibus. *Columbæ* silvestris species, paulo major *Alauda*, *Rostellum* habet columbinum, fuscum. *Ocellos* nigros, circello aureo. Totum *caput*, collum superius & ad latera, dorsum & alæ pennas habent obscure cinereas, seu lividas, oris nigricantibus lunatis. Longiores autem alarum pennæ, seu remiges, quæ inter volandum videntur; ruffi sunt coloris, uno latere nigricantes, ut & in extremitatibus. *Cauda* longiuscula ex pennis constat è cinereo fuscis, quarum & quædam nigræ, & medietate exteriori albæ. *Venter* albas pennas habet oris lunatis fuscis. *Crura* & pedes columbini albescentes. *Carnem* habent bonam, & sunt admodum pingues.

**PICA CUREBA** Brasiliensibus; quoque *Columbæ* silvestris est species, coloris cinerei cum ruffo mixti; pedibus & cruribus rubris.

*Avicula* (cujus nomen *Auctor non prodit*) passeris magnitudine & figura, tota nigra, capite tamen albo, & cauda ex multo nigro & gryseo colore mixta. Clamat *zip, zip*.

**TUIDARA** Brasiliensibus; *Ululæ* est species, Germanis *Schleier-Guhn* / Belgis *Kerckuple*. *Capite* rotundo, naso elato, & plumis compexis constrato; sub naso rostrum habet aduncum, album: *oculos* autem nigros. Tota avis faciei superficies, cordis, uti pingitur, habet figuram, plumulis obscure ex albo flavis, cum paucis nigro mixtis, quasi fimbria circumdata essent. *Plumæ* totius avis mixtæ albo & pallide flavo ac gryseo: *Alæ* undatæ, uti & cauda. *Corpus* subtiliter punctatum cum fusco. Describitur & à Gesnero.

**GUACA GUACU** Brasiliensibus, Lusitanis *Gairvota*, Belgis *Mecuwe*. *Avis* gallinæ vulgaris magnitudine, rostro recto, longo, crasso, flavo. *Caput* superius nigris tegitur pennis, ut & ultima medietas alarum & *Cauda*. *Guttur*, totum collum, pectus & infimus venter, ac initium alarum sunt alba. *Ova* ponit in arena, gallinaceis figura, magnitudine & colore similia: quæ quidem boni sunt saporis, sed *caro* avis nullius est pretii.

**TAPERA** Brasiliensibus, *Adorinha* Lusitanis; *Hirundinis* species, nostratibus similis, ejusdem magnitudinis, & eodem modo circumvolitans. *Rostrum* breve, latiusculum habet & nigrum. *Os* amplum, quod aperire ultra oculorum regionem potest, ut *Ibia* junior. *Oculos* elegantes, nigros. *Alas* longas, desinentes cum fine caudæ, quæ latiuscula est. *Crura* & pedes ut nostra-

tibus. Totum *caput* superius, collum, dorsum, alæ & cauda pennas habent coloris ex fusco cum gryseo mixti; remiges alarum & extremitas caudæ paulo magis fuscescunt reliquis partibus. Sub gutture & in pectore grysei est coloris cum albo mixti. *Venter* est albus, uti & sub cauda albet. *Crura* & pedes fusci.

## CAPUT IX.

*Psittacorum majorum & minorum  
varia species.*

**PSITTACORUM** in Brasilia maxima est copia & summa varietas; quos Brasilienses communi nomine vocant *A JURU*. Aristoteles lib. IV. *Histor. Anim.* cap. X. scribit; *Ea quæ ova pariunt, an somnient incertum est, manifestum vero ea dormire*. Ego utrumque adfirmo cum Jul. Scaligero in *Commentariis*, & quod ille de suo *Turdo* & *Accipitribus*, ego de meo *Psittaco*, quem *Lauram* vocabam, nam sæpius de nocte scipsum expergiscens semisomnis sublocutus est. Idem Lib. VIII. cap. X. scribit, *Psittacum* à Græcis etiam *ἀνδραπύλοισιν* vocari. *Psittaci* nidificant in cavis arboribus, ubi foramen extra rotundum faciunt, ac ova duo aut tria columbinis similia imponunt sine nido aliquo ficto. *Ova* si tangas, nihilominus excluduntur, nec *Psittacus* ea deserit. Pullos excludunt medio Junio & fine: plumati autem pulli inveniuntur apti ad eximendum fine Julii, & medietate Augusti. *Psittaci* juniores primum exclusi vermes crassiusculos habent, in quolibet narium foramine unum, ac præterea in summitate capitis tuberculum, in quo itidem vermis crassus latet. Omnes autem vermes brevi sponte excidunt, ac locus per se sanatur. Fiunt varii coloris à *Tapuyis*, deplumando juniores, & cutem variis coloribus inficiendo, Lusitani vocant *Papagios contrefeitos*. Nullus *Psittacorum* Brasiliensium, præter *Curicos* se manibus tangi in corpore permittit.

*Prima species* *A JURUCURAU* elegantissima est. Supra *Rostrum* in capite micellam habet eleganter cœruleam: *Guttur*, latera capitis & superior illius pars eleganti flavo vestiuntur, totum corpus læto viridi. In alarum extremitatibus pennæ una medietate nigræ, altera crocæ, partim etiam in extremitate cœruleæ, partim hinc inde virides. In summa, elegantur variegatæ. *Cauda* viridis, sed quando illam explicat, fimbriata nigro, rubro, cœruleo. *Crura* & pedes cinerei coloris. *Rostrum* ex cinereo fuscum. *Oculi* nigricantes, circulo aureo. *Lingua* omnibus lata & crassa.

*Secunda species* priori similis, paululum aliter



aliter variegatur coloribus, nimirum in summo capite mitella flava, cui albedo mixta, super oculos, & in gutture clare flavo. Circa rostrum superius macula est thalassina.

*Tertia species*; A J U R I C U R I C A. Mitram habet in capite ex cœruleo & paucō nigro mixtam, in medio mitræ maculam flavam. Infra oculos flava, & in gutture cœrulea est macula. Viriditas in pectore, alis & dorso paulo saturior, in extremitatibus alarum & cauda dilutior. Extremitates pennarum alæ flavæ & rubræ, & Indico colore mixtæ. Cauda inferius ex flavo & viridi mixta, superius dilute viridis. Crura è cinereo cœrulescentia. Rostrum superius cinereum, in extremitatibus nigrum, unguis pedum nigri.

T U I, vulgo Perroquet.

*Prima species*: Magnitudine Hirundinis: in totum viridis coloris: cauda longissima, rostro nigro, aduncō.

*Secunda*: Tui apud juba, viridis in totum & quidem dilutius in reliquo corpore, in ventre flavescens, in alis obscure viridis. Cauda longissima: magnitudinis ejusdem cum priori; Oculis magnis, subnigris, circello ex pennis circa oculos luteo, & supra rostrum, quod nigrum & aduncum, in capite maculam habet magnam ex pennis Auraici coloris.

*Tertia* T U I T I R I C A, paulo majores sunt Guineensibus, in totum viridis coloris, qui tamen in dorso & alis plerumque saturior, in reliquis partibus dilutior: rostro incurvato incarnati coloris. Oculis nigris; Pedibus cœrulescentibus; Cauda paulum ultra extremitatem alarum protensa. Admodum hi mansuescunt, & cibum ex alicujus ore capiunt, & manibus se tractari sinunt. Item instar Psittacorum garrum addiscunt.

*Quarta*: Magnitudine Sturni, ejusdem coloris cum secunda specie, sed breviori cauda.

*Quinta* J E N D A Y A: Sunt magnitudine Merulæ aut minoris Turdelæ, rostro & cruribus nigris, oculis nigricantibus, circulo aureo, exterius albo: Dorsum, alæ & cauda, ut & anus viridibus pennis vestiuntur, quibus thalassinus mixtus: Extremitas alarum quodammodo nigrescit. Totum caput, collum & pectus flavi coloris sunt, cui luteus intermixtus.

*Sexta* T U J E T E, magnitudine Alaudæ, in totum dilute viridis coloris. At initium alarum egregie cœruleum est, & omnium pennarum in alis oræ cœruleæ, ita ut complicatæ, quando quiescit avis, maculam longam cœruleam prope oram lateralem alæ ostendent. In dorso ad exortum caudæ usque etiam macula cœrulea est. Cauda brevis. Rostellum incurvatum,

incarnati coloris. Crura & pedes cinerei.

*Septima*: T U I P A R A Tupinambis, magnitudine Alaudæ, in totum dilute viridis coloris, cauda brevior, ita ut cum alis desinat. Rostro incarnato; cruribus gryseis. Prope rostri exortum in fronte, maculam habet semilunarem miniatam, quasi coronam, quæ & inferius est, in cujuslibet alæ medio lutei, seu Uranici coloris. Nidificant in cumulis à formicis relictis, qui in arboribus reperiuntur.

*Psittaci* & Tui semper catervatim volant nimirum bini ac bini juxta se invicem. Sylvæ his plenæ sunt, & sæpe quadringenti & quingenti simul volant, strepitum magnum clamore excitantes. Confident in altissimis arboribus: nidificant potissimum in mediterraneis. Caro boni saporis, si affertur, maxime Perroquet.

A R A R A C A N G A Brasiliensibus, Psittacus maximus, majores sunt corvis nostratibus. Caput magnum, superius planum, & latum habet. Oculos pulchros, cæcios, pupilla nigricante: Oculos autem exterius ambit membrana alba, ut & maxillas & rostrum inferius: hæc subter oculos semilunari forma est producta. Rostrum incurvum, magnum, superius albicans, inferius nigrum. Linguam habet ut Psittacus, & eodem modo edit. Voces etiam quasdam sonare discit. Rostrum superius tres circiter digitos longum, altum seu latum. Crura & pedes, ut Psittacus, habet nigros. Totum caput, collum, pectus, venter, crura superiora, & cauda inferius; ut & initium alarum superius elegantibus rubris pennis vestiuntur, per medietatem autem alæ tectæ sunt viridibus, extrema autem medietas alarum usque ad finem cœruleis ornatur. Extremitas dorsi prope anum superius, & cauda cœruleis constant, quibus aliquot brunni coloris admiscetur. Cauda longa est decem circiter digitos, & longe prominent ultra finem alarum.

A R A R A U N A Brasiliensibus: Figura alteri similis, sed alteris coloris. Rostrum nigrum, oculi cæcii, pupilla nigra. Cutis circa oculos alba nigris pennulis variegatur quasi acu picta esset. Crura & pedes fusci coloris. Caput anterius supra rostrum mittellam habet viridibus pennis; sub rostro inferiori ambiunt guttur pennæ nigræ: Colli autem latera, reliquum guttur, totum pectus & infimum ventrem tegunt pennæ flavi coloris. Extremum caput, collum posterius versum, totum dorsum & alas exterius cœrulei. Extremitatibus alarum plumæ flavæ sunt admixtæ. Cauda constat longis pennis cœruleis, quibus aliquot flavæ immiscetur. In genere autem cœruleæ pennæ interius sunt nigræ, & quodammodo etiam nigredinem ad latera de se spargunt.



**A N A C A** Brasiliensibus: *Perroquet*; magnitudine Alaudæ. *Rostrum* fuscum, aduncum. In capitis summitate epatici coloris pennæ, ad latera circa oculos brunni; *guttur* cinereum; *Collum* superius & latera viridia. *Venter* habet pennas & brunno rufescentes. *Dorsum* viride maculam habet dilute brunnam. *Cauda* quoque dilute brunna. In alarum initio sanguinea macula sive fimbria est: reliquum alarum viride, extremitas thalassini coloris. *Crura* superius viridibus vestita pennis, inferius cute cinerea, unguibus nigricantibus. Elegans plane avis.

**M A R A C A N A** Brasiliensibus, avis Psittaco plane similis (cujus & species) sed major, plumæ totius ex gryseo subcœrulescunt, clamat ut Psittacus. Fructus amat, Murucuja imprimis.

**M A R A C A N A** Brasiliensibus, itidem Araræ species minor: magnitudine Psittaci, figura Araræ, cauda longa tali, rostro, & cute circa oculos. *Rostrum* nigrum, cutis circa oculos alba punctulata plumulis nigris. *Oculi* flavescentes, pupilla nigra. Totum *caput* collum & alæ saturate viridis coloris ut in Amuricurica; summitas capitis dilutior & quodammodo cœrulescit. *Cauda* superius viridibus & in extremitate cœrulescentibus, inferius saturate constat pennis. *Alæ* interius etiam rubræ, exterius virides, & extremitates cœruleæ obscure. In exortu cujuslibet alæ maculam habet miniatam. Super rostri exortum, superius maculam habet parvam fuscam. *Crura* & *pedes* fusci. Clamat *Oe, Oe, Oe*.

**Q U I J U B Á T U I** flavus est totus, magnitudine Tuiapara; *rostro* incurvato gryseo, *Oculis* nigris. Extremitas alarum obscure viridis est: *cauda* longa flava. *Crura* coloris incarnati. Facile & valde mansuescit.

**P A R A G U A** Psittacus est niger, magnitudine Ajurucariu, pectore dorso & ventre medietate anteriore insigniter rubro. *Oculis* nigris, circello rubro. *Rostro* fusco, seu obscure cinereo. *Cruribus* & pedibus obscure cinereis.

**T A R A B E** Brasiliensibus, Psittacus est viridis: major quam Paragua, *capite* rubro & pectore atque initio alarum. *Rostro* & pedibus obscure cinereis.

**A J U R U C A T I N G A** Brasiliensibus, Psittacus magnitudine pulli gallinacei medio-cris, totus viridis, *oculis* rubris, & circa oculos cute alba. *Rostro* albo, & *cruribus* albis. *Caudam* habet longam, viridem.

**A J U R U A P A R A** Brasiliensibus, in totum convenit cum præcedenti, sed minor est.

## CAPUT X.

*Ipecu. Urubu. Tamatia utraque. Guirajemoja. Gurraru nbeengeta.*

**I P E C U** Brasiliensibus, Cortapao Lusitanis, Avis magnitudine columbæ. *Colli* longitudo duorum digitorum, *corporis* autem quatuor, & *cauda* idem quatuor, *crurum* fere sesquidigiti; in pedibus quatuor habet digitos, duos antrorsum, duos retrorsum versos, ut in Psittacis. *Caput* vestitur pennis cinnabarii coloris, in quo & cristam habet instar columbæ: *collum* ad rostrum usque inferius nigrum, ut & superius; In utroque autem latere linea est alba, crassa, quæ divisim ad dorsum protenditur. *Alæ* exterius totæ nigræ, interius albæ; *Cauda* nigra; in ventre & *cruribus* superioribus pennæ sunt nigræ, & albæ. *Rostrum* illius rectum, acutum, sesquidigitum longum, quo arborum cortices excindit, ut Picus.

**U R U B U** Brasiliensibus, vulgo *cin Menschen-esser*; Avis rapax, magnitudine Milvi & Nisi, pedibus gallinaceis subalbicantibus, *cauda* longa, & alis ea longioribus. *Pennæ* totius corporis sunt nigræ cum paulillo ravi coloris hinc inde mixtæ. *Caput* habet parvum, figura pene gallinarum Indicarum, cute tectum paululum rugosa. In summitate autem capitis secundum longitudinem quasi dividitur cutis, & in sinistro latere capitis infra oculum crocei est coloris; supra oculum cœrulei, in summitate item, reliqua parte ex ruffo subbrunni. In dextro latere capitis circa oculum superne & inferne crocei coloris, in summitate itidem, reliqua parte ex croceo albicantis. *Rostrum* habet satis longum, exterius aduncum, acutum, & ad medietatem usque à capite cute obtectum ex croceo cœrulescente. In medietate rostri superius narium foramen unum amplum transversum positum; extremitas rostri, quæ cute caret, est alba. *Oculos* habet elegantes rubini fere colore, *pupilla* rotunda nigra: *Palpebræ* sunt crocæ: *Linguam* carinatam, in ambitu denticulis acutis præditam. Fœter ejus *caro* instar cadaveris: nam & cadaveribus vescuntur, & in maxima copia statim advolant in Capitania Sirigippo, & Flumine Sancti Francisci, quando quis bestiam aliquam mactat. Fœda avis, semper macra, nunquam satura.

**T A M A T I A** Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine, seu Pici. Tota punctulata, & variegata maculis ut Turdus minor, Germanis vulgo *Cin Trostel*; in ventre albas habet pennas, maculis fuscis: sub gutture autem flavescit uti & circa collum.

*Rostrum* habet longum rubrum, superius



## C A P U T X I.

*Cocoi Ardeæ species : alia species. Guiratinga.  
Ardeola. Tacarini. Guiratirica.  
Guiranheemgatu.*

rius paululum fuscum ; cujus superior pars paulo longior, quam inferior. Supra nares subtiles aliquot extant pennulæ instar pilorum. In pedibus quatuor habet digitos unguibus aduncis. Caret *cauda*. *Caput* illius majus quam proportio corporis requirat, uti & rostrum.

**TAMATIA** itidem Brasiliensibus dicta, avis aquatica, forsan gallina. Nisi *rostrum* obtinet, magnitudine Yassana asu: *dorso* incurvato incedens & *collo* incurvato. *Caput* habet magnum, *oculos* magnos nigros, prope exortum rostri existentes. *Rostrum* duos digitos longum, plus uno latum, instar anaticis quidem, sed antierius acuminatum: estque superior ejus pars nigra, inferior flavescent. *Crura* superiora pennis nuda, satis autem longa: Digiti in pedibus quatuor, quorum tres antierius, unus posterius versus, more gallinarum, suntque longi ut in *Waterhoen*. *Crura* & digiticoloris ex virescenti flavi. *Cauda* brevissima, & non longior quam in Yassana. *Caput* nigris pennis vestitum, reliquum corpus brunnis; in ventre autem albicantes pennæ intermiscuntur.

**GUIRAJENOJA** Brasiliensibus, *Avicula* magnitudine Fringillæ. *Rostellum* habet vix semidigitum longum & nigricans, *ocellos* nigros. Totum *caput*, collum inferius, pectus, infimus venter & dorsi medietas extima pennis vestiuntur cœruleis: *Collum* superius & dorsi medietas anterior nigris: *Alæ* quoque nigræ, sed quibus in initio illarum inspersæ cœuleæ; reliquæ nigræ sunt, sed oras habent cœuleas. *Cauda* sesquidigitum fere longa & itidem nigra, desinuntque *alæ* paulo post initium *caudæ*. *Crura* fusca; in pedibus quatuor digiti vulgari modo.

**GUIRARU NHEENCETA**, Brasiliensibus; *Merulæ* aquaticæ magnitudine, aut paulo major. *Rostrum* habet rectum, compressum, nigrum, plus dimidio digito longum: *Oculos* Sapphyrinos, pupilla nigra. *Crura* quæ superius vestita, sunt pennis cinereis, inferius nigra cute teguntur, uti pedes, in quibus more vulgari quatuor sunt digiti, unguibus acutis nigris.

Totum *caput*, collum, pectus & infimus venter pennis vestiuntur albis ad gryseum dilutum accedentibus, dorsum autem leucophæis sive cinereis. A rostro in utroque latere per oculum usque ad finem laterum capitis, macula oblonga tendit nigra. *Alæ* nigræ, non tamen obscure. *Cauda* nigerimas habet pennas, quarum tamen extremitates sunt albæ, & superius quoque aliquot albisteguntur.

**COCOI** Brasiliensibus, *Ardeæ* species est elegans, *Oiconiæ* ferme magnitudine. *Rostrum* habet rectum, acutum, sex circiter digitos longum quod in exortu ex flavo virescit: *Oculos* crystallinos, circello aureo: circum *oculos* cutem cineream. *Colli* longitudo quindecim digitorum, *corporis* decem; *caudæ*, cum qua *alæ* desinunt. *Crura* superiora mediam partem plumata, octo digitos longa, inferiora sex & semis, cute tecta cinerea; digitos in pedibus quatuor, vulgari modo, quorum medius digitum longus, cæteri breviores unguibus lunaribus, fuscis. *Guttur* & totum collum sunt albæ, summitas capitis & latera nigri coloris cum cinereo mixti. Ejusdem coloris cristam elegantem gerit erectam; atque ab ea duæ elegantes plumæ deorsum posterius dependent, coloris ex nigro subcinerei, quælibet quinque digitos & semis longa. Anterior collum secundum longitudinem maculatum est plumis è nigro & cinereo mixtis. In colli parte anteriori & inferiori, elegantes habet plumas longas, albas, subtiles propendentes, quas in pileis gestare solemus. Totum dorsum, *alæ* & *cauda* cinerei sunt coloris diluti cum pauxillo albo mixti; superior medietas crurum superiorum, albis vestitur pennis. Per dorsi autem longitudinem cinereæ plumæ extenduntur subtiles, elegantes, figura similes illis in collo. *Caro* illius bona est, & sæpius comedi.

Reperitur hic & alia *Ardea*, *Anatis* domesticæ magnitudine, aut paulo major. *Rostrum* habet rectum, acutum, medietate anteriore, tam superius, quam inferius, dupliciter ferratum, quatuor & semis digitos longum. *Caput* & collum habet *Ardeæ*: *Oculos* nigros, circulo aureo; *Collum* pedem longum; *Corpus* quinque digitos & semis, *caudam* quatuor cum qua desinunt *alæ*. *Crura* tota novem & semis digitos longa, superiora mediam partem pennis vestita: quatuor digiti in pedibus vulgari modo. *Rostrum* superius est fuscum, prope exortum autem virescit è flavo. Totum caput & collum superius pennas habent longiusculas, pallide flaves, nigro undatas; sub gutture albicat. Collum inferius, pectus, & infimus venter plumas habent albas fusco undatas, quod in ambitu flavo est fimbriatum. Totum dorsum & *alæ* teguntur pennis fuscis flavo undatis, & remiges alarum pennæ sunt è nigro & cinereo, æquali parte, mixtæ, extremitatibus albis. *Cauda* constat ejusmodi pennis, qua-



qualibus extremitas alarum, sed transversim albo lineatis. *Crura* & pedes sunt obscure grysei coloris, ungues fusci. *Caro* comeditur, sapit ut aliarum Ardearum.

**QUIRATINGA** Brasiliensibus, *Garza* Lusitanis, *Ardeæ* species, *Alberdeolæ* magnitudine & corporis figura. Erecte incedit, collo longo, rostro extenso, recto, acuto, flavo, quatuor digitos longo, cuius pars superior nigra, inferior alba. *Crura* alta, ut *Ardeæ*, sex circiter digitos longa, pedum digiti ad vulgarem modum: crura exterius (ut & digiti) sunt flava, interius ex viridi & fusco mixta. Per totum corpus albissimis vestitur pennis: In collo elegantissimis plumis albis, quæ subtiliores sunt plumis *Struthionum*.

Aquatica est avis. *Crura* superiora sine pennis.

**ARDEOLA** columbæ magnitudine vix par: *Collum* habet longissimum. *Rostrium* rectum, acutum, superius fuscum, inferius ex albo flavescens, duos & semis digitos longum, *linguam* brevem, acutam. *Oculos* mediocres, circello aureo, pupilla nigra. *Caput* parvum, *Collum* tenue, ac septem digitos longum, cum corporis longitudo vix sit quatuor. *Crura* longa, quodlibet quinque digitos; superior medietas mediam partem nuda. In pedibus digitos quatuor communi modo dispositos, unguibus lunatis acutis. *Color* talis est: prope oculos, ubi rostrum inseritur, cutis melini coloris est. *Caput* superius vestitur pennis chalybei coloris pallide fuscis inspersis: totum collum cum pectore & infimo ventre plumas habet alas leucophæis mixtas & pallidis, ut variegatus appareat. *Dorsum* nigrum est, ex parte chalybeo fuscum cum cerei coloris pennis mixtum. Alarum pennæ longæ virentes, in extremitate maculam habent albam, reliqua superficie ex fusco, chalybeo, cereo, & leucophæo eleganter variegata. *Cauda* duos digitos longa, quam tegunt alarum extremitates, quæ cum illa desinunt. *Crura* superius leucophæo & cereo mixta. Nuda pars & pedes cute melina tecta sunt. *Ungues* leucophæi. Erecta incedit avis & decenter.

**JACARINI** Brasiliensibus, *Avis* carduelis magnitudine. *Rostellum* habet crassum, cinereum. *Crura* & pedes cinereos, cum quatuor digitis more vulgari. Totum corpus nigris vestitus pennis, sed in quibus resplendet color instar chalybis politi. *Alæ* interius albicant. *Oculi* cœrulei, & pone illos amplum foramen loco aurium.

**QUIRATIRICA** Brasiliensibus, *Avis* *Alaudæ* magnitudine. *Rostrium* habet crassum, rectum, superius fuscum, interius album, & paululum incarnatum. *Crura* cinerea cum quatuor digitis more vulgari. Totum *caput* cum gutture, & colli in-

feriore & media parte egregie sanguinei sunt coloris: *Oculi* cœrulescunt; aurium foramina ampla. Latera colli, totum pectus & infimus venter albis vestiuntur pennis. *Collum* superius habet nigricantes, quibus paucae albæ mixtæ. *Dorsum* gryseum est (inspersis nigris paucis) ut & initia alarum: reliquum alarum nigrum, ut & *cauda*, quæ tres circiter digitos longa: *Oræ* laterales in alis sunt albæ.

**GUIRAN HEEMGATU** Tupinambis; *Avis* passeris magnitudine. *Caput* superius luteum, & guttur: *Collum*, pectus, & infimus venter flavi coloris, alæ ex virescenti & flavo mixtæ ac fusco distinctæ, uti & cauda, ocelli & rostrum sunt nigra. *Crura* fusca; hic mas egregie canens ut *Fringilla*, vulgo *Wincke*.

Fœmina ejusdem magnitudinis plumis passeris vestitur, nec ita canit, sed clamat 'tschrip, 'tschrip, ut passer.

## CAPUT XII.

*Curucui. Caracara. Tyjeguacu. Teitei. Guiraguacu beraba. Guiracæreba. Guiraperea. Iapacani. Cabure. Andira aca.*

**CURUCUI** Brasiliensibus; Elegantissima avis, fere magnitudine *Picæ*. *Rostrium* habet breve, latiusculum, coloris sulfurei. *Os* amplum, & quando aperit, triangulatum. *Oculos* pulchros cœruleos circulo aureo; & sub quolibet oculo maculam cutaceam albam, ut gallinæ: in palpebris superius & inferius pilos nigros duriusculos. *Collum* haud longum. *Crura* breviora, & ad pedes fere plumata pennis nigris. *Caudam* habet quinque & semis digitos longam, latiusculam. Sub rostro inferiori in medio, & ad atrumque latus quasi barbam fetis compositam nigris, sed in quibus transplendet cœruleus, ut in *Anatum* collo: sub gutture autem plumæ tantum nigræ. Totum *pectus* & infimus venter egregie miniati sunt coloris; totum *dorsum* & cauda superius ex cœruleo & igneo splendide virescunt. Extremitas *caudæ* oram habet nigram: inferius autem cauda pennas habet albas, nigro transversim eleganter striatas. Initium alarum etiam insigni illa viriditate splendet, media pars canescit, nimirum plumis nigricantibus, minutissimis punctulis canis conspersis, ut anates esse solent. Ultima pars, scilicet longe alarum pennæ ex fusco nigrescunt. *Crura*, ut dixi, fere tota vestita, nigris pennis, cætera cum pedibus fusca sunt è cinereo. *Digitos* habet dispositos ut *Psittacus*. *Pennæ* subter alas sunt canæ.

**CARACARA** Brasiliensibus, *Gavia* *on* Lusi-



Lusitanis, Nisi species, Avis magnitudinis Milvii, *caudam* habet longam novem digitos; *alarum* longitudo quatuordecem digitorum, quæ tamen nondum ad finem caudæ pertingunt. *Color* pennarum totus est ravi coloris cum albis & flavis punctulis. *Cauda* albo & fusco est variegata. *Caput* Accipitrinum, *rostro* adunco, mediocriter magno, nigro. *Crura* habet lutea, pedibus accipitrinis, unguibus semilunaribus nigris acutissimis & longis. Avis gallinis valde infesta.

Habui aliam ejusdem magnitudinis, & colore pennarum ut præcedens, sed pectus & venter erant alba. *Oculi* aurei, & cutis circum eos flava. *Crura* lutea.

TIJEGUACU Brasiliensibus, Avicula passeris magnitudine, aut paulo major. *Rostellum* habet breve, triangulare, latiusculum, nigrum. *Ocellos* sapphyrinos: *Crura* & pedes cerei coloris, unguiculis fuscis, digiti dispositi more vulgari. Tota avicula vestitur pennis coracinis: at in summitate capitis maculam habet clypeiformem splendentis sanguinei coloris. Totum *dorsum* autem ferè & utramque alam superius ad partem obtendit macula nigro-cœrulea, *Cauda* brevis & nigra.

TEITEI Brasiliensibus quam etiam vocant *Guiranhemgeta* & *Guraundi*. Avicula Rubeculæ magnitudine. Aviario includitur pro cancri ave, sed pipit tantum ut Rubrica, Germanis *Gimpel*. *Vescitur* paco & mamao. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, nigrum. *Caput*, collum superius, alæ, & totum dorsum, & cauda nigris vestiuntur pennis, quibus aliquid cœrulei, admixtum, ita ut splendeant instar chalybis. *Guttur*, collum inferius, pectus, totus infimus venter, & crura superiora sunt lutea: ad exortum rostri superioris post nares maculam habet è pennis luteis. *Crura* & pedes fusci sunt coloris; & hic est mas.

Fœmina proportionem & magnitudine plane respondet mari, eodem rostro, & iisdem cruribus; sed color plurimum differt; est enim viridis, ut Acanthis. Germanis, *Zeischen*. Alæ ac caput cum collo superius paulum fuscescunt & cœrulescunt mixtum. *Delectantur* hæ aviculæ quinque aut sex conjunctim aviario includi.

GUIRAGUACU BERABA Brasiliensibus. Avis Carduelis magnitudine. *Collum* inferius, *dorsum* & ventris extremitas lutei seu aurei est coloris. *Caput* superius & collum, dorsi medietas anterior, alæ & cauda dilute viridis. In alarum extremo fuscae pennæ mixtæ sunt. Sub gutture ad oculos usque maculam habet magnam, nigram. *Rostellum* habet rectum, acutum, flavum, superna parte paulum nigricans. *Crura* & pedes fusci coloris.

GUIRACOEREBAB Brasiliensibus:

Avis Fringillæ magnitudine. *Rostellum* habet nigrum, tres quartas partes digiti longum, acutum, & paululum deorsum flexum. *Oculos* nigros. *Linguam* multipliciter fissam: In capite superius mitellam thalassinis pennis, reliquum caput, guttur, & totum corpus inferius, pectus, & totus infimus venter, cum dorsi medietate posteriori cœruleis vestiuntur pennis, lactescentibus, & à pectore per initia alarum ad dorsum, ubi incipit cœruleus color, linea lata cœrulea transit transversim per exortum alarum: totum autem collum superius cum medietate dorsi anteriore profunde nigris subtilibus holosericeis vestitur plumis. *Cauda* sesquidigitum longa est & nigra. *Alæ* magnæ, quæ ad medietates laterales flavescent. Plavedo autem illa tegitur, nec videri potest, quando avis confidet, quando vero volat, alæ ex nigro & flavo eleganter striatæ videntur. Interius alæ ferme totaliter flavæ sunt. *Crura* superiora pennis nigricant, & cœrulea quodammodo sunt: Inferiora nuda, & cinnabarii coloris una cum pedibus, unguiculi in pedibus nigri. Habent autem pedes digitos quatuor, vulgari modo dispositos.

GUIRAPEREA Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* habet breve, crassiusculum, nigricans. *Caput* superius & collum, totum dorsum & infimus venter, pennas habent obscure flavi coloris, ut cera citrina: *Caput* inferius, guttur & collum inferius cum pectore nigras, quales & paucæ in ventre flavis sunt intermixtæ. *Cauda* duos digitos longa, & præterit alas. Constat autem cauda & alæ pennis fuscis & nigricantibus, quarum quælibet cum laterali extremitate thalassina, ita ut fuscae alæ thalassino videantur striatæ. *Cauda* itidem. *Crura* superiora etiam cerei coloris; inferiora cum pedibus obscure cinerei. Digiti quatuor modo vulgari, unguibus nigricantibus.

JAPACANI Brasiliensibus, Avis magnitudine *Bemtere* aut *Schanepue*. *Rostrum* habet nigrum, oblongum, acuminatum, & paulum deorsum incurvatum. *Oculos* aureos, pupilla nigra. *Caput* vestitur pennis nigricantibus, collum superius, dorsum, alæ ex umbra & nigro mixtis. *Cauda* superius albo maculata est. *Pectus*, & totus infimus venter ac crura superiora ex albo & flavo mixtes, ac lienis seu striis transversis nigricantibus intertexta. *Crura* fusca. Digiti in pedibus quatuor vulgari modo, unguibus acutis & nigris.

CABURE Brasiliensibus; Nocturæ species: Avis magnitudine. Turdelæ. *Caput* habet rotundum, rostrum breve, aduncum, flavescent, duo foramina narium. *Oculos* pulchros, magnos, rotundos, flavos, pupilla nigra. Sub oculis, & ad latera rostri multos



multos habet pilos, longiusculos, fuscus. *Crura* brevia, totaliter pennis vestita, flava, uti & pedes. In iis autem quatuor digitos, more vulgari, unguibus semilunaribus, acutis, nigris. *Caudam* latam, prope cujus exortum alæ desinunt. In tota capite, dorso, alis, cauda, coloris est umbræ dilutæ: ac in capite & collo minimis, in alis majoribus maculis albis variegatur. *Cauda* vero albo est undata. *Pectus* & infimus venter albicant, & maculis umbræ dilutæ variegantur. Facile mansuescit. *Collum* ita circumagere potest, ut rostri acies exacte dorsi medietatem ostendat. *Ludit* cum hominibus instar simiæ, & varios mimos facit adspectu suo, & crepitus rostello; præterea pennas ad latera capitis erigere potest, ut cornicula, seu auriculas repræsentent. *Vicitur* carne cruda.

*ANDIRACA* Brasiliensibus, Vespertilio cornutus. Multi hic reperiuntur in Palmis nuciferis degentes; paulo majores nostratibus, præpingues, cinerei coloris, mollibus & longioribus pilis, auribus latis. In singulis pedibus habent quinque digitos, acutis unguibus armatos. *Dentes* candidi, & supra nasum corpusculum, ejusdem cum auribus longitudinis, satis grande ex materia qualis illius rictus, flexile seu mobile. Alarum longitudo æquat semipedem Rhylandicum.

### CAPUT XIII.

*Macuacagua. Columba silvestris species. Anas silvestris. Urubitinga. Mareca utraque. Tijeguaçu parvara. Tangara utraque.*

**M**ACUACAGUA Brasiliensibus: Gallinæ silvestris species, magnitudine Gallinæ nostratis vel etiam major. *Rostrum* habet nigrum, plus sesquidigito longum, anterius paulo incurvum, ut perdicis: In rostri medietate duo narium foramina ampla. *Oculos* nigros, post eos aliquanto spacio aures more gallinarum. *Corpus* crassum, *Alæ* cum eo desinunt, nullam enim habet caudam. *Crura* inferiora nuda, duos & semis digitos longa. In pedibus tres habet digitos antrorsum versos, crassiusculos, unguibus brevibus, obtusis. *Calcaneus* rotundus, ut in Struthione, & paulum supra illum breviusculus digitus versus interiora, ungue obtuso. Totum *caput* & collum punctulatum est obscure flavo & nigro, sub gutture albicat. *Pectus*, venter & dorsum obscure cinerei sunt coloris. *Alæ* umbræ coloris per totum undatæ nigro, præter remiges pennas, quæ totaliter nigre. *Crura* superiora pennis vestita, uti venter, inferiora carulescunt cum pedibus, ungues grysei. *Carnosa* admodum est avis, &

tantum carnis habet, quantum duæ gallinæ domesticæ vix habeant; estque boni saporis. Sub cute crassa & pingui cuticulam habet, aliam qua caro tegitur. *Vicitur* variis fructibus qui ex arboribus silvestribus decidunt. In ventriculo illius inveni fabas silvestres, semina Araticu. Humi currit, nam pedes inepti ab arboribus scandendum. *Ova* ponit Gallinaceis paulo majora, coloris cœruleo viridis.

*COLUMBÆ* silvestris species ex Insula. S. Thomæ allata, nostratum magnitudine & figura: sed rostro superius aduncum, & coloris in medietate anteriori tota cœrulei, cum albo & paucis flavo mixti, in posteritate tota sanguinei. *Oculi* nigri, circulo cœruleo. Pennis tegitur per totum viridibus, ut Psittacus. Remiges alarum ex viridi fuscescunt, ut & extremitas caudæ. Sub ano flavo habet pennas. *Crura* & pedes eleganter crocei coloris, ungues autem fusci.

*ANAS* Silvestris, magnitudine Anseris. *Rostrum* habet nigrum; *Crura* fusca, uti & pedes. Tota nigra est, exceptis principis alarum, quæ alba; Nigredini tamen illi viridis color transplendet. *Cristam* in capite gerit nigris plumis constantem, & massam carnosam corrugatam, rubram supra rostri superioris exortum. *Cutem* quoque habet rubram circum oculos. *Caro* bona & copiosa. *Finguntur* plerumque in altis arboribus confidentes; nam post lotionem in aqua frigida altas subeunt arbores, captandi aëris & Solis causa.

*URUBITINGA* Brasiliensibus (sed dubito adhuc de hoc nomine, nam nobilior est hæc avis quam Urubitinga) Avis Aquilæ similis, Anseris semestris magnitudine. *Rostrum* habet crassum, aduncum, nigrum, & circa nares cutem flavescentem. *Oculos* magnos, splendide aquilinos. *Caput* grossum. *Crura* & pedes luteos; in pedibus quatuor digitos vulgari modo dispositos; *Unguibus* lunatis, longis, nigris: *Alas* amplas: *Caudam* latam. Tota vestitur plumis fuscis & nigricantibus; Per alas autem undatim quasi cinereus miscetur. *Cauda* novem digitos longa, ad sex alba, in extremitate ad tres nigricans, in extremitate tamen rursus minimum est albi. Egregiæ staturæ est avis.

*MARECA* itidem Anatis silvestris species, sed parva. *Rostrum* habet anatinum fuscum, ad cujus exortum in utroque latere macula rubra. *Caput* superius est leporini grysei coloris, latera capitis sub oculis tota alba. Totum pectus & infimus venter ligni querni secti colorem obscure æmuletur, variegati præterea punctulis nigris. *Crura* & pedes nigri. *Cauda* grysea. *Alæ* elegantes, in exortu ex gryseo subfuscentis coloris, remiges autem sunt in uno latere prio-



prioris coloris, tota autem medietas extrema dilute brunefcentis, qualis in pedibus esse solet, immedio autem coloris viridis transplendentis, cum fimbria nigra, qualis in anatum collis. *Caro* valde bona.

*MARECA* alia species, ejusdem cum antecedente magnitudinis & figuræ. *Rostrum* habet nigrum splendens. Summitas capitis, collum superius, totum dorsum umbræ coloris cum fusco mixti. Sub guttore albicat. *Oculi* nigri, & antequemlibet macula parva rotunda, plumis ex albo flavefcentibus. Totum pectus & infimus venter obscure grysei coloris cum aureo mixti. *Cauda* nigra. Alarum pennæ fuscæ, quibus viride transplendet: & mediæ pennæ alarum eximia viriditate & cœruleo in fusco transplendent, hic & undam nigram habent, extremitas autem remigum tota est alba. *Crura* & pedes insigniter rubri seu miniati coloris. Assata avis pedibus apprehensa manus & linteamina tingit colore miniato-sanguineo. Boni saporis habent carnem, sed paulum amaricantem.

*TIJEGUACU PAROARA* Brasiliensibus; Avis Alaudæ magnitudine. *Rostrum* habet breve, crassum, superius fuscum, inferius albicans. *Caput* superius, latera ejus & guttur ac collum inferius habent pennas flavas, sanguinei coloris pennis punctulatas (& hæc fœmina quidem, mas enim hæc tota habet sanguinea) *Collum* superius, & totum dorsum cinereas, umbra aliquatenus mixtas. *Alæ* fuscas oris albescentibus præditas, ut & cauda; sed alæ teguntur cinereis, dorsum maximam partem exceptis extremitatibus. Latera colli, pectus & totus venter, & crura superius albis teguntur pennis. *Crura* inferiora & pedes fusci sunt coloris; quatuor digiti more vulgari positi. *Ocellos habet nigros.*

*TANGARA* Brasiliensibus. (Reperiuntur ejus aliquot species colore variantes.) *Prima* elegans, magnitudine Fringillæ. *Rostrum* habet rectum, crassiusculum, nigrum. *Oculos* nigros. *Crura* & pedes ex cinereo fuscus. Supra rostri exortum superne maculam è pennis nigris. Totum *Caput* & collum splendentibus viridibus seu thalassinis pennis vestiuntur. Initium dorsi instar collaris ambiunt nigerrimæ pennæ. *Dorsum* autem sub alis usque ad exortum caudæ vestitur plumis luteis. Totus infimus venter egregie cœrulescit. *Alæ* nigræ sunt, & earum extremitates laterales cœruleæ, ita ut totaliter cœruleæ appareant complicatæ, & sola extremitas nigra videatur. Initium alarum exterius etiam thalassinis pennis nitet, & cuique alæ superius in dorso, seu in extremitate superiori laterali flavæ pennæ sunt mixtæ. *Caudam* habet latam, sesquidigitum circiter longam, nigram pennis, sed quarum extremi-

tates laterales cœruleæ sunt. Extremitas caudæ est nigra. Includitor cavæ, & clamat *zip, zip*, seu ut Rubrica Germanis *Gijmpel*. *Vescitur* farina & pane.

*Secunda species*: figura & magnitudine passeris nostratis. *Rostrum* habet ex flavo fuscum, latiusculum, in extremitate acutum, cujus inferior pars multo brevior superiore. *Ocellos* nigros. Totum *caput*, egregie miniatis tegitur pennis, totum reliquum corpus cum alis & cauda splendide nigris. *Crura* superiora albis pennis, & in latere exteriori maculam ablongam miniatam habent, quasi sanguine maculata. *Crura* inferiora & pedes cinerei sunt. In pedibus digiti quatuor more vulgari. *Cauda* brevis digitum longa, & alæ prope illius exortum desinunt.

#### C A P U T XIV.

*Anhima. Pitangua guacu. Attinguacu camacu. Guira acangatarã.*

**A**NHIMA Brasiliensibus: Avis aquatica ex rapacium genere, major cygno. *Caput* habet haud magnum, Gallinaceo simile & rostro nigro: cujus superior pars paulo longior inferiori, & in extremitate deorsum incurvatum. *Oculos* pulchros, aureos, pupilla nigra, & exterius nigro circulo. In capite prope exortum rostri cornu gerit erectum, extremitate sua antrorsum versus incurvatum, paulo plus quam duos digitos longum, crassitie chordæ majoris in Viola majore, rotundum quasi tornatum esset, coloris albicantis, seu ossei. Circum cornu plumellæ subtiles breves eriguntur albæ & nigræ. *Collum* habet plus septem digitis longum, reliquum corpus ad caudæ exortum fere sesquipedem. Alas amplissimas, utpote quarum plumarum longitudo sesquipedem superet. In cujusque alæ antica parte duo cornua recta triangulata ex ipso ossè alæ enata obtinet, crassa minimi digiti apicem, & conicæ triangulatæ figuræ. Est autem quodque anteriorum digiti longum, posteriora paulo breviora coloris fusci. *Caudam* habet decem digitos longam, instar anserinæ latam. *Crura* superiora quatuor digitos longa, & quoad medietatem inferiorem pennis nuda: Inferiora quinque digitos longa, fere duos crassâ. In quolibet pede quatuor digitos obtinet more Gallinarum dispositos, quorum mediis trium anteriorum quatuor & semis digitos longus, reliqui duo, tres & semis: posterior autem fere duos. Quilibet unguem habet corniculatum nigrum, digitum longum, & in posterioribus digitis paulo longiorem. *Cute* fusca & squamosa teguntur & digiti, & crura nuda. *Capitis* vertex plumulis varie-



gatus est albis & nigris: ad latera, in guttore & colli medietate superiori nigricat, inferior medietas colli & pectus variegantur albis, cinereis & nigris pennis. *Venter* inferior albas in totum habet pennas, ad latera sub alis, & in dorso sunt nigræ, sed quibus albæ hinc inde permiscuntur. *Cauda* est nigra; *Alæ* etiam nigræ exceptis oris extremis (prope ossa) ubi ex albo flavescuntibus pennis variegatæ sunt. Terribilem clamorem edit *vyhu*, *vyhu* vociferando. Nunquam sola invenitur, semper parmas & foemina junctim incedunt, & una mortua, altera à sepultura nunquam discedit. *Cornu* quod in capite gerit, remedium est contra venenum, si in vino per noctem infundatur. Idem remedium est contra suffocationem uteri, & in difficili partu. Hæc quam descripsi, foemina est; mas duplæ magnitudinis. *Nidum* suum facit è luto ad caudices arborum super terram, figura furni.

**PITANGUA GUACU** Brasiliensibus, *Bemtere* Lusitanis, magnitudine æquat Sturnum. *Rostrum* habet crassum, latum, pyramidale, paulo plus digito longum, exerius acuminatum. *Collum* breve, quod sedens contrahit. *Corpus* fere duos & semis digitos longum. *Caudam* latiusculam, tres digitos longam, crura & pedes fuscus, quatuor digitos more vulgari. *Caput*, collum superius, totum dorsum, alæ & cauda coloris sunt è fusco nigricantis, pauxillo viridi admixto. *Collum* inferius, pectus, & infimus venter habent flavas pennas, superius autem juxta caput corollam (quasi monachicam) albi coloris. Sub gutture ad exortum rostri albicat. *Clamat* alta voce.

Quædam harum avium in summitate capitis maculam habent flavam, quædam ex parte luteam. Vocatur à Brasiliensibus *Cuiriri*, alias per omnia Pitanguaguacu similis.

**ATINGUACU CAMACU** Brasiliensibus: *Avis* Turdelæ fere magnitudine. *Caput* habet satis grossum, collum mediocriter longum; *Corpus* tres digitos longum: *Rostrum* paululum aduncum, coloris ex viridi & flavo mixti. *Oculos* sanguineos, pupilla nigra. *Crura* cinerea mediocris longitudinis, superius pennis vestita. In pedibus digitos quatuor, vulgari modo. *Caudam* longissimam nimirum novem digitos longam, decem circiter pennis constantem, quarum quædam inferiores sunt breviores superioribus. Totum caput, collum, dorsum, alæ, & cauda pennas habent brunnas seu fuligineas, quæ in cauda paulo saturatiores sunt reliquis. *Extremitas* cujuslibet pennæ caudæ semidigitum longa, alba est, & inter album & ruffum nigro umbrata. *Guttur*, pectus, & infimus venter ac superiora crura cinereis pennis

vestiuntur. In capite longiusculas habet pennas, quas instar duorum cornuum potest furrigere. Elegans avis ob longitudinem caudæ.

**GUIRA ACANGATARA** Brasiliensibus. *Avis* picæ variæ magnitudine. *Rostrum* habet digitum longum, cujus superior pars paulum adunca, totum autem obscure flavescit. *Oculos* crystallinos, circulo fusco. *Collum* duos digitos longum. *Corpus* tres. *Cauda* longissima, nimirum octo digitos, constans octo pennis rectis. *Crura* superiora pennis vestita, & sesquidigitum longa, ut & inferiora. In pedibus digiti quatuor, more psittacorum, & quidem versus interiora sunt duo breviores, versus exteriora duo longiores in quolibet pede. Totum *caput* pennis vestitur, quæ in medio secundum longitudinem (proxime scapum) fuscae, in lateribus flavescences, ut crista. *Collum* & alæ è contrario pennas habent in medio flavescences, & ad latera fuscas. *Extremitas* alarum fere plane fuscescit. Totus *venter*, dorsum, (exceptis alis) crura superiora, & exortus alarum, ad trium & semis digitorum longitudinem pennis constant ex albo pallide flavescuntibus, reliquum caudæ fuscescit, extremitas autem albas oras habet. *Crura* inferiora, & pedes thalassini sunt coloris. In capite longiores pennæ in cristam eriguntur. Ingentem in sylvis excitat clamorem.

## CAPUT XV.

*Matuitui. Aracari. Anhinha. Ipecati apoa. Pul-lus gallinaceus. Innominata tres.*

**MATUITUI** Brasiliensibus, *Avis* sturni magnitudine. Brevi collo, pectore forti, cruribus brevibus, cauda duos & semis digitos longa. *Rostrum* habet rectum, forte, cujus superior pars paulum prominet acumine inclinato, cinnabarii coloris. Totum *caput*, collum superius, dorsum, alæ, & cauda constat pennis fuscis pallide flavo maculatis; apparentibus partim punctulatis, ut in Nisò. Sub gutture flavas habet pennas. Pectus & venter albis vestiuntur, quæ fusco sunt punctulatæ. *Crura* obscure cinerescunt.

**ARACARI** Brasiliensibus: *Avis* magnitudine picæ Martiæ. *Rostrum* habet quatuor digitos longum, sesqui latum, seu altum, tres & semis crassum, ubi crassissimum, paulum deorsum incurvatum, instar gladii Turcici, & in extremitate acutum, instar psittacini; estque superior pars paulo longior inferiori. *Rostrum* superius & inferius plus mediam partem ab extremitate numerando ferratum dentibus: superior pars rostri major inferiore; est autem rostrum canum, levissimum, levius spongia,



gia, superius album, linea in summitate crassa nigra secundum longitudinem distinctum: Inferior tota est nigra; totum inferitur in caput triangulatum, & ubi insertio est linea triangulata alba circumscriptum. *Lingua* habet quatuor digitos longam levissimam, aspectu plane pennam referentem, aut etiam plumata est & nigra, (si pennam habere lingua dici possit.) *Caput* non ita magnum habet, latum, compressum. *Oculos* magnos, pupilla nigra, circulo flavo, reliquas extremitates nigras. *Collum* haud longius Psittacino. *Corpus* à colli exortu ad caudam usque quinque circiter digitos longum. *Cauda* instar picæ latiuscula, & sex digitos, vel paulo plus longa. *Crura* & pedes nigricantes ex viridi, Psittacorum similes, duos digitos habent antè, quorum unus longior altero, duos retro, itidem inæqualis longitudinis; ungues incurvati, fusci, seu nigri. *Crurum* superiorum longitudo duorum digitorum, inferiorem sesqui. Totum caput & collum usque ad initium pectoris nigras habet plumas, & ubi desinunt, circulariter finiuntur. *Pectus* vero & infimus venter totus eleganter flavis vestiuntur pennis, cum pavonino mixtis: Per Pectus autem transversim linea digitum lata sanguinei coloris ducta est ab uno latere usque ad alterum. Totum dorsum, alæ, cauda, & crura superiora vestiuntur pennis ex nigro viridicantibus, uti in nostratibus piscis color esse solet. Extremitas dorsi ante initium caudæ etiam sanguinei coloris, plus uno imperiali in circumferentia. *Alæ* desinunt ad exortum caudæ, & interius è cinereo sunt subfusci coloris. *Rostrum* interius est nigrum. Avis hæc quasi suum nomen profert, clamando acuto sono, sed non admodum clangoso *Aracari*.

*ANHINGA* Brasiliensibus, Tupinambus Mergi aquatici species elegans, *corpus*, excepto collo, anatis domesticæ Europææ habet magnitudine. *Rostrum* rectum, haud crassum, acutissimum, tres digitos longum, & per rostri medietatem anteriorem tam superius, quam inferius duplicem ordinem acutissimorum hamulorum retro verforum. *Caput* parvum, longiusculum, serpentinum æmulum, paulo plus sesquidigito longum. *Ocellos* nigros, circulo aureo. *Collum* tenue, teres, pedem longum, corpus autem tantum septem digitos, crura breviora, superiora duos digitos longa, pennata, inferiora vix sesquidigito; quatuor digitos, tres antè versus, membranis junctos more anatum, aut corvi aquatici, quartus digitus brevior ad latus inferius extenditur, itidem membrana reliquis connexus; unguibus lunatis omnes acutissimis. *Caudam* latam, decem digitos longam, duodecim pennis constantem, alæ circa medietatem caudæ desinunt.

*Rostrum* gryseum est, & post exortum paulum flavescit. Caput totum & collum plumis subtilissimis tegitur ad tactum holosericum referentibus; Coloris in capite & collo superius ex gryseo subflavescentis: sub gutture, in collo inferius grysei coloris, ut pelles illæ (*Berchfelle* vocant) ex quibus mitræ fiunt muliebres, & ad tactum, & ad spectum illius pellis pilos refert. Totum pectus, & infimus venter, & crura superiora plumis mollibus vestiuntur coloris argentei. Initium dorsi pennis fuscis, sed quarum quælibet in sui medio maculam habet oblongam ex albo pallide flavam, ita ut punctulatim appareat: reliquum dorsi nigras habet pennas. *Alas* obtinet longas, quarum initium totum ejusmodi brevibus pennis tegitur, uti initium dorsi, sequitur ordo mediam partem, id est, uno latere canarum, altero nigrarum: Remiges autem nigræ sunt. *Cauda* nigris splendentibus pennis constat, quarum extremitas grysea. *Crura* & pedes ex obscure flavescente grysei sunt coloris. Solertissima in capiendis piscibus: nam, more serpentum, contracto prius collo, ejaculatur rostrum in pisces, ac unguibus eos præhendit. *Carnem* illius comedi, sed haud melior est, quam caro Lari.

*IPECATI APOA* Brasiliensibus: *Patalusitanis*, id est, Anser, nobis Anas silvestris magnitudine anseris, octo vel novem mensium, figura plane ut nostrates anates. *Venter* & interior pars caudæ, collum totum cum capite pennas habet albas, dorsum usque ad collum, alæ, summitas capitis nigras, cui viriditas mixta, ut in nostrarum anatum collis. In collo & ventre albis pennis nigræ passim sunt insparse. In his differt à nostratibus, quod sit *prima* major: *secundo* rostrum anatum quidem, sed nigrum, & in extremitate aduncum. Tertio super rostrum cristam gerit carneam, crassam, latam & rotundam fere, nigram, albis maculis insignitam. *Cristæ* altitudo eadem; inter cristam & rostrum (in summitate nimirum rostri) foramen transversum magnitudine pisi est, ab utroque latere conspicuum, quod narium vice fungitur. Quarto pedum & crurum color non ruber, sed è cinereo fuscus. *Carnem* multam & bonam habet, nam sæpissime comedi. *Reperitur* passim ad fluvios.

Alium habui per omnia similem priori, excepto, quod longiores illæ pennæ in alis, insigni brunno splendebant colore, puto marem hunc esse, alteram foeminam.

*ANNOTATIO.* Gesnerus pene similem dedit iconem sub nomine Anatis Indicæ, cujus picturam se à Cardano accepisse memorat. Sed color pennarum non nihil differt ab Auctoris nostri descriptione.

*PULLUS* gallinaceus munitus, magnitudine pulli recens exclusi. *Caput* habebat



bebat anaticum, superius tamen magis in acumen definens, *rostrum* anaticum, latum, cujus superiore extremitas deorsum inflexa. *Ocellos* parvos, collum breve; *alas* parvulas juxta priora crura positas: quatuor crura gallinacea, carebat pectore, quippe eo loco, quo pectus esse debebat duo crura habens, quodlibet superius tres quadrantes digiti longum, inferius quadrantem; & in singulis quatuor digitos gallinaceos. Posteriora duo crura ejusdem figuræ & longitudinis cum anterioribus mire posita erant, sinistrum quidem more naturali, dextrum vero in exortu suo sinistro erat adnatum, & quasi sursum vergebat, eo modo quasi duo sinistra crura fuissent, & unum dextrum loco sinistri in exortu fuisset adglutinatum: atque ideo urypigio carebat, quia nullum intervalum inter crura hæc posteriora, & caudæ loco ipsi sinistro cruri exterius longiusculi pili canescentes erant adnati. *Pedes* habebat gallinaceos, & digitos eodem modo dispositos: sed quilibet pes totus inverso ordine positus erat, ita, ut inferior pars esset superior, & superior inferior, unguiculi que etiam sursum non deorsum vergebant. Totum *caput*, collum, venter, alæ, dorsum, & superiora crura non vestiebantur pennis, sed pilis nigris semidigitum longis, qui sub ventre & gutture paululum canescebant. In summa, plane monstrosus pullus. *Crura* inferiora & pedes fusci coloris, uti & rostrum, vitalia viscera habebat gallinacea, sed inordinate disposita. *Cor magnum*. Vivebat excluderetur.

*Avis* (cui *Auctor* nomen non adscripsit) magnitudine *Alaudæ*, figura *Matuituy*. *Rostellum* habet rectum, nigrum: *Oculos* nigros; *crura* communia fusca: *Caudam* latiusculam, & alias longiorem. Totum *Caput* superius, collum superius, dorsum, alæ, & cauda, rufescentis sunt coloris, ex rubro, umbra & albo mixti. Guttur, collum inferius, & infimus venter albi sunt coloris. Per oculum utrumque à rostro transversim maculam habet oblongam fuscā. Clamat *Gip*, *Gip*, ut junior gallo-pavus fere.

*Avis* (cujus nomen *Auctor* non prodit) magnitudine *Patæ*, & ejusdem figuræ. *Rostro* nigro, crassiusculo; *capite* nigro, *pectore* & *ventre* cano; dorso, alis & cauda fuscescentibus, *cruribus* fuscis. Clamat *Zip*, *Zip*, ut *Passer*.

*Avis* (quam *Auctor* non nominat, sed tantum admonet esse speciem *Curucui*, de qua cap. 12.) magnitudine *Picæ* fere. *Rostrium* habet breve, crassiusculum, paulum deorsum incurvatum, gryseum seu cinereum: *Oculos* nigros, circulo croceo; *Caput*, collum, dorsum superius, & cauda superius coloris nigri cum viridi cœruleo persplendente, ut in chalybe polito: *Alæ* fuscæ; Totum pectus & infimus venter egregii coloris miniati:

*Cauda* inferius albas habet pennas, transversim nigro ordine undatas. *Crura* breviora, fusca sunt; digitis quatuor, more *Pittacorum* dispositis. Reperitur hic & alia *A R D E A* species: tota alba, rostro croceo, recto, acuto: *Oculis* nigris, circulo aureo, *cruribus* & *pedibus* nigris. *Rostrium* habet quinque digitos longum, *collum* longissimum, nimirum quinque digitos supra pedem. *Corpus* septem digitos longum, *caudam* quinque, cum qua alæ desinunt. *Crura* superiora octo digitos longa, & ex parte pennis vestita, inferiora sex digitos. *Digitis* pedum communi modo se habent, quorum medius anteriorum quatuor digitos longus, reliqui breviores, omnes unguibus lunatis præditi nigris.

D E

## A V I B U S

## AQUATICIS BRASILIANIS.

**I**Nter Aves marinas quæ in Brasilia reperiuntur, septem sunt notatu digniores.

*Prima* est *QUIRATINGA* grui magnitudine par, plumis candidis, rostro prolixo atque acuto, crocei coloris; *cruribus* oblongis è rubro subflavis. Collum ipsius vestitur plumulis tam subtilibus & elegantibus, ut cum *struthionum* plumis certent.

*Alter*a est *CARIPIRA*, quæ quod in binas partes bifurcatam caudam distinguat, interdum explicans interdum contrahens, sartoriæ forcipis instar, Rabo forcado ab Hispanis dicitur. Reperitur passim in utraque India. Plumas ejus quod longo tempore durent, sagittis suis adhibent *Barbari*. *Ximenes adipem* ad cicatrices faciei delendas, & arthritidis dolores sopiendos, singulare esse remedium narrat. Et sibi donati alarum remigium ita ut volant distentum, amplius quam mortalis ullus distento utroque brachii possit complecti, occupasse spacium, addit. Non facile capitur, nisi forte in deserta aliqua insula, in qua pullos excludit.

*Tertia* *CALCAMAR* columbæ est magnitudine sed volandi nescia. In fluctibus ova ponit & excludit; quos etiam alarum atque pedum remigio secat per velociter. Malacia & pluviis imminetibus tanto numero naves circumfluitant, ut à nautis fastidiantur.

*Quarta* *AYAYAM* nominant, picæ magnitudine, longo rostro cochlearis instar, plumis candidis rubris maculis eleganter suffusis, singulari in piscibus capiendis industria.

*CARACURA* est quinta, exili corpore, subcinerei coloris, pulchris oculis, iride eleganter rubente, ita vocalis, ut majoris longe molis quis opinaretur. Ante solis

Nie-  
remb. H.  
Exot. l.  
10. c. 38.  
De Laet.  
Ind. Oc-  
cid. l. 15.  
cap. 13.



lis forte ortum & sub occasum auditur, certo, ut volunt, serenitatis futuræ indicio.

*Sexta* est GUARA, pice magnitudine, oblongo rostro, & anteriore parte recurvo, longis pedibus. Primum exclusa nigricat, deinde evadit cinerea; ubi autem volare incipit egregie candicat, sensim autem rubescit, donec ætate plumæ illius colorem induunt purpuræ æmulum, quem ad senectam usque retinent. Victitant piscibus, carnibus, & aliis eduliis semper aqua temperatis. Pariunt quoque subtectis. Gregatim volant, & soli expositæ pulcherrium præbent spectaculum. Ex plumis diademata & alia ornamenta à barbaris conficiuntur.

*Ultima* est GUIRATEONTEON quasi dicas avem sæpius morientem & rursus resurgentem. Epilepsiæ enim obnoxia est admodum; alioquin candidis & pulcherri-  
mis plumis vestita.

## A P P E N D I X.

*De Avibus Fabulosis.*

### C A P U T I.

*De Gryphibus & Harpiis.*

**P**Lacet & de Fabulosis aliquid adnectere, ne & in hisce quicquam nobis desideretur. Præcedat Gryps sue GRYPHUS, cujus nomine major forte Aquila, ut sane in Oriente & Septentrione majora nostris animalia gigni experientia compertum est, venire potest. Ejus *formam* si spectes, fingitur esse quadrupes, antica parte, seu capite; alis, rostro, & pedibus aquilam referens; postica leonem. *Magnitudinem* alii Leonis, alii lupi tribuunt. Mandevil-  
lius octies Leone majorem reliquit. Dor-  
sum pennis integitur nigris, anterior pars rubris, alæ candidis. Montes *Ripheos* seu Hyperboreos, haud procul ab ipso Aquilonis exortu incolunt; sed & apud Indos & Bactrianos inveniuntur.

*Nidos* ex auro quod effodere construunt, & ova duo Aquilinis majora duriora, calidiora & sicciora, ponunt. *Volatum* avium par viarum ipsis Philostratus tribuit. Non enim pennatæ, inquit, sunt, sed rubra pellicula alarum costæ tanquam digiti connectuntur. Dicuntur aurum in Scythia Asia-  
tica custodire, ideo inter ipsos & Arimaspas internecinum vigere odium. Tractat de eo Ælianus, & quomodo aurum illud auferant incolæ describit, sed & equis peculiariter infestos esse rumor est. Videtur huc M. Pauli Veneti avis RUC dicta pertinere, aquilæ effigie, sed magnitudine immensa. Visitur certis anni temporibus in insulis ultra Madagascar sitis, tanti roboris ut sola, sine aliquo adminiculo ele-

phantem capiat, & in sublime raptum rursum ad terram labi sinat, quo carnibus ejus vescatur. Plæræque alarum pennæ passus XII. sunt longæ, ea crassitie, quæ longitudinis mensuræ conveniat. Fides sit penes Authorem. Navigationes & præteriti & hujus seculi, omnino de tali ave tacent.

HARPYIS nomen à rapacitate inditum. Ex Electoo Oceani filia genitas Hesiodus prodit. Ponti & Terræ filia aliis dicuntur. Tres fuisse Virgilius dicit, Ocypeten, Aëllon, & Celano. Hyginus Alo-  
pen Acheloën & Ocypeten appellavit; Homerus quartam nomine, Thyellam addidisse creditur. De forma sic Virgilius.

*Virginei volucrum vultus, fœdissima ventris  
Proluvies, unæque manus, & pallida semper  
Ora fame, &c.*

Collocantur in Strophalidibus insulis. Apollonius fugatas conjecisse in specie, qui in Creta sub Arginunte visebantur, tradit. De ipsarum rapacitate, ingluvie, & fœditate vide Valerium Flaccum, Virgilium, & alios.

### C A P U T II.

*De Stympthalidibus, Sirenibus & Se-  
leucidibus avibus.*

**S**tympthalidibus, à Stympthala palude nomen datum est. *Magnitudine* grues æquant. Ibibus cætera sunt simillimæ, rostra tamen, ejusdem nempe duritiei, ut hominum scuta perforare, firmiora habent, & non ut Ibes obliqua. Plinius eas cirrhatas facere videtur. Marinas eas Isidorus facit. Apollonius circa Aretiadem insulam collocat. Timagenes & Pisander in Scynthiam avolasse tradit. Pausanias Arabiæ quoque deserta incoluisse ait. *Vescebantur* humana carne. Hercules eas ex Stympthalide palude abegit, seu crepitaculi ærei sonitu, sed quod multas sagittis confecisset.

SIRENES qua forma fuerint, non convenit inter Authores. Alii eas superiori parte virginis formam intulisse, inferiore in piscis caudam desuisse: alii infera aviciam speciem habuisse fabulantur. Nonnulli in superioribus speciem passerum, in inferioribus mulierum eis tribuunt. Boccatus pedes gallinacos assignat. Eustathius vero à Venere, quod virgineam sibi delegissent vitam, in aves transformatas tradit. Bina sunt quibusdam, *Aglaopheme* nempe & *Thelxiepeja*: tres alias *Parthenope*, *Leucosia*, & *Ligia*. Sunt qui quatuor & quinque fuisse fingunt. Sed nec de eorum ortu eadem traduntur. Quidam è sanguine è cornu Acheloi destillante natas volant. Nonnulli ex congressu ejus cum Musarum aliqua, de Venere superius diximus. *Habitavere* primum juxta Pelorum Siciliæ promontorium, postea in Capreis. Plinius Surren-  
tum

In Theo-  
nid.

Virgilius  
lib. 3.  
Æneid.

Ovidius  
lib. 13.  
Meta-  
morph.

Valer.  
lib. 4.  
Argo-  
nant.  
Virg. l. 3.  
Æneid.

Pausan.  
in Arcad.

Plinius  
lib. 11.  
cap. 37.  
Isid.  
lib. 12.  
Origin.

Ælian.  
lib. 17. de  
Anim.  
cap. 23.

Philostr.  
l. 3. de vi-  
ta Apol-  
lonii.  
Ælian.  
l. 5. c. 27.  
Apuleii.  
lib. 11.  
Milesiac.  
Ælian.  
l. 4. c. 27.  
Barthol.  
Anglic. l.  
19. c. 94.  
Philostr.  
l. 3. de vi-  
ta Apol-  
lonii.  
Solin.  
cap. 25.  
Polyhist.

Ælian.  
l. 4. c. 27.

M. Paul.  
l. 3. c. 40.



tum Campaniæ oppidum, una cum promontorio Minervæ, earundem sedem fuisse scribit. Finguntur tam suavem harmoniam voce, tibiis, & lyraedidisse, ut & mare & ventos mulcerent. Cantu vero suo navigantes occidisse passim apud diversos Poëtas legere est. Deorum cum Ulysse colloquio vide apud Ciceronem carmen.

Cicer. l. 5. de finib.

Plin. l. 10. c. 27.

SELEUCIDES aves vocantur, quarum adventum Cassii montis incolæ, locustis fruges eorum vastantibus, à Jove precibus impetrant nec unde veniant, quove abeant, compertum, nunquam conspectæ, nisi cum præsidio earum indigetur. Voracitatem eis antiquitas tribuit. Ingestas locustas nullo negotio per alvum excernebant.

### CAPUT III.

*Du Phœnice, Cinnamomo & Semenda*

Herodot. Hist. l. 2.

Plin. H. N. lib.

Tzet. l. 5. Hist. Chil. 6.

PHOENIX fabulosa est avis. Herodotus nonnisi pictum se vidisse testatur. Plinius unum in toto orbe, nec visum magnopere scribit. In ejus descriptione variant Authores. Herodotus non tantum ei Aquilæ magnitudinem tribuit, sed & toto etiam habitu eidem similem facit. Alii Pavone majorem scribunt. Herodoto pennæ rubore perfunduntur. Plinio vero & Solino circa collum auri fulgore micant. Cætera perpureus dicitur, cœruleam roseis maculam pennis distinguentibus cristis, faciem, fauces caputque plumeo apice cohonestante. Idem Claudianus, Baptista Mantuanus & Lactantius produnt.

Locus. Amb. l. 5. Hexam. cap. 23. Plin. H. N. l. 10. cap. 2. Solin. Polyhist. Tacit. l. 14. Anim. Vetus.

Athenæ. lib. 14. Dipnos. Partus. Tacit. l. 14. Anal.

Ætas.

*Locus* ipsi quidam Arabiam assignant. alii Heliopoli civitate Ægypti primo visum reliquere. Quidam sub æquinoctiali ad Orientem & Meridiem reperiri scribunt. Claudianus, & Lactantius inaccessa loca habitare cecinerunt.

Nec de *victu* convenit. Plinius primum atque diligentissimum togatorum. Manilius de eo prodidisse author est, neminem extitisse, qui viderit vescentem, quidam rore victitare dixerant. Ovidius thuris lacrymis & succo amomi vivere scribit. De *Nidificatione* ejus & in parentem amore ita Tacitus: *Confecto annorum numero ubi mors propinquat; suis in terris struere nidum, eique vim genitalem adfundere, ex qua factum oriri, & primam adulto curam sepeliendi patris, neque id temere, sed sublato myrrhæ pondere, tentatoque per longum iter ubi par oneri, par meatui sit, subire patrium corpus, inque solis aram perferre atque adolere.* Idem Herodotus, ex quo ille desumisse videtur.

*Annorum* illorum numerus varie definitur. Maxime vulgatum quingentorum spacium, sunt qui asseverent mille quadringentos sexaginta unum interjici. Plinio sexcenti sexaginta placent; Philostrato sexcenti, Herodoto, Solino, Melæ quin-

genti quadraginta. Alberto trecenti quinquaginta; Chæremoni Ægyptio, sex supra septem mille. De *terrīs* quoque variatur. Jarchas Indus apud Philostratum prope Nilum assignat. Alii in Æthiopia, ut Chæremon Ægyptius, & Orus Apollo. Alii in Phœnicia, ut Lactantius.

*Nido* materia aromata, Cinnamomum, Cassia, thurisque furculi. Ubi illum conscendit, solaribus sese exponit radiis, alarumque continua ventilatione ignem excitare fingitur: sic se cremat. Ex cremato novum oriri pullum convenit inter omnes; quomodo vero id fiat, ambigitur. Plinius ceu vermiculum ex ossibus & medullis veteris Phœnicis primo pocreari, ex eo pullum nasci scribit. Philostratus nulla vel ossum vel medullarum mentione facta, ex cinere vermem, ex verme novam alitem generari nugatur. Oppianus ex cinere pullum exoriri refert. Orus ex effuso è patris vulnere, quod sponte sibi nimia ad terram allisione infligit, sanguine procreari affirmat. *Sexum* illi nullum attribuit antiquitas, sed inter vitæ remedia reposuit. Nam Plutarchus cerebrum ejus dulce esse tradit, nescio à quo gustatum; & Plinius inter prima à Magis ex cinere ejus nidoque medicinas proditas esse scribit. Heliogabalus in conviviis Phœnicem promittebat, aut M. auri libras pro eo.

Plut. l. de sanituenda.

CINNAMOMUS seu Cinnamologus, avis hætenus nobis incognita est. Herodotus grandem esse dixit. Vicentius Belunensis passere aliquanto majorem, coloris partim flavi, partim cœrulei, rostri longi ad flavum vergentis scripsit.

Herodot. in Euterpe.

*Locus* ipsi ab Antiquis in Arabia assignatur. Dionysius Periegetes terram ignorari una cum Herodoto memorat. Albertus in Æthiopia eum locat.

Albertus l. 23. de Animal.

*Nidum* ponit seu in excelsissimis arboribus, earumque ramis, seu in montium præruptis, illumque ex cinnamomi furculis exstructum. Aromate hoc cum potiri Arabes volunt, boum, asinorumque defunctorum membra minutatim concisa, juxta nidos ponunt, & absedunt. Frustra aves in nidos comportant, quibus sustinendis illi impares decidunt, & ab incolis colliguntur.

De SEMENDA non est quod dicam. Multa quidem sed parum verisimilia de illa Indica commentaria produnt. *Caput* ipsius, quod esse putabat, quod Aldrovandus in Musæo Lucis Florentini vidit, erat curvum, & valde crassum, colore in anteriore parte albicante, in posteriore purpureo obscuro, figura ovali. *Rostrum* habebat palmum longum, admodum acutum, intus quidem cavum, sed sine tribus illis fistulis, quibus musicam harmoniam à Semenda edi, quidam fabulati sunt.

Aldrov. Ornith. lib. 12. cap. 28.

M A N-



## M A N T I S S A

D E

## A V I B U S

## Exoticis ad nostrates accedentibus.

## I. De Aquilis.



D Aquilas pertinent *Itzquauhtli & Tlacoquauhtli* Indorum, nec non Leonis Africani *Ners*. Venu-

stum illud aquilæ genus, & insignito capite regium. Rostro est ad radicem luteo, deinde vero nigro, nigris unguibus; pedibus pallidis, cruribus ventreque è nigro & candido permixtis; collo fulvo, dorso & cauda nigris ac fuscis, corona cristave nigra. Magnitudinem circiter æquat vulgaris arietis, & vel ferocium audaciam animalium, adeo ut homines etiam ipsos, postquam cicurata est, levi ex causa aggrediat & involet: mitescit tamen, & aucupio non minus ac reliqui accipitres, quorum genus videtur, idonea est, atque inservire solet. Avis digna quæ à Regiis aucupibus alatur ac circumferatur. Vilior est *tlacoquauhtli*, seu aquila virgæ: frigidas amat plagas: asturis magnitudine, fulca & cinerea, rapax avicularum, murium, lacertarum, colotorum, quibus vescitur. De *Nesir* suo ita Leo Africanus: Avis est omnium earum, quæ in Africa reperiuntur, maxima, grue procerior, crassiorque, prædita rostro, collo & cruribus: adeo sublime volat, ut oculorum aciem effugiat, & conspecto alicujus animalis cadavere, supra terram jacente, illico in illud irruat. Raro sola, sed gregatim volare solet. Longæva est, nam pleræque conspectæ sunt calvo & deplumi capite, tanquam vulsæ fuissent capitispennæ: inde colligere licet, prænimio senio pennarum defluvium pati: ea de causa suos nidos veluti recenter natæ repetunt, unde à suis pullis educantur. *Coronata* in provincia Chiapæ habentur, ut apud de Laet in Novo orbe habemus.

## II. De Noctuis.

Exoticum Oti genus *talehiquatli* videtur. Cornuta avis est sive auriculata, parva corpore, resima, rostro brevi, nigra lumine, lutea erubescens iride; fusca & cinerea plumis usque ad crura, atra & incurva unguibus. Cetera natura similis no-

strati Oto. Apud eosdem Americanos *Te-coletl* genus est bubonis auriti, spectaculo dignum, nigro & fusco colore variegatur huic oculi magni & aurei.

## III. De Struthio-Camelo.

Species quædam *Struthiocamelorum* in Insula Maragnana invenitur. Proceritate staturam humanam superant, & maximæ sunt velocitatis. Magis supra terram feruntur quam volant. Barbari *yandeu* vocant.

De Laet  
Orbis  
Novilib.  
16.c.14.

## IV. De Psittacis.

Placet hic quædam de Psittacis ex *Hernando, Ximene, Clusio & Nieremberg*io adjicere. Ille primus ita scribit, de *Toznen*: Psittacei id genus, viridi & luteo colore micat, oculi rubeo, rostrum vero candenti & nigro, fusco pede, sed in candidum inclinante. Propensius est, aptiusque ad sermones humanos exprimendos cæteris, ac frequentius apud Hispanos. Alterum genus *Coch*o vocant viridi colore, rubro & candenti capite, ac minoris molis; quod loquax est, nec admodum dissimile præcedenti, etsi sono distet. Hos Psittacos vocant Hispani catherinas. Tertium *Quiliton*, tinctum virore, talandriæ vocatæ, aut galeritæ non cristatæ magnitudine. Frontem candida macula insignitum, rostro candido & nigris pedibus. Humanas voces imitatur, & gregatim cum congeneribus volat, cum reliqui compares tantum reperiuntur. Omnes vero in excelsis arboribus nidificant. Primum de quo diximus genus, certas statasque arbores, quas nunquam deserat, eligit: quæ cum in hæredes transeant, dominis illarum haud sunt parum utiles. Sunt & quas Haitini *Quacamayas* vocant, Mexicanæ vero *Alo*. Totæ rubæ, præter humeros & caudam, quæ cyanea sunt, & gallinæ corticalis nostræ circiter magnitudine, rostro magno candenti & resimo, pedibus nigris, ac carne similiter nigra, ex quibus nonnullæ offenduntur, quæ sermonem humanum doctæ æmulentur; rustice tamen & incondite: filiosque suos more aliarum avium domesticarum educunt in domibus ubialuntur. Offendas & alios virore diluto tinctos, nigrante rostro pedibusque, humeris & cauda virore tinctis

Nierem.  
Hist.  
Exot. l.  
10. c. 30.  
& 31.

Leo Afri-  
can. Afri-  
cæ l. ult.

Nierem.  
Hist.  
Exot. l.  
10. c. 39.  
& 40.



exaturato, nec præfatis minores. Vivunt hi juxta montium cacumina, excelsasque pinus. Acclamant vehementer, volantque bini. Sunt & montani incondita forma, qui non cicurantur aut aluntur domi. Nullius eorum caro est edulis, nam & atra est, & gustus injucundi. Omnibus est commune, utramque maxillam movere, quod nulli aliorum contingit animalium. Sunt & alia genera, de quibus alii Auctores latius.

*Ximenes* sic habet de Hispaniola loquens. Innumeri sunt Psittaci virides cum purpureis maculis, quorum *tria* in hac insula genera, *maiores*, *mediocres*, *minimi*. *Majores* ab Indis vocantur Higuaræ. Hi in eo distant ab aliis reliquarum insularum, quod maculam albam supra rostrum gestent, non viridem aut miniatam. Valde locutuleiæ sunt hæ higuaræ, si humanos doceantur sermones. *Minores* vocantur *xaxavis*, & viridiores sunt, à paucisque interstinguuntur miniatis plumis. Hi inquieti & turbulenti, mordaciores, iracundiores, & garruli, licet rudes humanis loqui vocibus, quas nunquam discunt. Decem ex his invadunt & fugant centum higuararum. Nulla inter hos pax. Diversis gregibus pervolant quacunque pervadant, garriunt. Higuaræ integriorem & corpulentiorē edunt sonum, *xaxavis* acutiorē & tenuiorē: & licet ignari humanis vocibus loqui, placent tamen in caulis assiduo garritu & inquietudine. *Tertia species minimorum* est, nec excedunt passerēs mole, viridesque sunt. Hi silent, & pacatiorē sunt: viror dumtaxat in illis placet.

*Clusii* Historia hæc est. Inter Neotericos autem; nemo mea opinione exactius & diligentius de hoc avium genere commentatus est quam Ulysses Aldrovandus Bononiensis, qui totum librum 40. Tomi primi Ornithologiæ suæ ei dicavit: Ille enim Philosophica methodo tradidit quicquid ad Psittacorum historiam pertinere potest, & quatuordecim diversas eorum species describit, tredecim vero icones exhibet, quarum duo priores maximæ sunt, & corvum magnitudine superant; tertia & quarta columbæ sunt magnitudine; quinta, sexta, septima, octava, nona, & decima mediocres sunt magnitudinis, caudamque brevem habent, saltem non adeo longam, ut tres subsequentes, quæ longiore cauda sunt præditæ: decima quarta brevem etiam habet caudam. Priorem illam elegantem, quæ Pectoris & ventris pennas flavas habet, tum & eas quæ alas dorsumque tegunt, tum etiam eas quæ in cauda cœruleas, non semel videre memini, & iconem habeo vivis coloribus expressam, atque illam ipsam esse arbitror, quam Joannes Leri cap. XI. Historiæ suæ Americanæ, Canide à Brasilianis appellari scribit. Alteram

speciem etiam videre memini in arce Cæsaris Ebers dorfiana ad Danubium sita infra Viennam, tum etiam Lugduni Batavorum apud Sionem Lucium Danistam binas aves ejus generis, quas postea Magno Duci Moscovitarum dono mittebat. Reliquæ vero species, (præter tertiam quæ illi albicristata est, & decimam quartam, quæ erythrochloros, etiamque cristata) mihi etiam conspectæ, dum plerumque aliæ ab ipso non descriptæ, tam breviori cauda præditæ, & majuscula corporis mole, quam minoris generis, quæ longiores caudæ pennas habent, & collum velut torque rubro atque atro ornatum. Humana verba exacte exprimere solitæ: quibus similem unam habuit nobilissimus vir Philippus Marnixius Sanct-Aldegondius, quam sæpe cacchinum humano morē extollere audivi, cum ab adstantibus Gallico sermone compellaretur hoc modo. Riez perroquet, riez; id est: Ride psittace, ride. Sed quod magis mirum, Gallico sermone etiam subiciebat illico, tanquam ratione prædita, haud dubite tamen ita edocta. O le grand sot qui me fait rire, hoc est, O magnum fatuum; qui me ad ridendum provocat. Illaque verba iterum ac tertio repetere solebat. Sed inter reliquas unam, psittacis primæ speciei magnitudine æqualem, apud Illustrissimam Dominam Mariam de Brimen, Duce[m] Croyam & Areschotensem felicissimæ memoriæ, priusquam ex Hollandia excederet, cui sane parē in coloris pennarum varietate & elegantia videre non memini. Etenim licet omnes fere pennæ corpus tegentes rubro colore essent infectæ, caudæ tamen pennæ, quæ valde prolixæ, partim rubræ erant, partim cœuleæ; at quæ in dorso & alis versicolores ex flavo, rubro & viridi, quibus cœruleus color etiam permixtus. Caput circum oculos albi coloris erat, sinuosisque lineis nigris, quemadmodum caudæ caput, distinctum erat. Psittacum, qui similis esset, apud nullum Auctorem descriptum memini. Ea porro avis Annam Illustrissimæ Ducis neptem, nunc Comitem Mergensem & Dominam de Grosbetee, adeo diligebat, ut quocunque per conclave spatia[re]tur, illam subsequeretur, nec quemquam vestem ejus attingere conspiceret, quin morsu illum appeteret, ita zelotypia quadam laborare videbatur. Ceterum psittacus ille majoris generis, quem Leri capite supra memorato à Brasilianis *Arat* vocari scribit, valde elegans etiam esse debet: nam alarum remiges pennas, & caudæ, quæ sesquipedalis longitudinis, media ex parte coccinei coloris esse refert, altera prorsus elegantis cyanei tubo seu nervo, qui medias pennas per longitudinem secat, diversos illos colores distinguente, reliquas vero



vero totius corporis pennas prorsus cœruleo colore tinctas esse. Addit utrumque genus illud majorum psittacorum. Arat videlicet & Canide, magna esse in æstimatione apud Brasilianos, quia illorum pennas ter quaterve in anno vellunt, ad vestem, pileos, clypeos & aulæa conficiendum, tametsi domesticum non sit, quia tamen in vastis arboribus medios vicos occupantibus frequentius versari solet quam in silvis. Præter binos illos ingentes, idem Lerus tria aut quatuor Psittacorum genera apud Brasilianos inveniri ait: *Primum* videlicet etiam majusculorum, & crassiore corporis mole præditorum cui *Aicurous* nomen indunt Brasiliani Tououpinamboutii, caput ornatum habens versicoloribus, flavo, rubro, & violaceo extremis alis sua verubentibus, & caudæ pennis oblongis & flavis, reliquo corpore prorsus viridi: hoc genus rarissime ad externos transferri, nulum tamen facilius & perfectius edoceri ad humana verba pronuntianda, quam istud. Addit etiam, Brasilianam quandam mulierem in pago, binis milliaribus ab Insula in qua ipse cum aliis Gallis habitabat, distante, similem psittacum in deliciis habuisse, qui eo intellectu & ratione præditus videbatur, ut comprehendere & discernere posset, quidquid ipsa diceret quæ illum educaverat. Nam cum, inquit, animi recreandi gratia, in illum pagum profecti, ante illius mulieris ædes interdum, transiremus, compellare nos ipsa solebat his verbis: Vultis mihi pectinem dare vel speculum, & illico efficiam ut meus psittacus coram vobis cantet & saltet? Si ejus petitioni annuebamus, simul ac quedam verba avi pronunciaverat, psittacus non modo in pertica, cui insidebat, saltare incipiebat, sed etiam garrere, sibilos edere, & Brasiliorum ad pugnam sese parantium vociferationes imitari. Breviter, quando in ejus heræ mentem veniebat ut diceret, Canem, canebat; Salta, saltabat; sin vero ægre ferens, se quod petierat non impetrasse, paullo acerbius avi diceret, Auge, hoc est. Sile, immobilis silebat, nec ulla ratione eum ad linguam aut pedes movendum excitare poteramus. *Secundum genus Margarinas* à Brasilianis appellatur, quale est eorum psittacorum, qui in Europam inferri solent, nec magni apud illos pretii, propter abundantiam non vero minus istis frequentes sunt, quam apud nos columbæ. *Psittaci tertii generis*, ab ipsis *Touis*, appellati, majores non sunt sturno, & universum corpus tectum habent pennis impense virentibus, caudæ vero pennæ, quæ valdè longæ, flavum colorem admixtum habent. Illud etiam addebat se observasse, psittacos illius regionis nidos ex arborum ramis propendentes non construere, ut topographi-

cis suis tabellis quidam persuadere conantur: at in arborum cavis, eosque orbiculari forma, satisque duos ac firmos. Ceterum cum sub extremum annum Christi millesimum quingentesimum sexagesimum quartum esse Olyssipone apud Sebaldum Linsium Germanum Ulmensem, memini filium ipsius Eodericum ex Fernambuco Brasilianorum, ubi commorabatur, eo appellere & navem mercibus onustam advehere, in qua etiam aliquod mancipia, & nonnulli psittaci quartæ speciei ab Aldrovando descriptæ, atque alii etiam minores, sturni magnitudinem non excedentes, prorsus viridis coloris pennis tecti, sed omnes brevi cauda præditi, & albo rostro: idque genus valde frugibus noxium referabat. Eos in itinere maizi granis alueret, cujus multas spicas eum adhuc habere observabam. In *secunda navigationem*, quam Batavi in Indiam instituerunt Orientalem, in Java vicinisque quibusdam Insulis psittacos observabant longe illis elegantiores, quos è Brasilia advehere solent, eosque à Lusitanis, qui in Java & Moluccis versabantur, noyras appellari intelligebant: & illos quidem corporis mole non valde magnos, sed adeo elegantis coloris, ut venustiores depingi non posse existimarent. Pectus enim & ventrem pennæ rubri coloris floridi splendentisque tegebant, dorsum aurei coloris pennæ, alas vero viridis & cærulei commixtorum colorum pennæ ornabant, sub alis suave rubens color splendebat. Valde autem ingens erat istis illarum avium pretium, ut non minoris æstimarentur, quam octo aut decem thaleris Germanicis. Linscotius scribit, Lusitanos sæpius periculum fecisse, an Olyssiponem transferre vivum aliquem possent, sed nunquam voti compotes factos fuisse, quod nimis tenelli & delicatuli sint: Batavi tamen eam Industriam adhibuerunt, ut unum vivum Amstelodamum usque retulerint, qui tametsi non esset è selectissimis, centum tamen & septuaginta florenis ejus Provinciæ, hoc est, paulo plurius quam septuaginta thaleris venditari potuit, quemadmodum in diario illius navigationis adnotatum comperio. Is in itinere pleraque verba Hollandica, quæ à nautis audiverat, pronunciare didicerat, adeoque cicurem ipsum ejus herus reddiderat, ut rostrum in os & aures ejus inferebat sine noxa, pilosque barbæ ipsius componeret; at si quis alius manum admovere vellet, illico morfu illam appetebat, haud secus quam canis quispiam. Anno porro Christi quinto supra millesimum & sexcentiesimum mittebat mihi Jacobus Plateau psittaci cujusdam iconem vivis coloribus expressam, cui cum similem hactenus non viderim, neque apud quempiam adscri-



ptum meminerim, in hoc Auctario ad Exoticorum historiam typis jam expressam adjunctam volui. Eum autem se plus quam biennio aluisse scribebat, columbæque esse magnitudine: caput illud habere pæne instar accipitris, ejusmodi nempe coloris pennis tectum, ardentes oculos. Collum & pectus versicolores pennæ obsidebant: quas, cum irascebatur, aut molestiam aliquis ipsi crearet, admoto ad cavæam, qua conclusus erat, aliquo animali, furrigebat, ut cristatus quodammodo videretur. Erant autem illæ rubescentis coloris, & extrema parte cœrulei elegantissimi. Ventræ pennæ similis fere erant coloris, fusco tamen insuper suffusæ colore. Dorsæ pennæ virides & alarum remiges pennæ sub cœruleæ: cauda frequentibus pennis viridibus, sed non longis constabat. Prætermittere nequivi, quin psittaci pusillum, genus ex Ethiopia locisque Manicongo vicinis, proximis his annis à Batavis naucleris alatum, simul & maris iconem, (fœmina vero multo est elegantior, utriusque enim sexus allatus) Lectoris oculis proponerem. Corpusculi moles fringillæ magnitudinem æquabat, hoc est, duarum unciarum cum semisse longitudinem habebat ab infimo collo ad uropygium usque. Omnes pennulæ corpusculum tegentes viridis erant coloris, sed in quibus manifestum apparebat discrimen: nam quæ in dorso saturatiores erant, quæ in ventre dilutiores. Remiges alarum pennæ trium unciarum longitudinem habebant: & tametsi prona parte, eo videlicet latere quo brevioribus villis erant præditæ, quoque sese invicem tegebant, viridi saturo colore essent tinctæ altero tamen, quod longiores villos habebat, & tota supina parte fuscierant. Caudæ pennæ elegantissimæ erant & pæne binas uncias longæ, paulo minus semiuncia latæ, colore ea parte, qua uropygio infixæ, viridi cum flavo permixto tinctæ, deinde rubro eleganti, demum nigro, postremo viridi: & tres isti postremi colores ab invicem distincti, veluti in quorundam psittacorum viridum, majore corporis mole præditorum, caudæ pennis videre est: istæ autem vix conspiciebantur, nisi cum caudam explicaret, quia ab aliis ejusdem longitudinis tegebantur, quæ prorsus virides. Collum breve & crassiusculum: plumulæ caput tegentes breves admodum & virides præter eas quæ verticem supra rostrum, quæque totum guttur tegebant; nam illæ rubrum, elegantem & floridum colorem habebant. De mare loquor, quia fœminæ pennulæ dilutius rubebant, neque tam amplum spatium occupabant, quam in mare. Oculi erant nigerrimi: rostrum crassum & firmum, superna pars adunca & mucronata, ut in reliquis psittacorum generibus

ejus color subrubens, crura brevia femur cæ longitudo vix æquabant, cineraceique coloris squamis erant tecta, ut aliorum vulgarium psittacorum pedes, iique in quatuor digitos divisi, quorum bini anteriores & imparis longitudinis, bini posteriores & illi etiam impares, brevioribus quidem articulis duobus præditi, hi interni; longioribus autem tribus, & hi externi. Ungues albi & satis longi. Valde exilem habere vocem, & dumtaxat pipire observabam. Gaudet Consortio. Cum edebat, altero pede cibum non tenebat ut alii psittaci, sed rostro carptim cibum arripiebat. Cibus autem magna ex parte phalaridis semen: illo enim libentius vesci observabam, quam ullo alio seminis genere. Mihi autem quidam conspecti sunt adeo edocti, ut panem aqua tinctum carptim morficando ederent. Potus est aqua. Illud præterea in hac avicula animadvertabam, quod fœmellæ senescentes vix edere volebant, nisi cibum jam à mare carptum, & aliquamdiu in prolobo retentum, & quasi coctum suo rostro reciperent, ut columbarum pulli à matre ali solent.

Apud Nierembergium de Guacamayan hæc leges. *Guacamayan* genus psittaci est pulcherrimi, qui cum pueris ludit. Incompositæ formæ est, solo vestitu in pretio habetur, neque prætermittenda industria & mirificus instinctus hujus alitis. In Potosi quidam psittacus, quem lorum vocant, admirandi ingenii. Vocabat Indos occurrentes patriæ suæ nomine Colla, leuca, Huayru, Quechua, &c. quasi qui ipsorum mores & vestimenti ritus dignosceret. Dissimulatam Indam nobiliori natu & pæne Regio dignovit. Cum vidisset illam, dixit: Huayru, Huayru, Huayru. Ignobilior ista natio est, quam illa cujus generis se simularet fœmina. Finxerat se Pallam è Regia stirpe. Matrona partim pudens, partim irata, sputo & maledicto avem affecit. Hispani etiam alius psittacus agnovit Medicum indignum nomine & arte; quem, quotiescunque occurrebat, convitiis variis proscindebat è fenestra, donec lite impetravit Medicus ne suspenderetur ibi. Alius Psittacus tabernarii vinarii solitus audire illum domi querentem vinum non vendi, quod acetum esset. Didicit hæc verba, atque ad januam suspensus garriebat repetito præconio, Acetum est. Acetum est, quod facile fuit ementibus credere: donec herus madefaciens (aquam enim odio habent hæ aves) & castigans psittacum dictavit, Optimum merum, Optimum merum, quod psittacus sic animadversus didicit, & postea ad januam identidem publicabat, optimum merum esse. Multi psittacorum simplicissimi, ut ad crocitantem psittacum ex arbore, in

Nieremb.  
Hist.  
Exot. c.  
63. & 46.

cujus



cujus ramis aucepslatet, multitudo ingens convolitet, capique facile patiantur: nil enim viso aucupe terrentur, sed ut laqueo trahantur ad collum coniecto expectant, nec aufugiunt uno captato, & in mantica, qua præcinctus est Venator ipsis cernentibus reposito. Psittaci faciem universim exprimit, quem quoque cantu ad amussim æmulatur *Neyra*, quæ ex Moluccanis Insulis in Indiam importatur, pennis tamen rubris crebrioribus vestita est. Illarum una viginti aut triginta pardavis in India vxnit, quæ postquam cum psittacis & aspectus amœnitatem, & garritus jucunditatem communem habeant, hoc sibi peculiare quoque vendicant, quod educatorum suorum, aut alias quoque adstantium capita & barbas, ut & aures dentesque linguis suis blande defricent aut allingant, quas partes studiose quasi ad vivum emungunt, & emundant, adeo ut illarum altoribus ex his gesticulamentis oblectationis emergat haud parum. Taceo, quod acutius attendenti coloris jucunda varietate psittacos haud leviter exsuperare videantur.

## V. De Picis.

Nierem.  
Hist.  
Exot. lib.  
10. cap.  
48. 49.

**P**Ræter enumeratas Picorum species dantur adhuc apud Americanos duo Pice nempe *Salutiferi* & *Imbrifeti*. Ille *Heuhqueholtotl*, seu avis capiti similis dicitur. Nobilis est à capitis dolore levando. Merula major est, rostro longo nigroque, sed inferna parte longe breviori, vertice ac pæne toto collo desuper rubeo, infernis partibus omnino cinereis; alis vero ac dorso nigris, sed albis transversisque lineis variatis. Degit Pavatlanicis agris provincie Totonacapæ. Pici species est arbores perforans, cujus capitis plumæ rubescentes applicatæ & conglutinatæ, capitis feruntur curare dolorem; sive in eam sententiam venerint, quod vertici avis adhæreant, sive id ita se habere experimento aliquoprehenderint. Hic *Quatotoni* audit, Upupæ magnitudine & fusco colore variatur. Rostrium, quo excavat arbores perforatque, tres digitos longum est, firmum & candens, & inferne brevius. Caput est parvum, ac rubris contextum plumis, crista quoque rubra insignitum, ac tres uncias longa, sed superna parte nigra. Alterutro colli latere fascia candida descendit ad usque circiter pectus. Crura pedesque livida sunt. Vivit non longe à mari Australi. *Nidificat* in arboribus excelsis: *vescitur* cicadis, tlaolli, & vermiculis: imbrium tempore educat, hoc est à mense Majo usque ad Septembrem: edulis tamen non est, nec alium (quod acceperim) præstat usum. Pici Martii datur in Nova Hispania species maxi-

ma. Cujus pulvis salutaris est hydropicis.

In Nova Galacia *Pica* sunt exiles, nec passeribus multo majores, sed tanto numero, ut integram segetem, ubi semel aristis incubuerint, prosternant atque conculcent, neque clamore aut aliis terculamentis deterreantur. Est & *Pica Xochitlacatl* dicta columbæ magnitudine, rostro præ corporis mole maximo, superiori parte luteo, inferiori vero subnigro, & in purpureum colorem vergente, oculis nigris, sed iride rubescente ex luteo, ac reliquo corpore cœruleo cinereoque. Vivit circa litora Oceani Australis; piscibus, quos rapit, vesci solet. *Iconem* vide apud Nierembergium *Historiæ Exoticæ* pag. 209.

## VI. De Sturno.

**A**D Surnos videtur pertinere quæ *Pterophænicus Indiarum*, & *Acolchi* dicitur, de qua sic Nieremberg. Alarum insignie commendat acolchichi, seu avem humerorum rubeorum, impetravitque ab Hispanis honorificum nomen, qui aves commendadoras illas vocant, quod æmulentur Equitum militarium insignia. Simili rubore ad latus fulgentia. Sturnorum, quos Hispani tordos vocamus, videatur species. Magnitudine, colore, & forma pares sunt, & cum eis ubicumque versantur, quanquam humeri primo fulvi appareant in rubrum vergentes, & cum ætate processere, in fulvum omnino mutantur colorem. In caveas coniecti, voces reddunt humanas, & lepide garriunt. Quavis reoblata vescuntur, sed pane maxime atque Indico frumento. Calidis frigidisque eas aves reperies regionibus, ab Hispanis colonis rubeorum humerorum commendadozas, ut dixi, vocatos, sed numerosis agminibus sunt oppidanis admodum molesti, eosque audacter incurfant, præcipue regionibus fervidis & maritimis. Malum insuavemque præstant succum, & in arboribus non procul ab oppidis hominumque commercio nidificant, & sata, in quibus forte confedere, devastant atque depopulantur. Cantant luduntque, seu caveis includantur, seu libere per domos permittantur incedere.

Nierem.  
Hist.  
Exot. l.  
10. c. 59.

## VII. De Coturnicibus.

**D**E Coturnibus idem Nieremborgius: Corturnices vocabat Nova Hispania *Colin*, quarum genera ex Francisco Hernando dabo. Nostratibus sunt similes, etsi ad perdicum species sint citra dubium referendæ. Multa genera apud Novos Hispanos reperiuntur nonnulla fusca & cristata, quæ *quahitzonecolim*



nuncupant, mediocris magnitudinis; alia fusca quoque, sed cristarum expertia, & paulo minora, alia omnium maxima fulvaeque, sed capite albo & nigro, colore variato, extremis vero alis dorsoque candentibus, pedes vero ac rostrum nigra sunt. Hispanis, ut dixi, coturnicibus assimilantur. Omnia & bono & grato constant alimento, si tamen jugules duobus tribusve diebus, antequam assa apponantur mensis. Exhibetur earum caro etiam male habentibus: nec est apud Indos ulla alia post cohortales, quæ illi possit anteferri, aut alimenti salubritate aut gustu. Canunt nostratium instar, etsi aliæ aliis suavius. Caveis includuntur: vescuntur Indico nostrove frumento, & sunt quamplurimis hujus plagæ locis familiares. Alibi idem Auctor de *Coyolcozque* seu colli sonali inquit: species est colin, seu coturnicis Mexicanæ, inter quam plures alias, de quibus loquemur seorsim. Ergo coturnicibus vocatis à nostris similis hæc est, magnitudine, cantu, nutrimento, volatu & moribus. Sed diverso colore, qui superne est ex fulvo candidoque commixtus, inferne vero tantum fulvus, etsi verticem & collum nigrantes albæque plumæ occupent; & tæniæ ab utroque latere adeoque à collo ad utrumque collum efforment atque constituent. Oculi sunt atrii, & fulva crura. Indigena avis est, campestribusque locis, velut & nostras, frequens, ac simili etiam alimento, quod ad illud perdicis Hispanicæ (est enim ejus species) proxime accedat. *Colcuicuiltic*, seu coturnicis simulacrum, coturnicis quoque nostræ species est, albis, nigris coccineisque variata plumis, & protractis desuper potius lineis quam circumscriptis maculis, subter vero potius maculis frequentibus, quam lineis, pedes cruraque cyanea sunt; sed cantu, magnitudine, moribus, cæterisque cunctis præcedenti omnino similis. Sturno est *Acolin* magnitudine par, cruribus pedibusque viridi pallescentibus, & in quatuor divisis prolixiores digitos. Rostrum est luteum, & longiusculum pro corporis proportionem, tenueque & mucronatum, oculi nigri, iris fulva, caputque parvum. Inferna corporis candida sunt, lateribus fusco maculatis colore, superiora vero & cauda, quæ breviuscula est, fulva sunt, sed maculis nigricantibus distincta, & candidis lineis quasvis pennas circumambientibus, ejusdemque coloris punctis nonnunquam conspersis. Lacus incolit, piscosumque est, nec tamen admodum ingratum præstat alimentum. Vermiculis, muscis, & aliis parvis animalibus quæ volitant circa paludem, victitare solet. Indigena est Mexicani la-

cus. Caput mira colorum varietate micat; Quod medium atra linea secant, ac velut cinereæ aliæ latera, maculæ vero parvæ & candentes canthos externos: collum pectusque cinerea sunt, cætera è fulvo in viride potius inclinant.

#### VIII. De Perdicibus.

**S**unt in Peruvia Perdicæ quas à sono *Stutu* vocant. Duorum generum. Aliæ majores, quæ mole accedunt ad Gallinas, & tantum in solitudinibus reperiuntur. Aliæ minores quam Hispanienses, sed carne longe optima. Utræque sunt colore pardo, rostris & pedibus albis. Ibidem sunt aviculæ plumis rubicundis, quos Hispani ob similitudinem nominant *Luscinias*, quanquam cantus harum sit adeo ingratus, ut mali augurii olim dixerunt barbari.

De Laet.  
Ind. Oc-  
cid. l. 10.  
cap. 5.

#### IX. De Turdis.

**G**enus Turdorum Chrappam incolit, quos vocant *Passeres fabros*. Nigri sunt, solam in pectore & capite rubri. Fructu quercino dumtaxat vescuntur. Rostrum perforant corticem pinnum, glandem singulis foraminibus aptissime accommodant, ut manu extrahi nequeat, sic omnem pinum ornatissime cingunt glandibus incis, Mox pedibus hærentes cortici, tendunt rostrum glandem, & vorant. Alia sententia Gomaræ est de Passeribus, quos vocant Hispani *carpinteros*. In Dariene scribit nasci palmas, quarum truncus per extrema attenuatur: in medio nidificare quosdam passeris excavato rostris nidos. Hos passeris vocat ipse *Pitos*, & putat esse quos Plinius Picos dixit, Hispani Fabros. Addit ex Aliquorum sententia, vim recludendi nidos ferro impeditos non esse alicujus herbæ, sed ipsius pici, cujus tactu infringi metallum.

Nierem.  
Hist. E-  
xot. l. 10.  
c. 57.

#### X. De Anatibus.

**G**enus est Anatis quam *Acitli* seu aquatilem leporem consueverunt vocare Mexicenses. Hæc cum descripta delineataque à quibusdam recentiorum eadem prorsus esset, nisi caput longe majori insigniretur crista, atraque, venter colore argenteo splenderet, & collum inferne niveo, superne vero è nigro vergente in fuscum. Lacubus innatat, ac juxta eos perpetuo versatur: nam neque volandi potis est, neque per terram commode incedendi; femoribus ita reliquo corpori connexis atque coalitis, ut natatui non incuissui queant inservire. Piscibus quos involat *vescitur*, indeque victitat. Prolem in juncetis atque arundinetis educat; nec anatum nostratium vulgarem vincit magni-

Nierem.  
Hist.  
Exot. l.  
10. c. 35.



magnitudinem. *Masculus* aliquanto longior est, corpore, collo ac crista ampliori. Rostrum fœminæ brevius est, nigrum & utrimque juxta oculos plumis fulvis tectum, cum mascandentibus tegatur. Hæc est avis illa, quam Indi fabulantur ventos evocare, ubi se peti ab aucupibus sentit, quibus flantibus turbatisque undis evertantur monoxyla, illamque insequentes submergantur, si quinque prius sagittis excussis arcu non contingat attingatque trusidari. In ejus dissectæ corde reperiri gemmam arbitrantur ad multa utilissimam, & maximo habitam in pretio, nec alii quam Deo consecrandam. Verum hæc nugæ sunt, & mendacia ab horum hominum profecta credulitate. Insuavi parumque salubri, velut & aliæ aves palustres, nutrimento constat, atque ideo à nullo sagacioris palati in cibos admittenda.

Est & apud Indos *genus quoddam anatis feræ* (hirundinem Hispani Indigenæ appellant) *tempatlahoac* domesticæ magnitudine, quare idem usurpavit apud Indos nomen; rostro lato est & longo, undeque nigrante. Lingua alba, cruribus palmisque ex pallido rubescentibus, collo & capite viridibus purpureis, & nigro splendentibus colore, adeoque pavonino aut heliotropiæ gemmæ; oculi nigri sunt, & pallens iris, pectus candens, reliquum vero corpus inferre fulvum, & binis maculis juxta caudam utrinque candentibus insignitum, superne vero semicirculus quibusdam in ambitu ex albo, tendentibus in fuscum; intra vero è nigro in viridem splendentem. Alæ initio cyaneæ sunt, mox candidæ, & tandem virenti micantes splendore: earundem tamen extrema altero latere fulva sunt, altero vero fulgida atque viridia: cauda desuper subtusque per ambitum candescit, ceterum inferne nigra, pavoniæque vero superne. Advena est lacui Mexicano, & quale aliæ lacustres aves solent præstare alimentum. In Asia quoddam est genus anatum, quod non immerito quis inter cornicines retulerit, ita voce cornuum sonitum imitantur, quæ inflare solent per dispositos equos iter facientium duces. Est ea avis, quamvis inermis, audax & strenua: quam etiam malos Dæmones terrere, Turcis persuasum est: certe libertatis adeo retinens, ut etiam per totum triennium in corte nutrita, facultatem nacta, libertatem saginæ anteponat, sedesque naturales & suetos alveos volatu repetat.

#### XI. De Mergis.

Nierem-  
berg. hist.  
Exot. lib.  
10. c. 27.

**A**D Mergorum historiam pertinent Mergus Americanus, & Mergus maximus Farrensis seu Arcticus. Ille exiguis est alis, ideo monstrosa. Hic ita à

Clusio describitur: Avis marina est, & palmipes, anseris domestico major, aut certe magnitudine illi æqualis: nam à collo qua parte pectori conjungitur, usque ad uropygium, binos pedes longa erat: corporis ambitus binorum pedum longitudinem superabat. Alæ quatuordecim uncias longæ; cauda brevis, vix trium unciarum, collum fere octo uncias longum, ejus ambitus paulo major, caput breve, tres uncias latum, rostrum nigrum, mucronatum, quatuor unciarum magnitudinem superabat. Lingua pæne tres uncias longa, nigra, mucronata, cartilaginea, quodammodo carinata, superiore parte qua rostri parti connexa erat, parvis dentibus introrsum recurvis utrinque prædita, media autem parte aspera: palatum similiter quatuor exiguum & brevium dentium introrsum spectantium ordinibus constabat, quibus escam retineret & conficeret: nam rostrum dentatum non erat. Totum corpus densis pennis tectum habebat, quæ in pectore, toto ventre, & alarum supina parte breves & candidæ, in dorso autem alarumque prona parte longiores & nigre, singulæ tamen circa extremum, geminis maculis albis insignitæ, quæ in dorsi quidem lateribus longiores, majoribus, quæ vero circa collum in medio dorso aliisque supra caudam, minoribus, sic ut aliæ aliis incumbentes, invicemque tegentes ad maculas illas usque, eam fere varietatem repræsentarent, quæ in meleagride sive Numidica gallina conspicitur. Collum velut torque cinctum erat, è nigris pennis constante: caput etiam similibus pennis tectum: quæ tamen oculos & rostrum ambiebant, parvis maculis albis erant distinctæ; sub gutture etiam aliquas parvas pennas albas nigris permixtas habebat: prona similiter colli pars supra torquem illum nigrarum pennarum, ad uncie longitudinem parvis pennis nigris, latera tamen alba habentibus, erat ornata, quemadmodum & ea pars quæ infra torquem in pectoris atribus, infra podicem, nigrarum pennarum transversam lineam habebat, quas albæ subsequebantur, deinde sub cauda aliæ nigre albis maculis notatæ. Crura habebat in extremo corpore sita, paullo longiora tribus unciis, plana, nigra; pedes quatuor uncias longos, plusquam tres latos, nigros, tribus digitis preditos (quorum interiores tribus articulis constabant, brevioresque erant, medii quatuor, exteriores quinque) nigra membrana simul connexos ad ungues usque, qui plani. Singuli etiam pedes, in posteriore parte paullo supra inflexionem, parvum articulum instar calcaris habebant. Circa Farrensem Insulam, quæ inter Norvegiam & Islandiam



diam sita, captam hanc avem scribebat Hojerus, foetum in undis educare, nec nisi procelloso mari ac circa Autumnum, hiemisve initium conspici, terram vero nunquam attingere, nec volantem unquam esse conspectam, adeoque nec alarum usum habere ad volandum, nec pedum ad incedendum: quo fit ut nonnisi capite extet (eo referente) quando se conspiciendam præbet. Huic non valde dissimilis videtur mergus ille marinus, cujus meminit Gesnerus in Paralipomenis ad Historiam de Avibus pag. 767. nisi illi in dorso cinereas plumas nigris maculis confusas tribueret. Huic similis est aqueus lepus, cujus jam meminimus. Iconem vide apud Clusium.

XII. De Hirundine.

**C**laudat agmen *Avis cucullata aquatica*. *Hirundo Exotica aquatica & Gallinago silvestris aquatica*. Quas in suo Gazophylacio rerum Naturalium descripsit, & ære exprimi curavit Nobilissimus D. Doctor *Besslerus*, Amicus noster plurimum honorandus. De illa ita scribit: Animal hocce capite monstrosum, in aquis natere ex decubitu naturali conjicere licet. Comam quam in fronte cernis, ferruginei est coloris. Ex parte maxillarum plumæ flavescens repullulant, quæ in extremitate nigrio-

Bessler. in  
Gazo-  
phylacio  
Rer. Na-  
tural.

res factæ, circulum egregie repræsentant. Collum cum ventre albicat, dorsum cum aliis cineritii est coloris, extremitas tandem in albas definit plumas. Pedes cum adnatis membranulis, semicirculis distinctis albicant, ubi in quolibet pede unicum tantum unguem animadvertere licet. De *Hirundine Exotica aquatica* hæc habet: Quis non in volucre palustri summam colorum varietatem miretur. A capite enim inchoando, superior pars, candet, inferior rubro intermixto cœruleo colore splendet. Venter inferior floccorum nivis instar albicat. In dorso principio pennæ duæ nigricantes, albis punctis distinctæ exsurgunt. Alias dorsum universum, una cum cauda ferruginei coloris; alæ quidem nigricant, punctis tamen niveis ornamentis instar distinguuntur. Pedes exporrecti subfusci coloris, rostrum nigricans, ad subulæ formam effigiatum, quo pisces quasi hamo excipere solet.

XIII. De Gallinagine.

**D**E *Gallinagine Sylvestri aquatica*, ita idem paucis: Rara hæc est avis, in locis paludosis victum quærigans, colore atro & rufo, per totum corpus instar holoserici splendente, rostrum oblongum, quodammodo incurvatum, crura alta & fusca, digitos longos habet.

**E**T hæc sunt, quæ de Avibus dicere volui. Quæ omiffa sunt, studiosus harum rerum Lector, aliunde supplere poterit. **CENSORI** cujuscunque tandem status & conditionis is fuerit, hoc subsequens interserviat. *Veritatem ad suum arbitrium exigere, & inter mendacia reponere, quicquid palato non arriserit, impudens nimis, & in DEUM, universam naturam, & humanum genus, injurii hominis est.*

F I N I S.



*Aquila Gefneri*




*Chrysactos Aquila*



*Ungula*

*Aquila*










*Haliaeetus*




*Aquila*



*Pygargus*



*Anathria seu  
Morphnos*











*Melanctes uel Melanxetus.*  
*Aquila Valeria.*



*Melanctes*



*Aquila Pygargus alius*







*Pernopteros*



*Morphnos*

*Bellonü*



*Ossifragæ aliæ Species*



*Pernopteros alius*









*Morphus Congener*




*Oßifragus*



*Pereuopteros Aquila peregrinus*



*Heteropus Aquilæ  
Species*



*Anis Scythica*



*Chrysaetos  
Bellonij*









*Vultur Cinereus*




*Vultur Beticus*



*Vultur*

*Leporarius*






*Vultur Alpinus uel aureus*

















*Asterias*



*Accipiter Palumbarius*



*Accipiter Fringillarius Nisus*



*Tirumculus mas Wandwahr Stern schmatz*



*Tirumculus Famina*









*Accipiter Egyptianus*



*Subuteo*




*Lanius*




*Lanius*




*Lanius albus*



*Lanius cinereus Faemina*











*Cuculus*

*Tinnunculus Cenebris*



*Cuculus  
Alter*

*Dendro Falcus*



*Accipiter  
Species*




*Lanius*



*Lanius Minor*







*Lanius Collurio*



*Lanius alius*



*Lanius Miluus*



*Cuculus Guggauch*



*Buteo Trionches*



*Accipiter*

*minor*



*Accipiter maior*



*Milvus*









*Falco Rubens*



*Falco*

*Falco atter*



*Falco Orientalis*



*Falco*









*Aesala Falconis Species*



*Falco*



*Falco  
Peregrinus*



*Gyr Falco*



*Falco*

*Montanus*

*Mirle Smirlin*









*Psittacus Minor*



*Psittacus Maior*



*Psittacus*



*Psittacus*



*Psittacus Viridis*



*Psittacus  
Toikilorinchos*









*Psittacus Maximus*



*Psittacus Maximus alter*



*Psittacus viridis Melanoriuchos*



*Psittacus abus Cristatus*




*Psittacus Versicolor siue Erythrogaos*



*Psittacus Leucocephalos*



*Psittacus Cincereus*










*Corvus Rab*



*Corvus*



*Cornix*



*Graculus*



*Nebel*



*Coriacias Arist*




*Pyrhocorax*

*Coraceus*



*Pyrhocorax alius*









*Cornix Cerula*



*Cornix cinerea*




*Cornix Frugitega*



*Pica Indica*  
mas.



*Pica Caudata s. varia*



*Pica Indica*  
Femina



*Pica glandaria garrula*



*Pica glandaria species alia*



*Pica*



*Pica marina*









Bubo



Bubo



Bubo



Ulu



Asio  
bubonis Species



Bubo



Asio alius seu Scops



Asio seu Otus









*Ulu*

*Ulu*

*Ulu*



*Aluco*

*Noctua*



*Strix*

*Saxatilis*

*Noctua*

*Ulu alia*









*Caprimulgus*



*Caprimulgus alius*



*Vespertilio*



*Vespertilio*



*Vespertilio lactans*



*Vespertilio*





1800

1800

1800





*Struthocamelus*



*Gallus Monstrosus Caudatus*



*Pavo Sine cauda  
Chinensis*









*Pauo*



*Pauo Fæmina Cum hordeo Spurio*



*Pfawo*









*Pauo albus cum tritico multypli*



*Pauo Iapenonsis mas*



*Pauo Iapenonsis foemina*











*Gallina Indica Cum  
Ouo Eius*



*Phasianus*

*Gallina Afriana*



*Phasianus*









*Urogallus Maior*



*Urogallus seu Tetrao  
alius*



*Urogallus minor*



*Grigallus Maior*



*Gallina Corylorum*









*Attagen*



*Otis Cum Capite Arietino*



*Otis Trada*



*Avis Stellata*



*Charadrios*



*Oedienemus*










*Galgulus*



*Attagen seu Perdix*



*Pica Caudata*




*Carijactes*



*Ortygometra*



*Coturnix Wachtel*



*Rusticula minor*



*Mos Kuw*



*Capella*



*Acrops*




*Upupa*













*Perdix rufsa*



*Perdix cinerea*



*Perdix Damascena*



*Lagopus*



*Lagopus altera*



*Coturnix mas*



*Ortygometra*



*Hortulanus mas*



*Hortulanus famina*



*Hortulanus Congener*








*Gallus Cornutus*



*Gallus Indicus*



*Gallina Patauma*



*Gallus Patavicus*




*Gallina*



*Gallina Pimilio*



*Gallus*



*Gallus*









*Gallina Turcica*



*Gallus Turcicus*



*Gallina Persica*



*Gallus Persicus*



*Gallus Indicus*



*Gallina Indica*



*Gallina Guinea*



*Gallus Indicus mirabilis*



*Gallina lanigera*



*Gallus palustris*



*Capo*









*Gallinae Aquaticae  
species*



*Gallina  
hipoleucos*



*Ispida*



*Scolopax siue Gallinago*



*Erythropus*



*Erythra*



*Rusticula sylvatica*



*Gallinula terrestris*



*Scolopax seu Gallinago minor*



*Gallina Ochra*



*Gallina Serica*



*Gallina Rhodopes*









*Columbus*



*Columba Indica* rostro  
oculto



*Columba Sylvestris*



*Columba Cypria*



*Turtur Indicus*



*Alchata siue Filacotona*



*Turtur*



*Columba domest:*



*Columba  
hirsutis pedibus  
maior*

*Columba Cypria*




*Columba Liua*



*Oncas seu Umago*



*Turtur*



*Columba Cypria*



*Columba domestica Varius*












*Fringilla*



*Turtur*



*Montifringilla*



*Chalcandra*



*Alauda non cristata*



*Ficedula*



*Ficedula Canadensis*







*Passer*

*Passer*

*Passer stultus*

*Passer montanus*

*Passer domesticus*

*Passer  
Canarius*

*Passer Sylvestris*

*Passer Solitarius*

*Passer  
domesticus alius*

*Passer flauus*

*Passer*

*maculatus*

*Passer montanus alius*

*Pa. Albicilla*

*Passer albus*

*Passeris Species*

*Passerculus*

*Brachyurus*








*Passeres Indici*



*Eritra melana Indica*

*Passer Indicus*



*Passer Indicus alius*

*Embriza alba*



*Embriza prateusis Fœminæ*



*Emberza prateusis mas*



*Emberza*









*Carduelis*

*Emberiza pratensis*

*Prunella*

*Linaria Rubra*

*Linaria*

*Fringilla Finck*

*Henfling*

*Acanthides quercus  
Spinum et Ligurinum  
weat*

*Fringilla Montana*

*Citrinella*

*Chloris*

*Carduelis nias*

*Serinus*

*Ligurinus alius*

*Fringilla alia*

*Carduelis ciliis albis*

*Canaria*

*Fringilla  
subluta*










*Canothraustes Indica*



*Canothraustes*




*Linaria*



*Alauda Cristata*



*Linaria*



*Alauda*



*Carduelis*



*Ligurinus*



*Ligurinus Spurius*



*Chloris seu fringilla Viridis*



*Turdus*



*Hortulanus*









*Montifringilla Congener*



*Montifringilla mas*



*Linaria alia*




*Linaria rubra*



*Linaria marina*



*Guntel*



*Alauda Cristata*



*Alauda*



*Alauda Cristata*



*Alauda Cristata*



*Alauda pratensis*



*Alauda Congener  
Cum loto Aethiopica*



*Chloris sylvestris*



*Calandra  
alauda maxima  
Calandei*



*Lutea mas*




*Lutea sen Cirulus  
femina*



*Citrinella*










*Turdus simpliciter*



*Turdus Viscivorus*



*Turdus leucocephalus*



*Merula*



*Merula fœmina*



*Merula mas*



*Merula alba et nigra*



*Passer solitarius  
fœmina*



*Passer solitarius  
mas*



*Merula torquata  
fœmina*



*Merula torquata mas*



*Merula Congener*











*Merula*




*Merula Rosea mas seu,  
Sturnus marinus*



*Merula apus Indica*



*Merula Braslica*



*Carijocatacte*



*Sturnus vulgaris*



*Sturnus Capite albo.*



*Sturnus*




*Sturnus Cinerous*




*Sturnus pullus*







*Picus Varius Minor*



*Picus Maximus niger*




*Picus Viridis*



*Picus Maior*




*Picus Murarius*



*Picus Viridis Maior*



*Picus nidum Suspindit*  
Widwal Bijnolt Goldmerle



*Picus Cingens*




*Picus Varius*



*Picus Luteus*  
Gyanopus



*Picus Chlorio Indicus*









*Iynx Congener*




*Iynx sen Troguilla*



*Regulus*

*Certhia*



*Passerculus Troglodytes*



*Merops Congener*



*Merops*

*Passer Troglodytes Armeniacus*



*Asylus*

*Hirundo Riparia*

*Hirundo Agrestis*  
*Spür Schwalb*



*Passer Troglodytes Bellonij*

*Hirundo Domestica*

*Upupa*



*Apus*











*Picus Cincereus*



*Pica Glandaria*  
Genus




*Acanthis*



*Pica Glandaria*



*Parus*  
*Sylvaticus*



*Rubecula*



*Auripennis*  
*Carduelis species*




*Ruticilla*



*Rubicilla*



*Collurio seu Lantarius*



*Motacilla*



*Pica Glandaria*



*Parus Major*







*Parus Cereuleus minor*

*Parus Major*

*Parus ater*

*Parus sylvaticus*

*Parus Palustris Kolmeiß Aeschmeiß*

*Parus Cristatus*

*Parus Caudatus*

*Motacilla alba*

*Motacilla flava*

*Sipolla*

*Motacilla mas*



*Stiparola*

*Borin Genua*

*Sipolla alba*

*Boarina*

*Stiparola*











*Muscipeta*



*Rubecula seu Phœnicurus*



*Rubetra seu Batos*



*Rubetra Belloni*



*Pyrhulas*



*Anthus*



*Cauncuarola Haufrotelein*



*Rubecula seu Phœnicurus Rotzager Rotfchwentzelein*



*Phœnicurus alter*



*Hypoclaïs seu Carruca*



*Luscinola*



*Oenanthe*



*Luscinia*



*alia Ficcdula siue Atricapilla*



*Atricapilla s. ficcdula*







*Onocrotalus Fœmina*

*Onocrotalus sine Pelicanes*

*Pelicanus sine Platæ*

*Larus Maior*

*Diomedea Aris*

*Larus Cinerens*

*Larus albus*

*Larus Piscator*

*Larus Minor*

*Larus*

*Marina  
Hirundo*


*Larus Niger*











*Ceyphus*



*Catharacta*



*Anser Bassanus*

*Phalacrocorax*



*Corvus  
Syluaticus*



*Graculus palmipes*



*Corvus aquaticus*



*Mergus Rheni*



*Mergus Glacialis*



*Mergus Longirostrus*



*Mergus  
Marinus*



*Mergus Bellonij*



*Albulus aquaticus*







*Colymbus Maior*  
*Bellonii*

*Colymbus Maior*

*Coruza*

*Mergus*

*Bellon*

*Colymbus Minor*

*Cygnus*


*Anosetta Italor.*

*Cygnus*

*Capricalea*

*Anser ferus*

*Brenta*



























*Ardea stellaris  
altera*



*Ardea stellaris  
major*



*Ardea Quaiotta*



*Facinellus*



*Ardea nigra*



*Ardea alba*

*Anis pugnax*



*Anis pugnax*



*Facinellus anis Falcata*




*Arquata seu Numerius*












*Alcedo Vocalis*

















*Grus Balearica*



*Grus mas*



*Grus Lapponensis*




*Grus Crispa*



*Grus Balearica  
Femina*




*Ausfelta Species*












*Monucodiata Aldr.*




*Monucodiata Aldr.*




*Manucodiata longa*




*Paradisea anis  
Maioris generis  
Clus*



*Rex animum Paradisea  
rum Clus*









*Pua Brasi.  
alia*



*Altera Xochi*

*Pica Braslica Toucan.  
Xochitenacatl*



*Emeu Clus*



*Emeu*



*Aufer Magella:  
nicus*



*Mergus arti:  
Clus*



*Gallus peregrinus  
Clus*

*Cygnus Cuculat*



*Ourissia. S. Tomiucio*

*Skua*

*Hoieri*









*Iacana*



*Curicaca, Numenius*  
*Indicus Clus*  
*Ardea species*




*Iupuiuba*



*Gallina Africana*



*Tyepiranga*



*Ibion Noitibo*



*Guira tangeima*



*Guira Guainumbi*



*Iaguacati*



*Mituporanga*










*Mitu Mutu*



*Mituporango*



*Iacupema*



*Guara*

*Ibiau magni:  
tudine noctue*



*Matutui*



*Guira  
querea*




*Soco*



*Guainumbi*



*Iacurutu*



*Iamacaj*



















Curucui

Tangara



Guiragua Cubersby



Atingacucumucn



Tyegua Cuparoara



Guiracaan  
gatarara




Pilangva gnacu

Pullus galli  
Naceus Monstrosu.



Aracari



Anhinga

Matuitui



Ipecali Apoa










*Uruba*



*Macuncagua*



*Cocoi ardeæ species*



*Caracara*



*Anhima*




*Ardeala*



*Tangara*



*Virebitinga*



*Guiraiouou*









*Phoenix*



*Pelicanus*



*Harpia*



*Griphus*







MUSEUM  
BRITAN  
NICVM















